00087903

THE
ASIATIC SOCIETY OF BOMBAY
Town Hall, Bombay.

Digitized with financial assistance from the
Government of Maharashtra
on 18 July, 2018

ANNALES

DES

SCIENCES NATURELLES

COMPRENANT

LA ZOOLOGIE, LA BOTANIQUE,
L'ANATOMIE ET LA PHYSIOLOGIE COMPARÉES DES DEUX RÈGNES,
ET L'HISTOIRE DES CORPS ORGANISÉS FOSSILES;

87903

RÉDIGÉES

POUR LA ZOOLOGIE

PAR MM. AUDOUIN ET MILNE EDWARDS,

ET POUR LA BOTANIQUE

PAR MM. AD. BRONGNIART ET GUILLEMIN.

Y85

Seconde Série.

Vol XV

TOME QUINZIÈME. — ZOOLOGIE.

MTe 20

PARIS.

FORTIN, MASSON & C^ie^, LIBRAIRES-ÉDITEURS,
PLACE DE L'ÉCOLE-DE-MÉDECINE, N. 1.

1841.

00087903

ANNALES

DES

SCIENCES NATURELLES.

PARTIE ZOOLOGIQUE.

Note *sur quelques espèces de l'ordre des* Acariens,

Par M. P. Gervais.

Diverses recherches, auxquelles je me suis livré pour répondre à la bienveillante invitation que m'avait faite M. Walckenaer de l'aider dans la rédaction de quelques chapitres de son Histoire naturelle des Aptères, m'ont fourni, sur plusieurs groupes de ces animaux, les Scorpions, Faucheurs, Acariens, Myriapodes et Hexapodes aptères, des renseignemens inédits que je publierai successivement par extraits.

Dans cette première notice, je parlerai de quelques espèces de l'ordre des Acariens. Les travaux de Degeer et Hermann, ceux plus récens de Dugès, imprimés dans ces Annales, et de M. Koch, ont considérablement augmenté nos connaissances en Acarologie ; mais, bien que les espèces admises dans cet ordre s'élèvent aujourd'hui à plusieurs centaines, il est encore aisé de s'en procurer qui soient à-la-fois nouvelles et intéressantes par les modifications que leur étude apporte dans la classification de ces animaux. Celles que je vais signaler appartiennent aux trois familles des Scires, des Gamases et des Cirons.

§ 1. Scires.

Cette petite famille est la moins nombreuse de toutes : elle n'en a pas moins été partagée en trois genres par M. Heyden dans le travail, malheureusement resté sans développement, qu'il a publié, en 1828, dans l'*Isis*. Le principal caractère de chacun de ces genres est tiré du nombre des yeux, ce qui a été imité, principalement par M. Ehrenberg, pour plusieurs groupes fort différens d'animaux inférieurs.

Ces genres sont :

1° Cunaxa Heyden; *Scirus*, Dugès, Annales des Sciences naturelles, 2e série, 1834. t. II. p. 42. — Deux yeux.

2° Cyta Heyden. — Trois yeux. Ex. Le *Sc. latirostris* Herm.

3° Bdella Heyden; Dugès, *loc. cit.* — Quatre yeux.

Si l'importance caractérisque attribuée ici au nombre des yeux était admise, on devrait établir une coupe générique nouvelle pour chacune des deux espèces de Scires dont je vais parler, puisque l'une m'a présenté six yeux en trois paires, et que l'autre m'a paru dépourvue de ces organes.

Celle-ci, que je nommerai Scirus obisium (1), est fort petite et surpasse à peine un tiers de millimètre en longueur. Je l'ai trouvée à Paris, vivant avec plusieurs autres Acariens, dont je parlerai ailleurs, dans les petits graviers dont le sol des caves est couvert : elle est de couleur orangée claire et presque transparente. Son dos est un peu plus foncé, et de chaque côté du corps naît une grande soie. Une paire de soies analogues, mais de moindre dimension, part en dessus, de la base du rostre. Les palpes sont terminés en crochets simples ; et ils jouissent d'une grande mobilité. Le petit animal les agite sans cesse pendant sa marche, les rapprochant vers son corps, ou les portant en avant, selon les circonstances, ce qui lui donne une certaine ressemblance avec diverses Pinces (Obisies et Chélifères), dont il

(1) Planche 2, fig. 1.

, du reste, tout-à-fait les allures. Son corps est à peine velu, et es pattes ne le sont elles-mêmes que très peu.

L'autre espèce (1) est plus grande et de la taille du Scire commun (*Sc. longicornis*). Je l'appellerai SCIRUS HEXOPHTHALMUS, à cause du caractère dont j'ai déjà fait mention. Son corps et ses pattes sont d'un jaune orangé uniforme, le rostre et l'extrémité des pattes passant au rougeâtre. Les six yeux sont d'un rouge carmin. Auprès des deux postérieurs naît une soie assez courte. Les pattes sont velues. J'ai trouvé l'individu unique que j'aie encore vu de cette espèce dans les prés de Gentilly, près Paris.

§ II. GAMASES.

L'espèce de Gamasiens que j'ai fait figurer (2) appartient au genre DERMANYSSUS de Dugès et mérite surtout d'être signalée à cause de son genre de vie. La plupart des Dermanyses connus vivent sur des Oiseaux. Dugès en décrit un qui vit sur la Chauve-Souris murine (*Vespertilio murinus*) : celle-ci est parasite de la Pipistrelle et se répand à la manière des Ptéroptes sur la partie membraneuse des ailes de cet animal, tandis que le *Caris* de Latreille, observé depuis par M. Audouin, s'enfonce sous les poils du corps et se fixe à la peau au moyen de son rostre et de ses palpes. Le *Dermanyssus pipistrellæ* (Pl. 2, fig. 3) a environ un millimètre de longueur pour le corps, et il est plus petit que le Caris, dont on ne connaît encore que le jeune âge, Il est ovalaire, allongé, fauve, avec une teinte plus foncée sur la partie postérieure du dos, ce qui tient au sang dont son estomac est gorgé. Ses poils, médiocrement longs, sont peu serrés, plus longs au bord postérieur qu'ailleurs; les pattes en ont aussi, et les palpes sont terminés en pointe.

§ III. CIRONS.

Les Cirons, qui comprennent les Sarcoptes ainsi que les acaris, auxquels Dugès laisse en propre le nom d'Acariens,

(1) Planche 2, fig. 2.

(2) Planche 2, fig. 3.

forment plusieurs genres. Le naturaliste que nous venons de citer en admet trois : *Acarus*, *Sarcoptes* et *Hypopus*. M. L. Dufour vient d'étudier celui-ci de nouveau, et il établit dans la même famille celui des *Trichodactylus*. C'est encore aux Cirons qu'appartient le genre *Myobia*, Heyden, reposant sur le *Pediculus musculi* et celui de *Glyciphagus* Hering (*Nova acta nat. curios.* t. XVIII, p. 619).

Ce dernier est assez voisin des véritables *Acarus* Dug., dont il peut être distingué par l'absence d'épines à la base des pattes et parce que le corps n'est pas séparé transversalement en deux parties, correspondant aux deux faisceaux de pattes. A ce genre paraît se rapporter l'espèce que M. Hering décrit comme un Sarcopte sous le nom de *Sarcoptes hippopodos*. Nous avons reproduit (Pl. 2, fig. 4) la figure qu'en a donnée ce naturaliste.

M. E. Rousseau nous a remis vivant un petit Acarus, trouvé dans les plumes d'un Grand-Duc (*Strix bubo*), mort à la Ménagerie (Pl. 2, fig. 5). Ce sera le *Glyciphagus cursor*. Son corps présente quelques poils assez grands et qui paraissent frangés, si on les observe à un grossissement assez considérable. Le bord postérieur du corps présente un petit tube saillant, analogue à celui des autres Glyciphages, et les pattes sont simples et bien complètes, à tarses multiarticulés, ce qui est encore un caractère des animaux de ce genre. Les mandibules sont en pinces didactyles, caractère que présentent aussi les autres Cirons. Le corps a un millimètre de longueur.

On trouve aux galeries d'anatomie comparée, dans les cavités et sous les cartilages ou les épiphyses des os de beaucoup de squelettes, des Acariens fort semblables à ceux dont il vient d'être question, et peut-être de la même espèce.

Les figures des Sarcoptes de la gale de différens Mammifères; données par M. Hering, suffiraient pour démontrer que tous les animaux qu'on a rapportés aux Sarcoptes ne sont pas du même genre. Outre celui des pieds du cheval, *Sarcoptes hippopodos* qui paraît devoir rentrer parmi les Glyciphages, il semble que l'on devra aussi séparer génériquement du Sarcopte de l'homme, les *S. Equi*, décrits par Degeer, *Cynotis* Hering, qui est figuré d'après un jeune individu; *Ovis* Hering, et *Cati* Hering, qui ont

pour caractère d'avoir au moins une des deux paires de pattes postérieures complète et caronculée, l'une et l'autre ou une des deux seulement portant de longues soies. Dans les *Sarcoptes hominis* et *rupicapræ* Hering, les pattes des deux paires postérieures sont rudimentaires, sans tarse, sans vésicules et sétigères. A ce second groupe, auquel resterait en propre le nom de *Sarcoptes*, tandis que le premier prendrait celui de *Psoroptes*, se rapporte aussi l'espèce de gale du Chameau, déjà connue par ses effets et l'ardeur des démangeaisons auxquelles sa présence donne lieu, mais non encore représentée. Nous avons fait figurer comparativement les *Psoroptes equi*, *Sarcoptes hominis* et *S. dromedarii* (1). Nous nous sommes procuré ce dernier dans les croûtes psoriques d'un Dromadaire nouvellement envoyé d'Afrique au Jardin-du-Roi, et qui fut abattu dès qu'on eût constaté qu'il était atteint de la gale. Les figures des Acarus de l'homme et du cheval sont également faites d'après nature vivante. Aucune ressemblance n'existe entre le parasite des chameaux et celui du cheval, tandis que le premier, au contraire, ressemble assez à celui de l'homme pour qu'on le confonde avec lui, si on l'examine avec peu d'attention. On pourrait même supposer que c'est à cette similitude d'organisation qu'il doit de pouvoir passer si facilement de l'animal auquel il est particulier sur le corps de l'homme, et de transmettre avec la plus grande facilité la maladie de l'un à l'autre. Toutefois, lorsqu'on étudie comparativement les deux Sarcoptes en question et avec un assez fort grossissement, on ne tarde pas à remarquer entre eux des différences assez importantes pour les faire séparer spécifiquement. La forme est à-peu-près la même; mais le Sarcopte du Dromadaire est un peu plus allongé que celui de l'homme; les tubercules papilliformes du dos n'ont pas tout-à-fait la même disposition; le poil bilatéral est plus grand et plus reculé dans l'espèce de l'homme, et, au lieu que la paire intermédiaire des poils postérieurs soit la plus petite, elle est, au contraire, la plus grande. La face ventrale présente aussi des caractères distinctifs. Le collier est plus nettement séparé dans le Sarcopte de l'homme, et il envoie inférieurement une pointe

(1) Planche 2, fig. 6, 7 et 8.

aciculiforme, qui n'existe pas dans l'espèce parasite du Dromadaire. Il y a aussi une différence aux épines de la base des deux paires de pattes postérieures : elles sont inégalement bifides dans la seconde espèce et simples au contraire dans la première. Ajoutons que le Sarcopte de l'homme est plus petit que l'autre, ce qui est sans doute une des raisons pour lesquelles celui-ci, lorsqu'il attaque l'homme, détermine des douleurs plus insupportables que l'autre, qu'il surpasse à-peu-près d'un quart en grosseur.

EXPLICATION DES FIGURES DE LA PLANCHE 2.

Fig. 1. *Scirus obisium.* — 2. *Sc. hexophthalmus.* — 3. *Dermanyssus pipistrellæ.* — 4. *Glyciphagus hippopodos*, d'après M. Hering. — 5. *Gl. cursor.* — 5 *a.* Un de ses poils très grossis. — 6. *Psoroptes equi.* — 7. *Sarcoptes dromedarii.* — 8 *Sarcoptes hominis.* — 8 *a.* Une de ses pattes postérieures. — 8 *b.* Une de ses pattes antérieures.

SUR *quelques points de l'organisation des Limules, et description plus particulière de leurs branchies* (1),

Par M. G. L. DUVERNOY.

(Mémoire lu à l'Académie des Sciences, le 17 septembre 1838.)

L'étude comparée et approfondie de l'organisation est la source la plus féconde des connaissances qu'il soit donné à l'homme d'acquérir sur les êtres qui jouissent de la vie. J'en ai manifesté la conviction déjà en 1799, lorsque je me décidai à soumettre au jugement du public mon premier essai, ayant pour titre : *Réflexions sur les corps organisés et les sciences dont ils sont l'objet.*

(1) Ce Mémoire n'a encore été imprimé que par extrait (dans le Compte rendu de la même séance), du moins pour la première et la seconde partie, et sans les figures. Ces motifs et celui qu'il renferme plusieurs points importans sur l'organisation des Limules, qui étaient absolument inconnus ou méconnus, à l'époque de sa lecture à l'Académie, ont fait espérer à l'auteur que les deux premières parties de ce travail auraient encore assez d'intérêt pour être insérées dans les Annales, malgré les vingt-huit mois, et plus, qui se sont écoulés depuis cette lecture.
(*Note du 25 janvier 1841.*)

Une expérience de bientôt quarante années n'a fait que me confirmer dans la justesse de cette proposition, à l'appui de laquelle j'ai payé mon tribut à la science, toutes les fois que les circonstances et ma position m'ont permis de le faire.

Le nouveau travail que je prends la liberté de communiquer aujourd'hui à l'Académie, contribuera peut-être à lui faire juger favorablement cette pensée, qui a été celle de toute ma carrière scientifique.

Qu'on se garde d'en conclure cependant que je prétende expliquer par l'organisation tout le mystère de la vie; qu'on se garde surtout de m'accuser de vouloir trop la matérialiser.

Mais, parmi les phénomènes variés, qui apparaissent dans les êtres vivans, il y en a qui dépendent d'affinités chimiques, que je signalai sous la dénomination d'*affinités vitales*, dans le premier travail que je viens de mentionner. Il en est d'autres de physique mécanique, hydrostatique, acoustique, optique, électrique ou galvanique, qui s'expliquent par les lois des sciences physiques, auxquelles l'anatomie démontre que les machines organiques sont merveilleusement adaptées.

Quant aux phénomènes purement vitaux, on les observe, on étudie leur succession, leur liaison, sans pouvoir les expliquer. L'essentiel, dans cette étude difficile, est de bien analyser les uns et les autres et de ne pas les confondre.

L'à-propos de ce préambule, pour lequel je demande grâce à l'Académie, se trouve dans le désir bien naturel de montrer sous leur véritable point de vue, et de faire apprécier à leur juste valeur, les travaux auxquels une existence active, qui s'avance rapidement vers son terme, a été en partie consacrée.

J'en viens au sujet de mon mémoire, que j'ai divisé, pour plus de clarté et de précision, en trois parties: la première *historique*, la seconde *descriptive*, et la troisième *théorique*.

I. PARTIE HISTORIQUE.

Les *Limules* forment un genre anormal d'animaux articulés, dont la place n'a pas été tellement bien assignée dans les cadres

de la méthode naturelle, qu'on ne puisse en contester l'exactitude ou la justesse.

On regarde généralement ce genre comme appartenant à la classe des Crustacés; cependant certains caractères, tels que l'absence des antennes, la forme des mandibules, celle des pieds mâchoires, la nature cornée du test, etc., les rapprochent des Arachnides, avec lesquels M. Straus-Durkheim a proposé de les placer. Latreille les désignait, long-temps auparavant, sous le nom de *Crustacés arachnides*, pour indiquer ces rapports (*Dictionnaire d'histoire naturelle*, articles *Entomologie* et *Limule*). Linné les classait parmi les Insectes *Aptères*, entre son genre *Cancer* et son genre *Oniscus*.

Dans le tome IV du *Règne animal*, rédigé, comme l'on sait, par Latreille, ils forment la première famille, celle des *Xyphosures*, de l'ordre des *Pœcilopodes*, le second de la sous-classe des *Entomostracés* et le dernier de toute la classe; mais l'autre famille de cet ordre se compose d'animaux parasites, qui n'ont pas de rapports avec les Limules, ainsi qu'on l'a judicieusement remarqué. (1)

Le même auteur avait évité cet inconvénient dans ses familles naturelles, en plaçant dans un ordre distinct le genre *Limule*, sous ce même nom de *Xyphosure*.

Lamarck en a fait une division de ses *Branchiopodes*, première section de son ordre des *Crustacés hétérobranches*.

M. Milne Edwards, dans le premier volume de son *Histoire naturelle des Crustacés*, qui a paru en 1834, établit, en faveur du genre *Limule*, une troisième sous-classe de Crustacés, toujours sous le nom de *Xyphosures*, qu'il distingue des deux autres sous-classes (celles des *Crustacés maxillés* et des *Crustacés suceurs*) *par une bouche conformée pour la mastication, mais dépourvue de mandibules et de mâchoires proprement dites, et entourée de parties ambulatoires, dont la base tient lieu de mâchoires*. Ce savant a reproduit tout récemment (en 1838) cette même classification dans ses additions à la nouvelle édition de Lamarck sur

(1) Entre autres M. Milne Edwards dans le tome V de la nouvelle édition des *Animaux sans vertèbres*, par Lamarck, page 218.

les *Animaux sans vertèbres* (et spécialement aux pages 165 et 218 du tome V).

Les dénominations génériques de ces animaux n'ont pas moins varié que leur place dans les cadres de classification.

Linné les réunissait dans son grand genre *Monoculus*, nonobstant leurs deux yeux à facettes, entre lesquels sont plusieurs yeux lisses.

O. F. Müller les confondait avec les *Apus*, sous la dénomination de *Limulus*.

Gronovius est le premier qui les ait séparés dans un genre particulier, auquel il donna le nom de *Xyphosura*.

Fabricius adopta le nom générique de *Müller*, au lieu de prendre celui plus ancien de *Gronovius*.

Lamarck lui substitua celui de *Polyphemus*, que Linné avait choisi pour désigner l'espèce unique connue de son temps; mais c'est le nom de *Limulus* qui a prévalu et qui est généralement adopté.

Les espèces peu nombreuses de ce genre singulier sont répandues dans le littoral des mers de l'Asie méridionale et orientale et dans une grande étendue de côtes du continent ou des îles de l'Amérique. Vieillot a observé le *Crabe-Tortue*, c'est ainsi qu'il appelle le *Limule géant*, depuis New-York jusqu'en Caroline. Il pense que cette espèce existe plus au sud et plus au nord. Cette opinion était fondée. D'autres voyageurs l'ont trouvée, en effet, dans le golfe du Mexique, etc.

Bosc et Vieillot (1) l'ont observée en grand nombre sur les rivages sablonneux de la Caroline, où il s'enfonce dans le sable humide, lorsque la mer se retire. (2)

(1) *Histoire naturelle des Crustacés*, par Latreille, tome IV, pages 85 et 86, édition de Buffon, dite de Sonnini, et l'article *Limule* du *Dictionnaire d'histoire naturelle*, par le même.

(2) Cette espèce était commune sur les côtes de la Virginie, lors de la découverte de cette contrée par les Anglais, en 1595. On en voit deux figures, assez bien faites et très reconnaissables, dans la planche de l'expédition de Richard Grenville et W. Ralegh, qui représente la manière de pêcher des habitans. Ce Voyage fait partie de la célèbre collection des Voyages du libraire-éditeur Dieterich-Debry, qui a paru à Franckfort-sur-le-Mein, en 1600. Dans les deux figures que je viens de citer, les feuillets qui distinguent la dernière paire de pieds y sont représentés étalés. La paire antérieure est didactyle, ce qui caractérise les mâles de cette

Je ne m'arrêterai pas à en déterminer, ni à en caractériser les espèces. Ma correspondance avec M. Van der Hœven, professeur à Leyde, m'ayant appris que ce savant était occupé de ce travail et qu'il en publierait incessamment les résultats (1). L'espèce que j'ai eu l'occasion d'observer plus particulièrement est le *Limulus polyphemus* de Latreille (2), le *Polyphemus occidentalis* de Lamarck.

Le musée de Strasbourg en avait reçu, il y a deux ans, un exemplaire femelle dans le plus bel état de conservation, par les soins de M. Ackermann, chirurgien-major de marine, dont le zèle pour l'histoire naturelle et l'expérience des plus périlleux climats, ne demanderaient qu'à se soumettre, pour l'avancement de la science, aux épreuves de nouveaux dangers.

L'anatomie des *Limules* est encore très incomplète.

M. Cuvier avait donné, dans la première édition des leçons (t. III, 1805), une description remarquable de l'appareil buccal dont M. Savigny a déterminé plus tard les diverses parties, comparativement à celles des autres animaux articulés.

M. Strauss a communiqué quelques notions sur la disposition générale de leur système nerveux à Latreille, qui les a publiées dans le *Règne animal* (t. IV, p. 187).

On trouve, dans cette même page, une description abrégée du cœur, de tout le canal alimentaire et de ses annexes, et quelques mots sur les ovaires et les testicules, d'après M. Cuvier. Latreille indique, dans ce même article, les deux yeux composés et les deux yeux lisses de ces animaux; il y fait connaître que

espèce ; ou bien cette circonstance et celle de la grande proportion de cette première paire de pieds, l'inégalité des doigts des paires moyennes et les dentelures du stylet caudal indiqueraient-elles une espèce encore indéterminée? (*Note ajoutée après la lecture.*)

(1) Ils ont paru dans une très intéressante Monographie ayant pour titre : *Recherches sur l'histoire naturelle et l'anatomie des Limules*, Leyde, 1838. La note 2 de la page 20 montre que cette date de 1838 doit s'entendre de la fin de cette année, et que l'impression de cette Monographie est postérieure à la lecture de mon travail. Je ne fais cette observation que pour confirmer ce que j'ai déjà imprimé dans la note 1 de la page 459 du tome VII des *Leçons d'anatomie comparée*, sur la simultanéité de nos observations. (*Note ajoutée après la lecture.*)

(2) Les figures 2, 3 et 4 de la Monographie de mon savant ami M. Van der Hoeven, ont été faites d'après l'exemplaire qui a servi à mes observations, figures que je lui avais envoyées pour cette Monographie, ainsi qu'il a eu soin de l'indiquer. (*Note ajoutée après la lecture.*)

leurs organes de génération intérieurs se voient à la face postérieure de la première paire de rames.

On trouve encore dans le vol. II, p. 2, des *Transactions philosophiques* de 1782, une description des yeux des *Limules*, par André.

J'ai moi-même fait connaître en détail (dans la nouvelle édition des *Leçons*, t. V, pages 236 et suivantes) l'appareil buccal et tout le canal alimentaire de ces animaux.

Il est singulier que les branchies, quoique placées à l'extérieur et faciles conséquemment à apercevoir et à décrire, n'aient été connues jusqu'à ce jour, que d'une manière incomplète ou inexacte, et que les ouvrages d'anatomie ou d'histoire naturelle même les plus nouveaux, n'aient fait que répéter à ce sujet la description publiée par Latreille, dans l'édition de Buffon dite *de Sonnini.*

Voici comment cette description est conçue : « Derrière cha« cune des cinq paires de feuillets, qui sont sous le second « bouclier sont cachées les branchies, qui consistent en un paquet « de petites fibres très nombreuses, concentriques, appliquées les « unes sur les autres. Ce paquet est épais au côté latéral exté« rieur, et finit en tranche au côté interne. Les branchies sont « ainsi au nombre de six, et peut-être de douze. » (1)

Cette description renfermait deux erreurs : la première, relative au nombre des branchies, dont il n'y a que cinq de chaque côté, dix en tout; la seconde, au sujet de leur structure, ainsi que nous l'expliquerons tout-à-l'heure. L'une et l'autre avaient disparu dans la première édition du *Règne animal*, qui est de 1817; à la vérité, cette dernière est reproduite dans le tome IV, pages 186 et 187 de la seconde édition, publiée en 1829. Elle a été copiée mot à mot par Meckel dans son *Système d'anatomie comparée* (2). Cependant je trouve dans les *Considérations générales sur la classe des Crustacés*, par A. G. Desmarest (un volume in-8, Paris, 1825, page 61), « que les Limules ont, « sous la seconde partie de leur test, cinq grandes lames trans-

(1) *Des Crustacés et des Insectes*, par Latreille, tome IV, pages 81 et 82.

(2) Tome VI, page 49, de l'édition allemande.

« verses ou pieds nageoires, unis par leur base et portant à leur « face postérieure un grand nombre de feuillets fins, empilés, « qui sont des branchies ». Ce peu de mots, copiés, à la vérité, de la première édition du *Règne animal*, tome III, p. 62, caractérisait exactement ces organes. Comment se fait-il que, dans l'exposition des caractères du genre *Limule* (page 533), le même auteur ait publié la description erronée qui représentait les branchies comme *composées de fibres très nombreuses, très serrées, appliquées presque concentriquement*, et que Latreille ait reproduit cette erreur dans la seconde édition du *Règne animal?* M. Cuvier aurait-il été l'auteur de la première bonne description, qui aurait été abandonnée en 1829 par Latreille, rédacteur principal de cette partie du *Règne animal?*

Le traité d'anatomie comparée de M. Carus, qui ne comprend guère que des indications sans description, à l'appui des vues ingénieuses de l'auteur, ne nous a rien offert de relatif à notre sujet.

Il en est de même des *Elémens d'anatomie comparée* de M. R. Wagner, dont le plan très abrégé, a dû également empêcher cet auteur recommandable d'entrer dans des détails descriptifs.

II. PARTIE DESCRIPTIVE.

La nécessité de conserver le seul exemplaire dont j'ai pu momentanément disposer, et le travail général que je viens de faire sur les organes de la circulation et de la respiration, pour les tomes VI et VII de la nouvelle édition des *Leçons*, m'ont fait diriger plus particulièrement mes recherches sur ces organes; mais, avant de les décrire, je crois devoir revenir sur la détermination de l'appareil buccal et locomoteur de ces animaux.

A. *Idée générale des appendices qui se détachent du corps des Limules, pour remplir les diverses fonctions d'appendices préhensiles, masticateurs et ambulateurs, natateurs et générateurs, natateurs et respirateurs.*

PREMIER GROUPE. — *Appendices du premier bouclier.*

L'étude des divers appendices qui appartiennent plus particu-

lièrement à la bouche, dans les *Articulés condylopes*, comme Latreille les appelle, et la comparaison de leur structure et de leur composition, a pris un haut degré d'intérêt depuis que M. Savigny a démontré que les grandes différences apparentes des appareils de succion ou de mastication dans ces animaux, ne sont, au fond, que de simples modifications d'un même plan, que des changemens de forme, de dimension ou de proportions des mêmes parties; depuis que ce naturaliste profond a fait voir que, dans les *Crustacés* en particulier, certains de ces appendices, qu'il nomme pieds-mâchoires, se rapprochent de la bouche dans les *Décapodes*, pour remplir la double fonction qu'indique le nom qu'il leur a donné, ou s'en éloignent dans les *Izopodes*, pour ne plus servir qu'à la locomotion.

Ces rapports une fois saisis, il a été possible de comprendre les différences que présentent les *Crustacés*, les *Arachnides* et les *Insectes*, et plus particulièrement les Crustacés, dans leurs divers appendices, surtout dans ceux qui sont préhensiles, masticateurs ou locomoteurs.

On sait que le corps des *Limules*, comme celui des Stomapodes bicuirassés, est recouvert par deux grands boucliers. Dans les *Limules*, ces deux boucliers, de substance cornée, sont articulés l'un devant l'autre par une articulation médiane assez mobile.

Nous allons d'abord examiner rapidement les diverses sortes d'appendices qui répondent à ce premier bouclier. Ils appartiennent essentiellement à l'appareil buccal, quoique servant à d'autres usages.

Les *Limules* n'ont point d'antennes ou d'appendices tactiles articulés. Ce caractère négatif les rapproche des *Arachnides*, et les sépare des autres *Crustacés*, surtout de ceux de la première sous-classe, qui ont deux ou quatre antennes, dont les dimensions sont le plus souvent extraordinaires.

L'appareil buccal peut être justement comparé à celui des *Crustacés décapodes*, pour l'ensemble de sa composition, ou à celui des *Aranéides*, pour les modifications de forme de certaines de ses parties.

Cet appareil se compose : 1° D'une première paire d'appen-

dices préhensiles de petite proportion ; ce sont, pour la forme et l'usage, des mandibules de Scorpion.

M. Cuvier les avait décrites dans le t. III de la première édition des *Leçons*, qui a paru en 1805, comme des palpes bi-articulés, terminés en serre, portés par une lèvre supérieure (antérieure), prismatique.

Le plus grand et le premier des deux articles de ces mandibules a, en arrière, un crochet en forme d'anse, auquel s'attache son muscle rétracteur. Le second se prolonge, en dedans, en un doigt fixe, qui s'oppose à un doigt mobile, formant le troisième article de ce membre. C'est sur les côtés d'une sorte de chaperon, qui tient lieu de labre, que s'enfonce l'apophyse en forme d'anse, que nous venons de décrire comme appartenant au premier article.

2° On trouve dans cette même description, déjà citée, de M. Cuvier, des parties de la bouche des Limules, « que ces ani-« maux ont cinq paires de mâchoires, courtes, comprimées, « hérissées de petites épines, portant chacune un très grand palpe « en forme de pied à quatre articulations, terminé par une serre « semblable à celle des pieds de devant des écrevisses » (1). On voit que cette description s'appliquerait tout aussi bien, sauf les épines, à l'unique paire de mâchoires et au palpe qui les surmonte dans les Scorpions.

Je ne parle pas des différences que présente la terminaison de la première et même de la seconde paire de ces appendices, suivant les sexes ou les espèces (2) ; mais je dois remarquer ici que la dernière paire a une double hanche, dont l'intérieure supporte un article aplati, élargi en palette (3), comparable,

(1) Il faut remarquer que le doigt mobile est l'extérieur et que le doigt fixe est l'intérieur.

(2) L'espèce qui me sert d'exemple, le *Limulus polyphemus* Latr. a la première patte de ces appendices monodactyle dans le mâle ; mais c'est le doigt immobile de la pince, formé par un prolongement de l'avant-dernier article, qui manque, tandis que le doigt mobile subsiste, et que des muscles très forts le mettent en mouvement, à en juger par le grand développement de l'avant-dernier article, qui leur sert d'étui. C'est donc à tort que Latreille (*Règne animal*, tome IV, p. 186), dit que les pinces des pieds antérieurs sont dépourvues de doigt mobile. M. Van der Hoeven m'écrit que le *Limulus rotundicauda* a les pieds didactyles dans les deux sexes.

(3) *Leçons d'anatomie comparée*, deuxième édition, tome V, page 132, Paris, 1837.

suivant M. Savigny, au flagre des pieds-mâchoires des Crustacés décapodes.

3° C'est en arrière de cette dernière paire que se voient les deux lobes, bien séparés, qui répondent à la lèvre inférieure ou postérieure. Ces deux lobes sont dentelés comme des mâchoires, de forme et de dimension analogues.

Tous ces appendices entourent l'orifice buccal, grande fente longitudinale qui se voit en les écartant un peu.

Après la première paire, qui répond aux mandibules, il y en a cinq qui correspondent exactement aux trois paires de *pieds-mâchoires* et aux paires de *mâchoires* des Crustacés décapodes; mais, dans ceux-ci, la mastication est exercée par les mandibules, et les cinq appendices suivans ont été modifiés pour la préhension des alimens, pour palper les objets, pour provoquer et diriger des courans d'eau des branchies, ou pour fermer comme un couvercle, surtout dans les *Brachigastres*, l'orifice de la cavité branchiale. Il faut avoir saisi tous ces usages, ainsi que je les ai expliqués dans la nouvelle édition des *Leçons* (1), particulièrement ces derniers, pour comprendre l'arrangement, la forme et le nombre des appendices multiples qui composent l'appareil buccal des Crustacés décapodes.

S'ils sont très différens, sinon pour le nombre, du moins pour la forme, la composition et les proportions dans les *Limules*, c'est qu'ils ne sont plus masticateurs que par leur base (la hanche); qu'ils sont préhensiles par leur extrémité, et locomoteurs par le nombre, la mobilité et l'étendue de leurs articles.

Je ne crois pas devoir entrer ici dans des détails sur la composition et la forme de ces appendices, très bien décrits, ainsi que je l'ai déjà exprimé, par MM. Cuvier, Savigny et Latreille.

Si j'ai de nouveau rappelé dans cette partie de mon travail, ces différentes circonstances de structure, c'est qu'on y trouve une des plus intéressantes démonstrations que, dans les *Articulés*, en général, et dans les *Crustacés*, en particulier, tous les

(1) Tome v, pages 106 et 107. Voir encore, pour la composition et la comparaison des divers appendices des Crustacés, l'*Histoire naturelle des Crustacés*, de M. Milne Edwards, t. I, p. 41 et suiv. Paris, 1834.

appendices préhensiles, masticateurs, ambulatoires et natateurs, qui appartiennent à la face inférieure (abdominale) du corps, se transforment évidemment les uns dans les autres, suivant les ordres ou les familles; ce ne sont que des modifications d'un même plan.

C'est encore pour montrer que, dans les déterminations de ces appendices, il ne faut pas perdre un instant de vue une considération d'une aussi grande importance. Cette négligence conduirait à trouver des différences essentielles de composition, dans des cas où il n'existe que de simples modifications d'un plan unique, pour des usages particuliers.

J'applique immédiatement ces réflexions et ce principe aux *Limules,* dont les mandibules en forme de pince ne servent plus qu'à saisir des alimens et à les porter à la bouche, et ne peuvent plus les broyer, comme chez les crabes; et dont les appendices qui répondent aux mâchoires, dont on a nié l'existence, sont de véritables organes de mastication très énergiques, bien plus que chez ces derniers, où elles ont éprouvé de singulières modifications de formes pour le mécanisme de la respiration. Les mâchoires des Limules, au contraire, dégagées de cette complication de fonctions, extraordinairement multipliées d'ailleurs, puisqu'il y en a cinq paires, sont devenues, comme les mâchoires des Scorpions, de puissans moyens de mastication; tandis que l'extrémité des appendices dont elles forment le premier article, est un organe parfait de préhension, et que la mobilité et l'étendue de tous les articles de ce membre, en font un organe de progression sur le sol. Mais ce triple usage n'empêche pas qu'on ne puisse considérer cet appendice (organe) à fonctions multiples, comme une mâchoire, tout aussi bien que comme une pince, que comme un pied ambulatoire.

Deuxième groupe. — *Appendices du second bouclier.*

Il me reste à décrire six autres paires d'appendices locomoteurs, toutes modifiées pour la natation; la première sert encore de couvercle à l'appareil de respiration, et comme support

extérieur aux organes de génération; les cinq autres servent à-la-fois à porter et à protéger les branchies.

La première paire qui appartient, par ses adhérences et par ses muscles, autant au premier bouclier qu'au second, forme une sorte de diaphragme transversal, ou plutôt d'opercule, recouvrant en partie les autres paires, lorsqu'elle est couchée en arrière, dans l'état de repos. On voit à sa face postérieure, dans les femelles du moins, deux canaux saillans, qui descendent en se rapprochant de la ligne médiane, et se terminent vers le tiers inférieur de la hauteur de cette nageoire, par un assez large orifice. Ces canaux sont les oviductes extérieurs; nous les avons trouvés farcis d'œufs jusqu'à leur orifice. Cette première nageoire est formée de deux moitiés symétriques, composées de pièces cornées très aplaties, analogues à celles des cinq paires de nageoires suivantes; ces deux moitiés sont réunies par une peau molle formant un espace circulaire, que contournent de haut en bas les deux vagins.

Les rames suivantes, ou les nageoires branchiales, sont suspendues au fond d'une cavité triangulaire à sommet tronqué en arrière, creusée profondément sous le second bouclier.

Elles sont attachées sous la voûte de cette cavité par les muscles qui descendent de cette voûte sur la nageoire, et par une peau molle, continuation de celle qui répond à l'abdomen de ces animaux. Chaque nageoire est une large rame, en forme de cœur, disposée en travers, relativement à la longueur du corps, et composée de deux moitiés distinctes, séparées complètement dans leurs deux cinquièmes inférieures; mais réunies par leur trois cinquièmes supérieures, au moyen de cette même peau qui descend entre elles depuis leur bord adhérent et supérieur. Cette même partie a son bord inférieur libre et se prolongeant dans son milieu, en un long tentacule (*c*, f. 1 et 2, pl. 3) de même nature, qui forme comme une sorte de luette, flottant entre les deux portions détachées de cette double rame.

La portion inférieure de la nageoire que je décris, chargée plus particulièrement de remplir l'office d'organe de mouvement pour la progression dans l'eau, se compose de pièces cornées disposées en deux séries.

Il y en a trois dans la série interne; la supérieure et la moyenne sont triangulaires et l'inférieure est rhomboïdale (*d. e. t. i.*). Ce sont les plus grandes. Elles me paraissent correspondre à cette lame arrondie, très développée, s'appliquant contre le plafond de la cavité branchiale, que j'ai décrite dans les crabes (*Leçons d'anat. comp.*, t. IV. 1re part. p. 117), comme faisant partie du second appendice maxillaire

Les plus petites de ces pièces, au nombre de quatre, forment la série interne : la première répond à la hanche de cette sorte de membre, la seconde à la cuisse, la troisième à la jambe, et la quatrième tient lieu de doigt; elle compose avec les deux premières, la pièce triangulaire inférieure de la série interne et la pièce rhomboïdale, une double palette très mobile, qui est mise en mouvement par des muscles puissans que nous décrirons bientôt.

La partie branchiale de cette nageoire est la supérieure et la plus étendue.

Sauf la pièce triangulaire supérieure de la série externe des pièces cornées qui viennent d'être indiquées, et une série de douze petites pièces en carène, également de substance cornée, qui protègent son bord libre en ayant et en dehors, ainsi que l'artère branchiale qui suit ce bord, cette partie n'est composée que d'une peau molle, analogue à celle de l'abdomen, ou bien à la peau (*l*, fig. 1 et 2), que nous avons dit réunir les deux rames correspondantes.

C'est à l'une des deux faces de ces rames, celle qui est supérieure, lorsque la nageoire est retirée dans sa cavité, ou postérieure, lorsque la nageoire est devenue verticale pour la natation et pour la respiration, que sont situées les branchies.

Tels sont les divers appendices des *Limules*. Les mandibules, ainsi que dans les Scorpions, sont devenues des appendices préhensiles seulement. De même que dans les *Aranéides* et dans les *Scorpions* en particulier, où l'on reconnaît cependant généralement une paire de mâchoires, les appendices maxillaires n'ont plus l'emploi de leur nom, que dans leur premier article; mais ce développement de leurs autres articles, et la forme des deux derniers, en font des appendices ambulatoires et

préhensiles. Ce n'en sont pas moins, en premier lieu, par leur position et par leur structure, des mâchoires très puissantes; et l'opinion qui considérerait ces animaux comme dépourvus de mâchoires, ne serait pas, à notre avis du moins, aussi exacte que celle que nous adoptons. Aucun animal n'en a autant; puisque même la lèvre paraît devoir aussi en faire les fonctions.

Quant aux appendices devant servir essentiellement à la progression dans l'eau, et à la respiration, nous reviendrons sur leur forme et leur composition, après avoir fait connaître les branchies.

B. *Des branchies.*

Les branchies ne sont pas des paquets de petites fibres très nombreuses, concentriques, appliquées les unes sur les autres, comme on l'a écrit et répété partout : elles se composent de larges feuillets membraneux, d'une minceur extrême, groupés en autant de séries distinctes (*b; b*, fig. 2, pl. 3) qu'il y a de branchies, au nombre de 150 à 160, et conséquemment de 15 à 1600 pour chaque individu. Les feuillets de chaque série, ou de chaque branchie, se recouvrent de haut en bas, de manière que le supérieur, ou le premier, est en même temps le plus intérieur, et que le suivant dépasse un peu le bord du précédent.

La forme de chacun de ces feuillets est celle de la moitié d'un ovale ou d'un cœur, dont la partie la plus large serait dirigée en dehors (fig. 3). Les derniers cependant sont semi-circulaires. Leurs dimensions varient de manière que les premiers sont aussi les plus petits, et qu'ils vont en augmentant, ou du moins en conservant la plus grande dimension, jusqu'au-delà du 130e; à partir de l'avant-dernière dizaine, ils diminuent un peu jusqu'au dernier, qui conserve cependant une dimension beaucoup plus grande que le premier.

Afin de pouvoir résister à l'action de l'eau sans changer de forme, sans faire de plis, ces feuillets, au lieu d'être doublés par une lame cartilagineuse ou osseuse, comme ceux des branchies des poissons, sont soutenus dans tout leur bord libre par un filet corné qui le cercle, pour ainsi dire, et le distend. Ce

filet est un peu plus fort dans la portion de ce bord qui reste toujours extérieure ; ce qui contribue, avec la forme et les lignes d'attache des feuillets, à produire cette plus grande épaisseur que présente leur série de ce côté, et qui avait déjà été remarquée par Latreille. Ce même bord libre est cilié ou hérissé de soies protectrices dans toute son étendue, mais plus fortes et plus nombreuses dans sa partie antérieure. Ces soies ne diffèrent pas, en apparence, de celles qui se voient sur les deux surfaces des pièces cornées, formant la partie essentiellement motrice de cette rame branchiale. (1)

Chaque feuillet branchial est composé d'une double membrane, interceptant une sorte de poche, à cavité très divisée par des adhérences partielles et nombreuses de ces deux lames.

Il en résulte, surtout dans un espace ovale (*p, p,* fig. 3 et 4) de la partie centrale de chaque feuillet, une sorte de réseau dont le cordon est formé de canaux s'anastomosant fréquemment entre eux, soit immédiatement, soit par des branches latérales plus petites ; les apparences de mailles de ce réseau répondant aux adhérences que nous venons d'indiquer. Ces mêmes canaux forment des arcs concentriques transverses, parallèles au bord libre, et paraissant s'anastomoser moins fréquemment hors de cette partie centrale, qui semble plus essentiellement respiratrice. Ils sont plus ou moins remplis, après la mort, de sang blanc, grumelé, semblable à celui que j'ai trouvé dans les sinus veineux et dans le cœur ou le vaisseau dorsal des Squilles. Les branchies comme les rames branchiales sont au nombre de cinq paires.

On peut juger par le nombre des feuillets qui composent chaque branchie et par l'étendue de leur surface, combien cette fonction doit être importante dans les *Limules*.

Je dois faire observer ici que la structure qui vient d'être décrite est semblable, pour l'essentiel, à celle des branchies des Crabes ou des Décapodes brachigastres, et de tous les Macro-

(1) Ces poils ont une forme et une structure remarquables, qu'on pourra voir dans les figures 5 *a*, *b*, *c*, *d*, et dont on lira la description avec l'explication de ces figures.

(*Note ajoutée après la lecture.*)

gastres, qui ont l'habitude de sortir de l'eau et de vivre plus ou moins long-temps à l'air, dans les plages humides et sablonneuses. La seule différence bien caractéristique, est qu'ici les feuillets sont arrangés sur deux rangs, tandis que dans les Limules ils sont disposés sur un seul rang. Le réseau de canaux que j'ai examiné plus particulièrement dans le *Crabe tourteau*, est plus serré et plus fin; mais il m'a paru résulter, au fond, de la même composition organique. Nous verrons, dans la partie théorique de mon travail, les conséquences à déduire de cette observation.

Le sang arrive des différentes parties du corps dans un sinus veineux qui répond à chaque branchie. L'artère branchiale descend le long du bord interne de la nageoire en diminuant à mesure de diamètre. C'est à l'extérieur de cette artère que se voient douze ou treize plaques cornées, la plupart en carène (fig. 1, *n*, *n*, *n*) qui la protègent. Le sang qui a respiré est versé, des feuillets branchiaux de chaque branchie, dans une veine située du côté opposé à l'artère; elle se continue vers le cœur, qui en reçoit ainsi cinq de chaque côté.

Pour terminer cette description des branchies, il ne nous reste plus qu'à faire connaître les muscles qui les mettent en mouvement. Ce sont proprement les muscles de la rame qui les supporte. Chaque moitié de cette rame, qui forme une nageoire distincte, a deux muscles, l'un *protracteur*, qui la déploie en la tirant en avant dans la direction perpendiculaire, et l'autre *rétracteur* ou adducteur, qui la porte en arrière et la relève, ou replie ainsi les branchies dans leur cavité.

1° Le premier, ou le *muscle protracteur*, s'attache en avant sous la ligne vertébrale du bouclier, en dehors des apophyses en forme de lames qui descendent de cette ligne. Il est considérable, et se divise en nombreux faisceaux qui se dirigent en rayonnant vers le bord intérieur de la rame et croisent la direction des feuillets, à la base desquels ils adhèrent; ils pénètrent même entre ces feuillets et les pièces cornées sur lesquelles ils se terminent. Il résulte de cette double attache que ce muscle, en portant énergiquement en avant la rame branchiale, déploie en même temps les feuillets branchiaux, en les écartant les uns des autres.

2° Le muscle *rétracteur*, moins considérable, se fixe en arrière, à la base des mêmes apophyses, et se porte de dehors en dedans, pour s'attacher à la partie interne de la nageoire et agir plus particulièrement sur la série du même côté des pièces cornées. On peut suivre sa direction à la face postérieure de cette partie, à travers la peau transparente qui la revêt.

Il existe un *troisième muscle*, on ne peut pas plus singulier, par la structure de son tendon.

On observe à la peau de l'abdomen, de chaque côté et au milieu de l'intervalle qui se voit entre deux paires de rames, un enfoncement très prononcé (*e, e*, fig. 1), qui est l'orifice assez large d'un tube conique dans lequel on peut facilement introduire un stylet jusqu'à environ deux centimètres de profondeur (1). Ce tube, en forme d'entonnoir, est un tendon creux, adhérent à une assez grande étendue de la peau de l'abdomen, par suite de cette singulière organisation, qui a sans doute pour but d'augmenter ses points d'attache. Il appartient à un muscle qui remonte, avec le *protracteur*, sous la voûte du second bouclier, et réunit ses faisceaux à ceux de ce muscle, pour se terminer aux apophyses descendantes de la ligne médiane dorsale de ce bouclier. Si la paire correspondante de ces muscles appartenant au même intervalle agissait isolément, elle devrait sans doute rapprocher les deux nageoires entre lesquelles elle se trouve, en tirant en avant la peau qui les unit, et en la raccourcissant d'avant en arrière; mais les muscles de tous les intervalles devant agir ensemble, leur action se balance et doit avoir un effet contraire, celui de maintenir les rames dans la direction perpendiculaire, et conséquemment dans l'abduction. Ce serait donc, si je ne me trompe, un *abducteur*, ou un *abaisseur des rames*.

(1) L'abbé C. Ranzani (*Osservazioni sul Limulo Polyfemo.* — Mémoire compris dans le recueil intitulé: *Opusculi scientifici*, Bologna, 1818) a vu cet enfoncement et pense, comme Clusius, qu'il cite, qu'il répond à de petits osselets, dont l'emploi est de soutenir les branchies. Ces prétendus osselets sont les tendons ossifiés que nous décrivons.

Clusius (*Exotic.* lib. VI, cap. 14) avait déjà trouvé ces tendons ossifiés: « Media prona « parte, sex lacunarum angustarum, quasi cultri mucrone impressarum bini ordines appare- « bant, quibus interna testa parte, totidem plana ossicula, veluti abruptarum costarum frag- « menta, respondebant. »

C. *Du cœur.*

Nous dirons aussi quelques mots de cet organe, dont la forme et la structure générale ont déjà été indiquées par M. Cuvier.

C'est un long canal, à parois très musculeuses, qui occupe toute la ligne médiane du second bouclier, au-dessus des deux séries de branchies.

Comme cela a lieu presque toujours, le principal organe de circulation est rapproché des organes de respiration, toutes les fois que ceux-ci sont localisés.

Il est recouvert d'un péricarde très remarquable par son grand diamètre, qui excède de beaucoup celui du cœur. On voit les veines branchiales au nombre de cinq paires, égal à celui des branchies, traverser l'intervalle qui existe entre le péricarde et le cœur, pour se terminer sur les côtés de ce long tube à des intervalles égaux.

Les parois du cœur sont très musculeuses; vues dans l'intérieur de cet organe, elles paraissent composées de faisceaux plats, se divisant dans différentes directions, et formant comme un treillis, sans intervalles.

L'artère principale sort de son extrémité antérieure, vis-à-vis la jonction du premier bouclier au second, et se continue suivant la ligne médiane du premier bouclier jusqu'au-delà de la bouche. Cette partie thoracique est encore entourée du péricarde. Elle se distingue de la première par un calibre un peu plus étroit; mais aussi par des parois beaucoup moins épaisses; de sorte que le vide de ce vaisseau dorsal thoracique, est plus grand que celui du vaisseau dorsal abdominal ou du cœur proprement dit.

Il se termine en avant par trois branches principales. Deux branches de chaque côté que nous regardons comme artérielles, se rendent du cœur aux deux moitiés de la nageoire génitale. En arrière, le cœur diminue rapidement de diamètre, au-delà des dernières branchies, et finit par une pointe effilée, formant un vaisseau artériel. A l'endroit où le cœur semble se changer ainsi en un vaisseau terminal, et où commence ce vaisseau, celui-ci donne

une branche artérielle, de sa face inférieure, qui se porte dans l'intestin.

Nous venons de voir que les *Limules* ont des branchies lamelleuses operculées, comme les Isopodes, et qu'elles ont, en même temps, de grands rapports avec celles des Crabes. Comme dans ceux-ci, ces branchies se composent d'un grand nombre de feuillets, qui retiennent facilement une lame d'eau entre eux. L'opercule branchial, dans ces Limules, est en même temps une nageoire, dont l'action paraît devoir être assez puissante, quand l'animal est dans le cas de s'en servir. Mais lorsqu'il est à sec, les cinq paires de nageoires rétirées, avec les branchies qu'elles supportent dans la cavité du second bouclier et racouvertes encore par la nageoire génitale qui est la plus grande, doivent conserver assez d'humidité sur ces branchies, pour permettre aux *Limules* de vivre hors de l'eau, comme beaucoup d'autres Lamellibranches, et d'avoir les habitudes des Crabes, en s'enfonçant dans le sable humide des plages maritimes.

Les récits des voyageurs sont, à cet égard, entièrement conformés aux déductions que nous tirons de cette structure et de ce mécanisme.

La structure des branchies que je viens de faire connaître dans les *Limules*, est un fait d'anatomie comparée d'une grande importance, soit pour l'explication des mœurs de ces animaux, soit pour leur classification, soit même pour conduire à une distribution naturelle de la classe. (1)

(1) Pour faire comprendre toutes ces conséquences, je renvoie à l'esquisse des principales différences que présentent, dans leur structure et dans leur mécanisme, les organes de respiration des Crustacés, formant la partie théorique ou la troisième de ce Mémoire (qui a déjà été imprimée dans le Compte rendu de la séance de l'Académie des Sciences, du 17 septembre 1838, tome VII, pages 611-616); et à la suite des mémoires sur les Crustacés, que j'ai lus à cette Académie dans le cours de l'année 1840, et dont les extraits ont été insérés dans les *Comptes rendus des séances*, t. X, p. 489 et suiv.; ibid. p. 921 et suiv.; t. XI, p. 217-220; ibid. p. 598; ibid. p. 881-894. (*Note ajoutée au moment de l'impression, janvier* 1841.)

EXPLICATION DES FIGURES DE LA PLANCHE 3.

Fig. 1. Deuxième paire de rames branchiales, vue par la face externe; cette face est inférieure dans l'état de repos, ou antérieure quand la rame est descendue dans la position perpendiculaire.

De (m) à (n), bord supérieur adhérent d'une paire de lames.

De (m) à (q) se voient en avant, le long du bord libre, une série de lames cornées, la plupart en carène, d'autres arrondies, qui se prolongent comme des côtes, mais dans la première paire seulement, sur la face externe de chaque rame. Ces lames protègent l'artère branchiale, qui contourne le même bord extérieur de la rame.

(d. e. f.) Pièces cornées de la rame, formant la série extérieure.

(g. h. i k.) Série interne des pièces cornées de la partie motrice de cette même rame.

(l.) Peau molle réunissant les deux rames correspondantes.

(c.) Tentacule qui descend du bord libre de cette partie mitoyenne.

(a.) Tendon du muscle abducteur droit de la seconde paire.

(o) Entrée de l'entonnoir que forme son canal.

(a') Muscle abducteur de la troisième paire, dont l'attache mobile est entre la deuxième et la troisième paire de rames.

Fig. 2. La même paire de rames, vue par sa face supérieure ou postérieure, celle qui supporte chaque branchie.

a. a sont les deux muscles *abducteurs* de la troisième paire, dont les tendons sont attachés à la peau, qui se voit dans l'intervalle de la deuxième à la troisième paire de rames branchiales.

(o. o.) Les deux embouchures de l'entonnoir que forme leur tendon.

(b. b. b.) et (b'. b'.) forment les deux séries des feuillets branchiaux appartenant à chaque rame.

Les autres lettres ont la même signification que dans la figure précédente.

La figure 3 montre deux lames branchiales, écartées l'une de l'autre par leur bord libre. *pp.* Tache obscure qui se voit au milieu. Ces lames sont de grandeur naturelle.

La figure 4 est une lame isolée, représentée au double de sa grandeur.

Fig. 5 *a.* Une portion de poil, vue par la base. Rond à sa racine, ce poil est creusé d'un large canal: il ne tarde pas à s'aplatir et à prendre des dentelures sur ses deux bords, qui vont en grossissant; il s'élargit en même temps.

Dans la figure 5 *b*, qui montre l'extrémité de ce même poil, le canal intérieur va en diminuant de diamètre, et finit par n'être qu'un trait à peine visible. Les dentelures ne sont plus égales; il y en a de plus petites entre les grandes.

La figure 5 *c* montre un poil naissant: il sort très près du bord de la lame branchiale au milieu d'une espèce de bourrelet. Son canal intérieur, proportionnellement très étroit, s'évase rapidement à sa base et se continue avec une capsule en entonnoir, qui s'ouvre au-delà du bord de la lame branchiale, entre les feuillets de cette lame.

La figure 5 *d* montre cette communication de la cavité intérieure (*h*) d'un poil ayant atteint sa forme et son accroissement avec la cavité en entonnoir (*y*), qui se perd dans la grande cavité du feuillet respirant.

Il y a, il me semble, dans cette structure des poils et dans leur implantation, de grands rapports avec ceux des plantes.

Les dessins des figures 5 *a*, *b*, *c*, *d*, que je viens d'ajouter (25 janvier 1841) à ceux de mon ancien travail, ont été faits, à ma prière, par M. de Quatre-Fages. Toutes ces figures 5 sont vues à 500 diamètre de grossissement.

OBSERVATIONS *sur l'origine et le mode de développement des Zoospermes,*

Par M. LALLEMAND,

Correspondant de l'Institut, professeur à la Faculté de Médecine de Montpellier. (1)

ARTICLE Ier. *Remarques préliminaires.*

§ 1. Des recherches microscopiques sur la liqueur séminale de l'homme, entreprises dans un but purement médical, m'ont conduit peu-à-peu à d'autres analogues sur les Mammifères, les Oiseaux, les Reptiles, les Crustacés et surtout les Mollusques. J'ai vu bientôt avec autant de surprise que de satisfaction, ces observations, si différentes par leur caractère, s'éclaircir réciproquement dans la plupart des cas et concorder toujours d'une manière remarquable; si bien que j'ai retrouvé à l'état normal chez les animaux, ce que j'avais vu chez l'homme à l'état pathologique.

§ 2. Leuwenhoek et Hartsœker, ayant découvert des animaux infusoires d'une forme constante pour chaque espèce dans le sperme, il semblait qu'on eût dû voir dans ces êtres nouveaux un caractère distinctif de la liqueur séminale, un moyen précieux de la reconnaître au milieu de tout autre produit organique. Cependant cette ressource fut complètement négligée des médecins, malgré l'insuccès de tous leurs efforts pour établir le diagnostic de diverses maladies des organes génitaux sur des bases solides.

Pourquoi cette pensée ne leur est-elle pas même venue? C'est sans doute parce que les recherches microscopiques étaient tombées dans le discrédit. Mais cette défaveur elle-même tenait à l'imperfection des instrumens et aux conséquences hasardées

(1) Un extrait de ce travail a été lu à l'Académie des Sciences le 9 novembre 1840 et inséré dans les *Comptes rendus*.

qu'on s'était hâté de tirer d'un petit nombre d'observations incomplètes.

Les premiers microscopes employés n'étaient que de fortes loupes, et ne permettaient pas d'augmenter beaucoup le grossissement des objets sans diminuer dans la même proportion la netteté des formes; on concevrait même difficilement aujourd'hui comment Leuwenhoek a pu faire tant d'observations précieuses avec un pareil instrument, si l'on ne savait qu'il employait une partie de sa vie à fabriquer ses lentilles et l'autre à s'en servir. Cependant toute sa patience et son habileté n'ont pu le soustraire aux illusions qui devaient naître de la petitesse et de la confusion des images. Ceux qui ont voulu vérifier ses assertions se sont pressés de nier ce qu'ils n'avaient pu voir, ou d'y suppléer par l'activité de leur imagination. Buffon, qui n'avait rien de ce qu'il fallait pour des recherches longues et minutieuses, s'est précipité dans des hypothèses hasardées qui provoquèrent d'abord l'enthousiasme et bientôt l'incrédulité. Ceci explique suffisamment l'éloignement des praticiens pour un moyen d'investigation qui devait leur inspirer si peu de confiance. Il est évident aussi qu'un excellent microscope est indispensable à l'étude des Zoospermes, puisqu'il a fallu les perfectionnemens récens de l'optique, pour faire cesser les discussions soulevées par les recherches de Leuwenhoek et Hartsœker. J'ai pu du reste en juger par ma propre expérience.

§ 3. D'après les éloges donnés par M. Raspail au microscope simple, je me suis servi d'abord d'un de ceux qui portent son nom, et je dois avouer, qu'après une année d'incertitude, j'ai acquis la conviction qu'il fallait toute son habileté pour l'employer à l'étude des Zoospermes. Je me suis servi plus tard du microscope de Selligue, il m'a suffit dans les circonstances les plus favorables; mais j'ai vu combien il était insuffisant pour les observations délicates depuis que j'ai employé celui de Georges Oberhoeuser et Trécourt (1).

(1) Les modifications qu'ils ont apporté dans la distribution de la lumière sur l'objectif, permettent facilement de distinguer les contours des objets sous une ampliation de 1080 fois. Il n'est pas ordinairement nécessaire d'employer un pareil grossissement, mais il est bon de pouvoir s'en servir pour quelques instans sans que les formes perdent de leur netteté; c'est ce

L'étude des Zoospermes exige quelques précautions spéciales; comme ils ne peuvent être observés que par réfraction, il faut avoir soin que le porte-objet, traversé par la lumière, soit exempt de bulles, de raies, et d'une épaisseur égale. Je sais que plusieurs années d'expérience peuvent dispenser de beaucoup précautions, mais on n'en s'aurait trop prendre en commençant. Le liquide à examiner doit être recouvert d'un autre verre, aussi mince que possible, travaillé exprès. Les feuilles de *mica* dont on s'est servi long-temps ne sont jamais aussi transparentes et présentent toujours des fissures, des irrisations, qui peuvent tromper ceux qui

qu'il est facile d'obtenir en employant un diaphragme capillaire avec un réflecteur concave. L'appareil de M. Dujardin a besoin d'être mis au point pour chaque expérience, il peut se salir ou se déranger facilement. Le diaphragme capillaire est exempt de tous ces inconvéniens; c'est donc une amélioration qu'apprécieront tous ceux qui sont obligés d'employer habituellement, de très forts grossissemens. Il importe aussi de pouvoir se servir de la lumière artificielle pour ne pas être arrêté par les variations solaires ou par la chute du jour. C'est moins une lumière très brillante qu'on doit chercher qu'une lumière constante; celle qui vient du ciel ou des nuages blancs est la plus favorable parce qu'elle fatigue moins la vue. Celle des lampes est plus vive et dessine encore plus nettement les objets, mais il faut éviter la vacillation de la flamme en modérant la combustion au lieu de l'augmenter comme on est presque toujours tenté de le faire. Quand on a parfaitement reconnu certaines formes à l'aide d'un fort grossissement, on peut aisément les retrouver avec de plus faibles, mais elles ont toujours besoin d'être parfaitement nettes. Je crois que l'étude des Zoospermes est celle qui exige les meilleurs microscopes : j'ai du moins trouvé toutes les autres beaucoup plus faciles. Mais il ne suffit pas encore d'avoir un bon instrument, il faut apprendre à s'en servir, car tous les sens ont besoin d'éducation, surtout quand on les sort de leurs habitudes. Il faut aussi savoir parer aux incidens qui troublent souvent les observations les plus simples. Avant de se servir d'un objectif ou d'un oculaire, il serait bon d'en examiner toujours la surface à la loupe, si elle est ternie par de la poussière il faut éviter, en soufflant dessus, d'y projeter de la salive; si elle est salie par des parties adhérentes on ne peut les enlever qu'après les avoir humectées avec la vapeur de l'haleine et en se servant d'une peau de chamois, ou mieux encore d'un morceau de moelle de sureau. Il est aussi des dispositions naturelles dont il faut tenir compte. Les individus sanguins ne peuvent se livrer à des recherches microscopiques un peu prolongées sans éprouver des étourdissemens; l'injection facile de leurs vaisseaux capillaires nuit bientôt à la netteté de leurs perceptions. Ce qu'ils ont de mieux à faire lorsque ces phénomènes se présentent, c'est de suspendre complètement leurs recherches. Le même conseil doit être donné à ceux qui sont très nerveux, dès qu'ils éprouvent du malaise, des impatiences. Ceux qui ont habituellement les yeux irrités, larmoyans, etc., qui éprouvent facilement des palpitations, de l'oppression, des tremblemens, etc., doivent renoncer à des recherches qui altéreraient leur santé, sans leur offrir de compensation. Enfin, il faut souvent beaucoup de temps et de patience pour suivre des recherches un peu délicates, et la plupart des observations doivent être répétées, variées à l'infini avant de laisser une complète conviction, car les illusions sont d'autant plus faciles qu'on emploie de plus forts grossissemens.

ont le plus d'habitude de s'en servir. Ce petit verre mince est indispensable pour diminuer autant que possible l'épaisseur du liquide et en rendre la couche parfaitement uniforme, pour ralentir son évaporation et prévenir son contact avec la lentille de l'objectif; car la vivacité de la lumière diminue en raison de la masse qu'elle traverse et la confusion augmente avec le nombre des objets superposés. Une évaporation rapide entretient dans le liquide un mouvement perpétuel; l'objectif peut être terni par la vapeur, surtout lorsqu'on se sert de forts grossissemens qui exigent un rapprochement très considérable. Quand la matière s'est desséchée sans être couverte d'une lame de verre, sa surface est irrégulière et change l'aspect des objets : il s'y dépose d'ailleurs des corps étrangers, et la préparation ne peut être conservée.

Une seule goutte de liquide suffit pour une observation complète, et même une plus grande quantité ne peut avoir que des inconvéniens. Il faut presser le petit verre mince dont on la recouvre, afin de l'étaler, d'arrêter promptement les courans qui s'y établissent et de faire disparaître les bulles d'air qui peuvent s'y trouver emprisonnées. Il y a des cas dans lesquels ces bulles d'air permettent de mieux distinguer certains objets; mais il faut bien les connaître pour ne pas se tromper sur leurs véritables dimensions. Quoique les deux verres paraissent se toucher, les zoospermes se meuvent dans leur intervalle avec une entière liberté, tant qu'ils conservent de l'énergie et que l'évaporation n'a pas fait trop de progrès; ce qui peut durer plusieurs heures; du reste, une goutte d'eau tiède favorise et prolonge beaucoup leurs mouvemens. Quelque mince que soit la couche de liquide, elle ne peut être embrassée dans toute son épaisseur par un très fort grossissement, il faut donc faire monter et descendre continuellement le foyer, pour être sûr que rien n'échappe à l'observation. Cette précaution est surtout importante dans les cas de pollutions diurnes, puisqu'il n'existe souvent que deux ou trois zoospermes dans la goutte de liquide qu'on a déposée sur le porte-objet. Il faut aussi changer souvent la position du miroir réflecteur, pour faire varier l'intensité et la direction de la lumière. Les zoospermes sont souvent d'une grande transparence

dans les cas pathologiques, et la lumière la plus vive, la plus perpendiculaire, n'est pas celle qui permet de les distinguer mieux. Il est aussi fort utile de faire varier la densité du liquide, soit en y ajoutant de l'eau, soit en le laissant dessécher. Le sperme contient des matériaux qui proviennent des vésicules séminales, de la prostate et de l'urèthre. Quand la couche du liquide est trop épaisse ces matériaux masquent les zoospermes. Une goutte d'eau appliquée sur les bords du petit verre mince pénètre bientôt au-dessous, et les zoospermes sont bientôt isolés; en même temps que leurs contours sont rendus plus apparens par la diminution de densité du liquide. D'un autre côté, quand le pouvoir réfringent des zoospermes diffère peu de celui de la liqueur séminale, leurs parties les plus minces sont traversées par la lumière sans apporter à l'œil des sensations distinctes. On n'aperçoit alors que des globules très petits, ovoïdes, très brillans, terminés par une petite pointe: dès que l'eau commence à pénétrer entre les deux verres, un mouvement rapide empêche de distinguer nettement les objets qui passent; mais quand le calme est rétabli, on aperçoit la queue des zoospermes, et leur dimensions semblent avoir augmenté, ce qui tient à la diminution de densité du liquide ambiant. L'eau ordinaire suffit pour obtenir ce résultat : il est plus sensible quand on y ajoute une petite quantité d'alcool; mais, plus tard, les formes des zoospermes en sont altérées : il vaut donc mieux n'employer que de l'eau quand on veut conserver la préparation.

L'évaporation amène quelquefois dans la liqueur séminale des changemens non moins remarquables; il m'est arrivé dans beaucoup de cas pathologiques, de ne rien distinguer au milieu du liquide pendant une demi-heure, une heure et même plus, et d'y voir apparaître tout-à-coup un animalcule, puis dix, puis cent dans l'espace de quelques minutes. Le lendemain quand la dessiccation était complète, je n'en retrouvais plus de traces, ou bien je n'en distinguais plus que les queues, le reste étant empâté dans le mucus desséché : mais l'absorption d'une goutte d'eau amenait la reproduction des phénomènes observés la veille. J'ai eu plus de cinquante occasions de voir les mêmes faits et je dois en conclure, que cette transparence de zoosperme est

très commune dans les maladies graves. Il est du reste facile de se rendre compte de ce qui se passe dans cette circonstance. Quand le pouvoir réfringent des zoospermes est le même que celui du liquide ambiant, la lumière traverse le tout de la même manière et la masse paraît homogène; mais l'évaporation agit plus promptement sur le liquide que sur des corps organisés; et quand la différence de densité change le pouvoir réfringent, la forme des zoospermes se dessine momentanément parce qu'ils sont devenus plus transparens que le reste. Quand le dessèchement est complet, tous les zoospermes qui se trouvent empâtés dans la matière disparaissent de nouveau, parce que le pouvoir réfringent est redevenu le même pour le mucus et pour les zoospermes complètement secs. L'absorption d'une certaine quantité d'eau reproduit les mêmes phénomènes, aussi souvent qu'on le veut et dans tous les temps, parce que la matière emprisonnée entre deux lames de verre n'éprouve aucune altération appréciable. Après le dessèchement de toute la liqueur séminale, les Zoospermes qui sont restés isolés, paraissent avoir pris un tiers ou même moitié plus de développement dans tous les sens, ce qui tient à ce que les parties les plus transparentes se dessinent complètement. Il y a des Zoospermes de Poissons, de Mollusque qu'on ne peut bien voir que dans cet état de dessèchement, parce que leur queue est d'une ténuité, d'une transparence si extraordinaire, qu'elle échappe d'abord au plus fort grossissement des meilleurs microscopes. Il est bon alors d'étendre d'eau la liqueur séminale, afin de bien disséminer les Zoospermes et de les observer jusqu'à ce que le dessèchement soit complet; c'est aussi dans cet état définitif qu'il faut comparer les Zoospermes appartenant à des individus différens ou à des époques différentes, car c'est alors seulement qu'on peut être certain de les retrouver toujours dans des conditions parfaitement identiques. Mais chez la plupart des Mollusques le dessèchement altère plus ou moins les formes; il en est de même dans toutes les espèces dont les Zoospermes ont peu de consistance. Il est donc indispensable de les examiner dans tous les états.

Enfin, il arrive quelquefois que deux Zoospermes sont super-

posés de manière à faire voir deux têtes naissant d'une même queue, et plus souvent encore, deux queues se séparant d'une seule tête; mais il suffit de faire pénétrer une goutte d'eau entre les deux verres pour opérer un déplacement qui fait cesser toute illusion.

§ 4. Je suis entré dans tous ces détails parce que des observations inexactes, adoptées trop légèrement par des savans distingués, ont accrédité de graves erreurs qu'il eût été facile d'éviter en prenant les précautions dont je viens de parler. J'aurai l'occasion de revenir sur quelques autres, mais je dois indiquer ici la voie qui me paraît la plus simple pour acquérir l'habitude d'observer les animalcules dans le sperme normal, afin d'arriver promptement à les reconnaître dans les cas pathologiques.

Après tout acte vénérien, il reste toujours assez de liqueur séminale dans l'urèthre pour suffire à des études microscopiques précises et complètes. Il est donc inutile de chercher d'autres matériaux, ce qui n'est pas indifférent sous bien des rapports. Quand le canal est exprimé peu de temps après l'acte, on en obtient toujours de la liqueur séminale, et une seule goutte déposée sur le porte-objet, laisse apercevoir des milliers d'animalcules qui s'agitent comme des têtards entassés dans une mare d'eau stagnante. Seulement la queue des Zoospermes est relativement plus longue, plus mince, et près de son insertion la tête présente un point très brillant. Toutefois, le nombre même de ces animalcules empêche d'en suivre exactement les mouvemens; il faut étendre la liqueur d'une certaine quantité d'eau et presser fortement le petit verre mince qui les recouvre afin de les disséminer : c'est sur les bords qu'on les trouve plus isolés. Si l'eau a la température du corps, on voit les mouvemens devenir plus libres et plus vifs, jusqu'à ce que l'évaporation ou le refroidissement devienne sensible. En prévenant ces deux causes de perturbation, on peut entretenir le mouvement des Zoospermes pendant plusieurs heures.

Quel que soit le temps qui s'est écoulé depuis l'acte vénérien il existe toujours des animalcules vivans dans l'urèthre, tant qu'ils n'ont pas été entraînés par une émission d'urine quoique l'ouverture du gland soit parfaitement sèche et que l'expresion

du canal dans toute sa longueur n'en puisse faire sortir la moindre humidité, on peut cependant y trouver des animalcules vivans la première fois que l'urine est rendue; il suffit pour cela de n'en laisser pénétrer d'abord dans l'urèthre qu'une très petite quantité et de recueillir sur une lame de verre la première goutte qui se présente. D'après ce que je viens de dire, il est évident que cette première goutte de liquide se trouve précisément dans les conditions les plus favorables à l'observation microscopique du sperme, car il est délayé dans plusieurs fois son volume d'urine à la température du corps, et cette urine remplace ici de la manière la plus simple l'eau tiède qu'il aurait fallu ajouter pour observer convenablement les mouvemens des Zoospermes. Il est vrai qu'il se trouve dans ce mélange plus de mucus, de fluide prostatique et de débris d'épithélium, que dans le sperme recueilli peu d'instans après le coït : mais les animalcules y sont si bien isolés; ils s'y meuvent avec tant de vivacité et d'énergie qu'il est impossible de ne pas les distinguer au premier coup-d'œil de tout ce qui les entoure.

Ce procédé est donc le plus naturel et le plus prompt qu'on puisse employer pour se familiariser avec ces recherches; il n'exige pas qu'on s'y livre immédiatement avec précipitation, et ce qui est bien plus important, il peut être appliqué à tous les cas de pollutions diurnes à la place de tous les procédés compliqués et incertains qui ont été conseillés jusqu'à présent pour arriver au même résultat.

Il est clair que les mêmes expériences pourraient être faites à la suite des pollutions nocturnes par ceux qui y seraient sujets, car il reste toujours des animalcules dans l'urèthre après toutes les évacuations séminales de quelque manière qu'elles aient eu lieu. C'est même ce qui fait que ce procédé est exactement applicable à l'étude des pollutions diurnes. Mais on pourrait tomber dans plus d'une erreur en commençant par des cas pathologiques. C'est dans l'état de santé que le développement des Zoospermes est le plus parfait; c'est après l'acte vénérien qu'ils sont plus actifs et vivent plus long-temps, ce sont donc ces circonstances que les praticiens doivent choisir pour s'habituer à les reconnaître plus tard.

Après avoir donné les moyens de répéter, de vérifier mes observations microscopiques, il me reste à en faire connaître les résultats.

ARTICLE II. *Nécroscopie.*

§ 5. Sur *trente-trois* cadavres, je n'ai trouvé que *deux fois* des animaux spermatiques dans les testicules. L'un de ces deux individus était mort le lendemain d'une chute, l'autre avait succombé à une gastro-entérite aiguë. La liqueur séminale était plus abondante chez le premier et contenait aussi plus d'animalcules dans la même quantité de liquide. La même disposition existait dans les canaux sécréteurs examinés isolément. Quant aux autres malades, ils avaient langui à l'hôpital fort long-temps pour des affections chroniques. Un seul avait succombé en deux jours à une péritonite aiguë; mais il avait 73 ans. Chez tous, les testicules étaient mous, pâles et comme flétris, leur section offrait un aspect grisâtre et ne laissait écouler aucun liquide; le tissu était presque sec, fort peu injecté; on pouvait facilement isoler les canaux sécréteurs les uns des autres, les développer sur le porte-objet sans les rompre. Ils renfermaient des globules très brillans, exactement semblables entre eux, presque du volume de la tête des Zoospermes, dix fois plus petits que les globules du sang ou de mucus, différant d'ailleurs de ces derniers par la constance et la régularité de leurs formes. Ces corps brillans, qui remplaçaient les Zoospermes, méritent d'être remarqués à cause de leur analogie avec ceux que présente le sperme de l'homme et des animaux dans certaines circonstances.

Pour bien observer ce qui existe dans les canaux sécréteurs des testicules, il faut d'abord en étaler une portion sur le porte-objet. Après l'avoir examinée à sec, faire pénétrer de l'eau entre les deux verres et suivre les changemens qui s'opèrent dans l'aspect des parties; comprimer ensuite le verre pour aplatir les parois du canal, le rompre et faire sortir une partie du contenu, enfin, revoir le tout quand la dessiccation est complète, car c'est alors qu'on voit mieux les Zoospermes restés dans les canaux.

§ 6. Dans l'épididyme, je n'ai trouvé de Zoospermes que chez les

deux individus dont le testicule en contenait aussi. Chez tous les autres je n'en ai rencontré que dans le canal déférent, ou dans les vésicules séminales. Il n'en existait même nulle part chez le malade de 73 ans, il m'a paru que les animalcules étaient d'autant plus rares, que les individus avaient souffert plus longtemps, car dans ces derniers cas, je n'en ai rencontré que dans les vésicules séminales. Quoi qu'il en soit, plus les Zoospermes étaient rares, plus ils étaient difficiles à voir à cause de leur extrême transparence. Ce n'était qu'après une heure ou deux qu'on commençait tout-à-coup à les apercevoir au milieu d'un liquide qui jusqu'alors avait semblé tout-à-fait homogène. Leurs dimensions étaient celles des animalcules les mieux développés, mais ils étaient pâles dans toute leur étendue et plus transparens que le liquide ambiant. Une dessiccation complète les faisait disparaître de nouveau. L'absorption d'une petite quantité d'eau et son évaporation reproduisait les mêmes phénomènes. J'en ai donné l'explication plus haut, ils prouvent que leur densité pouvait être moindre momentanément que celle du liquide ambiant, que par conséquent leur texture était beaucoup plus lâche que dans l'état normal. C'est surtout dans les cas de phthisie, de carie vertébrale, de tumeur blanche, que j'ai eu plus de peine à distinguer les animalcules, ce qui tient sans doute à ce que ces maladies ne causent la mort qu'après un temps très long. Ceux qui voudront répéter ces recherches devront donc choisir des sujets dont la constitution n'ai pas été profondément altérée et se rappeler que les Zoospermes peuvent n'apparaître qu'au moment où la liqueur acquiert un certain degré de consistance. Il est probable que l'opinion de MM. Prévost et Dumas sur les fonctions des vésicules séminales est due *en grande partie* à cette cause d'erreur. C'est sans doute elle encore qui a fait dire d'une manière trop absolue à Burdach et à M. Mandl que la liqueur séminale des malades ne contient plus de Zoospermes.

§ 7. J'ai presque toujours trouvé dans les vésicules, surtout au fond des anfractuosités, une matière épaisse, grumeleuse, brillante, variable pour l'aspect, la couleur et la consistance, mais ressemblant assez à de la colle plus ou moins dense, plus ou moins transparente : sous un grossissement nécessaire pour ob-

server les zoospermes, les grumeaux de cette matière paraissent énormes, irréguliers, plus ou moins opaques, sans forme constante. Ce sont évidemment des produits de la membrane interne des vésicules séminales, car on les retrouve avec des caractères analogues dans les *vésicules accessoires* du Hérisson, du Rat, etc., qui ne contiennent jamais d'animalcules, et ne communiquent pas directement avec les canaux déférens, dans lesquels, d'ailleurs, on ne trouve jamais rien de semblable dans aucune espèce. Cette matière est donc analogue à celle que produisent les follicules prostatiques, les glandes de Cooper, etc. Ses fonctions sont les mêmes, mais elle mérite, sous beaucoup de rapports, une attention spéciale.

La sécrétion du sperme diminue dans toutes les maladies graves, comme on vient de le voir, et les évacuations séminales sont toujours très rares, surtout dans les derniers temps. Il n'est donc pas étonnant que les produits de la membrane muqueuse prédominent alors sur ceux du testicule, et que ce mucus particulier prenne plus de consistance par un long séjour dans les anfractuosités des cellules. De là vient la différence qu'on observe entre le sperme tiré des vésicules d'un cadavre et celui qui est évacué par un individu bien portant. Cependant, à la suite d'une continence très prolongée, on remarque souvent dans le sperme des grumeaux plus ou moins volumineux et tout-à-fait distincts du liquide. Quand les émissions sont plus rapprochées, on peut encore y reconnaître des granulations de même nature, mais beaucoup plus petites. Ces observations sont importantes pour l'explication de plusieurs symptômes de pollution diurne.

§ 8. J'ai dit qu'en faisant uriner les malades dans un bain, on pouvait facilement reconnaître le sperme qui s'échappe à la fin de l'émission, aux globules qui tourbillonnent au milieu du nuage: d'après ce qu'on vient de voir, il est évident que ces globules sont fournis par la membrane interne des vésicules séminales. On conçoit qu'ils peuvent manquer dans les cas très graves où sa sécrétion n'a pas le temps d'acquérir de la consistance, mais leur présence ne peut laisser aucun doute sur l'existence des pollutions diurnes, puisqu'ils ne peuvent venir que des vésicules séminales. Au reste, j'ai trouvé des animalcules dans les urines

de tous les malades qui avaient observé ce phénomène en prenant un bain.

Ces remarques sont exactement applicables aux globules que laissent déposer les urines dans certains cas de pollutions diurnes, globules qui ont été comparés par les uns à des grains de semoule, par d'autres à des grains de millet, à des grains d'orge, etc., suivant leur volume. Ces globules s'aperçoivent dès que les urines viennent d'être rendues ; ils sont arrondis, très mous, et ne donnent aucune sensation sous le doigt : on ne peut donc les confondre avec les sels urinaires, qui se déposent seulement quand les urines se refroidissent, qui ont une forme cristalline, et donnent sous le doigt la sensation bien distincte d'un corps dur. Le mucus vésical ne se dépose aussi que par le refroidissement, et il ne fournit pas de granulations brillantes, etc. Quant au pus, son aspect est facile à reconnaître. Enfin, j'ai trouvé des animalcules dans toutes les urines qui laissaient déposer de ces globules. C'est donc avec raison qu'ils ont été signalés comme des indices certains de pollutions diurnes, et cela se conçoit, puisqu'ils ne peuvent venir que des vésicules séminales.

J'ai fait remarquer aussi que, dans certains cas, les urines examinées par transparence laissaient apercevoir au milieu d'un nuage floconneux des multitudes de *points brillans* tout-à-fait caractéristiques. En effet, ce sont des granulations plus petites et par conséquent plus légères que celles qui, chez d'autres malades, tombent au fond du vase. On ne les observe ni dans le mucus vésical, ni dans le fluide prostatique, qui pourraient seuls former des nuages analogues à ceux des pollutions diurnes. Ces points brillans proviennent donc aussi des vésicules séminales. Leur présence indique celle du sperme, ainsi que je l'ai vérifié souvent à l'aide du microscope. Je dois cependant prévenir ceux qui voudront répéter ces expériences, que ce n'est pas au milieu du nuage parsemé de ces points brillans qu'ils doivent chercher les zoospermes, car la densité de ces derniers les fait bientôt tomber dans la couche inférieure du liquide : c'est là seulement qu'il faut les chercher. (1)

(1) Depuis la lecture de ce Mémoire, on m'a apporté les organes génito-urinaires d'un homme

§ 9. Les résultats de toutes ces observations faites sur le cadavre, peuvent donner une idée de l'influence des maladies graves et prolongées sur les fonctions des organes spermatiques. Mais ce n'est pas seulement à l'état morbide qu'elles éprouvent de grandes variations, il peut exister des différences remarquables entre des individus bien portans, non-seulement pour la quantité de sperme fournie dans un temps égal, mais encore pour le nombre, l'aspect et les dimensions des animalcules. J'ai observé, sous tous ces rapports, des différences d'un tiers et même de moitié.

On se tromperait beaucoup en supposant que cette comparaison peut être difficile à établir. Rien n'est au contraire plus simple. Quand on conserve du sperme sous un verre mince, il est à l'abri de toute altération, et comparable dans tous les temps avec une autre préparation semblable (1). On peut alors les faire passer successivement sous les mêmes lentilles avec la même lumière, le même micromètre, et répéter ces comparaisons tant qu'on le veut. Rien n'est donc plus susceptible d'une précision mathématique. Le docteur Devergie a bien voulu mettre à ma disposition les préparations de ce genre qu'il a recueillies dans

d'environ quarante ans, qui est mort à la suite d'une rétention d'urine, provoquée par un rétrécissement de l'urèthre, porté au point de produire la rupture de la portion du canal située au dessous, une infiltration d'urine etc. ; il existait aussi de graves désordres du côté de la vessie et des reins. J'ai examiné au microscope le liquide contenu dans les vésicules séminales, dans le canal déférent et dans le testicule, et nulle part je n'ai trouvé de zoospermes bien ou mal conformés : il n'y en avait pas la moindre trace ; mais j'ai rencontré partout des corps *brillans* sept à huit fois plus petits que les *globules de mucus*, tous parfaitement sphériques et semblables entre eux, du volume de la tête des animalcules de l'homme. Les canaux éjaculatoires étaient très dilatés, les testicules flasques et pâles, mais exempts de lésion organique. Ainsi voilà une affection des voies urinaires qui a certainement agi d'une manière profonde sur les fonctions des testicules, ce qui confirme ce que j'ai dit de l'influence de la membrane muqueuse de l'urèthre sur les organes spermatiques ; voilà du sperme dans lequel les animalcules manquaient complètement et étaient remplacés par les *petits globules brillans* dont j'ai souvent parlé.

(1) Ayant eu récemment l'occasion de passer en revue les Zoospermes, que je conserve ainsi entre deux lames de verre pour mes observations comparatives, j'ai retrouvé ceux des Mammifères, des Oiseaux et des Reptiles dans le même état que le premier jour ; mais ceux des Mollusques étaient complètement déformés et méconnaissables ; ceux des Crustacés m'ont paru altérés, mais à un moindre degré. Il semblerait donc que l'organisation de ces Zoospermes est d'autant plus parfaite et plus résistante, qu'ils appartiennent à des animaux d'un ordre plus élevé.

diverses circonstances, et j'y ai retrouvé des différences aussi grandes. Un de mes élèves, le docteur Labat, a constaté (*Gazette des Hôpitaux*, 16 juin 1839) que les zoospermes d'une semence inféconde avaient la tête *déprimée*, *plus petite* et *moins brillante* qu'à l'état normal : il a de plus signalé les modifications qu'ils éprouvent par suite des graves perturbations de l'économie.

Le docteur Mandl dit que la micrographie peut décider maintenant les qualités fécondantes d'une liqueur séminale donnée, *par le développement des zoospermes qu'elle contient*, et il ajoute que, ayant eu l'occasion d'observer au microrcope celle d'un homme stérile, il y a constaté « des animalcules *plus petits* qu'à l'ordinaire, parmi lesquels s'en trouvaient quelques-uns d'une configuration *particulière* » (*Traité pratique du microscope*, page 149). J'ai vu les dessins de ces zoospermes exécutés par Turpin, ils sont très remarquables par l'irrégularité de la tête, etc. ; chez quelques-uns, de l'origine de la queue.

§ 10. J'ai disséqué avec M. Milne Edwards un coq de huit ans, qui était devenu stérile après avoir été remarqué long-temps par sa fécondité. Tous les œufs des poules qu'il avait couvertes depuis près d'un an étaient restés inféconds, quoique régulièrement couvés. En cherchant la cause de ce changement, nous avons trouvé le testicule gauche désorganisé et nous n'avons pu découvrir aucun animalcule dans son canal déférent. Le droit était petit et flasque; son canal déférent contenait peu de liqueur séminale et nous n'y avons découvert qu'un très petit nombre de Zoospermes. Leur queue était si petite et si transparente, que nous ne l'aperçûmes qu'après de dessèchement du liquide. Le même jour, nous avons examiné un jeune Coq très fécond. Ses testicules et ses canaux déférens étaient gorgés de sperme, comme à l'ordinaire. Ses animalcules s'y trouvaient entassés, leur queue était deux fois plus longue et plus épaisse que dans le Coq stérile : il y avait moins de différence dans le volume de la tête. Le tout a été mesuré au microscope et dessiné à la *camera lucida*. Ainsi ce n'était pas seulement la liqueur séminale qui était plus abondante; la même quantité de liquide contenait peut-être cent fois plus de zoospermes, et leur dimension était à-peu-près double.

§ 11. Un de mes malades ayant eu, il y a douze ans, une double orchite, n'a jamais rencontré depuis cette époque la moindre trace d'animalcules spermatiques dans sa liqueur séminale; ses observations méritent d'autant plus de confiance qu'il est très habile micrographe et qu'il a renoncé au mariage à cause de cette absence de zoosperme, qui lui a fait penser, avec d'autres circonstances, qu'il était impropre à la reproduction. Son testicule gauche est très petit et l'épididyme du droit plus dur que de coutume. Le docteur Labat à vainement cherché des zoospermes dans la liqueur séminale d'un de ses malades, qu'il avait traité dix-huit mois auparavant, d'une inflammation des deux testicules accompagnés de bubons. Ce jeune homme était également impropre à la reproduction, quoique robuste et assez ardent. Il est remarquable que dans les deux cas la liqueur séminale a conservé son odeur caractéristique.

Le docteur Devergie, cherchant à donner plus de certitude *aux signes de la mort par suspension*, a été conduit à examiner au microscope, la matière contenu dans l'urèthre, d'après cette considération qu'une éjaculation plus ou moins abondante accompagne ce genre de mort, quand les individus sont dans un âge convenable. Voici quelques-uns des résultats de ses recherches. (Voyez *Annales d'hygiène et de médecine légale*, janvier 1839.)

Dans quelques cas, au lieu de zoospermes, il n'a rencontré dans l'urèthre qu'une série de *petits corps ovoïdes*, ressemblant à des animalcules sans queue, et presque toujours il a retrouvé, en même temps, les mêmes corps dans la liqueur extraite des vésicules séminales.

« Serait-ce donc là, dit-il, un état embryonnaire du sperme ou une liqueur séminale dans laquelle il y aurait un arrêt de développement dans les animalcules spermatiques. Cet état du sperme porterait-il avec lui le cachet de l'impuissance? Ce sont autant de questions que je ne saurais résoudre. Toutefois, ayant donné communication de cette note à M. Turpin, il me cita deux faits qui viendraient à l'appui de cette dernière opinion. Ce savant et habile micrographe a examiné le sperme de deux frères, l'un médecin, l'autre phamacien, tous deux mariés depuis un cer-

tain nombre d'années et qui n'avaient pu avoir d'enfans. Chez tous deux, le sperme était dans les conditions que je viens de signaler, et ces corpuscules ovoïdes y ont été vus *vivans et se mouvant à l'instar des animalcules spermatiques.*»

Dans d'autres cas, le docteur Devergie n'a trouvé qu'une très petite quantité d'animalcules dans le sperme extrait des vésicules séminales, et il me semble l'attribuer à l'évacuation occasionée par la suspension; car il ajoute : « c'est ce qui s'observe chez le vivant au fur et à mesure que le coït est plus souvent répété dans un court espace de temps ». Mais pour que ce rapprochement fût exact, il faudrait que le sperme resté dans les vésicules ait eu le temps d'être délayé par une nouvelle sécrétion de la membrane interne, et c'est ce qui n'est pas admissible. Quoi qu'il en soit, c'est une chose bien remarquable que la rareté de ces animalcules, ou leur remplacement par ces corpuscules ovoïdes; car ces changemens sont précisément les suites ordinaires des pertes séminales les plus graves, et j'ai montré, par un grand nombre de faits très frappans, combien cette cruelle maladie poussait au suicide. Ces divers rapprochemens peuvent donc conduire à des conséquences importantes sous tous les rapports.

§ 12. Malgré la facilité avec laquelle on reconnaît les pollutions nocturnes, j'ai soumis au microscope la liqueur séminale recueillie, à la suite de ces évacuations, par des individus placés dans des conditions de santé très variées : voici ce que j'ai observé.

Dans le principe, quand les évacuations sont encore rares et que le sperme a conservé ses caractères définitifs, les animalcules ne présentent rien de remarquable sous le rapport du nombre, des dimensions, etc. Mais quand la maladie a pris assez de gravité pour influer sur le reste de l'économie, le sperme devient plus liquide, et les animalcules sont moins développées moins vivaces. Toutefois, leur nombre ne diminue pas encore sensiblement, il m'a paru même augmenté chez quelques individus. Quand les érections commencent à diminuer, le sperme est encore plus aqueux; les dimensions des animalcules sont quelquefois d'un quart, d'un tiers plus petites qu'à l'état normal; la queue est difficile à distinguer avec un grossissement de 300 fois. Plus tard encore, les animalcules deviennent rares. Enfin,

chez deux individus tombés dans le dernier degré de la consomption dorsale, le sperme ne contenait plus d'animalcules quoiqu'il eût encore son odeur carastéristique. Examiné avec les plus forts grossissemens et toutes les précautions que j'ai indiquées ailleurs, je n'y ai jamais trouvé que des globules brillans, parfaitement semblables, à-peu-près de même volume que la tête des animalcules ordinaires. Le professeur Delille qui possède un excellent microscope d'Amici et qui s'en sert tous les jours pour les recherches les plus délicates, a vu exactement de la même manière. Ces globules ressemblaient sous tous les rapports à ceux que l'on trouve dans les testicules, des sujets morts à la suite d'une longue maladie.

Les observations microscopiques que j'ai faites sur le sperme rendu pendant la défécation, m'ont donné des résultats analogues. Lorsque ces pertes n'avaient lieu qu'accidentellement, à de longs intervalles, le sperme était épais, blanchâtre, imprégné d'une forte odeur, et rempli d'animalcules très développés. J'ai pu même en trouver quelques-uns de vivans après une heure ou deux, surtout en été. J'en ai vainement cherché dans la petite goutte de matière filante et visqueuse, qui se présente ordinairement à l'ouverture du gland après les efforts prolongés que nécessite une violente constipation : je n'y ai vu qu'un liquide parfaitement transparent dans lequel nageait des débris d'épithélium et des globules de mucus, très variables dans leur formes et dans leurs dimensions.

Quand ces évacuations deviennent fréquentes, habituelles, au point de constituer une véritable maladie, elles deviennent en général, moins abondantes, et le sperme perd insensiblement ses qualités normales. Les zoospermes sont ordinairement plus petits que dans l'état de santé, et toujours beaucoup moins vivaces qu'après le coït. Je conserve des préparations dans lesquelles ils ont près de moitié moins de volume et de longueur qu'à l'ordinaire, et il m'est arrivé plusieurs fois, de n'en plus trouver un seul vivant quelques minutes après qu'il avait été expulsé. Tout étant préparé, les malades avaient été à la selle près de mon cabinet, ils avaient reçu la liqueur séminale sur un verre disposé exprès, je l'avais mis immédiatement sur le foyer

du microscope et déjà tous les zoospermes étaient complètement immobiles. L'addition d'une goutte d'eau tiède ne produisit aucun effet. Ainsi quelques minutes avaient suffi pour les faire périr.

Quand la maladie devient très grave, les zoospermes deviennent rares : ils sont même quelquefois remplacés par des globules ovoïdes ou sphériques semblables à ceux dont j'ai déjà parlé. Je n'ai rien trouvé de plus chez trois malades arrivés au dernier degré de dépérissement et qui rendaient assez de sperme à chaque selle pour remplir une cuillère à café. Je dis que c'était du sperme, parce qu'on ne pouvait se méprendre à son odeur, et que l'urèthre n'expulse jamais subitement une aussi grande quantité de mucus ou de fluide prostatique. Ces cas sont extrêmement rares, à la vérité, mais il serait d'autant plus fâcheux de les méconnaître qu'il est plus urgent d'y porter remède, car ce sont précisément les plus graves.

§ 13. J'ai dit que les écoulemens continus n'étaient jamais spermatiques, quelque ressemblance que la matière pût avoir avec du sperme mal élaboré. En effet, je n'ai jamais rencontré d'animalcules dans ces matériaux fournis par la blennorrhée; je n'y ai jamais vu que des globules très variés, des débris d'épithélium et des filamens qui paraissaient énormes sous le plus faible grossissement; très longs, cylindriques, plus ou moins transparens, quelquefois rameux; ces filamens proviennent de la coagulation du fluide prostatique dans l'urèthre : ce sont eux qui tourbillonnent dans le premier jet d'urine, et qui préoccupent si souvent les malades. Je ne veux pas dire par là que je n'ai jamais trouvé de zoospermes chez les individus affectés de blennorrhée, mais ce n'est pas dans la matière même de l'écoulement que j'en ai rencontré, c'est dans celle qui s'était échappée brusquement et en masse comme dans les pollutions diurnes ordinaires, c'est-à-dire quand la blennorrhée était compliquée, ce qui est très commun.

Dans quelques cas graves, ce n'est pas seulement dans les efforts de la défécation que le sperme s'échappe, il suffit quelquefois que les muscles abdominaux se contractent fortement pour déterminer l'expulsion de quelques gaz. Les malades

éprouvent alors de l'humidité à l'extrémité du gland; s'ils expri ment l'urèthre et conservent le liquide sur une lame de verre, on y découvre des zoospermes ordinairement en petit nombre et mêlés à des globules de mucus, à des débris d'épithélium, mais très faciles à reconnaître, pour peu qu'on en ait l'habitude.

§ 14. En résumé, les pertes séminales qui compliquent les écoulemens chroniques en diffèrent par leur abondance, par leur instantanéité, par leur intermittence, et le microscope ne laisse aucun doute sur la nature du fluide. Je dois faire observer cependant que cet instrument ne fait alors que confirmer ce qu'apprennent les plus simples notions d'anatomie et de physiologie, car les glandes cooper, les follicules de la prostate et de l'urèthre, manquent de réservoir; leurs produits doivent donc s'écouler d'une manière lente et continue; ils ne peuvent augmenter momentanément que de quelques gouttes. Ainsi, toutes les fois qu'il s'y joint une émission subite et un peu copieuse, il faut supposer qu'elle provient des vésicules séminales, qu'elle est par conséquent spermatique. C'est surtout pour la recherche du sperme contenu dans les urines que le microscope a été mis à contribution avec ardeur. Quoique les procédés suivis jusqu'à présent doivent être remplacés tous par un plus simple, je dois dire ce que j'en sais et comment j'ai répété ces expériences. Ayant toujours à ma disposition du sperme frais ou desséché provenant des malades, j'en ai mis une quantité égale dans de l'urine provenant d'une même émission, après avoir constaté qu'il contenait une grande quantité d'animalcules. Je ferai remarquer, en passant, que le sperme desséché spontanément peut reprendre exactement tous ses caractères après plusieurs années, quand on l'humecte lentement et sans l'agiter; non-seulement il recouvre son aspect, son odeur, etc., mais encore les animalcules reparaissent avec la forme qu'ils avaient avant la dessiccation. C'est d'abord sur du sperme desséchée que j'ai agi, mais je me suis bientôt aperçu que les animalcules s'altéraient promptement dans l'urine; probablement parce que leur texture avait été modifiée par la sècheresse quoique leurs formes ne fussent pas altérées. Depuis lors,

je ne me suis plus servi que du sperme frais apporté par mes malades.

Il a toujours produit dans l'urine un nuage rempli de *points brillans*, tout-à-fait semblables à ceux dont j'ai parlé à l'occasion des vésicules séminales, nuage qui restait ordinairement suspendu dans les couches inférieures de l'urine, mais qui s'élevait par la moindre agitation; tandis que le mucus se dépose au fond du vase et même y adhère, sans contenir d'ailleurs de *points brillans*. Cette expérience directe confirme donc exactement ce que j'ai dit ailleurs des urines qui contiennent du sperme.

Une observation non moins remarquable sous d'autres rapports, c'est la rapidité ou la lenteur de la décomposition des animalcules suivant qu'ils proviennent de malades plus ou moins gravement affectés. Toute erreur à cet égard était impossible; car chaque verre portait le nom de l'individu et la date de l'immersion du sperme dans l'urine.

Les zoospermes ont disparu complètement dans les cas les plus fâcheux, vers le huitième jour, tandis que dans d'autres, ils étaient encore reconnaissables après cinquante jours. Je n'en ai jamais retrouvé plus tard; mais, par analogie, je crois que le docteur Donné a pu en reconnaître après trois mois d'immersion, puisqu'il a opéré sur de la liqueur séminale provenant d'individus bien portans.

Une résistance si prolongée à la décomposition est bien remarquable dans des êtres si petits et presque transparens, surtout quand on voit les formes des Monades s'altérer quelques heures après la mort. Cette persistance prolongée de la forme des zoospermes annonce une organisation plus compacte, plus puissante, qu'on ne la suppose: elle suffirait seule pour faire distinguer les zoospermes des infusoires ordinaires. La résistance inégale des zoospermes à la décomposition dans l'urine, suivant qu'ils proviennent d'individus sains ou affectés du spermatorrhée plus ou moins grave, doit être rapprochée des différences que j'ai déjà signalées dans leur nombre, dans leurs dimensions, dans leurs formes, dans l'énergie et la durée de leurs mouvemens. Toutes ces variations, si contraires aux idées reçues, suf-

firaient déjà pour indiquer que les animalcules sont des produits de l'organisme et non des parasites.

Quelques jours avant qu'ils disparaissent, leur surface s'altère, se déforme, et des globules apparaissent sur différens points, en sorte qu'on croirait quelquefois voir une seconde tête se développer à côté de la première. La queue semble aussi se rétrécir vers son insertion, etc. Je n'aurais pas parlé de ces effets naturels de la décomposition putride, s'ils n'avaient prêté à l'imagination de quelques observateurs superficiels, des argumens en faveur de la reproduction des zoospermes par *gemmiparité*, par *scission transversale*.

Quand on examine journellement ce qui se passe dans les urines, on ne tarde pas à y voir paraître des monades, des vibrions, etc., dont le nombre augmente de jour en jour. Ces infusoires, dans leurs brusques mouvemens, impriment à tout ce qu'ils heurtent des déplacemens qu'on pourrait croire spontanés. Les vibrions ont quelque ressemblance avec la queue des animalcules: quand ils se trouvent confondus ensemble ou mêlés à des globules, on croirait souvent voir remuer des zoospermes. Je sais que de pareilles illusions ne peuvent tromper que des observateurs peu exercés ou préoccupés; mais je ne puis expliquer autrement certains faits rapportés par Burdach avec une incroyable crédulité, pour soutenir une opinion non moins extraordinaire, celle de la génération spontanée des animalcules dans les substances animales en putréfaction.

§ 15. Voyons maintenant quels procédés on peut suivre pour les amener sous le foyer du microscope.

Leur densité les fait tomber à la partie la plus déclive du vase, c'est donc dans la couche inférieure de l'urine qu'il faut les chercher. Le docteur Devergie verse le dépôt dans un tube de verre, assez large, mais effilé par un bout à la lampe. Après quelques heures de repos, il coupe avec des ciseaux l'extrémité de la pointe, de manière à ne laisser tomber qu'une très petite quantité d'urine sur le porte-objet. Je dois dire que je lui ai vu employer son procédé avec un succès complet. Mais, en supposant que tous les praticiens puissent y apporter la même dextérité, ce procédé présente des inconvéniens que l'observa-

teur le plus habile ne peut éviter. Je fais abstraction de la nécessité d'effiler chaque fois la pointe, ne décanter l'urine, de l'introduire dans le tube, etc. Il se dépose ordinairement des cristaux par le refroidissement: ils sont encore plus lourds que les animalcules et s'opposent au passage de l'urine quand la pointe du tube est coupée au dessous de l'obstacle; quand on arrive au dessus des cristaux, l'urine tombe en masse, couvre tout le porte-objet, et l'expérience est manquée. D'autres fois, c'est par des matières filantes et tenaces, que le tube est obstrué. Ces difficultés se présentent d'autant plus souvent chez les malades affectés de pollutions diurnes, que leurs organes urinaires sont ordinairement irrités. Il paraît enfin que les zoospermes ne tombent pas toujours exactement à la partie la plus déclive; car il m'est arrivé de n'en pas trouver dans des urines où j'en avais vu la veille. Pendant que j'examinais les premières gouttes qui étaient tombées sur le porte-objet, une nouvelle quantité de liquide s'était échappée, et c'est probablement celle qui contenait les animalcules; car je n'en ai pas trouvé dans le reste. Ce procédé, tout ingénieux qu'il est, présente donc des difficultés et peut même être infidèle.

Le moyen le plus simple consiste à puiser, avec une pipette, l'urine qu'on suppose contenir du sperme. C'est la première pensée qui doit se présenter à l'esprit de quiconque a fait quelques expériences de chimie. Mais on ne puise pas toujours dans le point le plus convenable, on peut faire monter des animalcules dans la partie supérieure du tube, en y laissant pénétrer trop d'urine, et n'en plus avoir dans les deux ou trois gouttes qu'on laisse tomber sur le porte-objet, ou bien il peut s'en échapper une trop grande quantité à-la-fois. Il m'est arrivé souvent de passer plusieurs séances sans rencontrer un seul zoosperme dans des urines, où j'en avais mis, ou d'en rencontrer du premier coup après en avoir vainement cherché la veille. Ce procédé, plus simple que le précédent, me paraît donc être aussi plus infidèle.

Quand les urines ont été filtrées convenablement, la plus grande partie des animalcules reste sur le filtre et occupe le centre, qui se trouvait, pendant l'opération, la partie la plus déclive. On peut donc être certain de les avoir presque tous

réunis sur une surface peu étendue. Il semble dès-lors qu'il suffirait d'appliquer cette surface, encore humide, sur le porte-objet; pour y déposer les animalcules. Mais ceux-ci ne quittent pas facilement les aspérités du papier pour adhérer à la surface lisse du verre. Il faut donc enlever cette partie centrale du filtre, la renverser sur un verre de montre rempli d'eau, et l'y laisser pendant vingt-quatre heures : quand on l'enlève, les animalcules sont presque tous tombés au fond de la capsule, où il est facile de les puiser, en attirant dans la pipette quelques gouttes de la couche inférieure du liquide. Ce procédé est certainement le plus sûr; mais il est aussi le plus long et le plus minutieux.

On voit que toutes ces opérations exigent beaucoup de temps, de soin et de patience avant de conduire à un résultat un peu positif. Il est donc difficile qu'elles deviennent usuelles. Il n'y a pas de praticien un peu occupé qui puisse y avoir recours journellement, lors même qu'il en aurait acquis l'habitude. Je me suis fait un devoir de répéter toutes ces expériences, de les comparer, de les varier, pour savoir à quoi m'en tenir, et je ne regrette pas le temps que j'y ai consacré, parce qu'elles m'ont permis de vérifier la valeur de plusieurs symptômes de pollutions diurnes; mais je renoncerais à traiter ces malades, s'il me fallait répéter, pour chacun d'eux, ce que j'ai fait dans l'intérêt de la science. On a bien fait d'insister sur l'application du microscope à l'étude des pertes séminales, et le docteur Mandl a eu raison de dire que ces maladies sont assez graves, assez nombreuses, pour que les médecins accordent quelques mois à l'étude des zoospermes, eux qui consacrent plusieurs années à s'exercer aux diverses applications du sthétoscope. Mais il se laisse entraîner un peu trop loin, lorsqu'il prétend que *la diagnose est faite en peu d'instans*, que *tous les doutes sont dissipés*, etc. (Traité pratique du microscope, page 148). Il s'est fait illusion sur la facilité, sur la certitude de ces recherches, parce qu'il y avait consacré sa vie, parce que sa clientelle ne l'empêchait probablement pas de terminer à loisir une expérience commencée. Mais le praticien le moins occupé n'est pas du tout dans les mêmes conditions, et le traité du docteur Mandl ne lui offrirait pas de moyens plus expéditifs que ceux dont je viens de parler. Enfin il semble ignorer que les

pertes séminales offrent souvent des intermittences notables, et probablement il cesserait lui-même de soupçonner des pollutions diurnes, après avoir vainement cherché des zoospermes pendant huit ou quinze jours dans les urines d'un malade.

Il faut le dire franchement, tous les micrographes ont suivi une mauvaise direction en cherchant toujours les zoospermes dans les urines, et leur persistance à cet égard prouve qu'ils n'avaient pas suffisamment observé la maladie; car ils auraient pu atteindre leur but d'une manière prompte et sûre, en recommandant au malade d'exprimer le canal après avoir uriné, et de recevoir sur un morceau de verre, une goutte du liquide qui se présente à l'ouverture du gland.

En effet, toutes les fois que du sperme est rendu pendant l'émission de l'urine, c'est toujours à la fin du jet, et quelques fois même quand la vessie est complètement vidée. Il en reste donc toujours dans le canal plus qu'il n'en faut pour une observation microscopique. Si ce verre est mis à l'instant sous le foyer, après avoir été recouvert d'une lame mince, tout se trouve dans les conditions les plus favorables à l'étude des animalcules, et l'on peut les observer vivans. Cependant il est rare que les malades rendent du sperme chaque fois qu'ils urinent; les intervalles sont très variables et les retours imprévus. Il arrive donc ordinairement que les pertes les plus abondantes ont lieu quand le malade est loin de son médecin et même loin de chez lui; mais les recherches microscopiques par le procédé que je viens d'indiquer, peuvent avoir lieu de même, et c'est en cela surtout, qu'il est supérieur à tous les autres. En effet, le malade ne peut transporter partout un vase pour garder ses urines, mais rien ne l'empêche d'avoir un morceau de verre de l'étendue de l'ongle, d'y recevoir une goutte de la matière exprimée du canal et de l'y laisser dessécher, ce qui peut être terminé en deux ou trois minutes. Après quoi ce morceau de verre peut être transporté partout, envoyé à toutes les distances, pourvu qu'on le préserve de la poussière et des frottemens. Il ne reste plus alors à l'observateur qu'à laisser tomber une goutte d'eau sur la tache laissée par l'évaporation, pour rendre à la matière sa première fluidité et tous les caractères qu'elle avait avant son des-

sèchement, quand bien même il aurait duré plusieurs années.

Ce procédé simple et expéditif peut être employé par tous les praticiens qui voudront avoir un bon microscope et s'exercer à ces recherches, dans les circonstances que j'ai indiquées ci-dessus, car la marche est toujours exactement la même, et ils auront bientôt pris l'habitude de reconnaître les zoospermes, quand ils les auront vus vivans : ils seront ainsi dispensés de toutes les opérations préalables qu'exigent tous les procédés qui ont pour objet de retrouver des zoospermes dans l'urine, et le microscope pourra désormais devenir, entre leurs mains, un moyen sûr, prompt, véritablement usuel de vérification. Je n'ai pas besoin de dire que le même procédé doit être employé pour constater les pertes séminales qui ont eu lieu pendant la défécation. Seulement on peut alors recueillir tout le sperme qui est expulsé, quand le malade a eu soin de vider préalablement sa vessie, et il est bon d'en apprécier la quantité pour avoir une idée plus exacte de la gravité de la maladie et de ses variations. On préférera donc, dans ce cas, un verre de montre à un verre plat, et on y puisera une goutte de liqueur, à l'aide d'un pinceau mouillé. Si la liqueur avait eu le temps de se dessécher, il suffirait d'y ajouter quelques gouttes d'eau, en évitant d'y toucher jusqu'à ce qu'elle ait repris sa première fluidité, afin d'éviter d'altérer les zoospermes. Quand il s'agit de l'émission des urines, on n'opère que sur une très petite quantité de liqueur restée dans le canal : si on la recevait dans un verre de montre, il faudrait l'en tirer pour la placer sur le porte-objet. Il vaut donc mieux la recevoir immédiatement sur un verre plan. On voit que ce procédé est exactement celui que j'ai indiqué aux praticiens, pour acquérir l'habitude d'observer sur eux-mêmes les zoospermes vivans : ils n'auront rien à y changer pour en faire l'application à l'étude de toutes les pertes séminales involontaires.

Le docteur Bayard a fait des recherches intéressantes sur les moyens de découvrir la nature spermatique des taches que peut présenter le linge, ou tout autre tissu. J'ai répété ses expériences, et je dois dire que je les ai trouvées fort exactes. Mais elles ne peuvent guère être utiles qu'à la médecine légale. Voici pourtant un cas dans lequel on pourrait à la rigueur en tirer

parti. Chez quelques malades, la chemise présente des taches un peu brillantes, demi transparentes, qui raidissent le tissu comme de la gomme ou de l'empoi. Ces taches proviennent de quelques gouttes de sperme qui étaient restées dans le canal après la défécation ou l'émission de l'urine. Si on sépare cette portion de la chemise et qu'on l'étende sur un verre de montre rempli d'eau, la matière visqueuse se dissout, et les zoospermes tombent sans altération au fond de la capsule, d'où on peut facilement les transporter sur le porte-objet à l'aide de la pipette. J'ai constaté qu'une tache de la largeur d'une pièce de 50 centimes donnait assez de zoospermes pour être facilement distinguée de celles qui peuvent être produites par des écoulemens chroniques. Mais les malades n'ayant aucun intérêt à tromper, il est plus simple de leur faire recueillir sur une lame de verre la matière suspecte, et de la placer de suite sous le foyer du microscope.

Au reste, les praticiens pourraient même se dispenser d'avoir recours à cette épreuve, quand ils savent que ces taches sont survenues après l'expulsion des urines ou des matières fécales; car alors elles ne peuvent provenir que d'une matière venue des vésicules séminales : sans compter que les autres taches sont toujours moins fermes, moins brillantes, et empâtent moins complètement l'épaisseur du tissu.

Je dois faire observer en terminant, que toutes les recherches microscopiques dont je viens de parler, confirment pleinement ce que j'ai dit des signes de spermatorrhée; et cela devait être, puisque je n'ai parlé que des phénomènes dont j'avais souvent vérifié la valeur avec le microscope. C'est même probablement de cette manière que ce précieux instrument rendra le plus de service à la pratique. Quoique je me sois efforcé d'en simplifier l'application, je ne me fais pas illusion sur son impuissance quant à l'appréciation des causes de la maladie, de sa gravité et des moyens à lui opposer. Je conçois aussi que la plupart des praticiens ne pourront employer le microscope dans tous les cas et pour toutes leurs périodes; mais il est important que tous puissent répéter les mêmes observations, ou qu'ils sachent du moins qu'elles ont été répétées par d'autres.

§ 16. Maintenant, abstraction faite de toute application pathologique, il résulte des observations microscopiques dont je viens de parler, que les zoospermes disparaissent complètement, chez l'homme, par les progrès de l'âge ; qu'ils n'ont pas toujours, depuis la puberté, la même énergie, la même densité, les mêmes dimensions; qu'ils peuvent être plus ou moins nombreux, très rares et même remplacés par des produits incomplets, par des globules ovoïdes ou sphériques : mais ces données sont tellement contraires aux idées reçues, qu'elles ont besoin d'être appuyées par d'autres faits. J'ai dit qu'à la suite du coït, les mouvemens des animalcules étaient plus énergiques, plus rapides que dans toute autre circonstance, et qu'ils vivaient plus long-temps, toutes choses égales d'ailleurs. Les mêmes observations ont été faites sur les zoospermes des animaux. J'ai vu souvent aussi sur le chien, le lapin, le rat, le coq, etc., les zoospermes tout-à-fait immobiles, quoique les organes fussent encore chauds. Ceci est surtout remarquable sur les Mollusques. Au moment où ils viennent d'être tirés de l'eau, les zoospermes sont très agiles ; le lendemain ils sont complètement immobiles, quoique les individus jouissent encore de contractions musculaires énergiques, ce qu'il est facile de constater dans les bivalves à la manière dont ils rapprochent leurs coquilles ; cependant, la fécondation de ces animaux ayant lieu à travers l'eau, leurs zoospermes doivent y vivre long-temps, lorsqu'ils sont expulsés *spontanément*, sans quoi l'espèce périrait. J'ai remarqué que les mouvemens étaient plus vifs, plus prolongés, dans les zoospermes qui provenaient des vésicules séminales, que dans ceux qui étaient tirés des canaux déférens et surtout des testicules, quoique je commence ordinairement par examiner ceux-ci les premiers, et que je délaie toujours le liquide avec de l'eau tiède (1). Ces différences, déjà remarquées par d'autres, indiquent certainement un progrès dans la vivacité des animalcules, à mesure qu'ils approchent de l'orifice du conduit excréteur.

(1) Je dois faire observer cependant que j'ai vu souvent avec M. Milne Edwards, des zoospermes de plusieurs reptiles devenir subitement immobiles par l'addition d'une certaine quantité d'eau, quoiqu'elle fût à la température de leurs corps.

§ 17. On retrouve chez les animaux aux approches du rut, les mêmes changemens qu'on observe chez l'homme à l'époque de la puberté. Mais il faut à cet égard, établir une distinction entre les animaux sauvages, et les animaux domestiques.

Dans l'état sauvage, le mâle et la femelle se trouvent en même temps disposés à la reproduction, parce que les mêmes causes agissent à-la-fois et de la même manière sur tous deux. Parmi ces causes, il faut ranger particulièrement une nourriture abondante et une température favorable (1). Les ovaires et les testicules, deviennent donc à la même époque, le siège d'une congestion qui acquiert peu-à-peu son *maximum* d'intensité. La turgescence s'étend au reste de l'appareil génital, et les ovules arrivent à l'état de maturité en même temps que les animalcules spermatiques. Dans l'intervalle, les ovules sont dans un état rudimentaire, et la sécrétion des zoospermes diminue; ces êtres disparaissent même complètement et sont remplacés par des globules analogues à ceux que l'on trouve chez le mulet dans tous les temps, chez l'enfant au début de la puberté, chez l'homme dans certains cas pathologiques, ou dans certaines dispositions anormales. C'est chez les oiseaux ainsi que nous l'avons dit, que ces modifications sont les plus tranchées, je les ai vues cependant très prononcées aussi chez les batraciens et les poissons. On voit ainsi se renouveler à chaque période des amours, ce qu'on observe chez l'homme qu'une fois à l'état normal. On peut donc regarder comme une règle générale, l'absence des animalcules complets, quand la femelle n'a pas d'ovules à l'état de maturité. Aussi est-ce toujours au moment des amours qu'il faut commencer, dans chaque espèce, l'étude des zoospermes pour les observer à l'état parfait. A l'état sauvage,

(1) Cet hiver, un automne humide a été suivi de jours très chauds; les lilas les amandiers, etc., se sont couverts des feuilles et de fleurs; les batraciens sont entrés en rut au commencement de décembre ; en sorte que, dans le mois de janvier, tous les fossés étaient remplis de têtards comme au printemps. Il y avait donc eu un changement de saison qui avait produit tous ces effets comme s'il était venu cinq mois plus tard. Pour que la fécondation ait eu lieu au commencement de l'hiver, il a bien fallu que des ovules se développassent dans l'ovaire en même temps que des zoospermes dans les testicules, et qu'ils acquissent à-la-fois leur plus haut point de perfection.

l'apparition des animalcules est donc précédée et suivie de la production de corps incomplets, et les testicules sont dans les mêmes conditions que les ovaires. Il n'existe d'animalcules complets chez le mâle, que quand la femelle a des ovules à l'état de maturité.

Mais chez les animaux domestiques, les choses ne se passent pas exactement de même, parce que leur alimentation est toujours assurée, parce qu'ils sont abrités contre les intempéries des saisons, etc., ce qui les met dans les mêmes conditions que l'homme. Cependant, l'homme se reproduit également dans toutes les saisons; pourquoi n'en est-il pas de même des animaux domestiques? Cette différence dépend uniquement de la femelle. En général, elle cesse d'être en chaleur dès le moment qu'elle a conçu. L'éréthisme, le gonflement des parties génitales disparaissent, ainsi que la sécrétion abondante dont l'odeur excite si puissamment le mâle. Il cesse dès-lors de rechercher la femelle : s'il en approche, elle le repousse avec impatience. La truie est peut-être la seule qui reçoive le mâle après avoir été fécondée. Et encore n'est-ce que pendant quelques jours.

Dès que l'utérus est devenu le siège du travail si actif de la gestation, tout signe extérieur du rut disparaît, et l'indifférence la plus absolue persiste jusqu'au moment où les soins de la mère sont inutiles à la nouvelle génération : c'est alors seulement qu'une nouvelle période commence. Or, les mêmes phénomènes se manifestent à la même époque chez toutes les femelles de la même espèce, qui occupent le même pays : il en résulte qu'après le rut, les mâles n'en rencontrent plus qui réveillent en eux l'organisme vénérien; la sécrétion des testicules se ralentit, mais elle ne cesse pas complètement si les alimens sont abondans. Aussi les désirs se réveillent-ils bientôt avec énergie à la moindre excitation. Lorsque la brebis, l'ânesse, la vache, la jument ont été soustraites aux approches du mâle, ou lorsqu'elles n'ont pas été fécondées, de nouveaux ovules arrivent promptement à maturité, par l'absence de tout travail utérin. Alors le taureau, le bélier, sont excités de nouveau à la copulation, et s'y livrent avec la même ardeur que dans la saison des amours. La même chose arrive plus souvent encore chez les

chiens et chez les chats, parce que, dans ces espèces, il y a toujours des femelles qui entrent en chaleur plus tôt ou plus tard que les autres, soit qu'elles aient été séquestrées, soit qu'on leur ait ôté leurs petits, etc., car ce n'est pas seulement la gestation qui ralentit le travail de l'ovaire, c'est encore la lactation, qui porte sur les mamelles la fluxion dont l'utérus avait été le siège. Aussi les phénomènes du rut ne paraissaient-ils chez ces femelles, que quand elles n'ont plus de petits à nourrir, et c'est ce qui peut seul expliquer ce qu'on observe chez certains herbivores très salaces. Les lapins, les cabiais bien soignés, font des petits dans toutes les saisons. Les mâles les plus ardens ne tardent pas à tourmenter les femelles dès qu'elles ont mis bas, mais elles leur résistent pour ne s'occuper que de l'allaitement. Alors les plus furieux finissent par se jeter sur les petits, et parviennent à les étrangler malgré les soins de la mère. Aussi ceux qui ont l'habitude d'élever ces animaux, ne manquent-ils jamais d'isoler les mâles pendant toute la durée de l'allaitement. Ces actes inexplicables chez des herbivores, ne doivent donc être rapportés qu'à l'instinct de la propagation, exalté par une nourriture abondante et une douce température. Si cette disposition avait existé à l'état sauvage, elle aurait amené la destruction de l'espèce.

En résumé, à l'état domestique, le mâle reste apte à la fécondation dans l'intervalle du rut : si l'accouplement n'a pas lieu dans tous les temps, c'est que les phénomènes du rut ne reparaissent chez les femelles qu'après l'allaitement, et c'est ce qui explique les exemples de masturbation, etc., qui ont été observés chez quelques mâles bien nourris et peu fatigués. Aussi trouve-t-on dans ces espèces de zoospermes à toutes les époques de l'année, du moins dans les vésicules séminales, car il arrive quelquefois, qu'après une très longue abstinence, on n'en rencontre plus, dans les vaisseaux sécréteurs, que des corps incomplets comme ceux qui existent chez le mulet. C'est si bien à la femelle seule qu'il faut attribuer, chez ces espèces domestiques, la continence du mâle, que le coq n'éprouve jamais d'interruption complète et prolongée dans ses fonctions génitales; tandis qu'il n'en est pas de même pour le pigeon, aussi ardent que le coq,

extérieures d'êtres aussi petits et aussi simples, ne peut suffire pour faire admettre cette identité d'origine, d'organisation et de fonctions. Les cercaires sont d'ailleurs plus compliqués; quelques espèces ont même des rudimens d'yeux. Si l'on ne consultait que les formes, on ne pourrait au contraire rapprocher les animalcules des mammifères de ceux des poissons et des insectes, il faudrait en séparer surtout ceux qui sont contenus dans des capsules particulières, quelquefois très compliquées. On peut juger du danger d'un pareil système dans une question aussi délicate, parce qui est arrivé à Czermak pour avoir voulu classer aussi les zoospermes d'après leurs formes. Sa première section comprend les *céphaloïdes* qui sont, dit-il, arrondis, en forme de disque, et c'est dans cette section qu'il range les zoospermes des poissons, qui sont précisément ceux dont la queue est plus longue, mais aussi la plus déliée, ce qui a long-temps empêché de l'apercevoir. Il faudrait donc des considérations d'une autre nature et d'une plus grande importance, pour assimiler les zoospermes aux cercaires.

Des observations superficielles de Buffon firent supposer, pendant quelque temps, que les organes femelles pouvaient aussi contenir des animalcules spermatiques; mais cette illusion fut bientôt relevée avec d'autres du même genre dont j'ai déjà indiqué la cause. Cependant, comme toute erreur tend à se reproduire avec une incroyable ténacité, surtout quand elle vient d'un homme de génie, Burdach cite encore des observations plus récentes, d'où il résulterait qu'on aurait trouvé des zoospermes, ou des parasites semblables à des zoospermes, dans des organes femelles de certains Mollusques.

Ceci peut s'expliquer parfaitement, et de plusieurs manières, chez ces animaux.

Il en est beaucoup qui sont hermaphrodites, et chez lesquels l'oviducte et le canal déférent sont intimement unis dans une partie de leur étendue. Il est donc facile de les confondre dans le cours d'une expérience. Mais, il y a plus, ces conduits communiquent quelquefois directement par une longue fente; en supposant qu'elle s'oblitère pendant la copulation, par le gonflement des parties, ainsi qu'on le suppose, il n'en peut être de

même pendant une dissection, et la liqueur séminale peut facilement passer du canal déférent dans l'oviducte. Chez d'autres, le pénis du mâle est introduit dans le canal excréteur de l'ovaire, et l'on doit y trouver des zoospermes après la copulation: il existe même chez les Limaces, les Escargots, etc., sur le trajet de l'oviducte, une dilatation, ou *bourse copulative*, dans laquelle le sperme est déposé pour opérer ensuite la fécondation, à mesure que les œufs descendent de l'ovaire : cette bourse doit donc contenir des zoospermes long-temps après la copulation. C'est ce que ne savaient pas les observateurs cités par Burdach, puisque ces faits n'ont été constatés que depuis quelques années. Une cause d'erreur bien plus frappante encore, et plus commune, a dû naître de la détermination erronée des organes mâle et femelle dans un très grand nombre de Mollusques. Cuvier, qui a le premier débrouillé cet immense chaos par des travaux qui font son plus beau titre de gloire, Cuvier s'est trompé très souvent sur la nature des organes génitaux qu'il avait si bien disséqués et dessinés, parce qu'il ne s'était pas servi du microscope pour apprécier la nature des produits fournis par l'ovaire et le testicule. Dans d'autres cas, il n'a cru voir que des femelles dans certaines espèces, parce que les testicules ressemblent parfaitement aux ovaires, par leur position, par leur forme et la distribution du conduit excréteur; ou bien il a regardé comme hermaphrodites des espèces dont les sexes sont séparés. Ainsi, par exemple, il a fallu les recherches microscopiques et les expériences de M. Prévost pour démontrer que les sexes sont séparés dans la Moule (*Unio pictorum*). Nous avons constaté la même erreur, M. Milne Edwards et moi, dans les Vénus et dans les Patelles, et tous les jours le microscope en fait découvrir d'autres semblables dans cette même famille des Mollusques. (1)

(1) Je dois prévenir ceux qui voudraient répéter ces recherches, qu'il faut employer des grossissemens de huit à neuf cents fois pour voir les queues déliées et transparentes de ces zoospermes, et étendre la liqueur avec de l'eau alcoolisée, ou la laisser dessécher; pour voir leurs mouvemens, il faut choisir la plus grande activité de l'époque des amours, et opérer sitôt qu'on tire le Mollusque de l'eau.

Il est facile de concevoir que les micrographes, en partant de ces déterminations erronées, aient trouvé souvent des zoospermes dans ce qu'ils regardaient comme des ovaires, des oviductes; mais le tort qu'ils ont eu, c'est d'avoir montré plus de confiance dans Cuvier que dans leur instrument : au lieu de prétendre qu'ils avaient trouvé des zoospermes dans un organe femelle, ils devaient dire : « Cuvier a pris un testicule pour un ovaire, parce qu'il n'a pas fait usage du microscope pour en étudier les produits. »

Les faits invoqués par Burdach pour ressusciter l'opinion de Buffon ne méritent donc pas plus de confiance que les observations microscopiques du grand naturaliste.

Le physiologiste allemand fait observer qu'on trouve en tout temps une grande quantité de zoospermes dans la vésicule séminale des Lapins, quoique les canaux déférens s'ouvrent directement dans l'urèthre. Voici ce que j'ai remarqué à cet égard : 1° la quantité de zoospermes qu'on trouve dans la vésicule séminale des Lapins varie beaucoup d'un moment à l'autre; tout récemment, il m'est arrivé de n'en pas trouver un seul au milieu des globules variés qui remplissaient cette cavité; 2° les orifices des canaux déférens se trouvent placés au-dedans du repli de la membrane muqueuse qui entoure l'ouverture de la vésicule séminale; en sorte qu'il faut écarter ce repli de chaque côté pour bien voir l'endroit où se terminent ces canaux sécréteurs. D'un autre côté, lorsqu'on incise la vésicule séminale, après avoir renversé la vessie en avant, et qu'on pousse une injection colorée dans l'un des canaux déférens, on voit passer une partie de l'injection par l'incision; ce qui prouve que la disposition des orifices des canaux déférens au-dedans de ce repli est très favorable au passage direct des zoospermes dans la vésicule séminale. Il faut bien admettre que, pendant la vie, l'ouverture de ce réservoir n'est pas aussi béante qu'après la mort, surtout quand on l'entr'ouvre pour voir les orifices des canaux déférens. Dans l'état de rut, la turgescence de l'urèthre doit encore favoriser davantage le passage direct des zoospermes dans leur réservoir. Il n'est donc pas étonnant qu'on y en trouve habituellement.

Burdach s'étonne aussi de ce qu'on ne trouve pas de zoospermes dans les vésicules séminales du Rat, ce qui lui fournit un argument en sens contraire du précédent; mais celui-ci ne repose que sur un vice de langage. Les premiers anatomistes qui ont disséqué ces organes dans le Hérisson, le Rat et d'autres Rongeurs, ont été frappés des dimensions de ces poches, de leur nombre, de leurs complications, et ils en ont conclu naturellement qu'elles étaient d'une grande importance dans la fonction. Il les ont trouvées très distendues à l'époque du rut, et ils ont dû croire que c'était par du sperme. De là le nom de vésicules *séminales* qu'ils ont imposé à ces dilatations avec d'autant plus de confiance qu'elles ont à-peu-près la même position, les mêmes apparences que les vésicules séminales de l'Homme et de la plupart des Mammifères. Ces inductions semblaient donc irréprochables, et l'on ne saurait blâmer Cuvier de s'y être laissé prendre. Cependant, avant de les admettre définitivement, il eût fallu rechercher avec soin le mode de terminaison des canaux déférens, et surtout, examiner au microscope la matière qui distendait ces vésicules. Alors on aurait vu qu'elles n'avaient pas de communication directe avec les canaux déférens, et qu'elles étaient entièrement remplies de grumeaux brillans et irréguliers semblables à ceux qu'on trouve chez l'Homme dans les anfractuosités des vésicules séminales, à la suite des maladies longues. Alors on eût compris que ces dilatations sont uniquement des organes de sécrétion, et que ces matériaux, accumulés en si grande quantité à l'époque du rut, sont destinés à favoriser le transport et la dilution des zoospermes, comme le fluide fourni par la prostate, les glandes de Cooper et les follicules muqueux de l'urèthre; en un mot, que ces vésicules ne sont pas, comme celles de l'homme, des réservoirs de sperme; qu'elles ne remplissent que la moitié des fonctions départies aux véritables vésicules séminales. En étudiant ensuite les transformations qui s'opèrent dans les organes de sécrétion situés sur le trajet du sperme, on eût vu que les uns manquent parfois complètement, ou se remplacent réciproquement; que les autres peuvent changer d'apparence extérieure et même de structure sans cesser de remplir la même fonction. Ainsi, par

exemple, dans le Lapin dont je parlais tout-à-l'heure, la prostate a conservé sa position, et jusqu'à un certain point sa structure ordinaire; mais les follicules muqueux, au lieu de s'ouvrir isolément et directement dans l'urèthre, comme chez l'homme, versent leurs produits dans un petit nombre de conduits qui se terminent au-devant de la vésicule séminale. Ici on reconnaît encore assez la prostate pour lui conserver son nom; mais je suppose que plusieurs de ses follicules s'allongent et se dilatent de chaque côté, on aura exactement la même disposition que dans le rat et le hérisson; seulement le changement aura été si grand, qu'on ne trouvera plus d'analogie entre ces dilatations et les follicules prostatiques. Elle existe cependant d'une manière bien évidente, puisque la fonction est exactement la même, et le rapprochement est d'autant plus naturel, qu'il porte sur des Rongeurs très voisins les uns des autres et du même pays.

Si les zoologistes avaient tenu compte de toutes ces considérations, ils auraient appelé ces dilatations des vésicules *accessoires* ou *sécrétoires*, et ils auraient évité aux physiologistes des erreurs d'une autre nature.

En effet, Burdach n'est pas le seul qui ait été trompé par ces déterminations erronées, elles ont sans doute contribué à l'opinion de MM. Prévost et Dumas sur les fonctions des véritables vésicules séminales : n'ayant pas rencontré de zoospermes dans les vésicules *accessoires* de plusieurs Rongeurs, ils en ont conclu que celles qu'on trouve dans les vésicules séminales, dans celles du lapin par exemple, y pénètrent par hasard; enfin, que les vésicules séminales ne sont pas des réservoirs, mais des organes de sécrétion. Ainsi, l'autorité de Cuvier a prévalu encore une fois sur celle du microscope, même dans l'esprit de ceux qui devaient à ce précieux instrument leurs plus belles découvertes.

On conçoit pourquoi Burdach tenait à établir qu'on trouve des zoospermes dans des organes femelles, dans des cavités sans communication directe avec les testicules, tandis qu'on n'en rencontre pas toujours dans les *vésicules séminales*. Il s'agissait pour lui de faire prévaloir l'opinion que ces êtres vivans ne sont autre chose que des Entozoaires ordinaires, de véritables parasites qui se développent, comme tous les autres, partout où

ils rencontrent les conditions nécessaires à leur existence. Mais au lieu de s'appuyer sur des faits obscurs ou mal observés, sur la fausse détermination de certaines parties, il aurait dû examiner si ce rapprochement était fondé sur l'analogie, et il aurait vu bientot qu'elle était entièrement contraire à son opinion.

Les parasites se développent surtout chez les individus jeunes, faibles, d'une mauvaise constitution, mal nourris, exposés à l'intempérie des saisons, etc.; au contraire, les zoospermes n'apparaissent qu'au moment où le corps a pris la plus grande partie de son développement: ils sont reproduits avec d'autant plus de rapidité, que l'individu est plus robuste, mieux nourri, etc.; et ils diminuent sous l'influence de toute cause débilitante *physique* ou *morale*, de toute altération de la santé; conditions favorables aux parasites. Les organes souffrent toujours de la présence des Entozoaires; leur expulsion est toujours suivie d'une amélioration dans la fonction, dans l'état général de l'économie; le séjour prolongé des zoospermes augmente au contraire la force physique et l'énergie morale. Il suffirait de l'affaiblissement produit par leur expulsion exagérée pour éloigner tout rapprochement avec les parasites. Je ferai remarquer, à cette occasion, que ce n'est pas seulement l'absence de l'influence séminale qui agit sur les malades affectés de pollutions, comme on l'a si souvent répété; car les eunuques mangent bien, dorment d'un sommeil tranquille; il en est qui ont montré de la capacité et même du courage; leur santé n'est pas plus souvent dérangée que celle des hommes complets. Ceux qui sont épuisés par des pertes séminales involontaires tombent dans un état bien plus déplorable. Cependant la liqueur séminale n'est pas complètement absente comme chez les eunuques; elle n'est pas entièrement sans action sur les organes génitaux, puisqu'ils éprouvent encore quelques érections. L'économie doit donc en ressentir aussi quelque influence. Il faut par conséquent attribuer les symptômes graves qu'éprouvent ces malades, et dont les eunuques sont exempts, à la fatigue qu'entraîne une sécrétion exagérée de sperme. Mais il n'y a pas d'autre évacuation dans l'économie qui produise, à quantité égale, des effets analogues. D'où vient cette énorme différence? Elle ne tient pas au

liquide amorphe dans lequel nagent les zoospermes, puisqu'on en rencontre de semblables dans beaucoup d'autres organes dont la sécrétion n'a pas à beaucoup près la même importance. C'est donc aux animalcules qu'elle doit tenir. Mais si c'étaient des parasites, pourquoi leur expulsion aurait-elle des effets si déplorables? Si l'on se rappelle qu'une seule goutte de cette liqueur à l'état normal contient des milliers d'êtres vivans, on concevra que leur production ait d'autres conséquences que celle du mucus; que leur composition, leur énergie, leur vivacité, etc., soient modifiés par les passions, par les images et les idées lascives, par l'acte vénérien, etc., toutes choses qu'il est impossible d'expliquer, si l'on regarde les zoospermes comme des parasites, et l'on ne peut choisir qu'entre l'une ou l'autre de ces deux hypothèses.

D'un autre côté, on connaît le mode de reproduction des Entozoaires; on a même parfaitement constaté qu'ils se propageaient par les divers modes connus jusqu'à présent. On ne connaît, au contraire, absolument rien de semblable chez les zoospermes. M. Bory Saint-Vincent pense qu'ils pourraient bien se reproduire par *scission;* mais cette supposition, jetée en passant, n'est fondée que sur quelques vagues rapprochemens auxquels il ne paraît pas lui-même attacher d'importance. « Gruithuisen, dit Burdach (page 136), prétend avoir vu qu'ils se propageaient par scission longitudinale et par gemmation». Je n'ai pas pris la peine de remonter à la source de cette citation, parce que j'ai indiqué ailleurs les causes de ces illusions, dont il n'est pas aujourd'hui permis d'être dupe. Il n'existe pas à ma connaissance d'autres faits sur le mode de génération des Zoospermes, et, de l'aveu des micrographes les plus distingués, il est encore complètement inconnu.

Mais une difficulté autrement grave se présente pour ceux qui regardent les Zoospermes comme des parasites. C'est leur apparition à l'époque de la puberté, c'est leur retour à l'époque du rut, après avoir disparu complètement pendant une partie de l'année. Ce phénomène remarquable, constant, qui se reproduit sur l'immense majorité des animaux, ne peut s'expliquer que de deux manières. Il faut absolument que les animalcules

se «développent spontanément dans la liqueur séminale dès qu'elle acquiert les qualités nécessaires à ce mode de génération ou qu'ils soient produits par les testicules, quand ils éprouvent une excitation convenable: c'est ce que Burdach a parfaitement compris: aussi met-il à contribution son immense érudition et toutes les ressources de son imagination pour défendre la *génération spontanée* des Zoospermes. On conçoit qu'il m'est impossible de le suivre pas à pas dans cette longue discussion, où il paraît tenir, comme partout, au nombre des faits et des argumens plutôt qu'à leur valeur intrinsèque: il en est cependant que je dois relever.

D'abord Burdach cherche à établir (page 133) que la liqueur séminale est la plus *putrescible* de l'économie; qu'elle se trouve dans toutes les *conditions nécessaires à la production* des infusoires et termine ainsi son raisonnement. « Nous devons donc admettre que les animalcules spermatiques sont des infusoires qui se forment lorsque le sperme, ayant acquis son plus haut degré de perfection, est devenu *très décomposable* et apte à la fécondation; que, par conséquent, ils n'y existent pas dans le principe, et qu'ils n'ont par eux-mêmes aucune connexion avec la vie de l'organisme souche ». Avant d'aller plus loin, il est bon de rétablir la valeur exacte des mots et l'esprit de cet argument. Il ne s'agit pas ici de savoir si le sperme est *très décomposable;* car ce n'est pas dans des matières *décomposables* qu'on voit se former des infusoires; mais, dans des matières *décomposées*, c'est-à-dire dans lesquelles se sont manifestés des phénomènes de *putréfaction.* Or, peut-on supposer que la liqueur séminale, encore contenue dans le testicule ait déjà commencé à se putréfier? C'est ce que Burdach lui-même n'a pas osé dire; mais, si l'expression mitigée dont il se sert n'effarouche pas le bon sens, elle ôte à l'argument toute espèce de valeur, puisque le développement des infusoires dans les matières *putréfiées* était invoqué par lui, pour expliquer celui des animalcules dans la liqueur séminale. Au reste, la fin de ce paragraphe peut donner une idée de la puissance de raisonnement de l'auteur. Après avoir dit que ce n'est point à eux qu'est due la faculté procréatrice; qu'ils ne sont qu'un effet *accessoire*, un phénomène *concomitant* de

cette faculté, il ajoute immédiatement : « *Motif pour lequel ils manquent chez les* enfans, *les* vieillards *et les* malades. »

Ainsi ce qui prouve, suivant Burdach, le peu d'importance des animalcules spermatiques dans l'acte de la fécondation, c'est qu'ils manquent précisément chez les individus incapables de se reproduire!!!

« Needham, dit-il page 134, avait déjà observé que le nombre des animalcules *augmente* lorsque le sperme devient plus liquide et commence, par conséquent, à se décomposer, d'où il concluait qu'ils sont produits par la décomposition de la matière animale ». C'est-à-dire tout simplement, qu'ils deviennent plus apparens par suite du changement de densité qui s'opère dans le liquide ambiant, ainsi que je l'ai expliqué ailleurs. Si Needham s'est laissé tromper par des instrumens imparfaits, Burdach aurait dû connaître ce phénomène de dioptrique.

« Leuwenhoek a trouvé aussi qu'ils ne *deviennent vivans* que par la dilution du sperme, et Gleichen que leurs mouvemens sont lents dans le sperme frais, qu'ils ne font que s'y traîner, qu'ils acquièrent plus de vivacité lorsqu'on étend d'eau cette humeur (loc. cit.) ». Ces changemens, bien connus aujourd'hui de tous les micrographes, tiennent à ce que les zoospermes se voient mieux et se meuvent avec plus de liberté dans le liquide dont on vient de diminuer la viscosité; mais ils n'y *deviennent* pas *vivans;* car ils y périssent tous, quelque précaution qu'on prenne pour leur conserver une température et une humidité convenables.

« Tréviranus a observé dans la semence de la grenouille, fraîche et étendue d'eau, des courans qui entraînaient les globules et les filamens contenus dans le liquide; c'était plus tard seulement que se *formaient* les animalcules doués d'une force locomotive propre » (loc. cit.). C'est-à-dire que les zoospermes étaient entraînés d'abord par la rapidité du courant, et ne pouvaient pas être observés : le calme étant rétabli, ils se mouvaient dans tous les sens, et Tréviranus les observait à loisir. Tout cela est bien simple, bien connu de quiconque a touché un microscope, et la seule chose dont on doive s'étonner, c'est que Burdach ait cru voir là une création spontanée.

« Prévost et Dumas, dit-il un peu plus loin, n'ont aperçu d'animalcules dans la semence épaisse des conduits séminaux des Mammifères, qu'après avoir délayé celle-ci avec de l'eau ». Rien n'est assurément plus simple ; mais voici la conclusion qu'en tire le physiologiste allemand : « C'était donc au fond une *infusion* qui appelait sur-le-champ des *infusoires* à la vie animale, *puisque la force plastique la plus énergique et la plus exaltée ne peut point maintenir la cohésion de la matière vivante, et ne l'empêche pas de se résoudre en liquide* ». Ainsi voilà le sperme qui devient une *infusion* par l'addition d'une goutte d'eau, et des animalcules qui y naissent sur-le-champ !!! Quant à la dernière partie de ce paragraphe, je doute que personne en France en pénètre le sens profond.

« Bory Saint-Vincent, ajoute Burdach, a vu des *Infusoires* naître au bout de quelque temps dans la laitance mise en *infusion* ». Des *infusoires*, oui, mais non des *animalcules spermatiques*. M. Bory Saint-Vincent dit même, à cette occasion : « Loin que cette époque de corruption soit celle du développement de pareils *animalcules*, nul autre microscopique ne se développe dans le sperme *pourrissant* » (*Dict. class. d'hist. nat.*, art. Zoospermes, page 738). Je regrette d'avoir été obligé d'entrer dans tous ces détails ; mais Burdach est le chef de l'école spiritualiste ; d'Oimande, qui voit tout de haut et fait de la science *à priori*. L'ouvrage du maître a produit une grande sensation, par les nombreuses recommandables, la hardiesse de conceptions, la variété des connaissances et l'immense érudition qui s'y trouvent réunies. Je dois ajouter qu'il y règne, sur les observateurs français, un dédain magistral, qui n'a jamais manqué de produire chez nous un engouement irrésistible.

Il m'a donc fallu montrer sur quelles illusions d'optique, sur quelles aberrations de raisonnement l'auteur s'était fondé pour arriver à cette conclusion finale : « Les Spermatozoaires doivent être considérés, de même que les Entozoaires, comme des produits d'une substance organique qui se décompose dans l'intérieur d'un organisme vivant et sous son influence » (page 139). Ceux qui sont habitués aux recherches microscopiques penseront probablement que, pour avoir admis avec avidité tant

de faits sans valeur, il faut que le savant physiologiste allemand n'ait jamais étudié les zoospermes que dans les livres. Tous les micrographes savent parfaitement que, malgré les précautions qu'on peut prendre pour conserver ces êtres vivans dans les conditions de température et d'humidité convenables, ils périssent tous, sans exception, dès le moment qu'il se manifeste le plus léger signe de putréfaction, ce qu'il est facile d'apprécier par le changement qui s'opère dans l'odeur du liquide. M. Bory Saint-Vincent, qui les a étudiés pendant vingt ans dans les espèces les plus diverses, insiste souvent sur ce phénomène, et s'élève de toute sa force contre la pensée qu'ils puissent naître de la décomposition de la liqueur séminale. Son témoignage mérite d'autant plus de confiance dans cette circonstance, qu'il n'admet pas non plus la production des zoospermes par les testicules.

Il est vrai que, sous ce rapport, il s'est montré peu conséquent, car le retour des animalcules après une longue et complète disparition, ne peut s'expliquer que par l'une ou l'autre hypothèse. Celui qui recule devant l'idée de leur *génération spontanée*, doit nécessairement admettre qu'ils sont produits par les testicules. Mais on est conduit directement à cette dernière conclusion par l'observation scrupuleuse des faits.

Quand le rut est dans sa plus grande énergie, les zoospermes sont tellement entassés dans les canaux sécréteurs du testicule, qu'ils y occupent plus de place que le liquide ambiant. Ce fait a été signalé, dès le principe, par Leuwenhoek, et tous ceux qui ont répété ses observations l'ont trouvé parfaitement exact. Ainsi l'accroissement d'activité du testicule a pour résultat essentiel la création des zoospermes. En comparant la liqueur séminale puisée dans le testicule avec celle qui provient du canal déférent, on voit que la proportion du liquide augmente de plus en plus : ce liquide n'est donc qu'un produit accessoire, fourni par les parois des canaux que parcourent les animalcules ; il ne remplit pas d'autres fonctions que celui qui s'y ajoute plus tard.

Dans les vésicules séminales, le liquide est encore plus abondant ; il cesse d'être homogène et transparent, parce qu'il reçoit les produits de la membrane muqueuse de ces réser-

voirs, auxquels se mêlent plus tard ceux de la prostate, etc. Ainsi c'est dans les canaux sécréteurs des testicules que les zoospermes se trouvent entassés en plus grand nombre, et c'est là que la *liqueur* séminale est moins abondante, plus homogène et tout-à-fait transparente. Ces faits, parfaitement connus de Burdach lui-même, auraient dû suffire pour lui faire rejeter l'idée d'une génération spontanée produite par la décomposition des parties constituantes du sperme. Mais ce n'est pas tout; avec un peu d'attention, on s'aperçoit bientôt que les zoospermes ne sont pas toujours disséminés irrégulièrement dans les canaux sécréteurs, comme on le trouve dans les conduits déférens : ils sont au contraire, dans beaucoup d'espèces, appliqués exactement les uns contre les autres, et tous dirigés dans le même sens. Souvent ils se succèdent par fascicules plus ou moins nombreux, suivant les espèces; on les trouve encore groupés de la même manière dans la liqueur qui s'échappe d'une incision pratiquée au testicule, pourvu qu'on la dépose sur le porte-objet sans l'agiter dans l'eau. Dans le Rat, le Lapin, le Cabiais, le Moineau, le Lézard, le Limaçon, etc., je les ai trouvés parfaitement alignés, comme des paquets d'épingles dont toutes les têtes reposeraient sur le même plan. Chez la Raie, on le trouve encore ainsi jusque dans le cloaque. Dans beaucoup d'oiseaux, ces têtes étaient en outre enveloppées par une espèce de capuchon excessivement mince et transparent, qui accompagnait les queues plus ou moins loin, comme un enduit muqueux. J'ai constaté plusieurs fois que toutes ces têtes étaient dirigées vers l'épididyme; mais l'expérience est fort délicate, à cause de la facilité avec laquelle se rompent, chez ces animaux, les canaux sécréteurs, moins résistans, moins isolés, et plus distendus que ceux du testicule de l'homme.

Quoi qu'il en soit, cette disposition régulière par groupes successifs, dirigés tous vers l'extérieur, et composés d'un nombre égal de zoospermes dont les têtes se touchent, cette disposition indique assez que les animalcules viennent de l'extrémité des canaux sécréteurs, et sont produits à-la-fois par fascicules qui se désunissent quand chaque animalcule jouit d'une plus grande énergie et de plus de liberté dans le liquide moins

visqueux qui l'environne. Ce qu'il y a de certain, c'est que je n'en ai jamais vu un seul exercer le moindre mouvement spontané au milieu de ces groupes encore contenus dans le testicule.

Le Dr Milne Edwards a rencontré chez beaucoup d'autres animaux la même disposition par séries régulières, déjà remarquée par Wagner et par M. Dujardin. Il est vrai que nous n'avons rien observé de semblable dans d'autres espèces; mais le mode de développement des ovules et leur disposition, varient de même. Dans beaucoup d'ovaires tubuleux, les ovules se détachent aussi de l'extrémité du tube, par séries; tandis que dans d'autres ils n'arrivent à maturité que l'un après l'autre.

Mais ce rapprochement entre les ovules et les zoospermes est-il fondé? Cette question est grave sous plusieurs rapports. L'analogie est, après l'observation directe, la source la plus féconde d'inductions précieuses; mais il est facile de s'égarer dans cette voie, pour peu qu'on dévie au point de départ, et c'est ce qui fait qu'on a puisé dans de fausses analogies des argumens erronés contre la production des *animalcules* par *sécrétion*.

On ne peut admettre en bonne physique, dit M. Bory Saint-Vincent (*Zoospermes*, page 737.), que des animaux doivent leur origine à un tel mécanisme. Il paraît contraire à toute *analogie* que des glandes *sécrètent* des êtres vivans : ce serait la seule glande dans l'économie qui remplirait de pareilles fonctions.

Présenté de cette manière, l'argument a quelque chose de spécieux, quoi qu'il ne fasse que reculer la difficulté, puisqu'il faut toujours admettre que le testicule concourt à la formation d'un être vivant; mais il ne s'agit pas ici de comparer les testicules à d'autres glandes, puisque la génération ne ressemble à aucune autre fonction. Lorsqu'il existe des sexes séparés, la reproduction ne peut s'accomplir que par le concours de deux individus ou de deux organes distincts. Puisque la fonction est ainsi partagée, la comparaison des organes mâles ne peut s'établir qu'avec des parties analogues de la femelle. Il s'agit donc de savoir si les ovaires se comportent comme les testicules, les oviductes comme les canaux déférens, les ovules comme les zoospermes. La question ainsi ramenée à son véritable point de

vue, conduit aux conséquences les plus remarquables ; mais elle a besoin d'être envisagée dans toute son étendue.

Dans les végétaux, l'ovaire peut être considéré comme une feuille repliée sur elle-même, et les carpelles des ovaires composés, comme des agrégations de feuilles transformées. C'est ce qu'il est facile de voir dans les Légumineuses, les Delphiniées, etc. Malgré les nombreuses modifications que les ovaires subissent dans d'autres espèces, il est toujours possible de les ramener par la pensée à ce type idéal. De même qu'il se développe des propagules à la surface de certaines feuilles placées dans des conditions favorables, des ovules se développent à l'intérieur de celles qui sont repliées en ovaires. L'anthère n'est également qu'une feuille repliée sur elle-même, car il se transforme facilement en pétale, et les pétales ne sont que des feuilles qui ont changé de couleur. Dans chaque cavité de l'anthère, se développent les grains de pollen comme les ovules dans la cavité du carpelle, et chaque grain pollinique, renfermant la pulvisicule fécondante, représente exactement les spermatophores remplis de zoospermes. L'anthère est donc l'analogue du testicule, comme les granules polliniques représentent les animalcules ; l'odeur même de beaucoup de pollens est exactement la même que celle du sperme, et l'analyse chimique donne à-peu-près les mêmes résultats. Mais l'anthère est exactement l'analogue de l'ovaire, puisqu'il se transforme quelquefois réellement en ovaire. L'*Erica tetralix*, par exemple, perd quelquefois ses anthères, ce qui fait appeler cette variété *anandra*, et son ovaire prend autant de loges de plus. Ce fait, signalé depuis très long-temps par Richard le père, a été observé depuis par le fils, sur des pavots, et par M. Moquin-Tandon sur beaucoup d'autres végétaux.

Quant aux animaux, on a souvent comparé avec raison les testicules aux ovaires, les canaux déférens aux oviductes, etc. Mais cette ressemblance n'est frappante, dans les classes supérieures, qu'à l'état embryonnaire ; parce que, plus on s'élève dans l'échelle des êtres, plus les fonctions, les organes, les tissus, se spécialisent, et le fœtus, passant par tous les échelons qui constituent l'état parfait des classes inférieures, leur ressemble

successivement. On voit donc, chez l'embryon des Mammifères, les ovaires et les testicules se développer avec les reins aux dépens du corps de Wolf; ils occupent alors la même place, ils ont les mêmes rapports avec les reins et les parties voisines, et pendant long-temps il est difficile d'y reconnaître des caractères tranchés. Plus on descend dans les classes inférieures, plus les différences s'effacent. Dans les espèces dont l'ovaire tubuleux se continue sans interruption jusqu'à l'ouverture externe, il est impossible de distinguer les organes mâles des organes femelles autrement que par leurs produits. Quand l'ovaire se divise en nombreux rameaux, il devient une véritable *glande* dont le siège, l'aspect, la forme, les dimensions, la couleur, ressemblent souvent à ceux du testicule au point que la dissection la plus minutieuse ne permet pas de les distinguer. C'est ce qui a causé les nombreuses erreurs dont j'ai parlé.

Dans les Radiées, les ovaires et les testicules sont distribués de la même manière à chaque rayon. Dans les Oursins, ils sont également au nombre de cinq à l'intérieur de la cavité commune; ils présentent le même aspect, la même forme, et s'ouvrent dans cinq ouvertures situées entre les épines du dos; en sorte qu'on ne distingue les mâles que par la présence des zoospermes dans le liquide expulsé par ces ouvertures. Dans les Méduses, il existe quatre poches distribuées autour de la bouche, et logées entre les quatre divisions de l'estomac; au fond de chaque poche, est une bandelette en fer-à-cheval, ondulée, diversement colorée suivant les espèces : c'est l'ovaire ou le testicule. Mais ici la ressemblance est poussée si loin, qu'il faut beaucoup d'habitude avec le meilleur microscope et les plus forts grossissemens pour ne pas prendre les capsules spermatiques pour des ovules. Dans les Polypes ordinaires, les ovaires et les testicules sont rangés autour de la bouche en nombre égal, et les ovules tombent dans l'estomac, ainsi que les ovaires. Dans les Actinies, des filamens visqueux diversement colorés suivant les espèces, sortent de la bouche et de diverses ouvertures du corps. Ces filamens contiennent des ovules ou des spermatophores, sans que rien l'indique au premier aspect.

Enfin, dans quelques Polypes qui vivent à l'état d'agrégation,

comme les Escarres, MM. Nordmann et Milne Edwards ont trouvé des zoospermes entre les parois du corps et celles des organes digestifs, sans pouvoir distinguer de testicule ; et chez d'autres individus, ils ont rencontré dans le même lieu des ovules sans y apercevoir aucune trace d'ovaire. Ainsi les ovules et les zoospermes sont produits dans le même lieu, de la même manière, et la ressemblance persiste malgré l'absence d'organes spéciaux appréciables.

Arrivés dans l'oviducte, les ovules s'enveloppent en général d'une couche d'albumine plus ou moins épaisse, ensuite d'une membrane extérieure, et cheminent plus tard dans le liquide moins visqueux fourni par le reste du canal. Ainsi une partie de la sécrétion de l'oviducte est employée à compléter le développement de l'ovule, et l'autre à l'isoler, à favoriser sa progression. A la fin de l'oviducte, la proportion du fluide ambiant augmente de plus en plus, et en général, il s'y joint diverses humeurs fournies par des organes accessoires : c'est exactement ce qui arrive aux zoospermes à mesure qu'ils cheminent dans les canaux sécréteurs du testicule, dans le corps d'Hygmore, l'épididyme, etc.

Dans les ovaires tubuleux, c'est ordinairement vers le cul-de-sac épaissi du tube, ou des tubes, que se forment les ovules, sur une surface plus ou moins étendue, qui en produit à-la-fois une quantité variable. Dans les ovaires charnus, ils se développent successivement de l'intérieur vers la surface des ovules, qui tombent dans l'oviducte l'un après l'autre. On conçoit, dès-lors, que les ovules peuvent ensuite cheminer par groupes, ou être isolés, diversement disposés, suivant leurs dimensions et le diamètre de l'oviducte. Il est probable que les mêmes différences existent dans le mode de production des zoospermes, d'après ce que j'ai dit de la manière dont quelques-uns se trouvent groupés dans les canaux des testicules, tandis que, chez d'autres, ils sont disséminés sans ordre.

Les ovules se comportent donc comme les zoospermes, dans la liqueur fournie par les canaux qu'ils parcourent et par les organes accessoires ; seulement les ovules occupent beaucoup plus de place, et l'on oublie le liquide qui favorise leur progression ; tandis que les zoospermes ne sont pas appréciables à

l'œil nu, et l'on ne voit que le liquide dans lequel ils nagent. Mais dans les deux cas, le mucus n'est qu'un accessoire, et son rôle est exactement le même.

Cependant il n'arrive pas toujours que les ovules restent complètement mobiles et isolés dans tout le trajet de l'oviducte : ils sont quelquefois agglomérés, en nombre variable, dans une enveloppe commune qui se durcit après la sortie de la masse, et forme ce qu'on appelle *un œuf composé*. Un exemple donnera une idée de ce qui se passe. Dans les Sangsues, il existe à la fin des oviductes une dilatation remarquable qui a même été regardée comme une espèce de matrice. Cette poche peut contenir de dix à vingt ovules suivant la taille des individus : elle sécrète un fluide visqueux qui ne tarde pas à envelopper les ovules et le mucus qui les accompagne. Le hasard a permis à Carena de suivre jour par jour les changemens survenus depuis le moment où le sac venait d'être déposé sur les parois d'un bocal de verre, par une Sangsue commune. Elle se promena plusieurs fois autour de la masse pulpeuse pour en faire adhérer exactement les bords ; elle fit ensuite disparaître un gros repli de l'enveloppe commune. Des douze petits points ronds que Carena avait observés le premier jour, deux s'atrophièrent, les dix autres grossirent rapidement ; l'espèce de gelée molle qui les enveloppait d'abord disparut peu-à-peu, par la suite.

Les cocons de la Sangsue médicinale n'adhèrent à rien, et sont enveloppés d'un réseau spongieux de plusieurs lignes d'épaisseur, formé d'une espèce de bave qui se boursoufle et se durcit dans l'eau ; mais du reste, tout se passe comme dans la Sangsue commune. Ainsi chaque ovule a reçu, dans la première partie de son trajet, une couche d'albumine et une membrane propre, puis tous ont été enveloppés par une espèce de gelée molle. Enfin, les ovules, fécondés ou non, ont été agglomérés avec leur mucus, par une couche de liquide plus dense, provenant des parois de la poche dans laquelle ils ont séjourné quelque temps, avant de faire place à d'autres. Dans chaque ovule, tout s'est donc passé comme à l'ordinaire, jusqu'au moment où ils sont arrivés dans un réservoir commun. C'est alors seulement qu'ont été sécrétés les matériaux de l'enveloppe com-

mune. Il se passe des phénomènes analogues dans la production d'une foule d'œufs composés. Les Planaires, par exemple, qui ont tant d'affinité avec les Sangsues, produisent aussi *de la même manière* des œufs composés vers la fin de mars, quoiqu'elles se reproduisent en automne par scission longitudinale ou transversale. Il en est de même des Clepsines, des Pissicoles, des Naïdes, des Tristomes, etc., si voisines des Sangsues. Dans les Lymnées, une poche vaste et musculeuse, admettant une grande quantité d'ovules, les enduit d'une membrane commune, et des contractions énergiques forcent cette masse volumineuse à sortir par une ouverture assez étroite, ce qui lui donne la forme allongée d'un ver Lombric.

Chez les Moules, vingt à trente ovules se réunissent dans certaines cellules pour s'enduire d'un mucus qui les colle les uns aux autres. Les Décapodes enveloppent les leurs d'une matière gluante pour les fixer aux appendices de leur abdomen : les Cypris les déposent sur quelques corps étrangers, en les agglutinant, au moyen d'une matière visqueuse, en une masse de plusieurs centaines, etc. On conçoit que l'aspect de ces œufs composés peut varier à l'infini : c'est ainsi que ceux des Céphalopodes ressemblent à une grappe de raisin, quoiqu'ils soient pourvus aussi d'une membrane commune, fournie par un appareil spécial. Il est bon de remarquer que toutes les sécrétions de ces animaux sont en général très gluantes et visqueuses.

Voyons maintenant si les zoospermes présentent quelque chose d'analogue dans certaines espèces. J'ai dit que les animalcules d'un grand nombre d'oiseaux, observés dans les canaux sécréteurs du testicule, étaient groupés par fascicules, et que leur tête était enveloppée par une membrane excessivement mince, repliée du côté de la queue. Il paraît donc qu'après la production d'un groupe de zoospermes par les extrémités du tube, il se passe assez de temps avant qu'un nouveau groupe soit complètement développé, pour que la matière visqueuse du canal se condense et fasse une espèce de diaphragme, entraîné par les têtes des zoospermes qui viennent ensuite. C'est le premier rudiment des enveloppes de zoospermes; car la capsule m'a toujours paru incomplète, quoi qu'en ait dit Wagner.

Chez le Crabe commun, les animalcules sont enfermés dans une membrane très mince aussi, mais complètement fermée. Sur un mâle énorme, pris dans le coït, et examiné sur-le-champ, nous avons constaté, M. Milne Edwards et moi, que chacune de ces capsules contenait de quatre-vingts à cent zoospermes très petits, pyriformes, parfaitement immobiles dans l'enveloppe commune, se mouvant avec lenteur au moment de sa rupture, ensuite plus rapidement, jusqu'à ce que le liquide commençât à se dessécher. Ces enveloppes tout-à-fait simples et extrêmement minces, se forment dans la seconde partie de l'appareil spermatique; car dans la première, les conduits sont très étroits, tortueux, et ne contiennent que des zoospermes libres. C'est donc en arrivant dans cette espèce de vésicule séminale, qu'ils s'enveloppent d'une membrane commune, exactement comme les œufs composés des Sangsues, etc., se forment dans la poche terminale. Dans les testicules de la Langouste, j'ai trouvé la membrane commune des capsules spermatiques très mince, transparente dans les quatre cinquièmes de son étendue opaque sur un côté de la circonférence, comme si un embryon à moitié développé était appliqué à la surface. Dans le testicule du Homar, j'en ai trouvé de beaucoup plus compliqués, en forme de raquette allongée, dont le gros bout aurait été armé de trois filets. Au milieu du sac transparent, se dessinait un corps opaque ayant l'apparence d'un T, au bas duquel se trouvaient deux points brillans. Ces différences montrent combien la disposition de ces poches est susceptible de varier dans les espèces les plus voisines.

J'ai dit que le microscope permet à peine de distinguer les produits des ovaires et des testicules dans les Méduses. En effet, nous avions mis, le Dr Milne Edwards et moi, de la liqueur séminale sur le porte-objet, et nous n'avions cru y voir que des ovules pleins d'une matière granuleuse homogène, que nous avions pris pour des globules de matière vitelline; mais après avoir fait éclater ces sacs très minces par la pression du verre qui les recouvrait, il en est sorti une multitude de zoospermes qui s'agitèrent dans tous les sens avec une grande vivacité (1).

(1) Je viens d'apprendre que M. Siébold avait observé, de son côté, le même fait.

Leur queue était si mince et si transparente, que, malgré sa longueur, nous n'avons pu la distinguer qu'à l'aide du plus fort grossissement, et quand le liquide commençait à se dessécher : nous l'avons mieux vue le lendemain, quand le desséchement était complet; mais alors la tête était tout-à-fait déformée. Pour voir les zoospermes vivans, il faut opérer à l'instant où la Méduse est tirée de la mer; pour distinguer les queues, il faut attendre que le liquide se dessèche, et se servir d'un grossissement de huit cents fois au moins.

Les Actinies peuvent donner lieu à d'autres illusions, suivant les circonstances dans lesquelles on examine les longs filamens colorés fournis par les mâles, et qui ressemblent à ceux de la femelle. Une première fois, nous avons examiné, M. Milne Edwards et moi, cette singulière liqueur chez l'Actinie rousse, *au moment où l'animal venait d'être tiré de la mer*, et nous y avons trouvé une multitude de corps semblables à des zoospermes ordinaires, si ce n'est que la tête était très longue et la queue fort courte : nous les avons pris d'abord pour les animalcules de l'Actinie, en nous étonnant, toutefois, de les trouver immobiles; mais quelques jours plus tard, en examinant la même liqueur séminale sur un individu qui était resté plusieurs heures dans une boîte d'herborisation, nous avons trouvé presque tous ces corps sans appendice. Avec l'appareil de Dujardin, au grossissement de 1080, et sous une vive lumière, nous avons reconnu, dans l'intérieur, un cylindre opaque qui remplissait presque toute la cavité, tandis que la même partie était complètement vide et transparente chez ceux qui étaient pourvus d'une queue. Nous nous sommes assurés ainsi que ce cylindre interne n'est autre chose que la cavité qui renferme les zoospermes, et qui se renverse en dehors lorsque la membrane externe absorbe de l'humidité. Ainsi les zoospermes que nous avions cru voir la première fois n'étaient autre chose que des spermatophores à deux enveloppes, dont l'interne s'était vidée, en se renversant, de manière à représenter une queue, phénomène qui a fait dire à quelques micrographes que les zoospermes des Actinies avaient une queue susceptible de rentrer et de sortir à volonté. La seconde fois, la liqueur séminale

s'était trouvée en contact avec l'air en sortant du corps de l'Actinie; l'enveloppe extérieure n'avait pas pu absorber d'eau et chasser le tube intérieur : voilà pourquoi ces spermatophores étaient pleins et sans apparence de queue; c'est, au reste, ce que fera mieux comprendre l'examen des spermatophores du Poulpe, de la Seiche, etc.

Néedham les avait déjà décrits sous le nom de *corps mobiles*; mais il avait méconnu leur véritable nature. Cuvier, dans son remarquable travail sur les Mollusques, reste dans le doute si ces corps de Néedham sont des *parasites* ou *des organes appartenant essentiellement à l'économie naturelle des Céphalopodes* (Mémoires pour servir à l'histoire et à l'anatomie des Mollusques, page 33). Wagner a pensé que ces sacs contenaient chacun un ver parasite (1), et dernièrement M. Carus les a considérés comme des zoospermes gigantesques des plus parfaits (2); mais les observations récentes de Philippi (3), et surtout celles de MM. Milne Edwards et Peters (4), font voir qu'il n'en est rien, et que ce sont des spermatophores comparables aux capsules séminales dont il a déjà été question, et aux œufs composés dont je viens de parler.

Ainsi que je m'en suis assuré avec M. Edwards, ces spermatophores, chez les Poulpes, sont essentiellement composés de deux tubes renfermés l'un dans l'autre. L'interne est contourné en spirale d'une manière régulière, et sa cavité est distendue par des animalcules. Exposés à l'humidité, ils s'allongent par la petite extrémité, le tube intérieur se vide en sortant de l'enveloppe extérieure, et se renverse en dehors, peu-à-peu, comme les yeux des Limaçons. Au microscope, on voit dans la liqueur qui s'échappe du tube intérieur des milliers de zoospermes très longs, collés les uns contre les autres comme des mèches de cheveux, et s'agitant ensemble pendant long-temps avant de se séparer. Tout cela est très facile

(1) Wagner, *Lehrbuch der Vergleicheden anatomie*, Leipzig, 1835, page 312.

(2) Carus, sur le *Needhamia expulsatoria*, Académie des Cur. de la nature de Bonne, tome XIX.

(3) Archives de Müller, 1839, n° 4.

(4) Milne Edwards, *Observations sur les spermatophores des Mollusques céphalopodes*, etc. Annales des Sciences naturelles, tome XIII, page 193.

à voir dans le Poulpe, parce qu'il vit très bien hors de l'eau, ce qui permet d'observer ses zoospermes vivans; d'ailleurs, le tube intérieur de ses spermatophores sort très lentement : mais la Seiche meurt bientôt ainsi que ses animalcules ; ses spermatophores sont très sensibles à l'action de l'humidité, et le tube intérieur, composé de quatre parties distinctes, se renverse très brusquement, en quatre mouvemens rapides et très rapprochés ; il se rompt dans le Calmar, après avoir été expulsé brusquement, et cette rupture a presque toujours lieu à la jonction de deux espèces de capsules dont l'une tient à un ressort spiroïde, et l'autre au reste de l'appareil.

Quelques auteurs se sont hâtés de voir, dans ces mouvemens, des contractions spontanées, des preuves d'animalité, etc. Il est évident que ce renversement du tube intérieur est le résultat mécanique de la réplétion du tube extérieur par l'eau. Tous ces tissus gélatineux absorbent l'humidité avec une avidité extraordinaire, comme on le voit par le gonflement rapide des œufs de Batraciens, de Poissons, etc., des cocons de Sangsues, de Planaires, etc., dès qu'ils sont déposés dans l'eau. D'ailleurs, ces spermatophores n'éclatent pas tant qu'ils sont à sec : une goutte d'eau suffit, *long-temps après la mort de l'animal,* pour faire sortir le tube intérieur. Ce phénomène se voit même dans des spermatophores conservés dans l'alcool depuis des années (1).

J'ai déjà fait observer le même phénomène en parlant des Actinies. S'il est plus prononcé dans les Céphalopodes, c'est à cause des grandes dimensions de leurs spermatophores. Que se passe-t-il donc dans cette circonstance? L'enveloppe extérieure se gonfle par l'absorption de l'eau, sa cavité se remplit, le tube intérieur se tuméfie à son tour ; fortement comprimé de toute part, il se renverse ou il se rompt, et met en liberté les zoospermes. Les spermatophores qui n'ont qu'une seule enveloppe, se rompent dans tous les sens par l'excès de la distension et le ramollissement de la membrane dans l'eau. Dans ce cas, on ne peut invoquer des contractions spontanées, et le phénomène

(1) Voyez Needham, *Account of some new microscopical discoveries*, et Cuvier, *Anatomie comparée*, tome V, page 109.

doit être le même pour tous les autres. Au reste, il est bon de remarquer que ces capsules spermatiques n'ont encore été observées que chez des espèces dont la fécondation s'opère dans l'eau. Enfin, les spermatophores se comportent exactement comme les grains polliniques, sous l'influence de l'humidité, et par la même raison, c'est-à-dire parce qu'ils sont très avides d'eau. Ceux de ces grains qui n'ont qu'une enveloppe, comme dans les Graminées, se rompent pour répandre leur pulvisculе : ceux qui en ont deux poussent d'abord un long boyau aux dépens de la membrane interne, aussitôt que l'externe s'est rompue, et elle se rompt du côté du stigmate, parce que c'est le point sur lequel elle s'est trouvée plus ramollie par son contact avec une surface humide ; si plusieurs points de la membrane externe se déchirent à-la-fois, il se forme plusieurs boyaux, etc. Ici le rapprochement est d'autant plus remarquable, qu'il porte sur des organes tout-à-fait analogues pour la structure et pour la fonction. Tous ces phénomènes sont un pur effet d'endosmose, dû à l'avidité de ces tissus pour l'eau. La sortie du tube intérieur des spermatophores ne prouve rien de plus que le développement des boyaux polliniques. (1)

D'après ce que j'ai dit de la formation des œufs composés, il est facile de concevoir celle des spermatophores, et, en suivant les transitions, on arrive sans effort à ceux de la Seiche et du Calmar, qui sont les plus compliqués de tous.

On a vu que, dans un grand nombre d'espèces, les zoospermes se trouvent par fascicules réguliers dans les canaux du testicule; que dans beaucoup d'oiseaux, les têtes sont enveloppées dans une espèce de diaphragme creux, premier rudiment de spermatophore. On a vu comment, dans le Crabe, les zoospermes, libres dans la première partie de leur trajet, s'enveloppaient dans la seconde d'un kyste complet, mais simple et mince. Il n'est pas plus difficile de concevoir la formation d'une seconde enveloppe à la surface de la première, quand l'appareil est plus compliqué et le fluide plus visqueux, comme cela s'observe chez le Poulpe

(1) Voyez Dutrochet, Recherches sur l'Endosmose et sur la structure interne des organes des animaux; Mémoires, tome 2.

et surtout chez le Calmar et la Seiche. Mais d'abord, constatons exactement les faits.

Cuvier a été frappé de l'extrême ressemblance que présentent les diverses parties de l'appareil génital chez le mâle et la femelle dans toute cette famille des Céphalopodes, et il y revient souvent, avec raison, à l'occasion de chaque pièce, quoiqu'il n'en tire pas de conséquences. Voici ce qu'on observe chez la femelle : l'ovaire, granuleux à sa surface comme le testicule, est enveloppé d'un repli en forme d'entonnoir où sont déposés les ovules ; de là, ils passent dans un oviducte tortueux où ils s'enveloppent d'albumine et d'une membrane extérieure propre : ils traversent ensuite une espèce de glande charnue, contournée en spirale, dans laquelle ils se recouvrent du tégument commun qui les tient réunis en grappe. Toutes ces cavités sont remplies d'une matière poisseuse et filante, qui gêne même beaucoup la dissection de ces parties.

La disposition est exactement la même chez le mâle. J'ai constaté avec M. Milne Edwards que les testicules sont remplis d'animalcules semblables à ceux que contiennent les spermatophores, mais que ces animalcules sont libres : dans le canal déférent, on ne les trouve pas en liberté, mais on rencontre ordinairement deux ou trois spermatophores en voie de développement. Dans la glande spiroïde, épaisse et charnue, qu'on pourrait comparer à une prostate, on en trouve aussi quelques-uns, mais plus volumineux et pourvus déjà de deux membranes. Enfin ils descendent dans une cavité composée de replis très réguliers, dans lesquels ils sont reçus, sur plusieurs rangs, parfaitement symétriques, en attendant qu'ils soient expulsés. Cette poche joue, comme on voit, le rôle de vésicule séminale. Nous avons remarqué aussi que les spermatophores les plus voisins de l'ouverture extérieure sont ceux qui éclatent le plus promptement au contact de l'eau, et que ceux qu'on puise dans le canal déférent n'éclatent jamais, ce qui prouve qu'ils se perfectionnent jusqu'au moment de leur sortie, comme les ovules, comme les œufs composés.

Ici les zoospermes, au lieu d'être de plus en plus délayés dans le liquide fourni par le canal déférent, la prostate, etc., ont été

saisis en masse à mesure que les fascicules se sont présentés, et ils sont restés enveloppés comme ils se trouvaient, d'abord par une première couche de matière visqueuse, puis par une seconde dans un second appareil, et même les spermatophores sont unis entre eux dans la vésicule séminale par une espèce de colle élastique et tenace. Toute la différence qui existe sous ce rapport entre les Mammifères et les Crustacés, les Mollusques surtout, tient donc uniquement à la nature des fluides sécrétés par les organes à travers lesquels doivent passer les zoospermes. Il y a deux membranes dans les Céphalopodes, parce que l'appareil sécrétoire est composé de deux parties distinctes, remplies d'une grande quantité de matières visqueuses. L'abondance de cette matière est telle chez les Actinies, que leurs spermatophores sont retenus, enveloppés par de longs filamens de matière colorée, qui flottent long-temps dans la mer, sans se rompre. Si le tube intérieur est contourné en spirale chez le Poulpe et le Calmar, c'est probablement par la même raison que les chalazes sont tordues dans l'albumen des Oiseaux, c'est-à-dire par suite d'un mouvement de rotation combiné avec celui de progression. S'il est composé de plusieurs pièces distinctes dans la Seiche et dans le Calmar, c'est que leur appareil est le plus compliqué qu'on ait rencontré, même dans les Céphalopodes.

Wagner croit que les *capsules spermatiques* sont les organes producteurs des animalcules, et les admet, par analogie, dans les cas où l'observation directe n'en a jamais rencontré; mais je ne puis y voir que des espèces de spermatophores de la plus grande simplicité.

Je viens de montrer que les mouvemens observés dans les *corps mobiles de Needham* ou *spermatophores de Milne Edwards* sont dus à un pur phénomène d'endosmose, que la complication de leur structure dans les Céphalopodes tient à la plasticité de la sécrétion et au développement extraordinaire de l'appareil sécréteur; ainsi je ne m'arrêterai pas aux conséquences qu'on a voulu tirer de ces circonstances, pour attribuer à des enveloppes analogues la production des animalcules. Cette hypothèse, due à Wagner, me paraît sujette à trop d'objections pour supporter une discussion sérieuse. Il faudrait d'abord expliquer la formation, le

mode d'action, la nécessité de ces prétendus organes sécréteurs, *formés* de toutes parts et *flottans* sans adhérence aucune. Ensuite on ne voit pas pourquoi, les testicules fournissant des zoospermes comme à l'ordinaire, d'autres corps seraient chargés en même temps d'en produire de semblables. Il y aurait là superfétation inexplicable, dérogation inutile à la loi générale! On ne comprend pas non plus ce que deviendraient les animalcules produits par les testicules, puisqu'on n'en trouve plus un seul dans les conduits excréteurs qui contiennent des *capsules spermatiques* ou des *spermatophores*. L'hypothèse de Wagner est donc en opposition formelle avec cette unité de loi qu'on observe dans l'immense chaîne des êtres organisés, unité qui est si frappante quand on compare les ovules et les zoospermes, quand on les suit dans l'oviducte où le canal déférent, dans leurs annexes, et qu'on les voit se comporter de même, suivant la nature du liquide qui les environne et la forme des cavités qu'ils traversent. La ressemblance est surtout frappante dans les céphalopodes ou les mêmes organes jouent exactement le même rôle chez le mâle et chez la femelle.

Cette étude des spermatophores permet aussi d'apprécier la valeur de quelques autres hypothèses, imaginées pour expliquer d'autres difficultés. Certainement ici la scissiparité longitudinale ou transversale, la gemmiparité, la génération spontanée n'expliqueront jamais comment ces capsules contiennent des animalcules semblables à ceux qu'on trouve dans les testicules, ou comment ceux des testicules proviendraient de ces poches, qui se développent au contraire, en se compliquant de plus en plus, à mesure qu'elles s'éloignent des testicules pour se rompre seulement après leur sortie, par la seule action de l'eau. L'histoire des spermatophores fournit donc la solution matérielle la plus claire de l'origine des zoospermes; car ceux que renferment ces capsules viennent aussi évidemment des testicules que les ovules des œufs composés viennent des ovaires.

Si l'on peut procéder du connu à l'inconnu, il faut partir de la formation des capsules spermatiques simples et des spermatophores à deux enveloppes, pour comprendre celle des grains de pollen à une ou deux membranes. En effet, l'analogie et le

raisonnement indiquent que les granules fécondans sont formés avant la couche simple ou double de matière scarieuse qui les enveloppe : je dirai même que l'observation directe le prouve.

Quand on examine une anthère depuis le début de son développement, on voit que chaque loge est d'abord remplie d'un tissu cellulaire particulier, bien circonscrit et sans continuité avec les parois de la cavité : c'est ce tissu qui doit constituer plus tard la *masse pollinique;* c'est dans ses cellules que se développent les granules spermatiques et plus tard les grains de pollen. Dans le principe, ces granules sont disséminés d'une manière à-peu-près égale dans toute l'étendue de la cellule: ils ne sont circonscrits par aucune membrane appréciable, et ils paraissent aussi nombreux, aussi volumineux qu'au moment de la maturité du pollen. C'est seulement plus tard qu'ils se réunissent vers le centre de la cellule, quand il ne doit s'y former qu'un grain de pollen, ou bien ils se divisent en plusieurs masses, suivant le nombre *constant* des grains de pollen que doit contenir chaque cellule. C'est alors seulement qu'on commence à distinguer, à la surface du nuage, les premiers rudimens d'une enveloppe d'abord irrégulière et mal circonscrite, qui augmente ensuite d'épaisseur, se couvre de compartimens réguliers et quelquefois de papilles qui en occupent le centre. Dans les espèces dont le pollen a deux membranes bien distinctes, il est impossible de les distinguer avant sa maturité complète. Enfin, dans le *Cobœa scandens,* chaque cellule, d'abord remplie de granules spermatiques libres, renferme plus tard quatre grains de pollen, parmi lesquels il y en a presque toujours un qui est complètement transparent et ne contient aucun granule, de même qu'il arrive à certains œufs de ne pas contenir de jaune. Tous ces faits me semblent démontrer que les membranes du pollen se forment, après les granules fécondans, par un acte indépendant du premier et d'une autre nature, de même que les enveloppes séminales des animaux sont sécrétées après les zoospermes qu'elles contiennent, sans exercer la moindre influence sur leur production. Je suis persuadé que des recherches spéciales, entreprises dans ce sens, conduiraient aux résultats les plus décisifs. On peut déjà voir la confirmation de ces idées dans

les travaux remarquables de M. Adolphe Brongniart, quoique l'auteur ait à cet égard des opinions bien différentes. (Voyez *Annales des Sciences naturelles*, tomes XII et suivans.)

Si l'on s'étonnait de ce que ces formes compliquées se rencontrent précisément chez les animaux les plus simples, de ce que tous les végétaux ont dans leurs grains polléniques de véritables spermatophores, il suffirait de faire remarquer que les plus inférieurs parmi les êtres vivans sont précisément ceux dont la reproduction est assurée par un plus grand nombre de voies, parce que c'est, avec la nutrition, la seule fonction qui soit indispensable à l'entretien de l'espèce.

Il ne suffit pas d'avoir démontré que les zoospermes sont sécrétés par les testicules, comme les ovules par les ovaires, qu'ils se comportent de la même manière au milieu de fluides semblables, etc.; il faut examiner si la même analogie se montre dans le mode de leur développement.

On envisage toujours les zoospermes à l'état parfait: on ne les reconnaît pour tels que quand on leur trouve exactement les formes et les dimensions du type de l'espèce. J'ai cependant fait voir qu'ils peuvent être plus ou moins développés, plus ou moins vivaces, suivant les individus et les circonstances, suivant qu'on les observe dans les testicules ou les vésicules séminales. D'ailleurs on ne peut raisonnablement supposer qu'ils sont, dès les premiers instans de leur existence, ce qu'ils doivent être plus tard. Tous les efforts de Burdach pour constater qu'on ne trouve souvent dans les testicules que des globules ou des zoospermes immobiles, etc., concourent également à prouver que les zoospermes passent par plusieurs degrés de développement. Enfin il fait remarquer (page 134) que « Gleichen a rencontré dans des épididymes de petits globules tournant avec rapidité sur eux-mêmes et dans les vésicules séminales seulement des Spermatozoaires parfaits. »

J'ai fait beaucoup d'observations analogues sur des Mammifères, des Oiseaux et des Reptiles; je les ai variées avec d'autant plus de soin, que j'en ai mieux apprécié toute l'importance. Voici ce que j'ai constaté.

En examinant avec le docteur Milne Edwards un jeune Coq,

récemment sacrifié, nous avons trouvé, dans le sperme extrait de la surface du testicule, des corps sphériques très petits, fort brillans et d'une mobilité extraordinaire. Dans le reste du testicule, ils étaient mêlés avec des zoospermes. Dans l'épididyme, il n'y avait plus que des zoospermes: ils étaient également seuls dans le canal déférent, mais plus grands et plus mobiles. J'avais déjà fait les mêmes remarques sur d'autres Oiseaux, sur plusieurs Mammifères et sur des Lézards; mais c'est sur des Couleuvres vivantes, que nous avons observé, M. Milne Edwards et moi, ce phénomène de la manière la plus tranchée.

En effet, les testicules étaient remplis d'une multitude de granules très petits, brillans, arrondis et fort mobiles, dont les mouvemens rapides avaient lieu dans tous les sens, entre les globules de sang et de mucus, et nous n'y avons jamais rencontré de zoospermes. Dans l'épididyme, quelques-uns de ces globules étaient piriformes ou munis d'un rudiment de queue. Au commencement du canal déférent, il n'existait plus de globules mobiles; les zoospermes étaient pourvus d'une queue assez longue, mais très mince; la tête, encore peu régulière et fort transparente, laissait distinguer nettement un noyau central, qui nous a paru semblable aux globules mobiles observés dans le testicule. Du reste, ces têtes n'étaient pas toutes régulièrement conformées. A la fin du canal déférent, les zoospermes étaient plus opaques, plus réguliers et plus agiles, la queue était plus longue, et son extrémité se contournait plusieurs fois en spirale.

Il semble que, chez ces animaux, les organes spermatiques étant très allongés, comme tous les viscères, le développement des zoospermes s'opère dans des parties plus distinctes, ce qui permet d'en saisir plus nettement les différentes phases. (1)

J'ai souvent rencontré des monades dans le sperme de l'homme et de quelques animaux, lorsqu'il avait été recueilli sur des ca-

(1) Depuis la lecture de ce mémoire, M. Chambert, vétérinaire distingué de Montpellier, m'ayant fait prévenir qu'il devait sacrifier un Baudet de quatre ans, estropié par un accident, je m'arrangeai de manière à pouvoir examiner au microscope les fluides contenus dans les diverses parties des organes spermatiques *ayant qu'ils aient eu le temps de se refroidir.* Ayant incisé très légèrement la surface des testicules, je déposai sur le porte-objet le fluide que je recueillis de l'extrémité des canaux sécréteurs, et je trouvai au milieu des globules

davres dont la putréfaction commençait à s'emparer. Mais elles sont faciles à distinguer des *globules spermatiques*, en ce qu'elles sont aplaties, transparentes sur les bords, et laissent apercevoir des traces d'organisation intérieure; leur circonférence, d'ailleurs, change de forme pendant les mouvemens brusques qu'elles exécutent, et s'altère bientôt après que les mouvemens ont cessé; tandis que les *globules spermatiques* sont sphériques, très denses et homogènes, ce qui leur donne le pouvoir réfringent qui rend leur centre si brillant; aucun changement de forme n'accompagne leurs mouvemens, et quand ils ont cessé depuis longtemps, l'aspect reste encore le même. Ces caractères sont assez tranchés, je pense, pour qu'on ne puisse pas s'y tromper.

Quant aux molécules les plus ténues des corps bruts ou organisés dans lesquelles Robert Brown a signalé des mouvemens, pour peu qu'on ait l'habitude de semblables recherches, on ne pourra les confondre avec les *globules spermatiques* beaucoup plus volumineux, qui se ressemblent tous sous le même foyer, et se meuvent brusquement, rapidement dans tous les sens, au milieu de globules variables pour la forme et les dimensions, dont le déplacement est toujours lent, irrégulier, oscillatoire,

de sang quelques zoospermes rares et d'un quart plus petits que ceux du canal déférent, mais tous immobiles, malgré l'addition d'une goutte d'eau tiède. Une grande quantité de petits globules *brillans* accompagnait ces zoospermes, et presque tous jouissaient d'une grande mobilité, qui s'est ralentie promptement, sans doute à cause de l'abaissement rapide de la température. Les mêmes phénomènes se sont reproduits dans le liquide extrait de la surface de l'autre testicule, qui était encore chaud. Il a été facile encore de constater que les mouvemens rapides de ces petits globules brillans se croisaient dans tous les sens, et par conséquent étaient spontanés. Je n'ai plus rien retrouvé de semblable dans la liqueur séminale, puisée au centre du testicule, ou dans l'épididyme, etc. Ce n'est donc qu'à la *surface* des testicules, par conséquent à l'*extrémité des canaux sécréteurs*, que j'ai rencontré les premiers rudimens des zoospermes, et j'aurais pu être dans l'impossibilité de constater leur existence, si je n'avais pas pris toutes les précautions pour observer le liquide lorsqu'il était encore chaud. Je suis convaincu qu'en procédant ainsi, on pourrait s'assurer que la loi est générale; mais on n'a pas pris jusqu'à présent le soin d'examiner séparément le fluide fourni par la surface seule des testicules, et, quand on ne voit pas les mouvemens rapides de ces globules, on peut douter de leur nature, malgré leur extrême petitesse et leur aspect brillant. D'ailleurs, on n'était pas sur la voie. Aux approches du rut, on ne trouve que des globules brillans chez les Oiseaux et les Mammifères; mais pour bien voir leurs mouvemens, il faut que les organes soient encore chauds. M. Milne Edwards vient d'observer la même chose sur des *Vers*.

presque imperceptible, quand le liquide est recouvert d'un verre mince et ne présente plus d'agitation intérieure. Tous les micrographes savent aujourd'hui à quoi s'en tenir sur ces déplacemens produits par les influences extérieures, déplacemens dont on a fait beaucoup trop de bruit, et qui n'ont jamais trompé ceux qui avaient l'habitude d'observer de véritables mouvemens *spontanés*. Ce qui prouve d'ailleurs que ceux des globules spermatiques dépendant réellement de la vie, c'est qu'on ne les observe jamais que quand le sperme est très frais et qu'ils ne durent pas très long-temps. Il faut donc regarder les globules spermatiques comme des produits vivans des testicules.

Si l'on compare ce qui se passe ici avec ce qu'on observe dans le développement des ovules, il est difficile de ne pas voir, dans ces globules spermatiques les analogues de la vésicule de Purkinge. En effet, cette ampoule *proligère* est la partie essentielle fondamentale de l'ovule: c'est celle qu'on aperçoit la première; c'est autour d'elle que vient se déposer l'embryotrophe; c'est dans l'oviducte qu'une couche d'albumine enduit le jaune; que la vésicule, d'abord centrale, gagne la surface de l'ovule et y forme la membrane *proligère*. Le point brillant qu'on observe toujours à la tête des zoospermes a été signalé par tous les micrographes comme caractéristique; il se trouve dessiné, dans toutes les planches faites avec soin, comme une espèce de *sphère* ou de *lentille*, entourée d'un bord transparent. Ce point si remarquable est donc la trace du globule spermatique observé d'abord isolément; c'est autour de lui que s'est formée la tête, la base de la queue, etc.; c'est ce point initial, qui a groupé autour de lui les autres parties du zoosperme. Il joue donc exactement le même rôle dans leur développement ultérieur que la vésicule proligère dans le développement de l'ovule.

De même qu'il y a des espèces dont les ovules sont très simples et presque réduits à la vésicule proligère, il y en a dont les zoospermes restent piriformes ou presque dépourvus de queue. Je sais bien que, chez les Mammifères, on ne peut pas suivre, comme chez la Couleuvre, d'une manière distincte, les différentes phases du développement des zoospermes; mais aussi,

chez eux précisément, la vésicule proligère a été admise par analogie long-temps avant de pouvoir être démontrée par l'observation directe, et l'ovule se sépare de l'ovaire à l'état parfait; il ne reçoit pas de nouveaux développemens dans l'oviducte avant d'être fécondé.

Maintenant si l'on examine, d'un point de vue élevé, ce qui se passe dans le développement de tous les ovules, on voit que les premiers élémens de leur organisation se réunissent dans une cellule de l'ovaire qui leur sert de première enveloppe. C'est ce qui ne peut être mis en doute pour les ovaires *parenchymateux* des mammifères, pour les ovaires *celluleux* des Batraciens, etc., dans lesquels on peut suivre, chez la même femelle au temps des amours, tous les progrès de ce développement, depuis le moment où la cellule commence à s'emplir du jaune jusqu'à celui de la ponte, qui a lieu trois ans plus tard, pour les ovaires *vésiculeux*, dont toute la surface fournit des ovules. Dans la Baudroie, par exemple, on voit le tissu cellulaire placé entre les deux membranes du sac se remplir de matière opaque; ensuite, la forme irrégulière et polygonale de chaque cellule s'arrondit en se développant; l'ovule soulève la membrane interne et finit par tomber dans la cavité générale.

Des phénomènes analogues se passent à l'extrémité des ovaires *tubuleux*, qui ressemblent tant aux testicules. Dans les végétaux, c'est également une cellule de l'ovaire qui reçoit les premiers matériaux de l'amande, au sein de laquelle paraît ensuite la vésicule et le sac embryonnaire; c'est à sa base que se développent la chalaze et le podosperme. Il paraît donc que c'est toujours dans une cellule de l'ovaire que s'organisent les premiers rudimens de l'ovule; qu'une portion de l'organe femelle s'en isole de plus en plus pour fournir des élémens de la reproduction.

L'analogie permet de supposer que le premier rudiment du zoosperme se forme de la même manière, et tout ce que je viens de dire des *globules spermatiques* confirme ce rapprochement. Il paraît donc que, à l'extrémité des canaux spermatiques, un point de la surface interne est soulevé par le développement de la cellule sous-jacente, qui s'accroît, s'isole de plus en plus, et

finit par se détacher sous forme d'un globule déjà bien organisé et vivant, pour devenir le rudiment d'un zoosperme. La même loi s'observe dans les végétaux, puisque c'est dans les cellules du tissu spécial, qui remplit chaque loge de l'anthère, que se développent les granules fécondans.

Le volume de l'ovule animal est énorme dès son origine, si on le compare à celui du *globule spermatique;* mais cette disproportion tient uniquement à la présence du vitellus, et elle se manifeste également pour la même raison entre les ovules des ovipares et ceux des mammifères, parce que le vitellus des premiers doit servir *seul* au développement *complet* de l'embryon, tandis que celui des autres n'est indispensable que pendant les premiers jours qui suivent la fécondation. Le zoosperme ne présente rien de semblable, précisément parce qu'il trouve dans l'ovule les matériaux nécessaires à son développement ultérieur. Il ne faut donc comparer le premier rudiment du zoosperme qu'à celui de l'ovule, c'est-à-dire le globule spermatique à la vésicule proligère. La même cause fait que l'ovule végétal est également hors de proportion avec le granule fécondant. Excepté le point de la *vésicule germinative,* sur lequel doit se développer l'embryon, le reste est destiné à lui servir de nourriture ou de protection.

En résumé, les premiers rudimens des zoospermes et des granules polliniques se forment, comme ceux de l'ovule animal ou végétal, dans une partie du tissu propre d'un organe spécial. Il y a *séparation* d'une partie *organisée* et *vivante,* qui faisait auparavant partie de l'organisme-souche, et non pas sécrétion véritable d'un produit au moyen de matériaux extraits du sang par des vaisseaux particuliers.

La liqueur séminale seule est un véritable produit de sécrétions; mais ce n'est pas le testicule qui en fournit la plus grande partie; car elle est d'autant plus abondante, comparée au nombre des zoospermes, qu'on l'observe plus près de l'orifice excréteur, parce qu'il s'y joint la sécrétion de l'épididyme, du canal déférent, de la vésicule séminale, de la prostate, des glandes de Cowper et des follicules muqueux de l'urèthre. Chez d'autres animaux, il s'y ajoute encore d'autres produits, même

de l'urine. La fonction essentielle du testicule est donc la production des zoospermes, qui a lieu par un mécanisme tout différent de celui qui préside à l'élaboration du fluide dont ils ont besoin pour achever leur développement et favoriser leur expulsion. (1)

Comment s'achève ce développement? Voyons d'abord ce qui se passe dans celui de l'ovule, et prenons pour exemple les oiseaux chez lesquels les phénomènes sont les plus saillans et les mieux connus. Arrivé dans l'oviducte, l'ovule s'enveloppe d'une couche épaisse d'albumine, de chalazes, d'une nouvelle membrane, enfin d'une coque calcaire. Tous ces complémens sont tout-à-fait étrangers à l'ovaire, et tous sont des produits de diverses sécrétions, formées par des parties distinctes de l'oviducte, sans compter le mucus qui a favorisé la progression de l'œuf. Les mêmes phénomènes s'observent dans les reptiles, les batraciens, les poissons, les mollusques, etc., avec des modifications qui dépendent de la nature des fluides et de la structure des appareils. On a vu que la liqueur contenue dans les canaux spermatiques est assez dense: c'est probablement cette matière visqueuse qui enveloppe le *globule spermatique*, et en fait la tête du zoosperme, partie fondamentale qui existe toujours, non-seulement dans les différentes espèces, mais encore dans les diverses phases d'activité du testicule; ainsi on les rencontre seuls aux approches de la puberté et chez les vieillards, au début et à la fin du rut, dans les maladies graves, chez les hybrides, comme le mulet, etc. On distingue enfin ce noyau primitif au

(1) M. Dujardin paraît avoir à cet égard des idées analogues à celles que je viens d'exposer, si j'en juge par le passage suivant, que je regrette de ne pas avoir connu plus tôt. « Plus on étudie les zoospermes ou prétendus animalcules spermatiques, et plus on « reste convaincu que ce ne sont pas des animaux proprement dits, des êtres naissant d'un « œuf ou d'un gemme, comme les zoophytes, et susceptibles de se nourrir, de s'accroître « et de se reproduire. L'emploi du microscope le plus parfait et la comparaison de ces « corpuscules dans les différentes classes du règne animal, font penser, au contraire, que les « zoospermes sont simplement *un produit*, *une dérivation* de la couche interne des tubes « séminifères; non point *une sécrétion*, mais un *produit progressivement formé*, un pro- « duit conservant une sorte de vitalité nécessaire pour concourir à la formation de l'embryon. » (Annales des Sciences naturelles, 2e série, *Zoologie*, tome VIII, page 291.)

milieu de la tête de la plupart des zoospermes. C'est donc autour de lui que s'arrangent les matériaux qui viennent successivement compléter les zoospermes, ainsi que je l'ai montré distinctement pour la couleuvre. Il est remarquable que les dimensions de la queue sont proportionnées à la viscosité de animaux et de leurs sécrétions. C'est ainsi que celles des poissons sont très longues, et celles des mollusques encore plus longues et surtout plus épaisses. Quand les globules spermatiques descendent l'un après l'autre de l'extrémité de chaque conduit sécréteur, les zoospermes sont isolés dès le principe. Quand il en arrive un plus ou moins grand nombre à-la-fois, les zoospermes sont groupés en faisceaux, dans lesquels toutes les têtes sont unies. Si elles rencontrent plus bas un liquide gluant, elles s'en coiffent comme dans les oiseaux, etc. Lorsque ces groupes trouvent dans le canal déférent un liquide moins dense, les zoospermes se séparent peu-à-peu par fascicules de plus en plus petits, les queues deviennent libres les premières, les têtes ne s'isolent quelquefois qu'après beaucoup de mouvemens dans tous les sens, la surface présente encore pendant quelque temps des lambeaux de ce mucus gluant qui rendent les contours irréguliers. Si le liquide du canal déférent est lui-même très dense, les zoospermes restent unis jusqu'à la fin, comme dans la raie, où le cloaque en contient des mèches de plus de cent. Enfin, s'ils rencontrent sur leur trajet un réservoir rempli d'un liquide plus visqueux encore, ils s'y réunissent pour n'en sortir qu'entourés d'un kyste spermatique, comme dans les crustacés; s'ils traversent plusieurs appareils de cette nature, ils s'enveloppent de plusieurs membranes plus ou moins compliquées, comme dans les spermatophores des céphalopodes, en reproduisant exactement ce qui se passe dans la formation des œufs composés.

Ainsi les fluides qui entourent le zoosperme depuis son état le plus rudimentaire jusqu'à son expulsion, fluides sécrétés par des appareils très différens, jouent exactement le même rôle que ceux qui enveloppent l'ovule depuis sa séparation de l'ovaire jusqu'à la fécondation. Les uns contribuent à son entier perfectionnement; les autres à sa progression, à son isolement, et quelquefois à sa protection, en fournissant à plusieurs une

enveloppe commune. Mais les zoospermes ne sont pas plus des produits de sécrétion que les ovules, quoique divers fluides soient indispensables à leur achèvement.

Il est cependant un point sur lequel la ressemblance paraît cesser complètement. Les zoospermes jouissent de mouvemens spontanés qui suffisent pour constater en eux l'existence d'une vie indépendante. Les granules polliniques en ont même d'assez étendus, quoique plus lents et plus faibles. On n'observe rien de semblable dans les ovules, ce qui a fait penser qu'ils étaient privés de vie!... Mais la vie présente bien des degrés depuis l'éponge jusqu'à l'homme, dans l'échelle des animaux; elle ne varie pas moins dans les différens tissus du même animal, depuis l'os jusqu'au muscle qui le fait mouvoir. Il est enfin une vie latente qu'on ne peut nier, quoiqu'elle puisse rester insaisissable pendant des siècles. Telle est celle de la graine dont le tissu a été préservé de toute altération : l'ovule jouit certainement d'une vie moins obscure et plus active. Je ne parle pas seulement de l'ovule végétal, qui fait partie de l'ovaire jusqu'à parfaite maturité, et qui jouit par conséquent, avant comme après la fécondation, de la même vitalité que l'ovaire; je fais abstraction de l'ovule animal encore contenu dans l'ovaire, ou déjà fécondé : je dis que cet ovule, parfaitement libre de toute adhérence, jouit d'une existence indépendante, d'une vie propre, après sa séparation de l'ovaire et avant d'avoir pu subir l'influence de l'imprégnation. Cette vitalité augmente même à mesure que l'ovule chemine dans l'oviducte; car il continue à y naître, à subir des changemens intérieurs et constans, il s'enveloppe d'une couche d'albumine, de membranes nouvelles, etc. Dans les Batraciens, les ovules les plus faciles à féconder artificiellement sont ceux qu'on prend à la fin de l'oviducte; les fécondations sont d'autant plus rares qu'on opère sur des ovules plus éloignés de l'orifice extérieur. On n'en a jamais obtenu avec les ovules les plus développés qu'on ait pu trouver dans l'ovaire même; ce qui rappelle parfaitement l'infécondité des individus dont les zoospermes étaient rudimentaires ou seulement incomplets. Ainsi les ovules se perfectionnent, comme je l'ai fait voir pour les zoospermes, à mesure qu'ils s'éloignent de leur point

de départ; la vie s'y développe avec l'organisation à mesure qu'ils approchent du moment de la fécondation. Les ovules des Batraciens peuvent encore être fécondés d'un jaune après leur expulsion, quand on les conserve dans des conditions convenables. Si la fécondation devient impossible plus tard, c'est donc parce que la vie y a cessé, comme on est obligé de l'admettre pour la graine qui a cessé de pouvoir germer, quoique son tissu n'ait subi aucune altération *appréciable* à nos sens.

Immédiatement après la fécondation, la surface de l'œuf se couvre de sillons dont le nombre et l'étendue augmentent rapidement; ils sont bientôt croisés perpendiculairement par d'autres, et l'aspect de la surface change de moment en moment. Rusconi (1) étant parvenu à féconder artificiellement des ovules de poisson, y a remarqué la même série de phénomènes que MM. Prévost et Dumas ont si bien décrits sur les ovules de Batraciens; on doit les regarder comme constans, puisqu'on les rencontre toutes les fois qu'ils peuvent être observés. De semblables contractions dans les membranes extérieures de l'ovule seraient impossibles à l'instant de la fécondation, si ces membranes n'avaient pas été vivantes auparavant.

D'un autre côté, c'est aux dépens de l'enveloppe du jaune que se développent les organes digestifs de l'embryon; elle entre dans l'abdomen en grande partie dans les mammifères, en totalité chez les autres animaux. Il faut bien admettre que cette membrane vitelline était vivante, puisqu'elle finit par faire partie de l'organisme de l'embryon; et elle existait bien long-temps avant la fécondation, car on la trouve autour du jaune dès le moment où il paraît : il est même probable qu'elle n'est autre chose que la cellule du tissu de l'ovaire, dans laquelle s'est déposé le jaune, et par laquelle le jaune a été sécrété, comme la graine dans sa cellule adipeuse. L'ovule animal ou végétal vit donc aussi positivement que le zoosperme et le granule pollinique, mais il vit comme l'hydatide séquestré dans nos tissus, ou le lichen peu différent du rocher dans lequel il est empâté.

Ces mouvemens spontanés et énergiques des zoospermes

(1) Annales des Sciences naturelles, deuxième série, *Zoologie*, tome IV, page 183.

ont donné lieu à une autre erreur que je dois relever ici. Les zoologistes et les physiologistes, s'accordant à regarder la spontanéité de la locomotion comme le cachet de l'animalité, on a toujours rangé les zoospermes parmi les animaux, sans examiner s'ils en possèdent les autres attributs. Cependant tous les animaux se reproduisent et digèrent, et les zoospermes sont privés de ces deux fonctions non moins essentielles que la motilité. Je démontrerai bientôt très facilement la première proposition ; quant à la seconde, il me suffira de faire remarquer que les zoospermes n'ont jamais offert la moindre trace d'organes digestifs, de cavités intérieures, tandis que Ehrenberg est parvenu à démontrer l'existence de ces organes dans les animalcules microscopiques les plus simples, à l'aide de matières colorantes mêlées aux infusions où ils vivaient. Au contraire, si on introduit une solution de carmin ou d'indigo entre deux lames de verre où s'agitent des zoospermes vigoureux, on voit bientôt la matière colorante imprégner leur surface visqueuse, comme celle des globules de mucus, des débris d'épithélium, etc., qui flottent dans la même liqueur ; mais rien ne pénètre à l'intérieur, rien ne peut déceler la moindre trace d'une cavité communiquant au dehors, ni même d'un système absorbant quelconque ; seulement les parties qui étaient restées invisibles à cause de leur transparence et de leur extrême ténuité, deviennent apparentes, parce que, en retenant les molécules de matière colorante qui arrivent successivement jusqu'au contour; ces parties prennent une couleur plus foncée que celle du liquide ambiant. C'est même le moyen le plus sûr et le plus prompt qu'on puisse employer pour voir nettement, et dans toute sa longueur, la queue d'une foule de zoospermes, celle des poissons par exemple, ou bien des détails extérieurs sur lesquels on conserve des doutes. Je conseille à tous les micrographes d'employer ce moyen dans tous les cas embarrassans, en ayant soin d'étendre la matière colorante d'une très grande quantité d'eau. Mais ce moyen, si précieux d'ailleurs, ne m'a jamais rien appris sur la structure intime des zoospermes, parce que la matière colorante ne pénètre jamais à l'intérieur, soit pendant la vie, soit après la mort.

C'est aller contre l'observation rigoureuse des faits, et contre

toute analogie, que de regarder comme des *animaux* des êtres qui manquent des deux caractères les plus importans de l'animalité. C'est surtout dans les questions obscures qu'il importe de bien peser la valeur des mots. Qu'on appelle donc les zoospermes des tissus vivans, des parties vivantes, des êtres vivans, etc., doués de mouvemens spontanés, mais non pas des animalcules, à moins qu'on convienne de ne pas attacher à cette expression l'idée d'animaux très petits, mais complets, provenant d'individus semblables à eux, etc., car ils ne méritent pas plus que les ovules d'être rangés parmi les animaux, et ils sont produits comme les ovules par la séparation de particules vivantes, et non par une véritable sécrétion comme celle qui fournit la liqueur séminale.

Ces distinctions peuvent paraître un peu subtiles, mais on en verra plus tard l'importance; et dans tous les cas, on ne peut que gagner à rester exactement dans les limites du vrai.

Quoi qu'il en soit, ces considérations zoologiques confirment parfaitement le résultat des observations pathologiques; elles permettent de concevoir pourquoi les pertes séminales sont si débilitantes; pourquoi certaines liqueurs séminales ne contiennent que des globules brillans, piriformes, ovoïdes, ou même tout à-fait ronds, dont les mouvemens spontanés ont pu être constatés, dans des circonstances favorables.

On voit maintenant à quoi se réduisent les objections élevées contre l'opinion qui attribue aux testicules la production des zoospermes, puisqu'il est facile d'expliquer pourquoi ils n'ont pas toujours la même forme, dans la même espèce, suivant les époques; pourquoi on trouve dans le même testicule des corps vivans d'un aspect très différent: pourquoi on rencontre des zoospermes à l'état de liberté, dans le testicule, et d'autres semblables, emprisonnés dans des kystes, à la fin du canal déférent: difficultés dont on n'avait pas encore donné de solution satisfaisante. D'un autre côté, les zoospermes ne sont pas de véritables *animaux;* ils ne sont pas dus non plus à une véritable sécrétion, comme la *liqueur* qui leur sert de véhicule: ce sont des *tissus vivans*, dont la production a lieu comme celle des ovules, par séparation d'une partie du type, dans laquelle

la vie et l'organisation continuent à se développer jusqu'au moment de l'expulsion définitive. Ici commence une nouvelle série de phénomènes dont l'étude est le complément indispensable de ce qui précède, et dont je m'occuperai dans un prochain Mémoire. (1)

Sur *une nouvelle forme de branchies, découverte dans une espèce de Crustacé décapode macroure qui devra former le type d'un genre nouveau* (Aristeus antennatus *Nob.*),

Par M. G. L. Duvernoy.

(Note présentée à l'Académie des Sciences dans la séance du 10 août 1840.)

§ 1. *Idée générale du genre* Aristée, *et historique sur sa découverte.*

Si je prends la liberté de fixer un instant l'attention de l'Académie sur un simple fait d'organisation, c'est que ce fait se rattache, d'un côté, à un principe de physiologie, que j'ai cherché à établir dans mes Mémoires précédens, *relativement au degré d'influence que doivent avoir la forme et la structure des branchies des Crustacés sur leur séjour et, jusqu'à un certain point, sur leur distribution géographique;* c'est que, d'un autre côté, ce même fait soulève une question intéressante *sur l'importance que ces différences de forme et de structure peuvent présenter pour la classification de ces animaux, dans la méthode naturelle.*

Qu'on me permette de rappeler d'abord que les branchies des *Crustacés* se composent de lames plates ou vésiculeuses, ou de tubes simples ou ramifiés, dont l'arrangement peut varier beaucoup.

Ces formes simples ou plus ou moins divisées, étendent à

(1) Je dois témoigner ici ma gratitude au docteur E. Legrand, pour le zele éclairé et persévérant avec lequel il m'a secondé dans mes expériences et mes recherches microscopiques.

87906

proportion de ces divisions, toutes choses égales d'ailleurs, les surfaces respirantes ; elles ne peuvent manquer d'avoir un certain degré d'influence sur la nature de ces animaux.

Il est indubitable que tous les *Crustacés* qui ont la faculté de vivre à terre, mais toujours dans un air humide, ont des branchies composées de larges lames, préservées de l'action desséchante de l'air, par l'eau que ces lames retiennent entre elles.

Ajoutons qu'outre cette forme protectrice contre la dessiccation, il y a toujours, dans ce cas, comme l'ont démontré MM. Audouin et Edwards, un mécanisme particulier, qui permet à l'animal de retenir une certaine quantité d'eau autour de ses branchies, et qui ne donne accès, dans la cavité qui les renferme, qu'à de faibles portions d'air humide.

C'est à la catégorie des branchies en tubes, qu'appartiennent celles du Décapode Macroure que je vais faire connaître.

Cette espèce m'a été envoyée de Nice par M. Risso, comme vivant dans les grandes profondeurs de la mer. C'est, je pense, le *Pénée aux longues antennes* du même naturaliste (*Peneus antennatus*, Risso, que Latreille présumait devoir être réuni avec le *Pénée de Mars*, dans sa seconde division de ce genre, caractérisée par des antennes intermédiaires, terminées par de longs filets (*Règne animal*, tome IV, page 92).

Mais l'espèce en question n'a qu'un des deux filets des antennes intermédiaires extrêmement long ; tandis que l'autre est resté fort court.

Un autre caractère, beaucoup plus important, est celui que m'ont offert les branchies.

Au lieu d'être lamelleuses et penniformes, comme celles de la famille des *Salicoques*, à laquelle le genre *Pénée* appartient; comme celle du *Pénée caramote* en particulier, espèce type de genre; ce sont des branchies d'une forme nouvelle, que je désignerai par le nom de *rameuse*.

Cette forme, que je n'ai encore rencontrée, dans tous ses détails, chez aucun Crustacé, se rapporte cependant à la forme tubuleuse, ainsi que je l'ai déjà annoncé; mais ces tubes ne sont pas arrangés comme les soies d'une brosse, ainsi que cela se voit dans le *Homard*, etc.: ils ne sont pas disposés en pa-

naches, comme dans l'*Ecrevisse de rivière*, ni en jeu d'orgue, comme dans les *Squilles*.

Chaque branchie du Crustacé en question, se compose d'une tige principale qui s'étend dans toute la longueur du double cone branchial. De cette tige partent de chaque côté, à angle droit, un certain nombre de branches qui se courbent en demi-cercle, et dont les extrémités libres se rencontrent ou se rapprochent beaucoup, dans la plus grande partie de l'étendue de la face externe de la branchie. Il n'y a que celles des sommets des deux cônes ou des deux bouts de la branchie, qui restent droites et étalées.

Des faisceaux de rameaux et de ramuscules, très courts et très rapprochés les uns des autres, garnissent, surtout extérieurement, toute l'étendue de ces branches.

Chaque branchie, disposée verticalement, ou à-peu-près, à l'axe du corps, est ainsi un rameau très divisé, dont les branches forment un cylindre creux, à travers lequel l'eau doit circuler et filtrer pour l'hématose, que cette extrême division favorise.

Cette admirable disposition me semble propre à compenser, en partie, les effets, sur la respiration, d'une eau moins aérée, celle des grandes profondeurs de la mer que cet animal habite.

Joignez à cela l'accès facile de l'eau dans la cavité branchiale, sous toute l'étendue du bord constamment bâillant de la carapace, sans le secours du mécanisme ordinaire de la respiration; dont le peu de développement ou la faiblesse des pièces principales (la valvule bi-maxillaire, les lames inter-branchiales) montrent, dans ce cas, l'emploi nul ou très secondaire.

Cette nouvelle forme de branchies, entièrement différente d'ailleurs des branchies des *Salicoques*, qui sont lamelleuses et penniformes, ainsi que je l'ai déjà imprimé, et que j'ai pu le vérifier dans une bonne partie des genres de cette famille (1), obligera les naturalistes systématiques d'en extraire cette espèce, ou de réformer, sous ce rapport, le caractère de la même

(1) Les genres Crangon et Pontophile de Leach et Risso; Athanase et Hyménocere, Palémon, Lysmate et Rhynchocinète; Sténope, Pénée et Pasiphaë; Alphée.

famille, tel du moins qu'il a été établi dans l'ouvrage à-la-fois le plus récent et le plus complet sur cette partie de la zoologie.

Je propose de faire de cette espèce le type d'un nouveau genre sous le nom d'Aristée (*Aristeus*). Elle conserverait le nom spécifique que M. Risso lui a donné : ce serait l'Aristée aux longues antennes (*Aristeus antennatus* Nob.)

Je joins à cette note la description détaillée de ce genre nouveau, avec des figures, qui feront comprendre ses caractères, particulièrement ceux relatifs à la structure de ses branchies.

§ 2. *Caractères du genre* ARISTÉE (*Aristeus* Nob.)

Les *branchies* sont rameuses, c'est-à-dire composées d'une tige médiane longitudinale, et de branches transversales qui partent de chaque côté de cette tige, à angle droit et portent des paquets de rameaux et de ramuscules très courts. Leur forme générale est celle de deux cônes creux, adossés par leur base.

Il y a *seize branchies* de chaque côté, disposées sur deux rangs ; quatre forment la rangée interne, et les douze autres composent la rangée externe. Les premières de ces branchies et les douzième, onzième et neuvième de la rangée externe, sont fixées à la paroi du thorax. Les autres tiennent au premier article des second et troisième pieds-mâchoires et aux trois premières paires de pieds ambulatoires.

Il y a cinq lames interbranchiales vésiculeuses (*k*, *l*, *m*, *n*, *o*, Pl. 5, fig. 2) d'un tissu extrêmement fin et peu résistant.

Les *trois premières paires de pieds* sont en forme de serre didactyle : elles augmentent graduellement en longueur et en épaisseur, de la première à la troisième. Les deux dernières paires sont encore plus longues, mais très grêles et monodactyles.

Le tranchant de chaque doigt de la serre des premiers pieds est finement dentelé (Pl. 4 A, fig. 11) ; ces dentelures sont en partie cachées par de courtes soies. Les deux doigts et l'article qui supporte la serre (fig. 12) sont garnis de pinceaux de soies disposés avec régularité ; ils forment une série simple le long du

bord postérieur de cet article, dans les trois premières paires de pieds. Il y en a deux séries, le long de ce même bord, sur la partie basilaire de l'avant-dernier article, et une sur la face externe de la partie digitale de ce même article, et du doigt mobile ou du dernier article.

Les *antennes intermédiaires*, ou supérieures, ont deux filets articulés, dont l'un est très court et cilié, et dont l'autre extrêmement long, très grêle et capillaire vers son extrémité, dépasse le filet de l'antenne externe. Le pédoncule de cette antenne, qui supporte les deux filets, est plus long que celui de l'antenne externe; sa face supérieure est concave; il a extérieurement une pièce accessoire qui se termine en pointe (*i*, fig. 1 et 2).

La *lame accessoire* qui tient au pédoncule de l'antenne externe ou inférieure, est très grande, ovale, molle et membraneuse par son extrémité et son côté interne, solide par son bord externe, qui a une épine en avant (fig. 3, *h*).

La *mandibule* est forte: sa surface triturante a deux tubercules mousses et une forte dent pointue très saillante (*g*, fig. 4 et 5). Elle porte un palpe composé de trois articulations aplaties. (*p*, fig. 4 et 5).

La *première mâchoire* n'a que deux lames préhensiles développées, et une lame rudimentaire. La première, qui est aussi la plus grande, a son bord interne hérissé de petites dents qui doivent faire l'effet d'un rateau; ces dents sont alternativement plus grandes et plus petites. Le pédicule commun qui supporte ces lames préhensiles, s'articule en avant avec une lame hors de rang, tenant lieu de palpe dorsal (fig. 6).

La *seconde mâchoire* (fig. 7) se compose de quatre lanières, à bord cilié, dirigées en dedans; d'une lame qui se porte en avant, sorte de palpe dorsal, et d'une lame branchiale que j'appelle bi-maxillaire : cette lame est ici extrêmement mince; elle se prolonge davantage en avant de son articulation qu'en arrière, et ne doit jouer ici, à cause de son peu de consistance, qu'un rôle secondaire dans le mécanisme de la respiration.

Le *premier pied-mâchoire* (fig. 8) a une tige principale moyenne, composée de trois articles; une large lame interne accessoire, ayant son bord régulièrement hérissé en dedans et en

dehors d'une double rangée de gros poils. Le palpe (*p*), où le fouet, est un peu plus court que la tige principale.

Le *deuxieme pied-mâchoire* (fig. 6) se compose d'une tige plate et longue, repliée, ayant cinq articles. La hanche supporte, en même temps, un fouet cilié, presque aussi long que la tige principale, et multiarticulé.

Le *pied-mâchoire externe* ou le *troisième* (fig. 10) est grêle, allongé: il atteint par son extrémité le dernier cinquième de la lame accessoire de l'antenne externe. Il supporte un fouet grêle, composé d'une tige principale multiarticulée et de plusieurs petits articles basilaires.

La *carapace* est mince, divisée en avant par une crête médiane, qui se termine en un rostre médiocrement long, surmonté de trois dents : son bord antérieur a deux épines de chaque côté, qui répondent aux pédoncules des antennes. Son bord inférieur est bâillant, et laisse libre l'entrée de l'eau pour la respiration.

Les *fausses pattes* abdominales se composent de deux lanières ciliées, de grandeur inégale, excepté la première, qui n'a qu'un faible rudiment de la seconde de ces deux lanières.

Des deux *lames latérales de la nageoire caudale*, l'externe, qui est du tiers plus grande que l'interne, montre à son extrémité une légère suture transversale peu sensible.

Le dernier article de l'abdomen est long, très pointu et creusé en dessus d'un sillon médian.

Les trois avant-derniers ont une crête médiane dorsale, qui se termine en pointe en arrière.

L'*Aristée aux longues antennes* habite les grandes profondeurs de la mer de Nice.

§ 3. *Description détaillée des branchies.*

Cette description nous forcera à des répétitions, qu'on nous pardonnera peut-être, en faveur de l'intérêt que présente l'organisation des branchies en général, dans la classe des Crustacés, et celle en particulier que nous cherchons à démontrer avec exactitude.

Disposition générale et nombre. — Les branchies sont disposées en travers, c'est-à-dire dans une situation presque verticale relativement à l'axe du corps, ou même très peu oblique d'avant en arrière; elles descendent jusqu'au niveau du bord inférieur de la carapace, qui est bâillant et permet l'accès immédiat de l'eau sur les pyramides branchiales.

Il y en a douze externes sur un seul rang, dont la première et la dernière sont isolées, et les dix moyennes sont rapprochées par paires.

La première, la seconde et la troisième paires recouvrent quatre branchies séparées, formant la rangée interne.

Il y en a donc seize en tout.

Grandeur relative. — La première est la plus petite.

Les autres branchies vont en augmentant jusqu'à la quatrième paire.

La cinquième paire a les mêmes dimensions que la quatrième.

La dernière branchie est très sensiblement plus courte que celles de la cinquième paire.

Les quatre branchies du rang interne s'élèvent un peu plus que celles qui les recouvrent; mais elles descendent moins.

Forme générale.—Chaque branchie a la forme générale d'une navette, par suite du développement à-peu-près égal des deux cônes qui les composent et qui sont adossés par leur base; cependant le cône supérieur paraît comme tronqué dans les première, seconde et troisième paires. Nous expliquerons tout-à-l'heure par quelle circonstance organique?

Détails sur la forme et sur la structure. — Examinée de près, chaque branchie paraît un cylindre creux, fendu longitudinalement du côté externe, et plus largement ouvert en haut qu'en bas.

Il se compose, dans la ligne médiane, ou à-peu-près, de sa face interne, opposée à cette ouverture linéaire du côté externe, d'une tige principale, de laquelle partent, de chaque côté, des branches, à-peu-près d'égale longueur, excepté vers les extrémités, où elles diminuent plus rapidement à la supérieure qu'à l'inférieure. Ces branches transversales sont courbées en demi-

cylindre et viennent se rapprocher avec celles du côté opposé, le long de la fente longitudinale, que nous avons indiquée à la paroi externe du double cône branchial.

De chaque branche partent des rameaux et des rainuscules qui remplissent l'intervalle d'une branche à l'autre. Ces divisions se font en dehors du double cône et de ses branches transversales plutôt qu'en dedans : elles présentent dans leur nombre et leur arrangement assez régulier en faisceaux de très courtes ramifications, un admirable aspect.

A l'extrémité du cône supérieur des branchies, les dernières branches qui partent de la tige et dont la longueur va rapidement en diminuant, ainsi que je l'ai déjà dit, ne sont plus courbées sur elles-mêmes en demi-cercle. On les trouve étalées et montrant leur face externe, qui est devenue celle de l'intérieur du cylindre creux dans le reste de l'étendue de la branchie.

Attaches des branchies. — Chaque branchie est fixée par son tiers, ou son quart inférieur, à la paroi la plus basse du thorax ou à la hanche du pied correspondant, de manière que la portion de la branchie, qui dépasse en bas son point d'attache, est beaucoup plus courte que celle qui s'élève au-dessus de ce point.

La douzième branchie externe tient au thorax.

La onzième de même; la dixième tient à la hanche de la quatrième paire de pieds ambulatoires.

La neuvième est fixée au thorax.

La huitième a la hanche de la troisième paire de pieds avec la lame inter-branchiale.

La septième et la sixième, la cinquième et la quatrième sont attachées par paires, à la hanche de la seconde et de la première paire de pieds ambulatoires.

La troisième et la deuxième tiennent à la hanche du troisième pied-mâchoire.

La première branchie tient au second pied-mâchoire.

Les quatre branchies internes sont fixées au thorax.

EXPLICATION DES FIGURES.

PLANCHE 4 A.

Fig. 1. L'*Aristée aux longues antennes*, de grandeur naturelle, vu de profil du côté droit, avec ses appendices du même côté. On n'a pas dessiné les appendices du côté gauche, afin d'éviter la confusion qui aurait pu en résulter. — (*o*) est l'œil et son pédicule. (*i*) L'antenne intermédiaire et plus particulièrement l'épine, qui se voit du côté externe de son pédicule. (*c*) Son filet court. (*m*) Le filet unique de l'antenne externe. (*h*) La lame accessoire de son pédicule, et plus particulièrement sa partie dure et non membraneuse. *g*) Le pied-mâchoire externe. (*p g*) Son fouet. (*f*) Le second pied-mâchoire. (*p f*) Son fouet. 1. 2. 3. Les trois premières paires de pieds, terminés par une serre. 4 et 5. Les deux dernières paires, qui sont monodactyles. 6–10. Les fausses pattes abdominales. 11. La lame antérieure. 12. La lame postérieure de la nageoire caudale. 13. Le dernier article de l'abdomen.

Fig. 2. Le pédicule de l'antenne intermédiaire ou supérieure avec l'œil correspondant (*o*) et son pédicule (*p d*). (*i*) L'épine du pédicule de l'antenne. (*c*) Le filet court. (*l*) Le filet long de cette antenne. Le rapport du filet court de cette antenne paraît ici différent de celui indiqué dans la figure 1.ʳ Ce filet, dans l'animal, est au dessus et un peu en dehors du long filet. Le dernier rapport s'aperçoit presque seul dans la figure 2. Le premier, au contraire, est évident dans la figure 1.

Fig. 3. L'antenne externe ou plutôt inférieure gauche, dont le filet (*m*) est tronqué, mais dont on a déployé la lame accessoire pour faire voir sa forme et ses dimensions. La partie dure de cette lame, qui se termine par l'épine (*h*), est externe et un peu supérieure dans sa position naturelle. Cette lame recouvre l'antenne.

Fig. 4. La mandibule, vue par sa face interne.

Fig. 5. La même, vue par sa face externe.

Dans l'une ou l'autre figure, (*d*) est la dent la plus saillante de la partie triturante de cette mandibule. (*p*) Son palpe. (*t*) Le tendon de son muscle adducteur.

Fig. 6. La première mâchoire, de grandeur naturelle; et fig. 6′, la même, double de grandeur. — (*p*) Lame qui tient lieu de palpe. (*a. b. c*) Les trois lames dont cette mâchoire est composée: la troisième n'est que rudimentaire. L'antérieure (*a*), qui est la plus grande, a son bord interne hérissé de dentelures alternativement plus grandes et plus petites, qui font l'effet d'un rateau. La lame (*b*) n'a que des soies.

Fig. 7. Deuxième mâchoire. (*b m*) Sa lame, que j'appelle bi-maxillaire. (*a. b. c. d*) Les quatre lames préhensiles dont cette mâchoire se compose. (*p*) Lame qui tient lieu de palpe.

Fig. 8. Premier pied-mâchoire. (*p*) Son palpe. (*a*) La tige principale. (*b*) Lame de sa partie préhensile, très garnie de soies. (*c*) Lame rudimentaire.

Fig. 9. Second pied-mâchoire. (*p*) Son palpe. (*a*) Sa tige principale.

Fig 10. Le troisième pied-mâchoire ou l'externe. (*p*) Son palpe. (*a*) Sa tige principale. Les appendices figurés de 2 à 10 sont ceux du côté gauche, représentés de grandeur naturelle.

Fig. 11. Troisième serre du côté gauche, grossie du double, pour faire voir la disposition des paquets de soies, et surtout les dentelures, dont le bord interne de chaque doigt est garni. En *a*, on voit les soies de la seconde rangée entre les paquets de soies de la première. Ces deux rangées sont bien distinctes dans la figure 1, troisième pied.

Fig. 12. L'antépénultième article du troisième pied, grossi du double, pour montrer la disposition, en série régulière, des pinceaux de soies dont son bord postérieur est garni.

PLANCHE 5.

Branchies de l'Aristée.

Fig. 1. (*i*) Antenne intermédiaire ou supérieure. (*k*) Antenne externe ou inférieure. (*a*) Troisième pied-mâchoire ou pied-mâchoire externe. (*b*) Son fouet. (*c*) Le fouet du deuxième pied-mâchoire. (*d*) Le deuxième pied-mâchoire. (*e*) Le fouet du premier pied-mâchoire. (*f*) La tige de ce pied. (*g*) Lame bi-maxillaire. Cette figure est destinée à montrer l'ensemble des branchies, de grandeur naturelle. On a relevé, à cet effet, le bord de la carapace qui les recouvre, et dont on voit en (*h*) la membrane qui le double.

Fig. 2. Cette figure montre les détails de l'appareil branchial, grossi trois fois. Les douze branchies de la rangée externe sont numérotés de I à XII, et les quatre de la rangée interne de XIII à XVI. (*k. l. m. n. o*) sont les lames vésiculeuses qui séparent une partie de ces branchies. (*a. b. c*) sont les trois pieds-mâchoires tronqués, et (*d*) la lame bi-maxillaire.

Fig. 3. Une branche transversale, courbée en arc, d'une branchie, pour faire voir la disposition en faisceaux des dernières divisions des tubes respirateurs. Cette branche est représentée grossie environ quinze fois.

SUR *un nouveau genre de l'ordre des Crustacés Isopodes et sur l'espèce type de ce genre, le* Képone Type,

Par M. G. L. DUVERNOY.

Mémoire présenté à l'Académie des Sciences, dans sa séance du 12 octobre 1840.

§ 1. *Historique et idée générale du genre.*

On connaît depuis long-temps les individus femelles d'une espèce de très petit Crustacé parasite, de 0,011[mm.] au plus de longueur, appartenant à l'ordre des Isopodes, qui vit sous le bouclier de plusieurs espèces de *Palémons*. Il y est attaché à la membrane qui revêt ce bouclier, en dedans de la partie qui sert de paroi externe à la cavité branchiale. Il y occupe une fossette qui produit un relief plus ou moins sensible, une sorte de loupe à l'extérieur de cette paroi.

Le même Palémon ne nourrit qu'une seule femelle de Bopyre, lorsqu'elle est une fois fixée, ainsi que je viens de l'expliquer dans l'une ou l'autre de ses cavités branchiales; mais cette femelle est souvent, sinon constamment accompagnée d'un indi-

vidu beaucoup plus petit, que l'on trouve comme enfoui entre les deux séries de ses lames branchiales sous-abdominales près de l'issue des œufs, que sans doute il féconde, à mesure de leur sortie, à la manière des Batraciens.

La fécondité de ces petits animaux est extraordinaire. Les œufs pondus éprouvent une sorte d'incubation sous le thorax de la femelle, où ils sont retenus et protégés par des lames operculaires, qui n'existent pas dans les mâles et sous lesquelles ils éclosent.

M. Risso annonce avoir compté huit cents petits vivans sur une seule femelle.

Le *Bopyre* a été le sujet de singuliers préjugés consignés dans le *Recueil des Mémoires de cette académie* (année 1722, page 19).

Un demi-siècle plus tard, en 1772, Fougeroux de Bonderay reconnut pour un insecte cet animal, qui, selon lui, s'attache à la Chevrette. (1)

Etudié par Latreille (2) au commencement de ce siècle, il fit de cet animal son genre *Bopyre*, et le rangea parmi ses *Crustacés isopodes*. La description qu'en donne ce savant et laborieux entomologiste, est assez détaillée, quoique incomplète.

En 1817, époque de la première édition du *Règne animal* de Cuvier, Latreille, qui s'était chargé de la partie concernant les Crustacés et les Insectes, classa le genre *Bopyre* à la fin de l'ordre des Isopodes; sans doute pour indiquer une sorte de dégradation organique, relativement aux autres animaux du même ordre. Dans la seconde édition de cet ouvrage, dont le tome IV parut en 1829, le sous-genre *Bopyre* forme la première section de cet ordre, celle des *Epicarides*. C'était évidemment pour le rapprocher de la section des *Cymothoadés*, avec laquelle il a des rapports sensibles.

Postérieurement à Latreille, M. Rathke a fait connaître des détails intéressans sur l'organisation et le genre de vie de cet

(1) *Histoire de l'Académie des Sciences pour* 1772, pages 1 et suivantes.

(2) *Histoire naturelle, générale et particulière des Crustacés et des Insectes*, par P. A. Latreille, Paris, an XII, tome VII, pages 50-55, et Pl. 27, fig. 2, 3.

animal. Ils ont paru, en 1837, dans deux ouvrages de ce savant. (1)

Les femelles, observées par M. Rathke, avaient 5 lignes (0,0125$^{mm.}$) de longueur; les mâles, 1 1/3 ligne (0,003$^{mm.}$). M. Rathke n'a jamais trouvé de *Bopyre* que sur des Palémons femelles, quoiqu'il en eût rencontré plusieurs centaines avec cet animal, et autant de mâles, mais toujours sans cet animal.

M. Milne Edwards, dans le tome III de son Histoire naturelle des *Crustacés*, a fait connaître plus complètement la composition de la bouche de ces animaux, dans laquelle il a entre autres découvert des mandibules, qui avaient échappé à la sagacité de M. Rathke. Notre collègue a placé dans sa méthode de classification des *Crustacés*, la famille des *Bopyriens*, parmi les *Isopodes sédentaires*, et immédiatement après la famille des *Cymothoadés*, qui est la dernière de la section des *Isopodes nageurs*. Il y a sans doute dans cet arrangement, l'intelligence du rapport déjà compris par Latreille, entre ces deux familles. On doit y reconnaître encore une vue philosophique, qui assigne son rang au *Bopyre*, d'après le degré de perfection organique.

L'immobilité des femelles étant une dégradation fonctionnelle très sensible, ces animaux devaient être placés immédiatement après les *Cymothoadés*, à la fin de l'ordre des *Isopodes*, comme l'avait fait Latreille, en premier lieu, et non au commencement, comme il s'y est déterminé plus tard.

Les *Isopodes sédentaires* comprennent une seconde famille, celle des *Ioniens*, composée de même d'un seul genre, que Latreille a laissé parmi les *Amphipodes*, sans doute à cause de ses branchies arborescentes et déployées autour de l'abdomen, et de l'existence d'appendices thoraciques et abdominaux vésiculeux, en massue, et de différentes grandeurs. La seule espèce de ce genre, dont les habitudes, ainsi que le remarque ce dernier, sont les mêmes que celles des *Bopyres* (2), a été découverte par

(1) Henrici Rathke: *De Bopyro et Nereide*, Rigæ et Dorpati, 1837, in-4. — *Zur Morphologie*, Reisebemerkungen aus Tamien, von H. Rathke, Rigæ et Leipsig, 1837.

(2) *Règne animal* de Cuvier, tome IV, page 119, Paris, 1829.

Montagu, cachée sur le test de la *Callianasse souterraine*, et nommée par ce naturaliste *Oniscus thoracicus.* (1)

C'est Latreille qui a fait de cette espèce un sous-genre sous le nom d'*Ione.*

M. Milne Edwards a cru devoir le ranger dans l'*ordre des Isopodes,* malgré ses branchies arborescentes et flottantes autour de l'abdomen et l'existence de ses singuliers appendices vésiculeux. Cette détermination, que Latreille n'avait pas osé prendre, a pu paraître hardie aux naturalistes qui tiennent à des caractères de classification une fois admis; mais ceux qui comprennent la méthode naturelle, cette méthode de l'ensemble des rapports, qui est en même temps un moyen de progrès continuels et d'améliorations dans l'exposition de ces rapports, auront dû trouver cet arrangement très rationnel.

Un nouveau type générique, que je viens de découvrir, et qui est intermédiaire entre les *Bopyres* et les *Iones*, justifierait au besoin cette classification.

Les quatre exemplaires que j'en possède se sont trouvés parmi quelques autres *Crustacés isopodes*, qui m'ont été remis pour mes recherches d'anatomie comparée, avec une rare obligeance, par le fondateur de la première société d'Histoire naturelle de l'île Maurice, feu M. Julien Desjardins, dont la science regrette la perte récente.

Je propose, pour ce genre, la dénomination de *Képône,* du mot grec Κῆπος, jardin, afin de le consacrer au souvenir du naturaliste auquel la science devra d'en avoir recueilli les premiers individus, et qui est d'ailleurs connu par de bonnes observations sur la zoologie de l'île Maurice.

Si l'on compare les *Bopyres*, les *Jones* et les *Képônes*, on trouvera qu'ils ont beaucoup d'analogie :

1° Par les quatorze pattes ancreuses, attachées à leurs anneaux thoraciques;

2° Par les six segmens de leur abdomen, qui vont en diminuant du premier au dernier, et dont les cinq premiers, au moins, supportent des appendices branchiaux;

(1) *Trans. of Linn. Soc.* tome IX, pages 3-4, 1808.

3° Par la présence de quatre antennes, dont les deux internes sont rudimentaires;

4° Par l'absence d'yeux, au moins chez les femelles;

5° Par la plus grande taille de celles-ci, relativement aux mâles;

6° Par l'existence, chez les femelles, de plaques d'incubation qui recouvrent la face inférieure du thorax et protègent les œufs.

Voici d'ailleurs les principaux caractères du genre *Képône.*

Le corps a tous ses quatorze segmens, y compris la tête, très distincts. Ceux du thorax sont profondément séparés dans la femelle comme dans le mâle.

Les antennes externes ou postérieures dans la femelle, ont quatre articles; les internes ou antérieurs deux seulement.

La bouche dans la femelle a un *labre*, deux petites *mandibules*, une *lèvre postérieure*, des *mâchoires.* Toutes ces parties sont recouvertes par une paire de *pieds-mâchoires.*

La *hanche* des quatre premières paires de pieds supporte, sur un *court pédicule* cylindrique, une *pelotte hémisphérique* multipapilleuse, dirigée vers le haut. Dans les paires de pattes suivantes, le pédicule existe, mais sans la pelotte.

Les *pieds* ont cinq articles, dont le dernier n'a pas d'ongle. Plus dilaté que le pénultième, il paraît former une petite pelotte, qui rappelle celle des *Rainettes.*

Les *branchies* se composent de six paires d'appendices en forme de feuilles, à bord frangé, attachées et étalées sur les côtés des six anneaux de l'abdomen.

Cinq autres paires d'*appendices coniques* ou *pyriformes* sont attachées plus en dedans sous les *cinq premiers anneaux* de cette région.

Il y a, de chaque côté du thorax de la femelle, *cinq larges plaques d'incubation*, qui recouvrent toute la face inférieure de cette partie du corps.

Le mâle n'a que moitié de la longueur des plus grandes femelles.

L'abdomen et les folioles branchiales principales sont plus

développées. Les branchies accessoires des deux dernières paires sont bifurquées.

Les antennes internes sont à proportion plus longues et dépassent sensiblement le chaperon.

Il y a une apparence d'yeux à la face supérieure de la tête.

Les premières lames qu'on découvre autour de la bouche diffèrent beaucoup pour la forme des *pattes-mâchoires de la femelle.*

Ce nouveau type générique, et même de famille, appartient évidemment, par ses quatorze pattes, semblables entre elles, et par le nombre des segmens de son corps, à l'ordre des *Isopodes.*

Nous avons déjà fait sentir ses affinités incontestables avec les *Bopyres* et des *Jones.*

Il se rapproche des *Jones* par le nombre de ses appendices abdominaux et par leur disposition autour de cette région.

Il se rapproche des *Bopyres* par la forme lamelleuse ou en feuilles de ses branchies externes; mais les branches ou les dentelures de ces feuilles, qui ne se voient pas dans les Bopyres, rappellent un peu les divisions des branchies arborescentes des *Jones.*

Ce nouveau type, intermédiaire entre les *Bopyres* et les *Jones*, me semble devoir confirmer la réunion de ces deux genres dans une même section.

Le nombre de ses appendices abdominaux est le nombre normal le plus fort que l'on ait rencontré jusqu'ici dans l'ordre des Isopodes; mais, chez aucun animal de cet ordre, la dernière paire de ces appendices n'a subi la même transformation que les cinq autres qui la précèdent.

Cette circonstance singulière et la disposition étalée des branchies dans les *Jones* et les *Képones*, tandis qu'elles sont imbriquées et sous-abdominales dans tous les autres *Isopodes*, obligera de réformer, à cet égard, les caractères de cet ordre. Ce sont ces questions de principes de classification, soulevées par la découverte de cette nouvelle forme animale, qui m'ont encouragé à la faire connaître à l'Académie.

Je joins à cet extrait une description détaillée du genre *Képone*, et une planche, dont les figures donneront une idée exacte de ce genre.

§ 2. *Description détaillée du genre* KÉPÔNE (*Kepon typus* Nob.) *et caractères particuliers de la femelle de l'espèce type de ce genre.*

Forme générale. — Dimensions. La tête, le thorax et l'abdomen se distinguent facilement, au premier coup-d'œil, surtout quand on examine l'animal par sa face dorsale.

Le thorax a sept segmens et l'abdomen six, tous bien séparés.

Les premiers paraissent emboîtés à la suite les uns des autres par leur partie moyenne seulement, les derniers par toute leur circonférence.

Les anneaux thoraciques ont pour appendices sept paires de pattes semblables entre elles, ayant la plus grande analogie avec celles des autres Isopodes parasites.

Six paires de lames branchiales principales sont suspendues et s'étalent sur les côtés des six anneaux de l'abdomen, sous lesquels se voient encore cinq paires de lames branchiales accessoires, plus rapprochées de la position ordinaire des lames branchiales ou operculaires des Isopodes. C'est le nombre normal le plus complet des appendices branchiaux ou operculaires des Isopodes, puisque la paire d'appendices natatoires du dernier anneau n'est transformée en branchies que dans ce seul genre.

Des trois femelles que je possède, la plus petite a,

Pour la tête et le thorax. . . .	$0^m,005$
Pour l'abdomen.	0 ,001 5
Longueur totale. . . .	0 ,006 5

Les deux plus grandes ont,

Pour la tête et le thorax. . . .	$0^m,008$ 0
Pour l'abdomen.	0 ,004 5
Longueur totale. . . .	0 ,012 5

Le mâle a pour la tête et le thorax. . .	o^{m},004
pour l'abdomen	o ,002
Longueur totale. . . .	o ,006

Ce n'est pas la moitié de la longueur totale des femelles qui paraissent adultes.

La *tête* (Pl. 4 B, fig. 1, *c*), vue par le haut, se présente comme un gros tubercule cordiforme, ayant l'apparence d'être composé, sur les côtés, de deux rondes-bosses, et en arrière d'une pointe mousse.

Une lame à bord relevé l'encadre en avant et sur les côtés, comme une sorte de chaperon (*m*, fig. 1). Cette même pièce, qui est concave en dessus et convexe en dessous (*m*, fig. 1), forme de ce côté le premier segment de la tête. Un second segment frontal (*n*, fig. 1), plus petit, est distinct du premier par une ligne de jonction, formant un arc assez ouvert en arrière. On voit sur les côtés de celui-ci, toujours en dessous, une très petite antenne rudimentaire, composée de deux articles : c'est l'antenne interne et antérieure (*b*, fig. 1). Plus en dehors et en avant paraît l'antenne externe (*a*, fig. 1) et (*c*, fig. 1), qui est beaucoup plus développée, de forme conique, et se compose de quatre articles, diminuant rapidement d'épaisseur du premier au dernier.

La *bouche* a des rapports sensibles avec celle des *Bopyres* : elle est recouverte par les deux premières plaques d'incubation, qui tiennent au premier anneau thoracique (fig. 2, *c*).

Sous ces plaques, il en existe deux autres, qui sont larges, convexes en avant et se prolongent en arrière par leur bord interne, en un pédicule grêle, long, renflé à sa terminaison. Le bord postérieur de ces mêmes plaques est fortement échancré et concave (fig. 3, *f*). On observe, en arrière de cette échancrure, plusieurs bandes musculaires *g*. (1)

L'angle interne et antérieur de ces mêmes plaques, qui sont les *pieds-mâchoires*, supporte un article crochu, qui s'avance entre les antennes et croise sa pointe recourbée en dedans,

(1) Analogues aux petits muscles que M. Rathke indique en *c* Pl. 1, fig. 5

avec celle du côté opposé. Cette forme et cette composition des pieds-mâchoires ont de l'analogie avec ceux de plusieurs *Cymothoadés*, et même des *Cloportides.* (1)

Les autres parties de la bouche sont :

1°. Un labre, bande étroite en arrière du chaperon, échancrée au milieu et comme bilobée.

2° Le petit orifice du pharynx, qui se voit dans l'échancrure du labre ;

3° Une lèvre postérieure rectangulaire : elle s'appuie sur une pièce, assez large d'abord, sorte de hanche qui forme, en se portant en arrière, une carène assez saillante ;

4° De chaque côté de cette pièce en sont deux autres semi-lunaires, dont l'angle interne a un prolongement en crochet qui s'avance vers la lèvre : ce sont les mâchoires ;

5° Enfin, entre le labre et la lèvre postérieure, sont les deux petites mandibules, dirigées obliquement en travers, de forme conique, terminées par une pointe noirâtre, qui se glissent sous chaque angle de la lèvre et la dépassent en avant par leurs pointes, de manière à faire paraître cette lèvre, au premier coup-d'œil, comme fourchue.

Segmens du corps et ses appendices en général.—Les anneaux thoraciques, comme les anneaux abdominaux sont absolument à découvert. Aucune pièce ne s'étend de l'occiput en arrière, pour leur servir de bouclier, comme cela a lieu chez les Décapodes.

On peut distinguer, dans chacun de ces anneaux, du côté dorsal, une partie moyenne articulaire, composée des deux pièces tergales ; et deux parties latérales épimériennes, plus détachées, qui s'articulent et semblent se continuer avec la hanche de chaque pied. Le septième segment seulement semble manquer de cette partie latérale ou de cette pièce épimérienne : elle s'y confond du moins, avec la partie articulaire ou moyenne de ce segment.

(1) Voir entre autres le crochet de la grande plaque, qui compose le pied-mâchoire du *Porcellion* rude, d'après M. Milne Edwards et la figure qu'il en a publiée Pl. 71, fig. 1-9, des Crustacés du *Règne animal* de Cuvier.

Appendices des anneaux thoraciques.

1° *Des pieds ou des appendices préhensiles et ambulatoires.* Les pieds, comme dans tous les Isopodes parasites, sont plutôt organisés pour fixer l'animal, que pour le transporter d'un lieu dans un autre. Ce sont des *pattes ancreuses*, ainsi que les appelle M. Milne Edwards; elles se composent de la hanche et du pied proprement dit.

La hanche est une forte articulation, qui se continue, comme je viens de le dire, et s'articule avec la pièce épimérienne de chaque segment thoracique. Cela est du moins évident pour les six premiers. Son extrémité externe supporte un singulier appendice qui sert, selon toute apparence, à fixer l'animal du côté supérieur, en même temps que les pieds l'accrochent du côté inférieur.

Le premier de ces appendices se présente, à chaque angle du chaperon, comme un petit tubercule à surface granuleuse (*a*, fig. 1).

Le second, le troisième et le quatrième, vont en augmentant de grosseur, et forment une pelotte à-peu-près hémisphérique, de petites verrues qui sont séparées quelquefois en deux groupes inégaux par un sillon oblique; ce qui leur donne une apparence de main, ou, du moins, d'organe préhensile, ayant deux parties opposables (fig. 1, *b*, *c*, *d*, pour les trois derniers; et fig. 4, où l'on voit en *b* la pelote, et en *a* son pédicule). Ces pelottes tiennent à la hanche par un pédicule cylindrique, qui subsiste seul, dans les cinquième et sixième paires de pieds avec les mêmes dimensions que dans les précédens, qui n'est plus que rudimentaire dans la septième.

Les pieds proprement dits (fig. 1. 2. 4) sont grêles, courts, repliés en demi-cercle sous les côtés du corps et composés chacun de cinq articles, y compris le dernier, qui déborde l'avant-dernier et forme comme une pelotte analogue à celle des Rainettes, parmi les Batraciens. Cet article ne porte pas d'ongle.

Chaque pied a son extrémité dirigée en avant et un peu vers le

haut. La forme du dernier segment thoracique a fait descendre l'articulation de la dernière paire de pieds, de sorte qu'on ne l'aperçoit pas facilement depuis la face dorsale.

2° *Des lames ventrales et incubatoires.* Le côté ventral du thorax est garni de deux séries minces de grandes lames demi transparentes, qui se recouvrent en partie les unes les autres, et s'étendent sur toute cette région. Il y en a cinq dans chaque série.

Des plaques semblables se voient généralement chez les femelles des Isopodes : elles protègent les œufs que la femelle a pondus pour la fécondation, mais non pour s'en séparer. Elle les conserve sous sa poitrine, où ils paraissent éprouver une sorte d'incubation, nécessaire sans doute à leur germination ou au développement du germe.

Appendices de l'abdomen. — Branchies.

Les *branchies* sont attachées aux anneaux de l'abdomen comme dans tous les *Isopodes;* mais elles ont des caractères particuliers dans leur nombre, dans leur disposition et dans leur forme, qui suffiraient pour distinguer ce genre des deux autres de la même section.

Il y a six paires de *lames branchiales principales*, le dernier anneau abdominal en supportant une comme le premier. Elles sont assez épaisses, en forme de feuilles allongées et pointues; dont les dimensions vont graduellement en diminuant de la première à la dernière, comme celles des anneaux de l'abdomen, auxquels elles sont attachées. Leur bord est comme frangé par de petites productions tubuleuses ou foliacées.

Outre ces six paires de lames branchiales principales, il y a cinq paires de lames branchiales plus petites, simples, élargies à leur base très effilées à leur extrémité, ayant aussi leur surface hérissée de quelques papilles: elles sont plates ou épaisses et pyriformes, suivant la quantité de sang qui les gonfle. Ces branchies accessoires sont attachées sous l'abdomen, plus en dedans

que les principales, et paraissent répondre aux lames operculaires du plan général des Isopodes.

L'abdomen n'a pas d'autres appendices.

§ 3. *Caractères particuliers du mâle.*

Le mâle se distingue de la femelle:

1° Par ses dimensions: nous avons vu que sa longueur n'est que la moitié de celle des deux plus grandes femelles.

2° Par la plus grande proportion de l'abdomen, relativement aux autres parties du corps et par celle des feuilles branchiales principales. Le plus grand développement des organes de la respiration dans le mâle, qui paraît être plus mobile, me semble remarquable.

3° Les pelottes épimériennes des pieds sont à proportion bien plus petites que dans les femelles et à peine verruqueuses à leur surface. Leur nombre est d'ailleurs le même, ainsi que celui des articles de chaque pied.

4° Les pieds-mâchoires, ou les mâchoires, sont deux lames à bord arrondi du côté interne, relevé, qui m'ont paru s'articuler sur une sorte de hanche transversale, qui supporte une lèvre postérieure fourchue.

Je vois au devant de cette lèvre un tubercule, qui tient lieu de labre et de mandibules; mais j'avoue que mon exemplaire est en si mauvais état, que je n'ai pu assez répéter cette observation.

Les antennes externes dépassent le chaperon et montrent leur article terminal, lorsqu'on voit l'animal par sa face dorsale; cependant elle ne m'a paru avoir que trois articulations, et l'antenne interne deux. Il y a une apparence de deux petits tubercules symétriques à la face supérieure de la tête, peu distincts d'ailleurs, qui pourraient passer pour les yeux.

Les femelles n'en présentent aucune trace.

EXPLICATION DES FIGURES DE LA PLANCHE 4 B.

Les figures 1–6 se rapportent au *Képone femelle*. — Les figures 7–11 concernent le *Képone mâle*.

Fig. 1. *Képone femelle*, vue par la face dorsale. — Les numéros 1 à 7 indiquent les segmens du thorax, et les numéros 8 à 13 ceux de l'abdomen. Les lettres *a*, *b*, *c*, *d*. montrent les pelottes épimériennes attachées aux quatre premières hanches. Les lettres *e*, *f*, *g*, *h*, *i*, *k*. indiquent les six branchies principales du côté gauche.

La figure 2 est le même animal, vu en dessous. — Les chiffres 1 à 7 sont les sept pattes du côté gauche. Les chiffres 8 à 12 montrent les cinq branchies accessoires du côté droit. — *a*. est l'antenne externe; *b*. l'antenne interne; *c*, *d*, *e*, *f*, *g*. sont les cinq lames d'incubation du côté droit.

La figure 3 est la tête de la même femelle, considérablement grossie et vue en dessous. — *a*, et *b*. sont les antennes; *f*, *f*. la patte-mâchoire; *g*, *g*. des digitations musculaires qui se rendent aux organes de la bouche.

Fig. 4. Une patte de la femelle avec sa pelotte épimérienne (*b*). Le pédicule (*a*) qui supporte cette pelotte et les cinq articles 1–5 de cette patte.

Fig. 5. Pelotte épimérienne d'une des quatre grandes paires de pattes de la femelle.

Fig. 6. Une feuille branchiale externe ou principale, grossie.

Fig. 7. Le mâle, vu en dessus.

Fig. 8. Le même vu en dessous. — La lettre *a* est l'antenne externe. Les treize chiffres indiquent, dans les figures 7 et 8, les sept premiers, les segmens du thorax, et, les six derniers, ceux de l'abdomen, avec les branchies correspondantes d'un côté. Les segmens cornés de l'enveloppe thoracique sont déchirés dans leur partie moyenne, et les deux moitiés sont écartées l'une de l'autre de manière à figurer des plaques abdominales, qui n'existent pas dans le mâle.

Fig. 9. La tête du mâle, vue en dessous. — *a*. *b*. Les antennes. — 1. La première paire de pattes.

Fig. 10. Une pelotte épimérienne du mâle, très grossie.

Fig. 11. Les deux derniers segmens 12 et 13 de l'abdomen du même. — 5, 6 sont les cinquième et sixième paires de branchies principales; *c*. la cinquième paire de branchies accessoires, qui est bifurquée, ainsi que l'avant-dernière.

RECHERCHES *sur le développement des Aplysies,*

Par M. VAN BENEDEN,

Correspondant de l'Académie de Bruxelles.

(Mémoire lu à l'Académie de Bruxelles, à la séance du 5 décembre 1840.)

Il y a deux ans, pendant mon séjour à Cette (Hérault), j'avais commencé l'étude du développement des *Sépioles* et des *Aplysies.* Dans l'intention de la continuer, je m'étais de nouveau rendu cette année dans ce port, mais je n'ai pu me procurer que des œufs d'Aplysies, et j'ai dû livrer à l'impression mon travail sur les Sépioles tel qu'il était alors.

Les œufs d'Aplysies (*Aplysia depilans*) se trouvent en abondance dans le bassin de cette ville, et on se les procure tout aussi facilement que les œufs de Limnées dans nos ruisseaux. L'eau du bassin est tellement claire, que l'on peut suivre de l'œil les mouvemens des différens animaux qui rampent sur le fond. J'ai pu observer du quai les accouplemens et la ponte des œufs des Aplysies. L'on ne trouve peut-être nulle part autant de facilité pour l'étude des animaux inférieurs.

J'ai cru devoir ajouter ceci, pour ne laisser aucun doute sur la nature des œufs que j'ai étudiés. La planche qui accompagne ce travail représente bien les œufs et les embryons de ces Mollusques, quoiqu'il y ait une si grande différence entre le jeune âge et l'âge adulte.

Dans ce développement, j'ai à signaler trois faits importans : 1° la multiplicité des vitellus dans un seul *albumen ;* 2° la division des vitellus en tubercules, et 3° la présence d'une coquille nautiliforme et d'un opercule. (1)

(1) Ce travail était terminé lorsque j'ai eu connaissance d'un mémoire de M. Sars sur *le développement des Mollusques et des Zoophytes,* dans les archives de Wiegmann, 2e partie, 1840. L'auteur a observé les *Tritonies,* les *Eolides,* les *Doris* et les *Aplysies,* et il s'est assuré que tous ces Mollusques ont les mêmes divisions dans leurs vitellus, et une coquille nautiliforme pourvue d'un opercule dans le jeune âge. J'aurais pu me dispenser de

I. On trouve au fond de l'eau, dans le bassin de Cette, des cordons blancs, arrondis, très allongés et irrégulièrement repliés sur eux-mêmes. Ces cordons, qui contiennent une infinité d'œufs dans leur intérieur, et qu'on ne saurait mieux comparer qu'à du vermicelle mouillé, appartiennent à la grande espèce d'Aplysie.

Ces cordons se composent d'un tube dans l'intérieur duquel les œufs sont groupés, et se trouvent à deux ou à trois dans la largeur du tube.

Les œufs sont arrondis, serrés les uns contre les autres, et pourvus d'une membrane extérieure assez forte; en dedans, au milieu d'un liquide blanc transparent, l'analogue de l'albumen, nagent des globules opaques, dont le nombre s'élève jusqu'à cinquante, et qui sont les véritables vitellus. Chacun de ces vitellus se développe pour son propre compte, et puise une partie de sa nourriture dans l'albumen qu'ils possèdent en commun.

II. Avant qu'il ne se forme de blastoderme, le vitellus, d'abord parfaitement arrondi, se divise, à l'aide d'échancrures qu'on aperçoit à la surface, et qui se multiplient à mesure que le développement avance, en un corps multilobé. On aperçoit d'abord une première échancrure, puis une seconde du côté opposé, et le vitellus présente l'aspect de deux tubercules adossés. Au milieu de chacun des tubercules, se montre ensuite une nouvelle échancrure, et il se compose alors de quatre tubercules qui, se divisant à leur tour, amènent à la fin un vitellus bosselé sur toute sa surface. A mesure que le nombre de ces tubercules augmente, leur volume diminue, et ils deviennent définitivement si nombreux et si petits, que le vitellus n'est pas beaucoup plus bosselé que dans le principe du développement. Il reprend sa première forme, mais son intérieur a subi de profondes modifications.

Cette division du vitellus, observée en premier lieu par Rus-

cette publication, mais à cause du grand intérêt qui s'attache à ces faits et de l'incertitude dans laquelle se trouveront encore des zoologistes sur la détermination, j'ai cru devoir livrer mes recherches à l'impression.

cconi dans les Batraciens, se répète, d'après des observations récentes, dans les poissons. M. Dumortier (1) l'a vue, je crois, le premier dans les Limnées, et il a signalé l'analogie entre elle et le vitellus des Batraciens. Nous l'avons observée dans les Limaces. M. Sars (2) l'a remarquée dans plusieurs Mollusques marins nus, et M. Pouchet (3) aussi dans les Limnées: Le docteur Dè Filippi (4), dans son mémoire sur l'anatomie et le développement des *Clepsine*, a observé le même phénomène dans ces animaux.

Mon collègue et ami, M. Schwann, a donné une théorie du développement (5). Les tissus animaux procèdent tous, d'après lui, de cellules, comme on l'a dit pour les végétaux. Ces cellules s'observent surtout dans le principe du développement. Le vitellus lui-même suit cette loi commune. Il n'est donc pas étonnant, si le vitellus se développe à l'aide de cellules, que l'on aperçoive à sa surface des divisions et des bosselures. Il est vrai que, dans le vitellus des oiseaux, on n'observe point à l'extérieur ces divisions; mais, d'après l'explication que vient de donner M. Reichert (6), on comprend la raison de cette différence. Le vitellus des oiseaux se compose, d'après les observations de M. Schwann, de deux sortes de cellules, les unes centrales et les autres périphériques; et d'après M. Reichert, ce seraient seulement les cellules centrales qui correspondraient aux cellules des autres classes. Ces cellules pourraient donc se bosseler dans l'intérieur, sans que l'on aperçût aucun changement en dehors.

(1) Dumortier, *Mémoires sur l'embryogénie des Mollusques gastéropodes* (Mémoires de l'Académie de Bruxelles, 1837).

(2) Sars, *Beiträge zur entwickelungs geschichte der Molusken und Zoophyten* (Archives de Wiegmann), l. c.

(3) Pouchet, *Sur le developpement de l'embryon des Limnées* (Annales des Sciences naturelles, tome x, 1838, page 63). Notes sur le structure du vitellus des Limnées (Annales françaises et étrangères d'anatomie, etc., 2e vol. 1828, page 253).

(4) *Lettera del dott. f. de Filippi sopra l'anatomia e lo sviluppo delle Clepsine*, Pavia 1839.

(5) *Mikroskopishe Untersuchungen*, etc. Berlin, 1839.

(6) Reichert, *Das Entwickelungsleben in Wirbelthier-Reich*, Berlin, 1840.

Les bosselures qu'on observe à la surface du vitellus seraient, d'après cette théorie, l'indice des cellules qui se forment dans l'intérieur, et le blastoderme ne commencerait à se développer qu'après ces premiers changemens intérieurs.

Ainsi, le vitellus serait composé d'abord d'une grande cellule, au milieu de laquelle s'en développeraient deux autres; et dans chacune de celles-ci, il s'en développerait de nouveau deux, de manière à obtenir la multiplication que l'on observe dans le nombre des bosselures. M. Dumortier a vu se développer ainsi le vitellus des Limnées, en le désignant sous le nom de *foie*.

En même temps que le vitellus se divise, il sort de l'intérieur une vésicule blanche, contenant un liquide transparent, et qui va se perdre dans l'albumen. Cette vésicule est quelquefois suivie d'une seconde qui suit la même marche. Cette vésicule, simple ou double, sort de la même manière du vitellus des Limaces, et, d'après MM. Dumortier et Pouchet, des Limnées. Comment faudrait-il la déterminer? Sa constance mérite une attention toute particulière.

III. Le vitellus n'a pas sitôt subi ces changemens, que le blastoderme commence à s'organiser. L'on voit se former d'un côté, à la surface du vitellus, un épaississement qui s'accroît insensiblement, et qui indique, par des échancrures, les différentes régions du corps.

Il se forme bientôt autour de toute la masse une pellicule mince et transparente. Cette pellicule ne tarde pas à prendre la forme de la coquille de l'Argonaute, et le jeune embryon peut se retirer en entier avec son vitellus dans l'intérieur.

Dans les Limaces, on voit aussi de très bonne heure la coquille, mais il y a ici une très grande différence dans la nature de la coquille et dans l'endroit de son apparition. Dans l'intérieur même du bouclier des Limaces, on voit se déposer un grain calcaire autour duquel viennent se grouper d'autres cristaux. Cette coquille intercepte la lumière lorsqu'on l'examine au microscope, et l'on reconnaît sa nature par le dégagement de bulles, lorsqu'on la traite par une goutte d'acide nitrique dilué. Dans les Aplysies, la coquille est extérieure depuis son appari-

tion; elle est toujours transparente et de nature cornée. Il n'y a point de bulles qui se dégagent comme dans le cas précédent, si on la traite par le même acide.

Les Aplysies sont donc très éloignées des Limaces, quoique, dans l'état adulte, ils possèdent les uns comme les autres une petite coquille interne.

Les contours de la coquille sont réguliers. Il n'y a pas plus d'un tour de spire, et, sauf les stries et les tubercules, elle ressemble parfaitement à la coquille d'Argonaute. Cependant, lorsqu'on regarde cette coquille de face, on remarque une légère différence entre le côté droit et le côté gauche, comme l'indique la figure 16 (Pl. 1).

Un opercule, de même nature que la coquille, bouche exactement le péristome, et l'embryon porte cet organe sur une portion semblable au pied. Il peut faire rentrer entièrement l'opercule pendant les fortes contractions. Le plus souvent la coquille est ouverte, et l'opercule est couché sur la portion enroulée de la coquille (fig. 17).

On observe un mouvement de rotation qui a lieu en sens inverse de celui de l'animal à l'état adulte; il tourne en arrière. Des cils vibratiles très allongés recouvrent la nuque de l'embryon, et c'est à eux qu'est dû le mouvement de rotation. Ces cils sont sans doute aussi les organes temporaires de la respiration, en attendant qu'il se forme de véritables branchies. Dans le fond de la coquille, la masse plus opaque et composée de globules arrondis, indique le vitellus. Vers la partie inférieure de l'opercule, on voit dans l'intérieur de l'embryon une double vésicule, arrondie, transparente, située à l'endroit où se trouvent les ganglions œsophagiens. Dans les Limaces, nous avons remarqué une apparition semblable à la même époque, et nous avons considéré ces vésicules comme le premier indice du système nerveux (fig. 13, 15 et 17, *d*).

Il n'est pas très facile de distinguer d'autres organes dans l'intérieur de la jeune Aplysie. Le temps nous a manqué pour étudier l'apparition des viscères et les variations que la coquille subit pour arriver à l'état adulte. Nous n'avons pas non plus des notions précises sur le lieu d'insertion du sac vitellin.

La présence d'une coquille et d'un opercule dans ces animaux, à l'état embryonnaire, nous fait supposer que bien des Mollusques subissent des changemens pareils. La zoologie doit tout attendre de l'embryogénie ; c'est par elle que l'on constatera les affinités, et que l'on effacera peut-être bien des genres qui ne reposent que sur des variétés d'âge.

Ne pourrait-on pas dire, d'après ces faits, que les Mollusques subissent des métamorphoses aussi bien que les insectes? L'embryon des *Limaces* aussi bien que celui des *Aplysies* diffère totalement de l'animal adulte. Ces métamorphoses ne sont pas moins grandes, nous paraît-il, que celles que subissent les Batraciens et les insectes.

EXPLICATION DES FIGURES DE LA PLANCHE I.

Fig. 1. OEufs d'Aplysie, de grandeur naturelle, dans leur tube.

Fig. 2. Un morceau de ces tubes avec les œufs grossis. *a*, *a*. Parois du tube. *b*. Les œufs. *c*, *c*. Albumen commun. *d*, *d*. Vitellus. Ces derniers sont très nombreux dans chaque œuf. *m*. Premier segment ou chaperon. *n*. Deuxième segment.

Fig. 3. Vitellus isolé avant qu'il ne soit en voie de développement.

Fig. 4 à 11. Le même vitellus, divisé en lobules, qui augmentent successivement en nombre. *a*, *a*, *a*, *a*. Vésicule blanche, qui sort de l'intérieur pendant le développement, et qui va se perdre dans l'albumen.

Fig. 12. L'embryon, pourvu d'une coquille. *a*. Vitellus. *b*. Pied. *c*. Cils vibratiles.

Fig. 13. Le même, un peu plus avancé. Les lettres placées sur les figures suivantes indiquent les mêmes objets. *d*. Ganglion nerveux.

Fig. 14. Le même encore, un peu plus avancé et rentré dans la coquille.

Fig. 15. Le même, plus développé encore, vu un peu obliquement. L'animal, avec son opercule *e*. est rentré dans la coquille.

Fig. 16. L'animal, vu de face, avec son opercule *e*. Les cils vibratiles *c*, *c*. sortent des deux côtés.

Fig. 17 et 18. Le même, vu du côté droit. L'animal avec son opercule *e* sorti de la coquille.

RECHERCHES *sur les modifications de proportion de quelques principes du sang (fibrine, globules, matériaux solides du sérum, et eau) dans les maladies,*

Par MM. ANDRAL et GAVARRET. (Extrait.)

CHAPITRE II. (1)

MALADIES DANS LESQUELLES LA FIBRINE RESTE EN QUANTITÉ NORMALE, OU DIMINUE, EN MÊME TEMPS QUE LES GLOBULES RESTENT AUSSI EN QUANTITÉ NORMALE OU AUGMENTENT.

L'augmentation de la fibrine, caractère constant de l'état phlegmasique, est-elle liée à la nature même de cet état, ou bien dépend-elle du seul fait de l'existence de la fièvre qui l'accompagne? On peut, sans doute, d'autant plus se poser cette question, que, dans l'état phlegmasique, la fibrine diminue dès que la fièvre cesse, comme, dans la tuberculisation pulmonaire, elle augmente dès que la fièvre s'allume d'une manière continue. Nous ne craignons pas cependant d'affirmer que c'est de l'état phlegmasique, et non de la fièvre qui l'accompagne, que dépendait l'augmentation de fibrine dans les cas que nous avons passés en revue; si, dans ces cas, nous avons vu souvent la fibrine croître avec la fièvre, c'est que la violence de celle-ci traduisait la plus grande intensité de l'état phlegmasique. Il est, en effet, une autre grande classe de maladies aiguës dans lesquelles le phénomène fondamental est une fièvre aussi intense et souvent plus durable que la fièvre des phlegmasies, et dans lesquelles cependant le sang va se présenter à nous sans augmentation de fibrine, et souvent au contraire avec une notable diminution de ce principe. Ces maladies aiguës sont les pyrexies

(1) La première partie de ce Mémoire a été insérée dans le tome XIV de ces Annales (1840), page 361.

ou fièvres proprement dites; et ici, l'analyse du sang vient merveilleusement rétablir et confirmer une distinction réelle de nature entre cet ordre de maladies et l'ordre des inflammations.

Ainsi donc, il faut qu'une phlegmasie entretienne la fièvre, coïncide avec elle, ou s'y ajoute, pour que la fibrine du sang vienne à augmenter.

Mais indépendamment de ces maladies générales, qu'on appelle des pyrexies, il en est d'autres que la fièvre n'accompagne plus, qui semblent être toutes locales, et dans lesquelles nous avons souvent rencontré une diminution de la fibrine, soit absolue, soit relative aux globules dont la quantité se trouvait augmentée : ce sont les congestions et les hémorrhagies cérébrales.

ARTICLE Ier. *Pyrexies.*

Nous rangerons en cinq groupes les faits dont nous avons à rendre compte à propos de l'état du sang dans les pyrexies.

Dans le premier groupe, nous comprendrons les faits relatifs à cet état morbide tout particulier, qui précède, dans beaucoup de pyrexies, l'invasion du mouvement fébrile, et qui en constitue ce qu'on appelle le prodrôme.

Dans un second groupe, nous placerons un certain nombre de faits relatifs à des pyrexies, qui, nées de causes variables et marchant avec des symptômes divers, n'ont pas de places déterminées dans les cadres nosologiques, et n'ont par reçu non plus de nom spécial. Il y a là un trouble général qui se traduit par un mouvement fébrile de durée et d'intensité variables, et dont l'état des solides ne saurait rendre raison. Là se trouve un certain nombre de ces fièvres dont Pirel désignait les unes sous le nom de fièvres inflammatoires, et les autres sous le nom de fièvres bilieuses. Nous donnerons simplement à ces pyrexies le nom de fièvres continues.

Un troisième groupe renfermera les cas de fièvres typhoïdes proprement dites.

Nous rapporterons à un quatrième groupe les cas de fièvre irruptives (variole, rougeole, scarlatine).

Dans un cinquième groupe enfin, trouveront place les fièvres intermittentes.

Dans aucun de ces cinq groupes, la fibrine ne présente d'augmentation de quantité, si ce n'est dans quelques cas qui forment une exception qui n'est qu'apparente, et dont on peut se rendre compte; souvent, au contraire, la fibrine diminue de quantité, soit d'une manière absolue, soit d'une manière relative. Les globules peuvent conserver leur état normal; dans un certain nombre de cas, ils augmentent suivant une proportion très remarquable, et ils ne diminuent jamais que par le fait de circonstances dont l'influence vient se sur-ajouter à celle de la maladie.

Il suffit de mettre en parallèle ces résultats généraux avec ceux que nous a donnés le sang dans les phlegmasies, pour saisir tout ce qu'ils ont de différent. Arrivons maintenant aux détails.

§ 1. *Du sang dans le prodrôme des fièvres continues.* — Nous avons examiné ce sang chez huit malades et dans neuf saignées.

Dans aucun de ces cas, nous n'avons trouvé la fibrine plus abondante que de coutume; dans trois d'entre eux, elle était un peu au-dessous des limites de sa quantité normale, et cependant encore au-dessus de 2; dans deux autres cas, elle était encore moins abondante, n'étant plus représentée que par 1,8 dans un cas et 1,6 dans l'autre. Les globules, au contraire, ne furent trouvés, dans aucun cas, au-dessous de leur chiffre physiologique, et plus souvent même ils le dépassèrent, de manière à donner les chiffres 136,4, 137,9, 142,7, 143,5, et jusqu'à 157,7. L'individu qui offrit ce dernier chiffre n'avait que 1,6 en fibrine; il entra à l'hôpital dans un état d'abattement musculaire des plus prononcés; après plusieurs jours de repos, ses forces se relevèrent, il se trouva mieux, et alors nous le fîmes saigner de nouveau. Un changement notable s'était opéré dans son sang: la fibrine avait augmenté, en restant toujours au-dessous de son chiffre normal, et marquant 2,1; les globules, si abondans, étaient descendus de 157,5 à 129,3; les matériaux solides du sérum étaient tombés de 96,5 à 88,9: ces matériaux, d'ailleurs, dans tous les cas, se maintinrent assez haut, entre 84 et 96; l'eau fut, par conséquent, toujours peu abondante, ne

dépassant jamais sa quantité moyenne, et s'abaissant au-dessous de celle-ci, par des intermédiaires, jusqu'à 744, l'un des chiffres les plus bas que nous ayons rencontré pour l'eau.

§ 2. *Du sang dans les fièvres continues non typhoïdes.* — Nous avons examiné ce sang chez onze malades et dans vingt-et-une saignées.

Cinq de ces fièvres continues se sont peu-à-peu terminées par le retour à la santé, sans qu'aucun organe soit devenu le siège d'altération appréciable; six autres, après une certaine durée, ont en quelque sorte abouti à une lésion phlegmasique, comme érysipèle, angine, bronchite, etc. Il est nécessaire que nous distinguions ces deux séries de cas, car ils peuvent entraîner dans le sang des modifications différentes : c'est ce que nous allons chercher à déterminer.

Les cinq malades appartenant à la première série ont subi dix saignées.

Un seul, parmi eux, donna en fibrine 5,6, c'est-à-dire la limite inférieure du sang des phlegmasies. C'était une jeune fille de dix-huit ans, qui, à une saignée antécédente, avait donné en fibrine 4,6. Aucun accident particulier ne nous expliqua cette notable quantité de fibrine, qui fut trouvée le septième et le neuvième jour de la fièvre; et comme, d'une part, dans aucun autre cas de fièvre continue simple, nous n'avons rencontré autant de fibrine; comme, d'autre part, ce chiffre de 5,6 nous a paru toujours coïncider avec un état phlegmasique, nous sommes très portés à penser qu'il y avait eu ici une affection de ce genre qui nous a échappé. (1)

Chez les quatre autres malades, la fibrine, une fois encore à 4,2, varia toutes les autres fois entre 3,3 et 2,2.

Les globules, dans ces cinq cas, présentèrent aux premières

(1) Préoccupés de la singularité de ce cas, et lorsque notre rédaction était terminée, nous avons été de nouveau consulter les notes que nous avions prises près du lit de la malade, et nous y avons vu que depuis long-temps elle souffrait d'une douleur habituelle vers l'hypochondre droit, douleur qui s'était beaucoup exaspérée depuis l'invasion de la fièvre. Nous laisserons cependant ce cas dans le lieu où nous l'avions d'abord placé; cet exemple d'une rectification de diagnostic, par la considération du chiffre de fibrine, fera mieux ressortir la valeur de ce chiffre.

saignées des différences très grandes, sur lesquelles nous devons donner quelques détails. D'abord, ils s'élevèrent une fois au chiffre énorme de 185,1 (le plus haut que nous ayons jamais rencontré). C'était chez un malade âgé de cinquante-huit ans, qui avait 3,3 en fibrine, et chez lequel aucun phénomène spécial ne traduisit cette grande quantité de globules. Il offrait cet ensemble de symptômes qui caractérisent la fièvre inflammatoire, telle qu'elle est décrite dans la Nosographie de Pirel; il garda la fièvre sept à huit jours au plus, et guérit sans aucun autre accident.

Chez trois autres malades, les globules donnèrent les chiffres 120,7, 117,4, 103,6, et ce fut dans ce dernier cas que la fibrine atteignit le chiffre de 4,6.

Enfin, chez le cinquième malade, il n'y avait dans le sang que 82,5 en globules; chiffre inférieur, qui fonderait une exception au fait général que nous avons tout-à-l'heure établi, si une circonstance spéciale ne venait pas l'expliquer : ici, en effet, le mouvement fébrile s'était développé chez une jeune fille qui avait un commencement de chlorose.

Dans les seconde et troisième saignées, les globules suivirent leur loi ordinaire, c'est-à-dire qu'ils allèrent toujours en descendant vers un chiffre de plus en plus bas. Chez la jeune fille chlorotique, ils s'abaissèrent jusqu'au chiffre 62,4; et cependant la fièvre persistait encore. Ils revinrent au chiffre normal 128 chez le malade qui en avait eu d'abord 185,1, et qui fut saigné de nouveau lorsqu'il n'avait plus de fièvre.

Les matériaux solides du sérum se maintinrent dans les limites de 90,9 à 81, excepté une fois où ils s'élevèrent à 98,7. L'eau varia de 851 (chez la chlorotique saignée pour la troisième fois) à 725 (chez la malade qui eut 185 en globules).

Analysons maintenant les cas où, après avoir persisté seul pendant un temps plus ou moins long, le mouvement fébrile se compliqua de la phlegmasie de quelque organe.

Sur six cas de ce genre, il y en eut trois dans lesquels l'intervention d'une amygdalite dans deux cas, et d'un érysipèle dans un autre, n'entraîna dans le sang aucune modification nouvelle : ce sang avait peu de fibrine, de 3,8 à 1,6, et beaucoup de glo-

bules (160, 148, 131). Mais il y eut trois autres cas dans lesquels l'apparition d'un état phlegmasique appela une augmentation de la fibrine, et, chose remarquable et confirmative de tout ce que nous avons dit précédemment, les globules revinrent dans ces trois cas à un chiffre beaucoup plus bas que dans les trois autres cas précédens (118, 114, 94, ce dernier chiffre étant celui d'une seconde saignée). Quant à la quantité de fibrine dans ces trois cas, elle fut de 5,4 chez un individu qui, après quelques jours de fièvre, fut pris d'une bronchite intense; elle fut de 5 chez un autre malade dont la fièvre se compliqua d'angine, et ce cas est d'autant plus digne d'attention, qu'à une première saignée, pratiquée avant l'invasion de l'angine, le sang n'avait fourni que 3,6 en fibrine. Enfin, une femme chez laquelle une méningite vint terminer une fièvre de quelques jours de durée, n'avait eu que 3,1 en fibrine avant l'invasion du délire; pendant que celui-ci existait, elle en eut 4; plus tard, les signes de phlegmasie encéphalique cessèrent ainsi que la fièvre : mais cette femme resta aliénée. Une troisième saignée fut pratiquée dans ce dernier état, et nous trouvâmes de nouveau la fibrine descendue au-dessous à 3,7.

Ces faits montrent assez de quelle manière, et dans quel sens un état phlegmasique, qui vient compliquer une simple fièvre, peut changer la condition du sang créée par celle-ci. Supposez la phlegmasie très légère, il pourra se faire que le sang n'en soit pas modifié; il en fut ainsi dans nos trois premiers cas. Supposez la phlegmasie plus intense, et sur-le-champ elle marquera sa présence par une augmentation de la quantité de fibrine : c'est ce qui arriva dans nos trois derniers cas.

Les matériaux solides du sérum varièrent, dans ces six cas, de 76,6 à 95,6, et l'eau de 758,9 à 824,3.

§ 3. *Du sang dans la fièvre typhoïde.* — Nous avons examiné ce sang chez vingt malades et dans cinquante saignées.

Nous n'appelons du nom de fièvre typhoïde que la fièvre continue qui reconnaît pour caractère anatomique l'inflammation exanthémateuse, puis ulcéreuse des follicules intestinaux. Les lésions dont le tube digestif est le siège dans cette maladie,

toutes spéciales qu'elles sont, appartiennent par leur forme aux lésions phlegmasiques ; par conséquent, on serait en droit de supposer que, dans une pyrexie de ce genre, le sang doit participer, jusqu'à un certain point, de ce qu'il y a d'inflammatoire, sinon dans l'essence de la maladie, au moins dans les altérations des solides qui l'accompagnent. Mais il n'en est nullement ainsi. Le sang de la fièvre typhoïde n'a aucune sorte de rapport, sous le point de vue de la proportion relative ou absolue de la fibrine, avec le sang des inflammations. Quelle que soit l'intensité de la phlegmasie intestinale, le sang n'en emprunte pas les caractères. Mais tandis que les ulcérations des voies digestives, dans la fièvre typhoïde, quels que soient leur nombre et leur étendue, ne sauraient donner au sang les qualités que l'inflammation lui imprime, le sang pourra revêtir exceptionnellement ces qualités, si, dans le cours d'une fièvre typhoïde, il survient une phlegmasie accidentelle, dont l'existence reste indépendante de celle de la fièvre au milieu de laquelle elle s'est jetée.

A l'exception de ce dernier cas, dont nous traiterons à part, la fibrine, dans une fièvre typhoïde bien caractérisée, ne s'élève jamais, d'une manière notable, au-dessus de son chiffre physiologique ; elle le conserve assez souvent, mais souvent aussi elle s'abaisse au-dessous de lui, offrant ainsi une manière d'être précisément inverse de celle qu'elle offre dans toute phlegmasie bien établie. En outre, tandis que, dans celle-ci, la fibrine augmente en raison directe de l'intensité de la maladie, c'est le contraire qui a lieu dans la fièvre typhoïde : plus cette fièvre acquiert de gravité, et plus la quantité de fibrine va en diminuant ; et cette diminution peut être telle, que c'est dans certaines formes graves de la fièvre typhoïde que s'est trouvé pour nous le minimum de fibrine, tandis que son maximum s'est rencontré dans la pneumonie. Il ne faudrait pas croire, d'ailleurs, que cette fibrine diminue ainsi, ou par la répétition des saignées, ou par la prolongation de la diète : car, dans la plupart des autres maladies, faites intervenir ces influences de diète et de pertes de sang, et vous ne verrez pas diminuer la fibrine, si ce n'est dans quelques cas très rares dont nous avons précédemment parlé, alors que l'organisme est profondément épuisé par des

hémorrhagies très abondantes et très répétées ; et encore, dans ces cas, la diminution de la fibrine est constamment précédée d'une très grande diminution des globules : or, c'est ce qui n'a pas lieu dans la fièvre typhoïde. Ajoutons enfin que, dès que cette fièvre reprend une tendance vers le mieux, et avant que l'économie ne se soit réparée par assez d'alimens, on voit sur-le-champ la fibrine remonter vers un chiffre plus élevé, pour continuer à augmenter dans la convalescence; et cette ascension de la fibrine a lieu à une époque où les globules continuent à descendre, vu l'épuisement où est encore le malade, et l'insuffisance de son alimentation.

Nous avons vu, en parlant de l'état du sang dans les phlegmasies, que, dès le début même de ces maladies, et avant que les saignées ou la diète n'eussent agi, les globules, loin de s'élever, avaient au contraire, dans beaucoup de cas du moins, une tendance marquée à diminuer. Dans la fièvre typhoïde, les globules offrent une tendance inverse. Plus, en effet, on examine le sang à une époque rapprochée du début de la maladie, plus on trouve de cas dans lesquels les globules, non-seulement n'ont pas diminué, mais ont au contraire augmenté d'une manière très notable. Nous ne disons pas qu'il en est toujours ainsi, nous disons qu'il en a été ainsi dans plus de cas que dans la plupart des autres maladies; et cela nous semble d'autant plus digne d'attention, que, déjà dans les cas relatifs au prodrôme des fièvres continues, nous avons constaté la même disposition des globules à devenir plus nombreux.

Si maintenant nous recherchons le chiffre des globules à une époque plus avancée de la fièvre, nous trouverons que, dans plusieurs cas, il se maintient encore assez élevé ; et si, malgré une diète déjà longue et des pertes de sang déjà subies, on trouve encore ce chiffre un peu au-dessus de la moyenne, ou à son niveau, on ne devra pas hésiter à en conclure que, dans les premiers temps de la maladie, le sang a dû contenir un grand excès de globules; sinon, il en offrirait moins à l'époque avancée où on l'examine.

L'augmentation du nombre des globules est donc un des traits saillans qui ressort de l'analyse du sang dans la fièvre ty-

phoïde. Mais cette augmentation n'est pas constante, comme l'est l'augmentation de fibrine dans les phlegmasies. Elle n'est donc pas une condition essentielle de l'existence de la maladie; et, ce qui le prouve encore, c'est que, même dans les cas où les globules sont très abondans au début, ils ne tardent pas à le devenir de moins en moins, à retomber vers leur chiffre normal, ou à s'abaisser au-dessous, et cependant la maladie continue et s'aggrave. Remarquons toutefois que, dans les cas mêmes où, absolument parlant, la quantité des globules n'est pas très considérable, elle peut l'être encore beaucoup relativement à la fibrine, qui a généralement diminué.

En résumé, une diminution de la fibrine d'autant plus marquée et d'autant plus considérable, que la fièvre typhoïde a elle-même plus de gravité, voilà le trait caractéristique de l'altération du sang dans cette maladie; d'où se déduit, comme autre trait, un excès de globules par rapport à la fibrine; mais dans les premiers temps, il n'y a en réalité (et cela même pas toujours) qu'excès de globules, et la fibrine n'est alors en moins que par rapport à eux. A une époque de gravité plus grande, il y a en réalité diminution de la fibrine, d'où il suit que le caractère fondamental de l'altération du sang dans la fièvre typhoïde, ne se développe ou ne devient manifeste que dans sa forme grave, et que, dans les cas légers, il peut arriver que le sang ne présente que des caractères purement négatifs.

Prouvons maintenant ces diverses assertions par l'indication de quelques chiffres.

Dans les divers cas de fièvre typhoïde, la fibrine a donné pour maximum 3,7, et pour minimum 0,962. Nous ne prenons pas pour maximum le chiffre 4,2, que présenta un malade à une quatrième saignée, parce qu'il était alors convalescent, et qu'il ne lui restait que de larges ulcères au sacrum.

Considérés dans le sang des premières saignées, les globules se sont fréquemment élevés au-dessus de 130, et dans tous les autres cas (sauf un seul, où ils ne donnèrent que 77), ils se sont maintenus entre 130 et 100. Mais l'individu qui, par exception, ne donna que 77 en globules, était une fille chlorotique, et ceux qui ne fournirent en globules que de 120 à 100

étaient des individus dont les uns étaient déjà depuis longtemps atteints de la fièvre typhoïde lorsqu'on les saigna pour la première fois, et dont les autres, antécédemment à la fièvre typhoïde, étaient en proie à des affections chroniques de diverse nature, ou enfin avaient subi de longues fatigues, soit physiques, soit morales.

Si actuellement nous suivons le décroissement des globules dans les saignées successivement faites à un même malade, nous serons frappés du nombre de cas dans lesquels les globules se soutiennent à un chiffre élevé dans le sang des secondes et même des troisièmes saignées.

Il nous reste à parler d'un autre cas de fièvre typhoïde, où, par une exception singulière, la fibrine, dans trois saignées, successivement pratiquées, fournit constamment le chiffre 5, et ne descendit qu'à 4 dans une quatrième saignée. Pourquoi cette exception? Pourquoi, dans une fièvre typhoïde, ce chiffre des phlegmasies? Nous n'hésitons pas à le dire, ou nous avions commis une erreur de diagnostic, et la fièvre typhoïde n'était pas réelle, ou quelque circonstance toute spéciale devait nous donner la raison d'une semblable anomalie. Or, cette circonstance existait : c'était une inflammation aiguë des bronches qui avait remplacé la congestion bronchique ordinaire de la fièvre typhoïde ; c'était un des élémens ordinaires de la maladie, qui avait pris une grande prédominance, et nous croyons devoir attribuer à cette circonstance l'élévation insolite du chiffre de la fibrine. Contrairement d'ailleurs à ce qui existe dans les simples phlegmasies, les globules étaient très abondans, puisqu'ils donnaient 139. Ainsi donc, dans ce cas, le sang participait à-la-fois des caractères du sang des inflammations et de celui des pyrexies.

§ 4. *Du sang dans les fièvres éruptives.* — Sous ce titre, nous allons donner les résultats d'analyses du sang dans deux cas de scarlatine, sept cas de rougeole, cinq cas de variole, et deux cas de varioloide.

Dans ces cas divers, les résultats que nous avons obtenus ont marché dans le même sens que ceux auxquels nous a conduits

l'examen dans les fièvres continues, dont il a été question dans les paragraphes précédens.

Dans aucun de ces seize cas de fièvres éruptives, la fibrine n'a augmenté de quantité d'une manière notable: son chiffre le plus élevé, et encore ne l'a-t-elle offert qu'une seule fois, a été 4,4. Jamais, par conséquent, dans ces maladies, le sang n'a présenté le caractère du sang des phlegmasies. Cela n'a pas eu lieu, même dans la variole. D'un autre côté, la fibrine n'est jamais descendue aussi bas que dans la fièvre typhoïde: son chiffre inférieur a été 1,1, et encore ne s'est-il montré qu'une seule fois. La fibrine s'est maintenue, dans tous les autres cas, entre les chiffres 3,5 et 2.

Les globules ont offert cette circonstance remarquable que, dans plusieurs cas, ils ont éprouvé, comme dans d'autres pyrexies, une grande augmentation; mais, chose singulière! cela n'a eu lieu que dans la scarlatine, dans la majorité des cas de *rougeole*, et jamais, au contraire, dans les cas de variole et de varioloïde.

Entrons maintenant dans quelques détails.

1° *Du sang dans la variole et dans la varioloïde.* Nous avons examiné ce sang chez sept malades et dans quatorze saignées.

Sur ces sept malades, cinq avaient la variole et deux la varioloïde.

Chez les cinq malades atteints de variole, l'éruption était confluente; chez l'un d'eux, beaucoup de pustules se remplirent de sang, au lieu de pus. L'un d'eux, entré à l'hôpital pour une simple sciatique, fut saigné avant que l'on pût soupçonner qu'il était dans la période d'incubation de la variole. Son sang alors n'offrit autre chose de remarquable qu'un chiffre assez bas pour les globules (114), la fibrine donnant 3. Au bout d'une douzaine de jours, apparut la fièvre d'invasion de la variole. Une seconde saignée fut pratiquée pendant sa durée, et deux autres le furent ensuite le troisième et le sixième jour de l'éruption. Dans ces trois saignées, la quantité de la fibrine resta à-peu-près ce qu'elle avait été dans la première; les globules allèrent toujours en décroissant, sans avoir paru être influencés par la maladie.

Dans les quatre autres cas de varioles, nous trouvons à noter ce qui suit:

Une première saignée, faite encore pendant la fièvre d'invasion, donne 4,4 en fibrine, et deux autres saignées, faites chez le même sujet, l'une au commencement de l'éruption, et l'autre à l'époque de la suppuration des pustules, ne donnant plus autant de fibrine, 2,9 et 3,2 au lieu de 4,4. Dans ces trois saignées, les globules ne semblent pas être plus influencés par la maladie que dans le cas précédent., et ils donnent successivement 120, 110, 94.

Deux autres individus sont saignés, chacun deux fois, au fort de l'éruption. Les globules sont, dans ces quatre saignées, à l'état normal, variant de 127 à 124. Dans toutes quatre, la fibrine augmente sensiblement d'une saignée à l'autre, différente d'ailleurs, quant à sa quantité dans les deux cas. Dans l'un, en effet, elle s'élève de 1,1 à 2; dans l'autre, de 2,6 à 3,5.

Enfin, chez un cinquième malade, celui qui eut la variole hémorrhagique, et qui fut saigné vers le cinquième jour de l'éruption, nous trouvâmes 2,9 en fibrine et seulement 98,8 en globules. Ce chiffre assez bas des globules fut-il le résultat des hémorrhagies dont les innombrables pustules qui recouvraient la peau étaient devenues le siége?

Ainsi, dans ces cinq cas de varioles très confluentes, les globules n'offrent rien de particulier sous le rapport de leur nombre, excepté dans le dernier cas où ils sont diminués, et ce cas est tout spécial. Quant à la fibrine, elle est remarquable par la grande inégalité de son chiffre; plusieurs fois nous la voyons, comme dans les phlegmasies, augmenter après une première saignée; mais cette augmentation est faible, et la fibrine n'atteint pas le chiffre qui appartient à l'inflammation. Toutefois on peut se demander si, toute minime que fût cette élévation de fibrine, elle ne commençait pas à réfléchir dans le sang le travail phlegmasique dont la peau était le siége. Remarquons, en effet, que dans les autres pyrexies, nous n'avons pas vu ainsi la fibrine croître d'une saignée à une autre; c'est là un des caractères du sang des phlegmasies aiguës, et si ce caractère ne marque pas davantage, cela dépend sans doute de ce que la phlegmasie cu-

tanée n'est elle-même ici qu'un des élémens d'une maladie plus générale, dont le sang reçoit ses modifications. C'est ainsi que, dans la fièvre typhoïde, l'inflammation des follicules intestinaux ne semble non plus exercer d'influence sur la fibrine, qui diminue malgré son existence.

2° *Du sang dans la rougeole.* Nous avons examiné ce sang chez sept malades et dans neuf saignées.

Ce sang a été remarquable par les circonstances suivantes :

La fibrine s'est maintenue constamment dans les limites de la quantité normale ou un peu au dessous, variant entre 2,6 et 3,6.

Les globules ont présenté dans quatre cas sur sept une augmentation notable, représentée par les chiffres 146,9, 140,6, et deux fois 137.

Dans un cinquième cas, les globules offrirent à-peu-près leur quantité moyenne, 123,9

Enfin, dans le sixième et le septième cas, les globules donnèrent un chiffre plus bas, 118, 116. L'individu qui présenta ce dernier chiffre venait de subir un traitement pour des bubons vénériens.

Les malades qui donnèrent 146, 140 en globules; et l'un des deux, qui en donna 137, furent saignés le deuxième jour de l'éruption. L'autre malade qui donna aussi 137, et celui qui en présenta 124, furent saignés le troisième jour. Le malade qui n'eut que 116 ne fut saigné qu'à la fin du quatrième jour.

Ainsi donc nous trouvons que le chiffre des globules est d'autant moins considérable que nous les observons à une époque plus éloignée du début de l'affection.

L'individu qui n'eut que 118 en globules semble, à la vérité, faire une exception à ce principe; car il fut saigné vers le deuxième jour de l'éruption; mais il existait ici des circonstances toute particulières. C'était, en effet, une jeune femme, qui, par suite d'une menstruation trop abondante, offrait un commencement très marqué d'anémie, de sorte que, pour elle et pour son aspect extérieur, le chiffre 118 en globules était plutôt trop considérable. Il faut ajouter que très peu de temps avant l'invasion de sa rougeole, cette femme avait subi presque coup sur coup deux

saignées qu'on avait opposées, avant son entrée à l'hôpital, à quelques signes de phlogose utérine. A la suite de sa rougeole, cette malade continua à tousser, et finit par présenter des signes évidens d'un commencement de tuberculisation pulmonaire. Nous la fîmes alors saigner de nouveau, et, bien qu'elle prît habituellement assez d'alimens, nous ne trouvâmes plus dans son sang que 92,5 de globules. La fibrine, au contraire, était montée de 2,4 à 3,1. Ce fait confirme ceux que nous avons cités, en traitant de l'état du sang dans les tubercules pulmonaires. (Augmentation de la fibrine et décroissement des globules.)

3° *Du sang dans la scarlatine.* Nous avons examiné ce sang chez deux malades et dans deux saignées.

Dans ces deux cas de scarlatine, nous avons vu se reproduire le même fait, constaté par nous dans d'autres pyrexies, savoir: le maintien de la fibrine à sa quantité normale et en même temps un chiffre élevé des globules. Dans ces deux cas, la saignée fut faite vers le deuxième jour de l'éruption. Dans l'un, la fièvre d'invasion fut marquée par des vestiges très forts et un léger embarras de la parole. Dans l'autre cas, celui où il y eut 146 en globules, d'abondantes épistaxis eurent lieu pendant presque toute la durée de la maladie.

L'individu auquel le premier cas est relatif fut saigné de nouveau pendant sa convalescence, lorsqu'il avait déjà repris des alimens, et que sa peau était devenue le siège d'une éruption furonculaire avec fièvre. A cette seconde saignée, nous trouvâmes dans le sang plus de fibrine et moins de globules.

Cette nouvelle composition du sang était en rapport avec la légère affection phlegmasique qui existait à la peau.

§ 5. *Du sang dans les fièvres intermittentes.* — Nous avons examiné ce sang chez six malades et dans sept saignées.

Dans cette sorte de pyrexies, où, pendant les intervalles qui séparent les retours de la fièvre, tout rentre dans l'ordre, la théorie pouvait faire prévoir que le sang ne devait pas présenter d'importantes modifications dans la proportion de ses principes constituans, et c'est là effectivement ce que sont venues confir-

mer nos recherches. Ici donc nous n'avons obtenu que des résultats négatifs.

Dans six cas de fièvres intermittentes, dont quatre tierces et deux quotidiennes, nous avons vu la fibrine se maintenir constamment dans les limites de sa quantité normale, variant seulement de 3 à 3,8. Les globules donnèrent une fois le chiffre très bas de 68.8; mais c'était chez une chlorotique. Dans un autre cas, ils offrirent juste leur quantité moyenne (127,9). Dans les cinq autres cas, ils descendirent assez sensiblement au dessous de cette moyenne, variant entre 110 et 102. Mais il y a à remarquer que, chez le malade qui eut 127,9 en globules, la saignée fut faite dès le début de la fièvre, au deuxième accès, tandis que, chez les autres, un plus grand nombre d'accès avaient eu lieu, et que quelques-uns de ces malades, fatigués et incomplètement nourris, présentaient déjà d'une manière plus ou moins tranchée cette teinte pâle spéciale qui appartient aux anciennes fièvres intermittentes.

Parmi ces malades, les uns furent saignés dans l'apyrexie, d'autres pendant l'accès, soit pendant le stade de frisson, soit pendant le stade de chaleur, soit pendant celui de sueur. Il n'en est résulté dans le sang aucune différence appréciable.

REMARQUES GÉNÉRALES SUR L'ARTICLE PRÉCÉDENT.

Nous venons d'analyser le sang dans les formes les plus ordinaires des pyrexies, et toujours, dans ces maladies, nous avons vu le sang complètement différer du sang de ces autres maladies aiguës appelées des phlegmasies. Dans celles de ces pyrexies où le sang nous a présenté quelques modifications, celle-ci a toujours consisté dans un changement de proportion de la fibrine par rapport aux globules, de telle sorte qu'il y eût diminution du premier principe par rapport au second. Or, les expériences entreprises par M. Magendie sur les animaux ont démontré qu'un des effets de cette diminution de la fibrine par rapport aux globules, était la production facile de congestions et d'hémorrhagies au sein des parenchymes ou à la surface des membranes; mais ces congestions et ces hémorrhagies sont au

nombre des phénomènes qui se reproduisent le plus souvent dans un grand nombre de pyrexies, et nos analyses donnent de ce fait une explication analogue à celle que M. Magendie avait déduite de ses expériences. D'après ces vues, il semble qu'on devrait retrouver la fibrine réduite à son chiffre le plus bas possible dans le pourpre hémorrhagique, sorte de pyrexie qui se caractérise surtout par l'abondance et la multiplicité de lieux des hémorrhagies. Nous regrettons vivement de n'avoir pu encore analyser le sang dans cette maladie, non plus que dans le scorbut. Toutefois, dans quelques cas de fièvre pourprée hémorrhagique que nous avons eu occasion d'observer, nous avons été frappés de l'extrême liquidité du sang, qui, après la mort, s'écoulait comme de l'eau des vaisseaux et du cœur. Or, le propre de la diminution de la fibrine est d'enlever au sang sa cohésion, et de lui donner par conséquent une liquidité insolite.

Mais si, dans les pyrexies, la facilité des congestions et des hémorrhagies est en rapport avec le mode d'altération que le sang éprouve dans un certain nombre de ces maladies, ne peut-on pas supposer que le même vice de composition du sang se retrouvera aussi, dans certains cas du moins, soit de simples hypérémies, soit d'hémorrhagies qui ne sont plus liées à un mouvement fébrile, et dont en général on ne cherche guère la raison que dans les conditions du solide au sein duquel elles s'accomplissent. Nous allons citer quelques faits relatifs à ce sujet, en regrettant qu'ils ne soient pas plus multipliés, et avec l'intention de rechercher leurs analogues. Nous nous garderons, par conséquent, d'en tirer aucune conclusion générale.

Article II. *Du sang dans la congestion cérébrale et dans l'hémorrhagie cérébrale.*

§ 1. *Congestion cérébrale.* — On a désigné par cette expression un état morbide dont la nature intime nous est peu connue, et qui, dans sa forme la plus ordinaire, celle qui se traduit par de la céphalalgie, des vertiges, une disposition aux épistaxis, a plus d'un trait de ressemblance avec le prodrome

de la fièvre typhoïde, et il est remarquable que cette même ressemblance se retrouve aussi dans le sang.

En effet, dans quinze cas de ce genre, la fibrine, souvent en quantité normale, ne l'a jamais notablement dépassée, tandis que, dans plus d'un cas, elle a considérablement diminué. Son maximum a été 3,7, et son minimum 1,6. Ce minimum existait chez un fort de la Halle, d'une constitution d'apparence athlétique, et qui était sous l'influence habituelle d'excès alcooliques. Un des cas de ce genre, au contraire, où la fibrine atteignit un de ses chiffres les plus élevés relativement (3,5), nous fut offert par une femme d'une constitution des plus frêles et des plus délicates.

Quant aux rapports entre l'intensité des symptômes et le chiffre de la fibrine, il est digne de remarque que celui, parmi nos cas, où les symptômes de congestion cérébrale eurent le plus d'intensité, fut précisément celui où la fibrine eut son chiffre le plus bas.

Les globules ne marchant pas toujours dans le même sens, se maintinrent chez les uns dans les limites de leur état normal; chez les autres s'abaissèrent au-dessous; chez d'autres enfin ils s'élevèrent au-dessus. L'homme aux formes athlétiques, dont le sang contenait si peu de fibrine, avait au contraire beaucoup de globules, 132,9; et, parmi deux autres individus qui n'eurent en globules que 88, l'un était la femme à constitution débile, qui avait dans son sang une quantité à-peu-près normale de fibrine, et l'autre était un homme sous l'influence de la cachexie saturnine.

Quant aux matériaux solides du sérum, ils ne s'abaissèrent, dans aucun cas, au-dessous de leur quantité moyenne, et présentèrent 104 pour maximum.

L'eau varia du chiffre minimum 740 au chiffre maximum 820.

Parmi ceux de ces quinze malades qui furent saignés une seconde et une troisième fois, la fibrine ne se modifia pas sensiblement; les globules suivirent leur loi ordinaire de décroissement.

§ 2. *Hémorrhagie cérébrale.* — A la suite des congestions cé-

rébrales (expression que nous n'acceptons que provisoirement), nous sommes amenés à exposer ce que le sang nous a offert de particulier chez sept individus atteints d'hémorrhagie cérébrale, et qui ont été saignés huit fois.

Les résultats que nous avons obtenus dans certains de ces cas ont quelque chose d'inattendu et comme de singulier, au point de vue surtout des doctrines médicales les plus généralement répandus, et cependant ces résultats marchent d'accord avec ceux que nous avons obtenus dans plusieurs cas de congestion cérébrale; ils se fortifient en quelque sorte les uns par les autres. En effet, la modification que nous avons vue se reproduire le plus souvent dans le sang de nos sept apoplectiques, a été une diminution de la fibrine et une augmentation des globules, comme vont le montrer les détails suivans.

Le premier malade de ce genre, dont nous examinâmes le sang, était une femme âgée de cinquante-neuf ans, qui, deux jours auparavant, avait été frappée d'une forte attaque d'apoplexie. Nous trouvâmes la fibrine descendue à 1,9; mais en même temps les globules avaient atteint un chiffre auquel nous les avons vus s'élever bien rarement (175,5). Les matériaux solides du sérum avaient conservé leur chiffre normal, 80,3; l'eau, très diminuée, ne donnait plus que 742,3. Nous fûmes singulièrement frappés de cette grande quantité de globules. Cependant trois jours s'écoulèrent, pendant lesquels l'intelligence abolie avait recouvré une partie de sa netteté; nous fîmes alors pratiquer une seconde saignée, et nous trouvâmes le sang avec des qualités bien différentes que la première fois: la fibrine, diminuée d'abord, avait augmenté (3,5); les globules, au contraire, avaient diminué, bien que se maintenant encore en excès (137,7).

Ainsi, dans le sang de ce malade, au moment où il fut saigné pour la première fois, il y avait infiniment peu de fibrine par rapport aux globules (1,9 en fibrine, 175,5 en globules). Et ce n'était point d'ailleurs le fait même de la perte de sang qui avait pu produire un tel changement dans la proportion relative de la fibrine et des globules; car, outre que l'hémorrhagie n'avait pu être assez abondante pour entraîner dans le sang un grand

changement de ce genre, les faits consignés dans ce Mémoire nous ont appris que toute perte de sang a pour effet nécessaire de diminuer la quantité des globules, tandis qu'elle n'entraîne pas d'une manière aussi constante et aussi facile la diminution de la fibrine. Nous sommes donc amenés à demander si, dans ce cas, le changement de proportion survenu dans la fibrine et les globules, loin d'être un effet de la maladie, ne put pas, au contraire, contribuer à lui donner naissance; et cela, en raison de la facilité avec laquelle le sang, privé de sa quantité normale de fibrine, tend à perdre toute cohésion et à sortir de ses vaisseaux.

Poursuivons cependant l'examen du sang dans nos six autres cas d'hémorrhagie cérébrale; les résultats de cet examen, dans la majorité des cas, ne s'éloigneront pas de celui sur lequel nous venons d'appeler l'attention.

Dans un second cas, en effet, où la saignée fut pratiquée le jour même d'une attaque d'apoplexie moins forte que la précédente, la fibrine présenta encore un chiffre assez bas, 2,2; les globules restèrent toujours plus élevés que leur moyenne normale, ils marquèrent près de 135,9.

Dans un troisième cas où la saignée fut faite trois jours seulement après une attaque encore moins forte, la fibrine continua à se montrer assez peu abondante (2,6); les globules, offrant toujours la même loi d'augmentation, se maintinrent élevés au chiffre de 140,6.

Dans le quatrième et le cinquième cas, les malades ne furent saignés qu'à une époque beaucoup plus éloignée de celle de l'attaque (au bout de huit jours dans un cas, et de quinze jours dans l'autre). Dans ces deux cas, la fibrine resta encore à un chiffre au-dessous de sa quantité normale (2,0; 2,1); mais pour la première fois, nous voyons les globules descendre au-dessous de leur moyenne (122,4, 120,8).

Ainsi donc, dans ces cinq cas, la fibrine, d'abord très basse, s'est élevée peu-à-peu, mais jamais assez pour que, dans aucun cas, elle atteignît même le chiffre 3, qui représente sa quantité moyenne.

Un sixième cas va maintenant se présenter, où la fibrine s'é-

lève jusqu'à ce chiffre 3,2, et où les globules, au contraire, s'abaissent comme dans les deux cas précédens : ils sont à 123,4. Mais ce cas offre une circonstance nouvelle : le malade, arrivé au cinquième jour de son attaque, lorsque nous lui tirâmes du sang, avait déjà subi une autre saignée et une forte application de sangsues ; il était donc précisément dans la même position que le malade chez lequel le sang de la seconde saignée donna aussi 3,5 en fibrine, le sang de la première saignée n'ayant donné que 1,9 en fibrine. Le chiffre assez bas des globules s'explique, et par les pertes de sang déjà éprouvées, et par la diète imposée au malade ; et si, malgré l'influence incontestable et nécessaire de ces circonstances sur la diminution des globules, leur nombre, dans le sang d'une seconde saignée, était encore de 123,4, nous croyons pouvoir en conclure qu'au moment de l'attaque d'apoplexie, les globules devaient avoir dépassé leurs limites physiologiques ; sinon nous les eussions trouvés, dans la seconde saignée, à un chiffre moins élevé que 123.

Le fait général qui domine ces six cas d'hémorrhagie cérébrale, c'est donc la coïncidence de cette hémorrhagie avec une tendance, plus ou moins prononcée suivant les cas, à une diminution de fibrine et à une augmentation de globules. Toutefois, dans notre sixième cas, ce n'est plus déjà que par induction que nous avons pu admettre cette sorte de modification du sang ; et en voici maintenant un septième, dans lequel, dès la première saignée, le sang se montre avec une composition à-peu-près normale. Dans ce cas, la fibrine, loin d'être diminuée, a même un peu dépassé sa quantité moyenne : elle donne près de 3,9 ; les globules sont à 126,5 ; et cependant l'attaque d'apoplexie avait été violente, et la saignée avait été pratiquée dès le deuxième jour. Voilà un fait négatif qui a sans doute sa valeur, mais il ne saurait détruire celle de plusieurs des faits précédens ; et ici, comme dans la simple congestion cérébrale, comme dans bien d'autres états morbides, nous pensons que des maladies, semblables quant à leur forme, peuvent être le produit d'altérations très diverses, dont il appartient à l'anatomie et à la chimie pathologiques de révéler le nombre et la nature. Qui sait, par exemple, si, dans notre septième cas, l'élévation exception-

nelle du chiffre de la fibrine (élévation bien faible toutefois) ne coïncide pas avec un léger commencement de travail inflammatoire autour du sang épanché?

CHAPITRE III.

MALADIES DANS LESQUELLES LES GLOBULES DU SANG SONT SPONTANÉMENT DIMINUÉS.

Dans les faits divers que nous avons jusqu'à présent analysés, nous avons vu les globules du sang diminuer d'une manière constante sous l'influence des pertes de sang et de la soustraction des alimens; nous les avons vus diminuer également pendant le cours de certaines maladies qui s'opposaient à la libre et complète réparation du sang, comme le cancer d'estomac et les tubercules pulmonaires.

Il y a en outre certains états cachectiques qui ont aussi pour effet d'abaisser le chiffre des globules. Ainsi, nous avons vu ce chiffre descendre à 68,8 chez un individu qui, à la suite d'accès répétés de fièvre intermittente, était tombé dans cet état spécial d'étiolement qui en est si souvent l'effet. Ainsi, chez un malade atteint d'un diabètes sucré qui l'avait profondément épuisé, nous avons trouvé aussi les globules du sang diminués. Chez un autre, devenu hydropique par suite d'une dilatation anévrysmale du cœur, le chiffre des globules nous frappa également par son peu d'élévation, ne marquant que 68.

Nous recevons souvent dans nos hôpitaux des ouvriers qui, soumis depuis long-temps à l'influence des préparations de plomb, sont tombés dans un dépérissement tout particulier (*Cachexie saturnine*). Chez tous les malades de ce genre dont nous avons examiné le sang, nous avons trouvé, comme altération constante, un abaissement des globules au-dessous de leur chiffre normal. Dans un cas où cette cachexie constituait la seule maladie, il n'y avait que 83,8 de globules, et cependant l'individu se nourrissait bien. Dans les chapitres précédens, on retrouvera épars d'autres cas, dans lesquels la cachexie saturnine existait chez des individus atteints de maladies de nature

variée; et chez eux, quelle que fût leur maladie, elle marquait son existence par l'abaissement du chiffre des globules. Mais indépendamment de ces cas divers, il en est d'autres dans lesquels, d'une manière toute spontanée, le sang vient à perdre une grande partie de ses globules, en même temps que son eau augmente, et que d'ailleurs, la fibrine et les matériaux solides du sérum ne s'altèrent pas dans leur quantité d'une manière sensible. C'est cette espèce de modification du sang qui constitue essentiellement l'anémie; le seul fait de la diminution de la fibrine ne lui donne pas naissance.

La chlorose peut être considérée comme le type de l'anémie spontanément développée; elle reproduit dans le sang les mêmes altérations de composition que celles qu'y déterminent accidentellement les grandes hémorrhagies. On va en juger par les détails suivans.

Mais d'abord, nous avons besoin d'établir l'existence de deux degrés dans la chlorose. Dans un premier degré, la maladie est encore mal caractérisée: loin d'être décolorées, les jeunes filles ont une teinte rosée qui pourrait en imposer pour un état pléthorique. Mais c'est là une fausse phlétore : les malades sont déjà faibles et sans résistance : si on les saigne, les accidens qu'elles éprouvent augmentent d'intensité; leurs vertiges, leurs palpitations s'en accroissent; et si enfin on examine leur sang, on y constate déjà une notable diminution des globules, mais qui est loin toutefois d'être celle qui aura lieu par la suite.

Cinq cas de ce genre ont été étudiés par nous. Dans ces cinq cas, les globules fournis par le sang d'une première saignée ont varié entre 113,7 et 99,7. C'est là une faible diminution de globules, qui révèle plutôt une simple tendance à la chlorose qu'elle ne caractérise une chlorose bien établie.

Quant à la fibrine, elle s'est maintenue, dans quatre de ces cas, dans sa quantité normale, variant de 2,4 à 3,6. Dans un cinquième cas, la fibrine, loin de diminuer, s'éleva au contraire jusqu'au chiffre 5,3; mais nous pûmes nous en rendre compte, car, dans ce cas, la chlorose était accompagnée d'une bronchite aiguë d'une assez grande intensité. Dès-lors, rien de plus simple que cette élévation du chiffre de la fibrine, rien

de plus conforme aux lois que nous avons précédemment posées. A ce faible degré, la chlorose n'empêche donc point l'accomplissement de ces lois; elle ne s'y opposera pas non plus, alors qu'elle sera beaucoup plus avancée, comme nous allons le voir tout-à-l'heure.

Nous n'avons rien à dire; dans ces cinq cas, des matériaux solides du sérum, qui varièrent de 76 à 91, non plus que de l'eau, qui monta le plus souvent au-dessus de sa quantité normale.

Arrivons maintenant à d'autres cas dans lesquels, par les symptômes, la chlorose, plus avancée, ne peut plus être méconnue. Si alors on se livre à l'examen du sang, on y constate une diminution de globules qu'on ne trouve à ce point dans aucune autre maladie, excepté dans celles où, soit par d'énormes hémorrhagies, soit par l'abolition de la digestion, l'organisme s'est trouvé profondément épuisé.

Dans neuf cas de ces chloroses confirmées, nous avons examiné le sang,

1° Avant qu'aucun traitement n'ait été commencé;

2° Après que des moyens thérapeutiques, propres à le modifier, eurent été mis en usage; des saignées d'une part, des préparations ferrugineuses d'autre part.

Lorsque nous avons examiné le sang, avant l'institution de tout traitement, nous avons obtenu les résultats suivans :

Les globules ne se sont élevés que trois fois au-dessus de 60, représentés par les chiffres 77, 70, 62; ils se sont maintenus deux fois entre 60 et 50 (56,9, 54,6); ils sont descendus trois fois entre 50 et 40 (49,7, 49,6, 46,6); une fois enfin, ils se sont abaissés jusqu'au chiffre 38,7, chiffre le plus bas que nous ayons rencontré, si ce n'est dans un cas d'hémorrhagie utérine précédemment cité, où nous n'avons trouvé en globules que 21,4.

Dans ces neuf cas, qu'est devenue la fibrine? Elle n'a pas subi l'influence de la maladie; elle n'est pas descendue avec les globules; elle s'est maintenue dans les limites de sa quantité normale, variant de 2,6 à 3,6; elle s'y est maintenue, excepté dans deux cas où, loin de s'abaisser, elle s'est notablement élevée, atteignant les chiffres 5,3 et même 7,4. Pourquoi cette excep-

tion, qui paraît d'abord si singulière? C'est que, dans ces deux cas, la chlorose n'existait plus comme unique maladie; c'est que, dans un cas, elle marchait avec une phthisie pulmonaire, arrivée déjà au troisième degré; c'est que, dans le second cas, la chlorose s'était momentanément compliquée d'un rhumatisme articulaire aigu. Ainsi, non-seulement la fibrine se soustrait aux altérations que le sang éprouve par le fait de la chlorose, mais encore, si une autre maladie vient coïncider avec celle-ci, la fibrine en reçoit sa modification accoutumée, tout aussi bien que si la chlorose n'existait pas.

Dans ces neuf cas de chlorose, les matériaux solides du sérum ont varié entre 94 et 75; l'eau, toujours fort abondante, a présenté pour minimum 810, et pour maximum 868.

Examinons maintenant l'influence des traitemens.

Une de ces chlorotiques fut saignée une seconde fois; ses globules s'abaissèrent de 62,8 à 49.

Deux autres ne furent saignées de nouveau qu'un certain temps après que nous eûmes commencé à leur administrer du fer. Chez l'une d'elles, nous trouvâmes les globules remontés de 49,7 à 64,3; chez l'autre, qui avait continué plus long-temps l'emploi des préparations ferrugineuses, les globules qui n'avaient donné que 46,6 à la première saignée, avaient atteint le chiffre 95,7 après l'administration du fer.

Dans ces deux cas, d'ailleurs, la fibrine ne fut pas plus notablement modifiée par l'action du fer que par celle de la maladie.

A la suite de ces cas, qui tous appartiennent à des femmes, nous citerons, sous forme d'appendice, le cas d'un homme encore jeune, qui, sans aucune cause connue, était tombé d'une manière toute spontanée dans un état d'anémie tel, qu'il nous présentait tous les symptômes d'une chlorose de médiocre intensité. Son sang, examiné une première fois, ne contenait que 87,9 en globules, la fibrine ayant conservé, comme dans tous les cas de ce genre, son chiffre normal. Peu de temps après, il fut de nouveau saigné; nous ne trouvâmes plus que 77,2 de globules. Il fut alors soumis à l'emploi des préparations ferrugineuses, et, après qu'il en eut pris une assez grande quantité, nous voulûmes une troisième fois examiner son sang : les globules étaient

remontés au même chiffre qu'à l'époque du premier examen (86,9). Cet homme, par son aspect, semblait n'avoir que médiocrement gagné par l'emploi du fer, qu'il avait pris d'ailleurs avec assez d'irrégularité.

Ainsi l'altération fondamentale du sang dans la chlorose, c'est la diminution des globules, résultat déjà avancé par M. Le Canu. Mais ce que l'on avait cru généralement jusqu'à ce jour, c'est qu'il y avait en même temps dans le sang diminution de fibrine: or, nos recherches démontrent qu'il n'en est nullement ainsi: le sang des chlorotiques contient tout autant de fibrine que le sang de l'individu le mieux portant. Ainsi ce sang présente, en général, un caillot de consistance au moins ordinaire; il n'est pas même rare de trouver une couenne à la surface de ce caillot, ce qui dépend de la prédominance de la fibrine par rapport aux globules. Enfin, d'après les vues que nous avons exposées plus haut, cette conservation de la quantité normale de fibrine dans le sang des chlorotiques coïncide parfaitement bien avec la grande rareté des hémorrhagies chez elles; et dans les cas très peu communs où ces hémorrhagies ont lieu dans le cours d'une chlorose, il faut en chercher la cause ailleurs que dans l'état du sang. On comprend enfin qu'une chlorotique peut contracter, tout aussi bien qu'un autre individu, une phlegmasie aiguë, puisque, chez elle, l'élément du sang qui se modifie en plus dans l'état d'inflammation aiguë, non-seulement n'a pas diminué, mais est devenu prédominant relativement aux globules.

CHAPITRE IV.

MALADIES DANS LESQUELLES L'ALBUMINE DU SÉRUM EST DIMINUÉE.

Dans les chapitres précédens, nous n'avons accordé qu'une attention secondaire aux matériaux solides du sérum, et en particulier à son albumine, parce que effectivement, dans tous les cas que nous avons passés en revue, ces principes ne nous ont présenté aucune modification capitale.

Mais il est une maladie dont les reins sont le siège, et qui a pour effet de modifier de telle façon la sécrétion de ces organes,

que l'urine s'en échappe mêlée à une certaine quantité d'albumine. (*Maladie de Bright, Néphrite albumineuse, Albuminurie.*)

Nous avons examiné le sang dans cette maladie, et nous avons trouvé que la partie organique des matériaux solides du sérum, partie essentiellement formée d'albumine, avait notablement diminué ; et cette diminution nous a paru être d'autant plus considérable, que nous constations dans l'urine la présence d'une plus grande quantité d'albumine (1). Ainsi, dans trois cas de ce genre, les matériaux organiques du sérum descendirent de leur chiffre moyen 72 aux chiffres 61,5, 60,8, 57,9. Or, dans aucune autre maladie, nous n'avons trouvé une pareille diminution.

Chez l'individu qui présenta le chiffre si bas de 57,9, il arriva qu'au bout d'un certain temps, l'urine cessa de contenir autant d'albumine ; nous fîmes alors pratiquer une seconde saignée, et cette fois nous trouvâmes que les matériaux organiques du sérum étaient remontés de 57,9 à 66. Enfin, au bout d'un temps encore plus long, toute trace d'albumine disparut de l'urine. Une troisième saignée fut alors pratiquée, et les matériaux organiques du sérum avaient encore augmenté : ils s'étaient élevés de 66 à 72, c'est-à-dire qu'ils étaient revenus à leur quantité moyenne.

On doit conclure de ces faits, qu'il y a un rapport intime entre l'albumine du sang et celle qui accidentellement vient à être sécrétée par les reins.

Un quatrième malade vint en quelque sorte nous servir de contre-épreuve. Chez lui, en effet, l'urine ne contint de l'albumine qu'en très petite quantité, et d'une manière passagère ; chez lui aussi, les matériaux organiques du sérum conservèrent leur chiffre ordinaire.

Dans le second et dans le troisième cas, les globules sont de beaucoup descendus au-dessous de leur quantité physiologique. Cette circonstance ne saurait être attribuée à la présence de l'albumine dans l'urine ; puisque, dans le premier cas, nous

(1) Quelques auteurs anglais, et M. Rayer en France, ont déjà annoncé des résultats semblables.

trouvons que les globules sont restés en quantité normale; mais nous pouvons nous rendre compte, dans ces deux cas, de la diminution considérable des globules, par les circonstances suivantes.

Le second cas est relatif à une femme hydropique, et qui était arrivée à un état d'anémie assez prononcé pour qu'on entendît chez elle un bruit de souffle aux artères carotides. Son sang devait donc contenir très peu de globules.

Dans le troisième cas, où la diminution des globules est beaucoup moindre (82 au lieu de 61), il s'agit d'une autre femme qui, atteinte d'un érysipèle à la face, avait été déjà saignée une première fois, et avait subi une forte application de sangsues, lorsque de l'albumine apparut dans l'urine. On s'explique ainsi l'abaissement du chiffre des globules, abaissement qui toutefois fut plus considérable qu'il ne l'est d'ordinaire dans des circonstances semblables. Un peu plus tard, une seconde saignée, pratiquée après que de la nourriture eut été accordée, fit voir une augmentation dans les globules. Plus tard enfin, lorsque après la disparition de l'albumine du sein des urines, on pratiqua une quatrième saignée, dans laquelle on trouva l'albumine du sang revenue à son état normal, deux circonstances frappèrent encore notre attention, d'une part une nouvelle diminution de globules, et d'autre part une augmentation de la fibrine. Pourquoi ces nouveaux changemens dans le sang? C'est que peu de jours avant la dernière saignée, plusieurs ganglions lymphatiques du cou s'étaient enflammés, et étaient rapidement arrivés à la suppuration; la malade avait dû être de nouveau soumise à une diète sévère. Telles furent les causes, et de l'accroissement de la fibrine, et de la diminution des globules.

Nous nous sommes donc rendu parfaitement compte de ces singulières oscillations que présentèrent, dans trois saignées successives faites à un même individu, les différens élémens du sang; et c'est ainsi que, plus nous avons avancé dans l'exposition de nos recherches, plus il nous est devenu facile, par l'analyse des faits, de ramener à quelques principes les causes de tous ces changemens de composition du sang, qui, par leur mobilité même, et par la rapidité de leur succession, semble-

raient au premier coup-d'œil échapper à toute règle, et se produire comme au hasard. Au milieu de ce désordre apparent, il y a des lois qui s'accomplissent, et, pour les trouver, il ne s'agit que de dégager les phénomènes de leurs complications. (1)

Qu'on nous permette, avant de terminer, une dernière remarque sur le parti que quelques personnes supposent qu'on pourrait tirer de l'examen de la densité du sérum, pour évaluer la quantité d'albumine et de sels contenus dans le sang. On a effectivement vérifié que, dans la maladie de Bright, où le sang contient moins d'albumine, son sérum a aussi moins de densité (Christison, Rayer et autres). Mais toute diminution de densité du sérum est-elle le résultat d'une diminution de l'albumine, et, par contre, est-on fondé à donner pour preuve de l'abaissement du chiffre de l'albumine dans le sang, la densité de moins en moins grande que présente ce liquide à mesure qu'on répète les saignées? Nous ne saurions l'accorder, car ce serait là un résultat qui se trouverait généralement en désaccord avec celui qu'ont fourni nos analyses. Pourquoi donc, en pareil cas, le sérum perd-il de sa densité? C'est que celle-ci ne dépend pas seulement de la quantité d'albumine et de sels du sang. En effet, la proportion d'albumine et de sels restant la même, il suffit que les globules du sang diminuent pour que, la quantité d'eau augmentant proportionnellement, la densité du sérum se trouve abaissée. Or, comme le résultat le plus constant des saignées pratiquées à des intervalles rapprochés est de faire baisser la proportion des globules, on conçoit sans peine que les données fournies par la densité du sérum, peuvent induire en erreur, en faisant rapporter à l'albumine et aux sels une diminution de proportion qui le plus souvent porte réellement sur les globules. Lors donc que l'on constate un abaissement de la densité du sérum, la seule conclusion que l'on puisse tirer de ce fait, c'est que le sang est appauvri. L'analyse seule peut apprendre lequel de ses principes a subi un abaissement de proportion.

(1) On trouvera à l'article de la bronchite capillaire aiguë, deux autres cas où un grand abaissement du chiffre des matériaux solides du sérum coïncide encore avec la présence de l'albumine dans l'urine.

OBSERVATIONS *sur le développement et les métamorphoses des genres Campanulaire et Syncoryne,*

Par M. S. L. LOWEN. (1)

I. DU GENRE CAMPANULAIRE (*Campanularia* Lam.).

Le genre Campanulaire est bien déterminé : ses cellules en cloche et ses tiges de substance cornée, incolores, tubuleuses et noueuses, en font reconnaître facilement les espèces.

Peu de familles, parmi celles qui composent la classe des Polypes, ont été mieux étudiées que celle des *Sertulaires*, à laquelle appartient ce genre. Sans parler des travaux déjà anciens d'Ellis, de Pallas et même de Cavolini, on doit à MM. Grant (2), Lister (3) et R. Wagner (4), des traités particuliers plus récens sur l'anatomie ou la physiologie de ces animaux.

Nous aurons seulement à ajouter, à l'histoire naturelle des *Campanulaires*, quelques observations qui n'avaient pas encore été faites, ou qui étaient restées incomplètes.

C'est la *Campanularia geniculata* (5) qui en a été le sujet.

Le Polypier se divise naturellement en deux parties distinctes, le tronc (*stirps*) et les organes de fixité (*stolones*), qui forment un tuyau dont la coupe est circulaire. (6)

(1) Le Mémoire de M. Lowen a été imprimé parmi ceux de l'Académie royale des Sciences de Stockholm : il a paru dans les *Archives d'histoire naturelle* de M. Wiegmann, publiées en allemand à Berlin (t. v, p. 219-262 et p. 321-326). C'est de cette dernière langue que la présente traduction a été faite.

(2) *Edinburg Nov. Philos. Journ.* I.

(3) Philos. franç. 1834.

(4) Isis, 1833.

(5) *Sertularia geniculata* Müller, Zool. danica, tab. CXVII. La même espèce a été étudiée par M. Lister, qui en a donné une très bonne figure (*O. c.*, Pl. x, fig. 1).

(6) Dans les *Sertulaires*, dont les cellules sont sessiles, ou même enfoncées dans la tige, cette coupe, ou la lumière du tuyau qu'elle forme, n'est pas ronde, mais irrégulière.

La tige porte à l'extrémité de ses branches et dans les aisselles deux sortes de cellules, les unes mâles (Pl. 8 A, fig. 1), les autres femelles (fig. 2).

Celles-ci, avant qu'*Ehrenberg* (1) eût bien déterminé leur signification, étaient désignées tantôt par le nom d'ovaires, tantôt sous celui de vésieules. Chaque cellule mâle a un plancher (fig. 2, 3, *a*), ayant son centre (2) percé d'un trou rond (fig. 2 *b*).

Cette ouverture se prolonge du côté de la tige, ou du rameau qui supporte la cellule, en un très court tube en entonnoir (fig. 3 *b*).

Le bord de l'ouverture de la cellule est tout uni, et toutes les cellules sont fixées sur leur pédoncule dans le sens de leur plus grand axe. (3)

On sait que les parties molles de ces zoophytes adultes se composent d'un organe commun, le tube intestinal, qui se continue du tronc dans les racines et les branches du polypier, et qui sert de moyen d'union à tous les individus protégés par les cellules, soit pendant toute leur vie (les mâles), soit durant leur développement (les femelles). Il n'existe jamais qu'un seul des premiers par cellule, tandis qu'une cellule femelle renferme plusieurs Polypes.

Deux membranes composent cette partie molle, une extérieure transparente et incolore (fig. 1, *a*) : elle fournit des ligamens qui l'assujétissent aux parois du tuyau corné. Elle forme seule les tentacules des Polypes mâles et la plus grande partie du corps des Polypes femelles.

La membrane interne (fig. 1 *b*), moins transparente et d'une

(1) M. Ehrenberg appelle polypes femelles les cellules ovariennes, et polypes sans sexe ou neutres les Polypes stériles. La dénomination de *Polype mâle* est inexacte.

(2) Ce plancher ou ce diaphragme (*septum*), et son ouverture (*foramen*), décrits en premier lieu par M. Lister, existent dans toutes les *Sertulaires*, que j'ai examinées et paraissent de bons caractères pour les distinguer.

(3) Chez d'autres *Campanulaires*, le bord des cellules est hérissé de pointes, et celles-ci sont tellement arrangées, que, lorsque le Polype se retire dans sa cellule, elles la ferment, en se rapprochant par leur extrémité : c'est ce qui se voit, entre autres, dans la *Campanul. clausa* Nob. et, à un moindre degré, dans la *C. siringa* Lam., qui s'écarte de ses congenères par une position oblique des cellules.

texture granuleuse, enveloppée par la précédente, tapisse les parois du tube intestinal et de l'estomac des Polypes; en un mot, autant qu'il m'a paru, toutes les cavités dans lesquelles se meut un fluide; mais elle manque dans les tentacules des Polypes mâles et dans la plus grande partie du corps de la femelle.

Il nous paraît très convenable de faire la description détaillée qui va suivre, dans l'ordre successif du développement de l'animal, après que la première cellule, qui est toujours mâle, s'est ouverte; de décrire conséquemment, en premier lieu, le Polype mâle, puis le tube intestinal, ensuite la formation des bourgeons, le Polype femelle, enfin le développement du polypier.

Les tentacules du mâle (fig. 1 *c*, et fig. 4). J'en ai compté de seize à dix-huit: ils ne sont jamais d'égale grandeur, peut-être accidentellement. La différence du nombre ne paraît pas venir de l'âge, mais d'une nutrition plus ou moins abondante à l'époque du développement. Ils sont transparens, creux et formés d'une couche très mince de la membrane externe. Des papilles, plus prononcées dans les trois-quarts supérieurs, dont la pointe est dirigée en haut, qui sont disposées en spirale interrompue, hérissent la surface de ces tentacules. La cavité intérieure est divisée en cellules, par des diaphragmes membraneux. Un ligament pharyngien, qui entoure la bouche, réunit ces tentacules par leur base (fig. 1 *d*).

On n'y observe aucun mouvement de fluide en rapport avec celui des autres parties de l'animal: ce sont des *organes de préhension*. Leur direction est le plus souvent telle, que les uns sont plus étendus, les autres plus ou moins infléchis (1). En général, ils peuvent se plier dans plusieurs sens, mais toujours de manière que leur extrémité se porte en arrière vers la bouche.

(1) Les Bryozoaires forment avec leurs tentacules, durant l'état du repos, un cône renversé, ou ils les infléchissent subitement, en formant un angle aigu. Ici leur direction diffère. La proie n'est pas saisie immédiatement par ces organes; mais, au moyen des courans que leurs cils vibratiles produisent dans l'eau. Il y a, dans l'intérieur des tentacules, un mouvement continuel de fluide, mêlé de granules, lequel est en rapport avec un vaisseau annulaire, qui entoure la bouche.

La *bouche* (fig. 1 *e*; fig. 5, 6, 7), entourée d'un ligament pharyngien, est plus ou moins saillante, suivant les espèces. Elle l'est beaucoup dans celle-ci; sa saillie égale parfois la moitié de la hauteur de l'estomac. Elle est tellement resserrée à sa base, qu'il y a un intervalle considérable entre cette partie et le ligament pharyngien. La partie supérieure forme les lèvres. Tantôt elle est fermée complètement; tantôt elle est ouverte en entonnoir, ou plissée de différentes manières; elle se retourne et se déploie même comme une collerette, lorsque l'animal a faim (fig. 7).

On pourrait considérer comme l'œsophage la partie la plus inférieure, qui est étranglée.

L'*estomac* (fig. 1 *f*) est un large tuyau, qui commence à la base de l'anneau pharyngien et descend jusqu'au diaphragme. Il est susceptible de se contracter et de se raccourcir considérablement. Il est libre comme le ligament pharyngien et ne tient à aucune partie des parois de la cellule. Il n'y a que sa base qui soit attachée au diaphragme. Il y a ici une sorte de pylore qui envoie des ligamens, en rayonnant (fig. 8) au pourtour de l'ouverture du diaphragme. Il se continue à travers cette ouverture avec le tube intestinal.

Le *tube intestinal* (fig. 1 *g*) ne remplit pas complètement le vide du tuyau corné; il est extensible, paraît dilaté par intervalle et s'attache par des prolongemens ligamenteux de sa membrane externe, aux parois de son étui corné. Ces ligamens sont situés très irrégulièrement, tantôt rapprochés, tantôt écartés: ils disparaissent d'une position, pour se montrer où l'on n'en voyait pas auparavant. On voit dans l'estomac et plus clairement et d'une manière plus continue, dans le tube intestinal, au moyen du microscope, comme chez toutes les *Sertulaires* et les *Tubulaires*, un fluide dans lequel des granules sont constamment en mouvement. Cavolini avait déjà observé ce phénomène. Il a été considéré, par les uns, comme une circulation analogue à celle des animaux supérieurs; ou bien à celle des végétaux (des *Chara*). M. Ehrenberg l'envisage comme une impulsion des substances alimentaires, provenant du mouvement péristal-

tique du tube intestinal. Des observations faites avec soin m'ont déterminé à admettre également cette dernière opinion.

Les Campalunaires se nourrissent d'animaux dont la grandeur est au moins celle de leur estomac, comme de petits entomostracés (des *Cyclopes*, etc.); tandis qu'ils dédaignent de plus petites espèces (les *Bacillariées*).

L'estomac sépare, des parties nutritives qui passent dans l'intestin, les parties indigestes qu'il rejette par la bouche. Celles-là se composent de granules irréguliers, anguleux, colorés en jaune brun, pour la plupart, ronds pour quelques-uns, qui nagent dans un fluide transparent, et sont dans un mouvement continuel. On peut même leur reconnaître deux sortes de mouvemens.

Le premier est tel que beaucoup de granules paraissent entraînés par un mouvement égal dans un même courant, vers la même branche, ou s'y meuvent dans la même direction. Outre ce mouvement de circulation générale, on voit chaque granule exécuter, dans un court espace, des mouvemens indépendans de ces courans. La première espèce de mouvement est celle que M. Lister décrit comme un flux et un reflux réguliers. Sans apporter le moindre doute sur l'exactitude de cette observation, exactitude qui se montre d'ailleurs dans beaucoup de parties de son beau travail, je dois cependant avouer que je n'ai jamais pu me convaincre de cette régularité de mouvement de va et vient. D'abord la vitesse du courant m'a paru très inégale, de sorte que tantôt l'œil pouvait à peine suivre les mouvemens des granules, tantôt on les voyait s'avancer avec lenteur.

Leur direction n'était jamais la même dans toutes les branches; tellement que le courant d'un rameau pouvait être suspendu, tandis que celui d'un autre rameau avait une direction vers le haut, et qu'il descendait dans un troisième. Parfois le courant du tronc principal changeait tout-à-coup de direction et se portait avec rapidité vers le bas; alors le courant d'une branche suivait la même direction; mais dans une autre branche, on voyait les granules monter.

Il est cependant évident que tous ces mouvemens sont produits par une force *à tergo*, qui agit à-la-fois sur tout le fluide contenu dans un tronc ou dans une branche; cette force est la

contraction et la dilatation alternatives de l'intestin, qui ont lieu irrégulièrement tantôt ici et tantôt là. Cette irrégularité est la suite nécessaire de l'indépendance où restent les polypes les uns des autres pour prendre leur nourriture. Ensuite les parties molles du polypier, qui sont sur le point de produire des bourgeons, remplissent entièrement leur tuyau corné : elles ne montrent aucune contraction et restent constamment dilatées. Il en résulte qu'elles prennent plus de fluide nourricier que celles qui sont développées, qu'elles absorbent en totalité celui qui leur arrive, et qu'elles n'en renvoient pas. Voilà pourquoi le flux vers les bourgeons est toujours le plus fort.

L'autre espèce de mouvement, qu'on observe dans chaque granule en particulier, a lieu, que le courant général continue ou qu'il soit suspendu. Chaque granule se meut dans toutes sortes de directions, s'avance ou recule, s'enfonce ou s'élève, est entraîné par un autre granule, qui vient se heurter contre lui, ou détourne tel autre granule de sa direction, et fait ainsi des détours innombrables, tout en suivant le courant général. On voit de cette manière deux granules ou davantage, former une petite masse informe qui, durant un tourbillonnement irrégulier sur son axe, est entraînée çà et là.

Lorsque le courant général est très fort, ces mouvemens particuliers s'arrêtent dans quelques granules, qui n'ont plus qu'un mouvement progressif; mais, dès l'instant où le courant général s'affaiblit, et, comme il m'a paru, lorsque tel ou tel granule s'approche des parois du tube intestinal, le mouvement particulier des granules recommence; cependant il y a des points où il ne s'arrête jamais, je veux dire dans les parties qui sont en train de développement, et dans lesquelles a lieu la sécrétion de l'écorce cornée; enfin dans les rameaux des Polypes femelles.

Ici les granules sont sans comparaison plus nombreux que dans aucune autre place, et forment un amas si serré qu'on ne peut plus distinguer leurs mouvemens particuliers. On ne voit aucun granule revenir de cette partie : tous paraissent être absorbés. Le mouvement individuel des granules, si différent de celui que leur imprime le courant, doit aussi provenir d'une

cause différente, qui est répandue dans toute l'étendue des parois du tube intestinal, et qui n'agit pas de la même manière dans les différens points de ce tube : c'est du moins sous ces apparences que se manifeste ce phénomène.

On ne connaît pas d'autre force de cette nature que celle produite par les cils vibratiles, ces petits organes, qui ont été récemment découverts, et doivent être considérés comme un moyen puissant d'impulsion des fluides contenus dans les organismes ou qui baignent leur surface.

Je n'ai pas été assez heureux pour découvrir, dans ce cas, ces cils vibratiles; mais plus je les ai cherchés en vain, plus je me suis convaincu qu'on doit les découvrir; tant les mouvemens des granules que je viens de décrire, ont de ressemblance avec ceux qui sont produits évidemment par cette cause. (1)

Formation des bourgeons (fig. 1 *h*). Elle est de deux espèces, l'une produit des bourgeons mâles: elle a lieu, par le développement des rameaux, d'après des arrangemens propres à chaque espèce, et qui la caractérise; l'autre produit des bourgeons femelles, qui sont situés dans les aisselles des premiers, ou plutôt des rameaux qui les portent.

Les bourgeons mâles sont ici les plus nombreux, comme chez les Sertulaires. Les bourgeons femelles sont les plus gros, et leurs cellules renferment plusieurs individus.

Il faut observer ici que, dans les genres *Campanulaire* et *Plumulaire*, les bourgeons femelles sont plus distans des mâles; tandis que, chez les *Sertulaires*, c'est immédiatement sur la base des cellules mâles que se développent les cellules femelles.

Voici la marche que suit le développement du bourgeon. Dans une place déterminée par suite de l'arrangement dans les divisions du polypier, qui caractérisent son espèce, on s'aperçoit que le tube intestinal n'est plus libre dans son tuyau, qu'il le remplit entièrement, et que le courant des granules du fluide nourricier est plus fort dans cet endroit qu'ailleurs. On découvre

(1) Les cils vibratils existent dans les branchies de la plupart des Annelides au bord du pied des Gastéropodes, dans l'estomac et surtout dans le cloaque des Bryozoaires: ils existent même chez les Hydres.

bientôt, dans cette même place, une légère bosselure à l'extérieur du tuyau corné, laquelle va toujours en augmentant et ne tarde pas à se développer en un court rameau. Celui-ci croît de telle manière, que la partie dilatée du tube intestinal, contenue dans l'extrémité de ce rameau, reçoit une grande quantité de fluide nourricier, mélangé de ses granules; elle en extrait les matériaux de l'enveloppe cornée, dans laquelle elle-même se développe. Partout où la formation du tube corné est terminée, le tube intestinal s'en détache, en se resserrant sur lui-même, et n'y reste plus adhérent que par quelques ligamens; mais son extrémité renflée, qui agit ici comme un moule (une matrice) pour la formation subséquente de son enveloppe, continue de rester en contact avec la lame cornée formée la dernière. Le rameau qui se forme ainsi est le plus souvent caractérisé, près du tronc, par des dilatations et des étranglemens alternatifs; il reste ensuite tout uni pendant un certain espace, puis il prend de nouveau des nodosités, jusqu'à ce qu'enfin le dernier renflement, plus grand que l'avant-dernier, commence la cellule du Polype mâle. Alors se produit le diaphragme de cette cellule (fig. 1, *k*), pendant que l'intestin forme une dilatation annulaire; elle s'étend en cône au-delà du diaphragme, augmente de plus en plus d'étendue en s'élevant, et prend enfin la forme définitive de la cellule, celle d'une cloche renversée (fig. 9). Son bord supérieur devient tranchant; mais son entrée est fermée par une membrane convexe au centre, concave plus près du bord. Quand la cellule est terminée, la partie renflée de l'intestin qui l'a produite, se contracte, s'en détache, et devient libre : c'est alors seulement que les tentacules se développent (fig. 10). Lorsqu'ils ont tout leur développement et que le Polype est complet, il rompt la membrane operculaire de sa cellule, produit ses tentacules au-dehors, et commence sa vie indépendante.

Les bourgeons femelles (fig. 11) se développent, ainsi que nous l'avons dit, dans l'aisselle des rameaux. Leur pédoncule est plus court, et la cellule est presque deux fois et demie plus grande qu'une cellule mâle. L'histoire de son développement est la même, jusqu'au moment où l'intestin a produit la cellule, et

encore jusqu'à celui où il forme une forte dilatation sous l'opercule (fig. 11 *a*). Il s'arrête dans cette position. Sa partie grêle, qui descend dans la direction de l'axe de la cellule, est assujétie, d'un côté, par des ligamens aux parois de cette cellule.

On ne tarde pas d'apercevoir, et le plus souvent dans le côté du tube intestinal opposé aux ligamens, une petite élévation (*b*), dans la cavité de laquelle un courant de granules semble se concentrer : c'est un germe de Polype femelle. La protubérance augmente de grosseur, devient sphérique ; la partie qui la réunit à l'intestin se rapetisse à mesure, sa cavité grandit, se développe, et paraît comme partagée en plusieurs loges (fig. 11 *c*, *d*, *e*, et fig. 13 *a*).

Cette cavité reste toujours en communication, avec le tube intestinal, par un canal étroit, à-peu-près comme une vessie qui en serait une dilatation ; elle est revêtue intérieurement par la continuation de la membrane interne de l'intestin, et elle paraît remplie d'un amas de granules.

A l'extérieur de cette vessie se montre, avec un développement croissant, un petit corps sphérique (fig. 11 *f*), composé d'une matière de couleur foncée, granuleuse. Au côté extérieur de ce petit corps sphérique, on découvre ensuite une tache circulaire, de couleur claire, qui a même les apparences d'une petite sphère transparente, circonscrite dans la première.

Une capsule transparente (fig. 11 *h*), à parois extrêmement minces, enveloppe ces corps ; elle montre à son bord supérieur et extérieur une couronne de petites élévations (*k*). Cette capsule est le corps du Polype femelle ; les élévations sont ses tentacules ; le petit corps sphérique est un œuf, avec la vésicule de *Purkinge ;* et le sac qui se continue du tube intestinal répond à l'estomac du mâle.

Il se forme toujours plusieurs femelles à-la-fois, mais avec des degrés différens de développement. Toutes sont recouvertes par la membrane extérieure du tube intestinal, et leur développement a lieu par l'intermédiaire de sa membrane interne.

La femelle qui se trouve en haut est celle dont le développement est le plus avancé et son œuf le plus tôt mûr ; celle qui est le plus bas, est la moins développée. A mesure que l'œuf

grossit, le sac, qui n'est qu'un prolongement du tube intestinal, à la surface duquel l'œuf s'est formé, et qui excédait d'abord celui-ci en grosseur, est devenu beaucoup plus petit et l'œuf plus grand. La tache de l'œuf, de couleur plus claire, a disparu. La femelle qui s'est développée entre deux membranes n'a que l'extérieure à rompre. En même temps, le canal par lequel son sac est en communication avec le tube intestinal, s'allonge; de sorte que son union avec le tronc commun n'est pas détruite lorsque la femelle développée rompt la membrane extérieure et la lamelle cornée, extrêmement mince, qui ferme sa cellule, et dont on voit les fragmens se détacher, ainsi que Lister l'a décrit.

Quand la femelle est ainsi sortie de la capsule ou cellule commune, elle paraît comme une vessie transparente, à-peu-près ronde, avec un court pédoncule, en dehors du couvercle qu'elle a rompu, et dont l'ouverture qu'elle y a faite se resserre autour de sa tige.

Les tentacules, au nombre de douze, sont étalés chez quelques-uns; leur longueur, qui est à-peu-près la même pour tous, est environ celle du diamètre du corps; chez d'autres ils sont plus courts.

Ils sont plus effilés à leur extrémité que ceux du mâle, et hérissés irrégulièrement de petites épines. Du pourtour de la couronne de tentacules descendent quatre canaux dans la membrane mince qui forme extérieurement le corps de la femelle; ils se terminent dans le sac qui est à sa partie inférieure, à-peu-près réduit à l'état rudimentaire. On voit aussi que la membrane extérieure de l'œuf est attachée à ce sac (fig. 12).

Sortie et métamorphose de la larve. — Lorsque cette membrane se rompt, il en sort un jeune qui ne ressemble pas du tout à sa mère (fig. 12 *a*, fig. 13 *b*). Il a la forme d'un petit ver, une figure elliptique, un peu déprimée. Sa surface est toujours garnie de cils vibratiles, au moyen desquels il se meut d'abord dans le corps de sa mère. Après un certain temps, il passe une de ses extrémités entre les tentacules de celle-ci, et paraît au dehors, tout en s'allongeant davantage (fig. 13 *b*).

Chaque femelle porte ordinairement deux œufs; c'est ainsi que beaucoup de jeunes éclosent.

Dans un seul cas, j'ai vu sortir trois jeunes larves; je suppose qu'elles provenaient d'autant d'œufs.

Il y a quelquefois, dans ce développement de larves, une singulière irrégularité que je regarde comme une monstruosité : j'ai observé plusieurs fois, dans la femelle sortie de sa cellule, une jeune larve se partager en deux par une scissure transversale; ces deux parties se divisent à leur tour chacune en deux autres, et ainsi de suite, jusqu'à un nombre de plus de trente (fig. 13 *c*). Je n'ai pu observer le résultat de cette multiplication fissipare prématurée, et jusqu'à quel point elle peut se continuer? Après que la mère s'est débarrassée de ses petits, elle se contracte de plus en plus; elle paraît penchée et sans vie, et ses tentacules s'effacent presque entièrement.

Les excellentes observations de Lister montrent suffisamment qu'elle disparaisse par l'effet d'une absorption. Ce que j'ai vu me confirme dans cette idée. Après s'être rapetissée de la manière la plus évidente, entre-t-elle dans la capsule? Le prolongement du tube intestinal qui se continue, pour chaque femelle, à travers l'ouverture de cette capsule, s'atrophie à mesure que le courant du fluide nourricier diminue.

Lorsque le jeune s'est détaché de sa mère, il commence à nager par l'agitation de ses cils vibratiles. Il en résulte que son déplacement paraît se faire uniformément et comme en glissant. On le voit tourner continuellement autour de son axe, tantôt dans une direction horizontale, tantôt dans une direction verticale. En même temps, sa forme varie : elle prend (fig. 18) tantôt celle d'un œuf, tantôt elle s'allonge davantage, devient obtuse en avant, en même temps qu'elle s'amincit en arrière : l'animal se raccourcit en forme de poire. Sa couleur est blanche, et paraît à-peu-près opaque, vue au microscope; cependant elle conserve assez de transparence pour qu'on y distingue une cavité intérieure, que le fluide qu'elle renferme teint d'une couleur foncée, et qui est formée de deux membranes, une transparente comme du verre, et l'autre interne un peu opaque.

Des observations réitérées rendent invraisemblable que la petite larve se nourrisse par une bouche.

On a désigné long-temps les Campanulaires, à cette époque

de leur développement, sous le nom d'œufs mobiles, parce qu'on les a comparés aux propagules de certaines Algues. C'est par suite de la même erreur que l'on a considéré comme de simples capsules ovariennes, les Polypes femelles de cette famille. (1)

Après que les jeunes larves ont nagé librement çà et là, elles se fixent à un corps submergé, à un fucus, etc. Le corps de cette larve change alors de forme : il devient plat, circulaire comme un petit gâteau (fig. 15), autour duquel les cils vibratiles, qui ont cessé de se mouvoir, forment un cercle de franges transparentes. Au milieu de la cavité intérieure, paraît une tache obscure, dont le diamètre a environ le cinquième de celui de tout le corps ; cette tache se compose d'un amas de granules concentrés dans la place d'où la tige (le tronc) du Polypier doit s'élever. Ici la membrane extérieure paraît un peu plus épaisse que dans l'animal développé, et comme sillonnée de vaisseaux qui viendraient de la cavité intérieure. On voit bientôt s'élever ; de cette tache centrale, opaque, une bosselure hémisphérique (fig. 16) ; en même temps, la poche intérieure a perdu sa forme circulaire, et s'est divisée en quatre ou cinq lobes irréguliers ; la membrane extérieure, de nature celluleuse, en conservant sa forme générale circulaire, a son bord partagé en autant de lobes, par d'étroites scissures qui rayonnent de la circonférence au centre.

Ces lobes répondent aux parties du polypier qui doivent conserver la position horizontale et former ses organes de fixité.

Déjà le tout est revêtu d'une couche cornée ; mais on ne peut la bien reconnaître qu'au moment où, par suite de l'accroissement subséquent du tronc, la poche centrale s'est sensiblement rapetissée, et que la membrane externe s'est divisée en quatre lobes (fig. 17) ; elle s'attache alors par des prolongemens ligamenteux à l'écorce transparente et cornée, qui conserve, avec ses profondes incisions, sa circonscription première.

Le tronc, qui continue de s'élever verticalement, produit enfin à son sommet une cellule mâle, et montre, dans la formation de cette première cellule, tous les phénomènes du mou-

1) Voyez le Mémoire de Grant, *Edinburgh new philosophical Journal*, I, page 150.

vement des granules du fluide nourricier dans le tube intestinal etc., décrits dans la formation des bourgeons du zoophyte déjà développé.

Quand le premier Polype, qui est toujours mâle, s'est ainsi développé, sa membrane extérieure est plus mince qu'elle n'était dans la larve. On pourrait peut-être en conclure que le petit Polype, durant son développement dans la capsule cornée, s'est nourri aux dépens d'une partie de cette membrane, sans prendre au dehors les matériaux de son alimentation.

Il résulte des observations précédentes que les *Campanulaires* (et nous pouvons le dire également de toute la famille des *Sertulariens*) sont libres et non fixées durant la première époque de leur vie, nageant çà et là. Elles ont, à cet état de larve, une forme toute différente que celle définitive qui les caractérise dans leur état parfait. Dans ce dernier état, la Campanulaire est fixée et revêtue d'une enveloppe (d'une écorce) de nature cornée. Celle-ci une fois produite, n'est qu'une excrétion morte, de tous les points de laquelle la partie vivante qui l'a formée se détache, et qu'elle ne nourrit plus. C'est en dedans de cette enveloppe protectrice que se développe le Polype; qu'il prend le nombre, la forme et les dimensions de toutes ses parties; alors il rompt mécaniquement sa capsule, et ne prend plus d'accroissement.

Si l'on considère l'ensemble de ces phénomènes, il semble que ce ne serait pas trop oser que de les appeler une métamorphose; que de comparer ce premier état à celui d'une *larve*, et le second à celui de la *chrysalide*; que de voir dans le Polype mâle développé dans sa cellule, l'*image* entourée de son enveloppe de chrysalide, qu'elle conserve même après l'avoir ouverte. Le Polype femelle se dégage au contraire complètement de sa larve, accomplit la tâche qui lui est assignée, celle de servir à la propagation, et meurt.

II. Du Genre Syncoryne (*Syncoryna* Ehrenb.)

Deux espèces du *genre Syncoryne* Ehr. vivent sur les côtes de Norwège : *S. ramosa* Ehr. (*Stipula ramosa* Sars) et *S. Sarsii* Nob.

On peut s'en procurer, au commencement de juin, de très beaux exemplaires, sur lesquels on sera à même de répéter les observations suivantes :

1° La *Syncoryne rameuse* est suffisamment connue par la description de M. Sars ; j'y ajouterai seulement quelques détails.

Le *Polype mâle* (Pl. 8, B, fig. 1 *a*) est pourvu d'une très petite bouche, qui n'a pas de lèvres, comme celle des *Campanulaires*. On compte seize tentacules dispersés sur un renflement (une tête) conique, dont ils égalent la longueur. Leur structure diffère de celle décrite dans les Sertulaires. A la vérité, ils sont de même une production de la membrane externe du Polype, et on y observe pas davantage de fluide en mouvement ; mais leur surface est tout unie, et nullement hérissée de petits crochets, qui sont ici réunis en forme de pelotte ou de tête d'épingle, à l'extrémité du tentacule. Leur cavité est également divisée en cellules; mais les petites lamelles transversales qui les limitent, sont placées avec plus d'irrégularité, presque en spirale, et sont réunies par une columelle très mince, membraneuse, qui règne dans toute la longueur de cette cavité. C'est aussi à cette columelle que sont fixés les petits granules colorés encore immobiles.

Le sommet de la tête est hémisphérique ; il est entièrement garni de papilles dont l'emploi paraît être de servir de ventouses; chacune de ces papilles ayant dans son milieu un petit bouton.

Dans toute l'étendue du renflement céphalique, la membrane extérieure est très rapprochée de l'interne, qui forme proprement la cavité gastrique. Plus bas que l'estomac, au contraire,

dans la partie qui n'est pas encore enfermée dans un tube corné, l'intestin se rétrécit considérablement, et la membrane extérieure est unie à celui-ci par de la cellulosité.

Le *Polype femelle* (B, fig. 1 *b*, et fig. 2 *b*), dont une ou deux se fixent sur la base du Polype mâle, présente une forme bien remarquable : immédiatement au-dessous du tentacule le plus inférieur du mâle, se montre un court pédoncule, production de son tube intestinal. Ce pédoncule supporte une cloche diaphane comme du verre, de forme quadrangulaire ou pentagonale, dans l'intérieur de laquelle se trouve un corps libre, en massue, un peu aminci vers son extrémité, lequel renferme une cavité en communication évidente avec le tube intestinal. Ce corps est l'estomac de l'animal. Il a une très petite bouche à son extrémité (fig. 2 *a*), autour de laquelle se voient dix petites proéminences qui sont des tentacules rudimentaires (fig. 2 *b*).

L'estomac est entouré, dans toute sa longueur, par une enveloppe colorée en jaune brun, qu'une observation attentive montre renfermer des œufs nombreux, serrés les uns près des autres, en rangées régulières. Si on emploie le compresseur, ils s'échappent à travers la membrane qui les couvre, précisément à la place où ils se trouvent, et ne s'écoulent pas vers la partie supérieure.

L'enveloppe la plus extérieure, en forme de cloche, est une membrane diaphane comme du verre, très mince, dont la surface extérieure montre un réseau de mailles très peu liées (fig. 6) et de petites papilles serrées, dispersées sans régularité.

Le bord supérieur de la capsule est divisé par quatre, quelquefois par cinq tubercules proéminens, qui sont des tentacules rudimentaires. Une canelure part de chacun de ces boutons, et se prolonge en dedans et en bas en un lobule (fig. 2 *b*, et fig. 3 *a*).

De la base de l'estomac s'élèvent autant de canaux qu'il y a de tentacules (fig. 20 *c*, et fig. 21 *b*), et s'ouvrent dans leur cavité. Dans toute la longueur de chacun de ces vaisseaux, la substance de la cloche est un peu plus épaisse, ce qui lui donne dans cette partie une apparence anguleuse.

On aperçoit un mouvement continuel de globules, depuis l'estomac du Polype mâle, à travers le pédoncule du Polype femelle, dans l'estomac de celle-ci, et de cet estomac, par les canaux que nous venons de signaler, jusque dans leur dilatation supérieure. Ce courant est analogue à celui observé dans les Campanulaires.

Les oscillations des granules et leur réunion, se remarquent surtout dans cette dernière cavité. Au-dessous du bord de la cloche et entre les tentacules, il y a un ruban (fig. 3 *c*) qu'on pourrait prendre pour un vaisseau annulaire, mais je n'ai jamais vu le courant s'y prolonger; je le regarde plutôt comme musculaire.

Les mouvemens très vifs de la cloche consistent en contractions et en dilatations fréquentes, plus souvent dans le sens transversal que longitudinal, absolument semblables aux mouvemens alternatifs de systole et de diastole des Méduses.

2° La *Syncoryne de Sars* Nob. — Quelques jours après avoir fait les observations précédentes, je découvris cette espèce, avec les Polypes femelles, dont il y avait à la vérité un moindre nombre, mais de telle forme, que j'eus un instant l'idée qu'elles appartenaient à l'espèce précédente, mais qu'elles n'étaient pas entièrement développées.

Ce qui me frappa d'abord, c'est que, non-seulement les unes de ces femelles étaient attachées aux renflemens céphaliques des Polypes mâles, mais que plusieurs provenaient de tubes qui ne portaient pas de Polypes mâles.

Chez tous, la cloche paraissait plus approchant de la forme sphérique et déprimée. L'estomac était en forme de bouteille, sans œufs; on y observait de vifs mouvemens, pendant lesquels on le voyait tantôt s'étendre, tantôt s'infléchir. La cloche n'était pas entièrement ouverte à la partie supérieure, ainsi que cela se voit dans la *Thaumantia oceania*. Elle était fermée en partie par un diaphragme (fig. 7 *a*) qui se porte en dedans, comme cela se voit chez cette Méduse, dans les contractions de l'animal.

Enfin, les cirrhes du bord formaient ici de longs tentacules,

noueux, très mobiles, extensibles, creux, et à la base de chacun on apercevait, outre la dilatation du vaisseau longitudinal, un point de couleur rouge, luisant (fig. 7 *b*, fig. 10 *a*) que je considère comme un œil; en suivant la manière de voir d'Ehrenberg, pour des déterminations semblables chez les Acalèphes et les Échinodermes.

Le nombre des femelles était ici bien plus faible que chez la *S. ramosa*, et je n'en ai rencontré aucune avec des œufs. Je suppose qu'après avoir pondu leurs œufs, elles se détachent et deviennent libres; mais je n'ai pas eu l'occasion de le constater.

Qu'il me soit permis d'y suppléer, en rappelant ici des observations de deux naturalistes distingués, qui se rapportent à ce sujet.

M. R. Wagner a vu (1) dans beaucoup d'individus de la *Coryna aculeata* Wagn., en arrière des tentacules, des bourgeons (capsules) de différentes grandeurs, qui, si l'on compare sa description avec la nôtre, étaient des Polypes femelles. La figure qu'il en a publiée (fig. 26) ne laisse aucun doute à cet égard. La position des œufs, les quatre tentacules et les mouvemens qu'ils exécutaient, semblables à ceux des Méduses, sont analogues à ceux que nous avons observés.

Voici le résumé de cette observation: Aussitôt que le Polype femelle a acquis un certain degré de développement, au point d'avoir cinq tentacules, on voit s'élever dans son intérieur des proéminences qui sont de petites capsules, fixées par un pédicule et remplies de substance muqueuse. Celle-ci se transforme en œufs ou en gemmes. Lorsque ceux-ci sont mûrs, les capsules se détachent et se meuvent librement; ensuite les œufs en sont expulsés et vont se fixer sur le sol ou sur quelque corps submergé.

M. Sars a fait connaître dans son dernier et excellent travail (2) de semblables bourgeons, dans la *Corymorpha nutans* Sars. Immédiatement au delà des longs tentacules se voient des fila-

(1) *Iris*, 1833, p. 256, Pl. 11.

(2) *Beskivelser og Jagttagelser*, etc. Bergen, 1835.

mens ramifiés dichotomiquement; ce sont des ovaires, à l'extrémité desquels sont attachés, comme des grains de raisin, ce qu'on appelle très improprement les œufs. Ceux-ci sont pédonculés, évasés vers le haut, et renferment dans leur intérieur les parties essentielles d'un Polype. Au milieu est un corps en forme de massue (le renflement céphalique du mâle) et sur la partie supérieure, qui est la plus large, quatre tubercules, qui se continuent intérieurement avec autant de canaux. (1)

L'un de ces corps est toujours plus gros que les autres et se termine par un bouton arrondi. Ce bouton, suivant M. Sars, deviendrait plus tard un pédoncule, tandis que la partie intérieure serait le corps du Polype. Les mouvemens que nous avons observés, dans ceux que nous avons décrits, confirment ces déterminations.

Les observations de M. Wagner s'accordent parfaitement avec les nôtres, et, s'il avait connu les significations des capsules, telles qu'Ehrenberg les a proposées, il n'y aurait certainement rien à ajouter à ce qu'il a dit.

M. Sars, qui paraît avoir compris ce qu'il a observé, d'après les vues des écrivains qui l'ont précédé, a eu d'ailleurs le mérite de faire connaître les quatre canaux de la cloche. L'un et l'autre comparent les mouvemens de ces animaux à ceux des Acalèphes; mais il reste encore à observer comment le Polype femelle devient libre, et le développement de ses œufs?

Ces formes des Polypes femelles ont une frappante ressemblance avec plusieurs *Méduses*, particulièrement avec la *Cistœis tetrastyla* Esch. (2). Peut-être les a-t-on confondues quelquefois?

L'analogie de la cloche extérieure avec l'ombrelle de cette dernière, les quatre vaisseaux, les cirres du bord de l'ombrelle, la position de l'estomac, tout se ressemble. (3)

(1) M. Sars, *o*, *c*,. Pl. 1, fig. 3, *d*, *e*, *f*, *g*.

(2) Système des Acalèphes, tab. 8, fig. 2.

(3) Cette ressemblance est encore plus frappante, si l'on compare le *Strobila octoradiata* Sars (*o*, *c*, tab. 3). Cet animal, absolument semblable à un Acalèphe, se développe en grand nombre sur le corps d'un Polype, qui a l'aspect et l'organisation d'une Hydre. Nous y voyons

Si nous comparons les *Syncorynes* avec les *Campanulaires*, nous trouverons les différences et les ressemblances suivantes. L'une et l'autre ont une capsule extérieure en forme de sac, à parois diaphanes, dont le bord porte des cirrhes ou des tentacules, et dans les parois de laquelle des vaisseaux conduisent le fluide nourricier, depuis l'estomac. Ce dernier organe se développe par une sorte de bourgeonnement du tube intestinal. Les œufs paraissent autour de la cavité alimentaire; mais la forme différente de cette même capsule extérieure, le nombre différent des tentacules, la présence des yeux, du moins chez la *Syncoryne* de Sars; la vivacité des mouvemens dans ce dernier genre; l'immobilité presque absolue de la Campanulaire : la circonstance probable que la Syncoryne devient libre à une époque de sa vie; l'atrophie, au contraire, du Polype femelle de la Campanulaire, tout annonce entre ces deux genres d'importantes différences.

Ce n'est que lorsqu'on connaîtra mieux l'histoire du développement des Polypes à tuyau, qu'il sera possible de faire une bonne distribution systématique de ces animaux, et d'apprécier à leur juste valeur les différences que nous avons mentionnées.

Caractères des deux espèces de Syncoryne.

1. *Syncoryna ramosa* Ehr. — Sesquipollicaris, tubulis $\frac{1}{10}''$ crassis, rugosis; gemmis arrectis, flexuosis; fruticulosa et intricata. ♂. Tentaculis 16; ♀ elongato-campanulatis, cœcis, campanula aperta, cirris evanidis.

Habitat in fundo petroso inter ostræas et algas.

une si grande analogie avec ce que nous savons des Syncorynes, que nous nous sommes bien empressés de connaître l'histoire du développement ultérieur du singulier *Strobila* *. M. Sars a publié plus tard, en 1837, que son genre *Strobila* était le jeune âge de la *Medusa aurita*, qui prend d'abord la forme et l'organisation des *Ephyres*, avant d'avoir la forme définitive de cette espèce et de ce genre. Resterait à faire concorder ces observations avec celles de M. Siébold sur les métamorphoses de cette même Méduse.

* Note additionnelle du traducteur.

2. *Sync. Sarsii* Low. — Semipollicaris, capillacea, tubulis $\frac{1}{10}'''$-$\frac{1}{12}'''$, crassis, lævibus; gemmis elongatis, arrectis; parce ramosa. ♂ Tentac. 10-16; ♀ globosis, cirris elongatis: oculis exquisitè rubris; campanula membrana perforata, clausa.

Habitat in fissuris rupium, etiam in aquâ stagnante, ad insulam Masskoïr, etc. Bahasiæ.

EXPLICATION DES FIGURES DE LA PLANCHE 8.

A. *Campanularia geniculata* (Sertularia geniculata Mull.) *mâle*. Fig. 1-10.

Fig. 1. Cellule mâle, avec un bourgeon mâle. — 2. Cellule mâle vide, avec son diaphragme. — 3. Le diaphragme, vu de profil. — 4. Un tentacule. — 5, 6, 7. La bouche, différemment contractée. — 8. Partie pylorique de l'estomac, qui s'étend au dessus du diaphragme. — 9. Une cellule nouvellement formée. — 10. Une cellule semblable, encore fermée par un opercule durant le développement du Polype.

Campanularia geniculata, femelle jeune. Fig. 11-18.

Fig. 11. Cellule femelle. — 12. Partie supérieure d'une semblable cellule après la sortie des Polypes femelles. — 13. Une semblable cellule. — 14. Une larve de Polype. — 15. Un jeune Polype, qui vient de se fixer (*Chrysalide*). — 16. Un semblable Polype (*Chrysalide*), avec le commencement de sa tige. — 17. Un même, plus développé. — 18. Différentes formes de jeunes Polypes (*de larves*).

B. *Syncoryna*. Fig. 1-10.

1. *Syncoryna ramosa* Ehrenb. ♂ ♀. — 2. La même ♀. — 3. Le bord de la capsule extérieure de la femelle. — 4. Un tentacule ♂. — 5. Tentacules rudimentaires de la bouche chez la femelle. — 6. Morceau de la peau extérieure. — 7. *Syncor. Sars* Nob. ♀. — 8, 9. Sa bouche, avec ses tentacules. — 10. La base d'un cirrhe marginal, avec un œil.

Essai *d'une Monographie des organes de la respiration de l'ordre des Crustacés Isopodes*,

Par MM. Duvernoy et Lereboullet.

(Lu à l'Académie des Sciences, par M. Duvernoy, dans ses séances des 23 et 30 novembre 1840.

INTRODUCTION.

Nous avons fait ensemble à Strasbourg, aux mois de septembre et d'octobre 1839, la plupart des observations qui composent le travail que nous avons l'honneur de soumettre au jugement de l'Académie.

Le desir de le rendre moins incomplet et plus digne de lui être présenté nous a fait retarder ce moment jusqu'à aujourd'hui.

Cependant la nécessité où nous étions de prendre date, nous a déterminés à communiquer presque immédiatement, un résumé de nos premières observations à la Société d'histoire naturelle de Strasbourg: c'est ce qu'a fait l'un de nous, M. Lereboullet, le 27 novembre dernier.

Depuis cette époque, nous avons cherché toutes les occasions d'étendre et de perfectionner nos observations, en les répétant et en les multipliant à Paris et à Strasbourg, et en nous communiquant, à mesure, leurs résultats.

C'est ainsi que ce travail est devenu un premier *Essai d'une Monographie des organes de la respiration des Crustacés Isopodes.*

En effet, si l'on prend pour guide, comme nous avons pu le faire depuis le mois de janvier de cette année, le tome III de l'*Histoire naturelle des Crustacés* de M. Milne Edwards, l'ouvrage d'histoire naturelle classique à-la-fois le plus récent et le plus

complet sur ces animaux, ainsi que l'un de nous s'est déjà empressé de le reconnaître dans une autre occasion ; on verra que nos observations se rapportent à *une ou plusieurs espèces de beaucoup de genres, de presque toutes les familles et des trois sections* dans lesquelles l'ordre des Isopodes se trouve divisé dans cet ouvrage. Cet ordre, tel qu'il y est décrit, est un des exemples les plus frappans des immenses progrès qu'a faits, dans le siècle actuel, l'histoire naturelle des animaux. Il suffira, pour s'en convaincre, de se rappeler que les Isopodes ne sont encore qu'un simple groupe générique (le genre *Oniscus*), assez mal défini, dans la dernière édition du *Systema naturæ* de Linné, publiée par Gmelin en 1789.

Quant à l'appareil d'organes sujet de *cette monographie*, c'est à M. Savigny qu'on en doit la première connaissance générale. Les planches 11, 12 et 13 du grand ouvrage sur l'*Egypte* (1), comprennent des figures de cet appareil, appartenant à la plupart des familles de l'ordre des Isopodes. Malheureusement le texte détaillé qui aurait dû s'y rapporter n'a pas été publié par l'auteur. M. Audouin a pris à tâche d'y suppléer et d'en faire jouir autant que possible le public, par une utile quoique très succincte explication.

Après ce travail général d'une perfection remarquable, ainsi que tout ce qu'a publié M. Savigny, nous n'avons à citer, comme se rapportant à l'ordre entier qui nous occupe, que les indications faisant partie des caractères distinctifs des Isopodes, qui se trouvent dans les ouvrages de Latreille (*Règne animal* de Cuvier, première et deuxième édition), de Desmarest (*Considérations sur l'histoire naturelle des Crustacés*), et dans celui de M. Milne Edwards, que nous venons de mentionner. Nous devons ajouter que, dans ce dernier ouvrage, l'auteur a mis un soin particulier à faire connaître les organes de la respiration, soit comme pouvant contribuer à distinguer les groupes qu'il admet, soit pour mettre à même d'apprécier le degré d'importance des caractères tirés de cet appareil, soit dans un but à-la-fois anatomique et physiologique.

(1) Histoire naturelle, Zoologie, *Crustacés*, volume II.

Les planches 66, 71 et 71 *bis*, de la grande édition du *Règne animal* de Cuvier, renferment des figures d'une netteté remarquable, faites par le même auteur, sur les organes de la respiration des *Cymothoadiens* et des *Cloportides*, que nous citerons encore, en parlant de ces familles. C'est aussi dans l'historique que nous ferons de ces organes à l'occasion de chaque famille, que nous rappellerons le travail fondamental de G. R. Tréviranus sur les branchies de l'*Aselle d'eau douce*, et des *Cloportes* et *Porcellions*.

Afin de mettre l'ordre le plus convenable dans l'exposition des faits que doit comprendre ce Mémoire, nous grouperons nos descriptions par Familles, et nous ferons précéder celles de chacun de ces groupes, d'un tableau des Tribus et des Genres de la Famille dont il va être question, et des espèces observées qui se rapportent à ces genres, en suivant, comme nous venons de le dire, la méthode de classification de l'*Histoire naturelle des Crustacés* de M. Milne Edwards. On jugera ainsi d'un coup-d'œil des espèces que nous avons pu étudier.

ORDRE DES ISOPODES.

Section I.

ISOPODES MARCHEURS.
- Première Famille. IDOTÉIDES.
- Deuxième Famille. ASELLOTES.
- Troisième Famille. CLOPORTIDES.

Ire FAMILLE. IDOTÉIDES.

	Genres.	*Espèces observées.*
Ire Tribu. ARPENTEUSES	Arcture.	Id. tricuspide.
IIe Tribu. ID. ORDINAIRES	Idotée. . .	Id. linéaire.
		Id. hectique.
	Anthure.	

1° *Branchies de la famille des Idotéides.*

Les *Idotéides*, dans la méthode adoptée dans l'*Histoire naturelle des Crustacés*, forment la première famille de la première section de l'ordre des *Isopodes*, celle des *Isopodes marcheurs*.

Nous avons étudié les branchies de la seconde tribu, celle des *Idotéides* ordinaires, et plus particulièrement celles des *Idotées*, genre type de cette famille : dans l'*Idotée tricuspide*, dans l'*Idotée linéaire* et dans l'*Idotée hectique* de M. Milne Edwards, qui répondent à l'*Idotea tricuspidata* Latr., au *Stenosoma lineare* Leach. et au *Stenosoma hecticum* Desm.

Cette étude nous a donné un nouvel exemple de l'exactitude parfaite des figures publiées par M. Savigny sur les branchies de ces *Isopodes*, dans le grand ouvrage sur l'Egypte (Pl. 12, fig. 6); cependant nous verrons tout-à-l'heure, qu'il y avait quelques circonstances organiques, qui avaient échappé à ce perspicace investigateur de la nature.

Dans l'*Idotea tricuspidata*, l'appareil branchial est protégé par deux lames operculaires, de substance cornée résistante, joliment ponctuées de petits points noirs, fermant complètement la cavité branchiale. Ce sont comme deux volets ou deux battans d'une porte, qui se joignent sur la ligne médiane et s'ouvrent, en s'écartant l'un de l'autre et de cette ligne. (1)

Chacun de ces volets se compose de deux portions inégales : la première, la plus antérieure, est articulée dans toute la longueur de son côté externe, sous le rebord correspondant du dernier segment abdominal; la seconde portion est beaucoup plus courte et libre par son bord externe; une ligne transversale indique l'articulation de ces deux pièces. On pourrait considérer les deux battans dont nous parlons comme des appendices du segment abdominal qui auraient pris un très grand développement. Si l'on ouvre fortement les deux battans, on voit, entre

(1) Latreille, *Règne animal*, tome IV, page 139.

le côté externe de la deuxième portion de chacun d'eux et le côté correspondant du segment abdominal, un petit appendice styliforme très délié, garni sur ses côtés de cils fins et courts (1). Cette espèce de tige plumeuse est insérée à l'extrémité postérieure de ce qu'on pourrait appeler le gond de la pièce principale, et n'atteint pas tout-à-fait l'extrémité de la seconde pièce.

Dans deux autres Idotées appartenant à deux espèces différentes, le stylet cilié était plus grêle que dans l'*Idotea tricuspidata*, et garni de cils plus rares et plus courts; mais alors le bord correspondant de la portion libre de l'opercule était lui-même cilié. Cette disposition a sans doute pour effet, d'empêcher l'entrée des corps étrangers dans l'intérieur de la cavité respiratoire.

Les opercules surnuméraires que nous venons de décrire recouvrent dix paires de lames branchiales, disposées en deux séries.

Chaque paire, portée sur un pédicule quadrangulaire, se compose d'une lame externe ou recouvrante, et d'une lame recouverte. Ces deux pièces sont à-peu-près d'égale consistance; la lame recouverte peut se développer en vessie.

Les deux premières paires de lames, agréablement marquetées de raies noires très petites, dont quelques-unes sont disposées en étoiles, ont leur bord libre, assez fortement cilié; les cils sont rares dans les suivantes et ne se voient qu'aux lames recouvrantes, le long de leur côté externe.

La lame recouverte de la deuxième paire est munie, chez les mâles (2), d'un stylet filiforme très long, droit et rigide.

Le pédicule de ces lames peut les porter dans l'abduction, jusqu'à leur faire prendre une position verticale relativement à l'axe du corps. On les rencontre dans cette position lorsque l'animal respire activement, ce qui a fait penser qu'elles lui servent

(1) Planche 6, figure 1.

(2) La présence des stylets filiformes coïncide avec l'existence de deux pièces cornées, étroites, allongées, triangulaires, situées sur la ligne médiane, au devant de l'appareil respiratoire, et qui paraissent être des appendices générateurs. Ces appendices n'existent pas dans les individus dépourvus de stylets (les femelles).

d'organes de natation. Leur peu de consistance nous empêche de leur attribuer cet usage, comme rames. Ces lames renferment encore, après la mort, des restes du sang blanc qui circulait dans leur lacune, à l'instant où l'animal a péri. L'un de nous a vu, dans quelques individus, les lames recouvertes des deux dernières paires, marquées transversalement de stries très fines, serrées les unes contre les autres d'une manière assez régulière.

L'appareil branchial, dans l'*Idotée linéaire* et dans l'*Idotée hectique*, nous a montré absolument la même structure: seulement les lames branchiales sont ici plus étroites. L'opercule corné présente à sa face interne, entre sa portion libre et le bord correspondant du segment abdominal, le même petit stylet cilié que nous avons vu dans les Idotées; mais ce stylet est encore plus grêle et plus court; le côté correspondant de la pièce operculaire est visiblement cilié. Le stylet qui accompagne la lame recouverte de la seconde paire, chez les mâles, est plus long que dans les Idotées: il dépasse la longueur de la lame elle-même. (1)

Dans un ouvrage sur le développement de plusieurs animaux (2), M. Rathke a étudié, entre autres, l'appareil branchial de l'*Idotea Basteri*. On y voit que les deux opercules branchiaux qui tiennent au dernier anneau de l'abdomen, n'ont encore que de faibles dimensions vers la fin de la vie embryonnaire, et ne recouvrent pas l'appareil branchial. Les branchies jusque-là restent à découvert. Les lames branchiales présentent cependant la même forme que chez l'adulte.

(1) Sur trois Idotées hectiques, il y avait deux femelles chez lesquelles il n'existait ni stylets filiformes, ni appendices cornés en avant de l'appareil respiratoire. Dans le troisième, ainsi que dans un exemplaire de l'*Idot. linearis*, ces deux organes existaient simultanément.

(2) *Zur Morphologie, Reisebemerkungen aus Tamien* von H. Rathke, Riga und Leipzig, 1837, Pl. 2, fig. 7-12, p. 56. Nous n'avons pas étudié l'appareil branchial du genre *Anthure*. La double lame operculaire décrite dans ce genre et tenant à un seul pédoncule rudimentaire, nous semble répondre à la première paire de lames branchiales du plan général de composition de l'appareil branchial des Isopodes; de sorte que, dans ce genre, il n'en resterait que quatre paires par série pour la respiration. C'est ici une simple présomption de notre part, que de observations viendront affirmer ou infirmer.

II^e^ Famille. ASELLOTES.

	Genres.	*Espèces observées.*
I^re^ Tribu. Hétéropodes.	Apseude.	
	Rhoé.	
	Tanaïs	
II^e^ Tribu. Homopodes.	Limnorie.	
	Aselle.	L'Aselle d'eau douce.
	Jœra.	
	Jœridine.	
	Oniscode.	

2° *Branchies de la famille des Asellotes.*

L'appareil branchial est recouvert tout entier par un grand opercule, composé de deux pièces inégales, et porté sur une pièce basilaire très étroite et très courte.

Les lames branchiales sont des feuillets minces ou des vésicules. Sous le grand opercule (l'animal étant placé sur le dos), se voit d'abord une vésicule allongée, petite, attachée à son angle interne. Cette première paire de lames branchiales, operculaire et vésiculeuse, est suivie de deux autres paires, dont la lame recouvrante nous a paru, dans la plupart des individus, un simple feuillet mince et comprimé, et dont la lame recouverte était seule dilatée en vessie; cependant nous avons rencontré plusieurs individus chez lesquels les lames recouvrantes étaient dilatées en vessie, tout aussi fortement que les vésicules proprement dites. On voyait alors, derrière la grande lame operculaire, cinq vésicules de chaque coté, disposées irrégulièrement par suite de leur distension.

Les deux paires de lames branchiales qui seraient nécessaires pour compléter le nombre normal de dix, semblent remplacées par un appareil rudimentaire déjà indiqué vaguement dans la figure 2 de l'Aselle d'eau douce du *Dictionnaire des Sciences*

naturelles, cet appareil dont l'un de nous, M. Lereboullet, a dessiné avec soin tous les détails, est situé au devant des deux grands opercules, sur la ligne médiane. Il se compose, de chaque côté, en avant, d'une lame ovale, à bords ciliés, un peu concave à sa face dorsale, insérée par son extrémité la plus étroite à l'angle externe d'une pièce basilaire, carrée. Cette lame peut être regardée comme répondant à la première paire de lames branchiales.

La seconde paire est représentée par un petit appareil plus compliqué, exactement recouvert et protégé par la lame ovale : il se compose d'un grand pédicule quadrilatère, arrondi par son côté externe, et dont le bord libre et postérieur supporte deux pièces distinctes; l'une externe, bi-articulée, dont le dernier article est aplati et à bords ciliés, tient lieu de lame operculaire ou recouvrante; l'autre pièce, articulée à l'angle interne de l'article basilaire commun, a la forme d'une vésicule irrégulièrement ovalaire, et présente, tout près de son articulation, un petit appendice styliforme, recourbé en avant le long du bord interne de la pièce basilaire.

Cet appendice styliforme rappelle exactement les appendices analogues que supporte la lame recouverte dans plusieurs *Isopodes*. C'est une raison de plus pour regarder la pièce avec laquelle il est en connexion, comme représentant une lame branchiale vésiculeuse ou respirante.

Le curieux appareil que nous venons de décrire n'existe que chez les mâles, ainsi que l'avait bien vu Tréviranus. Ses usages ne se rattachent plus à la respiration : il paraît évidemment destiné à protéger les organes copulateurs et à les diriger dans l'acte de l'accouplement.

Chez les femelles(1), on ne trouve, en avant des grandes lames operculaires, que deux plaques minces, arrondies, un peu ovalaires, à bords garnis de cils très longs, inclinées l'une vers l'autre, et chevauchant le long de la ligne médiane.

(1) Le nombre des femelles serait-il moins considérable que celui des mâles dans le genre Aselle? Sur soixante-dix individus que nous avons examinés, il y avait cinquante-cinq mâles et seulement quinze femelles.

Ajoutons, pour compléter la description de l'appareil branchial de l'*Aselle d'eau douce*, que ses lames branchiales respirantes, vues au microscope, ne montrent aucun réseau, mais un dépôt sanguin, inégalement répandu dans leur poche, et lui donnant une apparence marbrée.

G. R. Tréviranus (1) avait reconnu l'appareil rudimentaire de l'Aselle d'eau douce; mais sa description est incomplete, et ses figures n'ont pas toute l'exactitude desirable.

Le même auteur décrit, au contraire, avec une grande fidélité, les trois paires de lames branchiales, qui composent l'appareil respiratoire proprement dit.

Il paraîtrait, d'après une description publiée, dans la *Revue philosophique d'Edimbourg*, par J. Goldstream (2), sur l'organisation et les mœurs de la *Limnorie térébrante* Léach., que le nombre des lames branchiales est également de trois paires par série, se recouvrant comme des tuiles. Chaque paire de lames est attachée à un pédicule commun. La lame recouvrante est ovale, la lame recouverte est oblongue, rectangulaire; leur bord est garni de soies.

Ce nombre de paires de lames branchiales, semblable dans le genre *Limnorie* et dans le genre *Aselle*, confirme leur rapprochement, adopté par M. Milne Edwards (*Histoire naturelle des Crustacés*, tome III).

(1) *Vermischte Schriften*, t. I, Pl. 10, fig. 56, et Pl. 12, fig. 67, 68 et 69, p. 70, 74 et 75.

(2) *The Edinburgh New. Philos. Journ.* volume XVI, Planche 6, figure 1.

III^e^ Famille. CLOPORTIDES.

		Genres.	*Espèces observées.*
I^re^ Tribu Maritimes (1). . . .		Ligie.	*Ligia océanique* Fab. *Ligie de Gaudichaud.*
		Ligidie.	*Ligidium Persoonii* Brandt. (*Oniscus agilis* Persoon.)
II^e^ Tribu Terrestres.	*Division des Porcellionides.*	Cloporte. .	*Oniscus murarius,*
		Philoscie .	*Philoscia muscorum* Desm.
		Porcellion.	*Porcellio scaber* Latr. — *pictus* Brandt. — *armadilloides* Lereb. — *trivitatus* Lereb.
	Division des Armadilles.	Deto.	
		Trichonisque.	
		Platyarthre.	
		Armadille.	
		Diploscoque.	
		Armadillidie.	*Arm. Zenekeri* Brandt.
	Division des Tylosiens.	Tylos. . .	*T. Latreillii* Aud.

3. *Organes de respiration des Cloportides.*

A. Partie historique.

Ce n'est que depuis peu d'années que les anatomistes et les zoologistes sont sur les traces des organes de respiration d'une partie des *Cloportides terrestres*, c'est-à-dire des Cloportes, des Porcellions et des Armadilles; mais ils leur ont donné deux déterminations bien différentes. Selon Latreille, qui l'annonçait à l'Institut en 1814, les Cloportes respirent par une petite partie

(1) Cette dénomination ne peut s'appliquer au genre *Ligidie*, qui comprend une seule espèce, *Ligidium Persoonii* Brandt, laquelle vit dans l'intérieur des terres.

jaunâtre, percée d'un trou et contenant à l'intérieur, de petits filamens. Il démontra cet organe dans les quatre premières écailles ou lames sous-caudales de ces animaux. (1)

Au contraire, selon G. R. Tréviranus, qui publiait le résultat de ses recherches en 1816, deux années après celles de Latreille, ces deux premières paires de lames sous-caudales font partie de l'appareil génital, et non de l'appareil respiratoire (2). Celui-ci consiste, suivant cet auteur célèbre, dans les trois dernières paires de lames sous-caudales, ou sous-abdominales, qui protègent et recouvrent autant de sacs membraneux dans lesquels le sang doit s'épancher pour la respiration. Du moins, Tréviranus tire-t-il cette dernière conclusion d'une observation négative : il n'avait pu y découvrir de vaisseaux.

M. Brandt, dans la *Zoologie médicale* (3), admet, sans restriction, la description de G. R. Tréviranus.

Meckel et MM. Carus et Rod. Wagner, dans leurs *Traités généraux d'anatomie comparée*, reproduisent, en citant son auteur, la même détermination, sans rien y ajouter pour la développer. Ils ne font pas même mention de celle de Latreille, qui valait cependant bien la peine d'être discutée, et qu'ils devaient connaître, au moins par le peu de mots que ce savant entomologiste avait imprimés, en 1817, dans la première édition du *Règne animal* de Cuvier. Il y est dit (tome III, p. 58), à la vérité au sujet des Armadilles seulement : « Les écailles su-« périeures du dessous de la queue ont une rangée de petits « trous qui donnent passage à l'air. »

Latreille développait encore cette manière de voir et l'étendait aux Cloportides terrestres, dans la seconde édition du même ouvrage, qui est de 1829. Il y écrivait que, chez ces animaux, « les premiers feuillets du dessous de la queue offrent une ran-« gée de petits trous où l'air pénètre et se porte aux organes de « la respiration qui y sont renfermés. » (4)

(1) *Histoire des progrès des Sciences naturelles*, par Cuvier, Paris, 1828, t. III, p. 319.

(2) *Vermischte Schriften*, von G. R. Treviranus und L. Chr. Treviranus, Goettingen, 1816, tome I, in-4.

(3) *Medizinische Zoologie*, Berlin, 1833, in-4.

(4) *Règne animal*, 1829, tome IV pag. 141.

Aucun savant, que je sache, n'avait rien publié sur cette manière de voir de Latreille, avant la communication faite à ce sujet le 27 avril 1839, à la Société Philomatique, par M. Milne Edwards (1). Il y annonça qu'il avait constaté, par l'observation directe, la détermination due à Latreille.

Le même savant décrivait, dans cette communication, la structure singulière des organes de respiration des *Tylos*, qu'on ne connaissait encore que par une figure publiée par M. Savigny, dans l'ouvrage sur l'Égypte.

Tel était l'état de la science, lorsque nous avons entrepris, au mois de septembre et d'octobre de l'année dernière, de découvrir, par de nouvelles recherches, de quel côté était la vérité, et si elle ne se trouverait pas dans l'une ou dans l'autre opinion?

Nous ne nous sommes pas bornés à des recherches purement anatomiques. Nous avons observé un grand nombre de Cloportes et de Porcellions, et un moindre nombre d'Armadilles, dans l'état de vie, ayant une circulation et une respiration plus ou moins actives, dont nous avons étudié les phénomènes.

Les résultats de ces premières recherches ont été réunis, ainsi que nous l'avons déjà dit, dans une Note lue, par l'un de nous, à la Société du Muséum d'histoire naturelle de Strasbourg, dans la séance du 27 novembre 1839. (2)

Depuis lors, M. Milne Edwards a fait paraître, au commencement de cette année, dans la 90e livraison du *Règne animal* de G. Cuvier, Pl. 71 des Crustacés, de très belles figures des deux premières lames branchiales operculaires de la femelle du *Porcellion rude*, montrant le corps blanc qu'elles renferment. Ces organes sont décrits plus en détail dans le texte du tome III de l'*Histoire naturelle des Crustacés*, offert à l'Académie des Sciences le 27 janvier 1840. Cette description, relativement aux corps blancs, est d'ailleurs conforme à la communication qui avait été

(1) *L'Institut*, 1839, n. 280, page 152.

(2) Voir l'*Institut* du 19 décembre 1839, p. 449 et 450, et notre fig. 8, présentée à la même Société, en même temps que la note.

faite à leur sujet, à la Société Philomatique, au mois d'avril 1839, communication que nous avons déjà citée.

Le desir bien naturel que nous devions avoir de multiplier nos recherches, afin de les perfectionner; l'intérêt qu'elles nous avaient présenté pour tâcher de découvrir la vérité sur le siège et la nature d'un organe aussi essentiel que celui de la respiration; le désaccord sur ces deux points entre des autorités qui méritent toute confiance, a été pour nous un motif de redoubler de soins pour parvenir à lever, s'il était possible, tous les doutes à cet égard. Nous ne nous flattons pas cependant d'y être parvenus complètement.

Cet exemple de l'imperfection de nos connaissances, ou de leur incertitude, sur la manière dont respire un animal aussi commun que le Porcellion et le Cloporte, prouvera, parmi tant d'autres, combien de questions restent encore indécises sur la science de la vie, même pour les animaux les plus vulgaires.

B. Partie descriptive.

Cette famille comprend les *Isopodes* les plus terrestres, ou, si l'on veut, les moins aquatiques. Il y en a même un certain nombre (les *Cloportes*, les *Porcellions*, les *Armadilles*, etc.), qui périssent au bout d'un temps plus ou moins court, qui ne se mesure pas même par jours, mais par heures, lorsqu'ils sont entièrement submergés. Ils meurent aussi, à la vérité, très vite dans un air sec, et d'autant plus promptement, qu'ils sont exposés, en même temps, à l'action de la lumière solaire.

On conçoit l'intérêt que doit avoir, pour la physiologie de la respiration, l'examen détaillé des organes qui remplissent cette fonction importante de la vie chez ces animaux.

Ces organes, qui ne peuvent respirer que l'air humide, sont-ils des branchies, conformément au plan général de la classe, qui est essentiellement aquatique? Ce serait un second exemple, assez difficile à comprendre et à expliquer, de Crustacés qui ne peuvent vivre dans l'eau, quoique avec des organes de respiration aquatique : je veux parler, pour le premier, des *Décapodes*

brachyures de la tribu des *Gécarciniens*, appelés vulgairement *Crabes de terre.* (1)

Ou bien ces animaux respireraient-ils par des poumons ou par des trachées, ou par quelque organe de respiration aérienne, arrangé sur un plan nouveau, qui bornerait la faculté de respirer l'air en nature, à la condition qu'il serait chargé d'humidité?

Nous verrons tout-à-l'heure que l'ensemble de l'appareil respiratoire n'est pas différent, dans cette famille, de celui des autres Isopodes, et que, si le fond de la structure paraît changé, pour plusieurs genres, dans quelques parties seulement de cet appareil, ce changement n'a pas lieu dans l'un des genres les plus terrestres, le genre *Cloporte.*

En général, l'appareil respiratoire des *Cloportides* se compose de lames branchiales operculaires et vésiculeuses. Mais ici, les lames protectrices sont plus nombreuses que les lames vésiculeuses, comme chez les Sphéromides?

La *Ligie océanique* en a cinq pour chaque série. La première, dans les femelles, est cordiforme, les suivantes rhomboïdales, à bord externe arrondi, à bord interne coupé en ligne droite; la dernière approche de la forme triangulaire par l'allongement de son angle interne et postérieur. Ces lames vont en augmentant de la première à la troisième, qui est la plus grande; la quatrième et la cinquième sont un peu moindres. La première lame a un petit appendice extérieur; la seconde un lobule externe qui en est profondément séparé. Ces pièces operculaires sont toutes articulées à l'extrémité externe d'une côte qui forme la portion inférieure du segment abdominal correspondant. Elles exécutent, sur ce point, des mouvemens de bascule en dehors et en avant, pour permettre l'accès de l'eau.

L'extrémité interne de la côte est libre et munie d'une petite apophyse ou crochet triangulaire dont la pointe se dirige en arrière et augmente d'étendue de la première côte à la cinquième.

Les mâles (2) présentent quelque différence que nous croyons devoir noter. Les lames ont leur angle postérieur interne un

(1) *Histoire naturelle des Crustacés*, par M. Milne Edwards, tome 2, page 16, Paris, 1837.

(2) Sur seize individus que nous avons observés, nous n'avons trouvé que deux mâles.

peu plus prononcé; le crochet interne de la côte est plus saillant, plus long, surtout pour la quatrième et la cinquième lame. Mais ce qui caractérise surtout les mâles, c'est l'existence d'un appendice styliforme long et grêle, articulé, à angle droit, à l'extrémité d'une pièce arrondie qui remplace la côte appartenant à la seconde lame. Ce stylet (1), très étroit, porté directement en arrière, atteint le niveau du bord postérieur de la quatrième lame operculaire; son extrémité libre est aplatie et légèrement dilatée : elle présente, sur l'un de ses côtés, quelques dentelures très fines. Ce stylet est analogue, comme on voit, pour sa disposition et ses rapports, à celui que nous avons décrit dans les genres précédens; il caractérise nettement les mâles.

Les deux premières lames operculaires ne recouvrent pas de vésicule branchiale développée. Il n'y a qu'une légère expansion membraneuse, un peu moins prononcée dans le premier segment abdominal que dans le second. Dans plusieurs exemplaires, cette expansion du deuxième segment abdominal ressemblait même à une petite vésicule.

Mais chacune des trois dernières lames operculaires recouvre une vésicule branchiale aplatie, dont la surface montre des élévations et des enfoncemens irréguliers, correspondans aux canaux qu'interceptent les parois internes de ces vésicules, et que l'on trouve plus ou moins remplis de fluide nourricier. Leur aspect, vu à la loupe, est entièrement analogue à celui des lames branchiales des *Limules* ou des *Crabes*.

L'un de nous, M. Lereboullet, a eu l'heureuse occasion d'étudier les branchies de la Ligie des *Hypnes* (*Ligidium Personii* Brandt, *Ligia hypnorum* Latr., *Oniscus agilis* Persoon), dans deux individus seulement, un mâle et une femelle, trouvés par lui, au mois de juin dernier, dans la forêt de Haguenau, parmi des touffes très humides de l'*Hypnum tamaricinum*.

Il nous intéressait d'autant plus de connaître les branchies de cette espèce, qu'elle appartient à un groupe d'animaux maritimes qui vivent parmi les rochers des bords de la mer; tandis que la *Ligidie des Hypnes* se tient dans l'intérieur des terres

(1) Pl. 6, fig. 4, *c*.

dans les endroits humides, comme les Cloportes et les Porcellions, dont elle paraît avoir les habitudes. Nous allons voir que, malgré cette différence de séjour, il existe les plus grands rapports entre les organes respiratoires de la *Lygidie* et ceux de la *Ligidie océanique* dont on vient de lire la description.

La petitesse de ces organes, et leur transparence, en ont rendu l'observation difficile; cependant nous sommes parvenus à les voir assez bien pour les dessiner, après les avoir séparés du corps.

Les lames operculaires, au nombre de cinq de chaque côté, se trouvaient, dans nos deux individus, dans un état d'abduction complet, en sorte que leur côté interne était devenu postérieur, à la vérité pour les trois dernières lames seulement. Nous avons représenté la quatrième et la cinquième lame dans cette position (Pl. 6, fig. 9 et 10).

On voit, par nos figures, que la première lame a la forme d'un triangle, à sommet mousse, postérieur; la deuxième, allongée transversalement, est extrêmement mince, transparente, et porte à son bord interne quelques cils très courts; la troisième et les suivantes ont aussi une forme à-peu-près rhomboïdale.

Ces lames sont articulées, par l'angle antérieur de leur bord externe, à une côte analogue à celle dont nous avons parlé plus haut. Elles se meuvent avec la plus grande facilité sur cette articulation, et peuvent éprouver un écartement considérable. L'apophyse interne de cette côte est proportionnellement plus développée que dans la *Ligie océanique*, et forme même une véritable lame accessoire qui acquiert un assez grand développement dans la première pièce operculaire (fig. 5, *c*). Cette lame accessoire se termine par une soie; elle est destinée à compléter en quelque sorte la lame principale, qui aurait été trop petite pour protéger la vésicule sus-jacente.

M. Lereboullet a parfaitement distingué, dans les lames dont nous parlons, les canaux qui donnent passage au fluide nourricier : ils règnent le long des bords antérieur et postérieur, et sembleraient même communiquer par un réseau très fin, mais assez distinct. Il nomme, par analogie avec les courans que nous

avons vus sur le vivant chez les *Cloportes* et les *Porcellions*, canal afférent, celui qui règne le long du bord antérieur, et canal efférent celui qui lui est opposé. Le reste de la lame est occupé par une matière granuleuse.

Le bord de toutes ces lames est renforcé par un filet très fin, de nature cornée; des soies courtes et peu nombreuses garnissent le bord interne.

Les lames operculaires du mâle sont toutes plus allongées; la côte de la deuxième lame supporte, comme dans la Ligie océanique, un stylet génital, mais beaucoup plus développé à proportion, plus élargi à son extrémité et recourbé en dehors. Ce stylet dépasse le dernier segment abdominal.

De même que dans la Ligie océanique, les deux premières lames ne recouvrent pas de vésicules, mais la côte supporte une expansion membraneuse proportionnellement très développée. Les vésicules branchiales, au nombre de trois de chaque côté, sont grandes, épaisses, remplies de matière granuleuse; leur bord postérieur est échancré, et présente en dedans une pointe mousse. Ces vésicules sont presque aussi développées que les opercules qui les protègent.

Les autres genres de cette famille que nous avons observés, les Cloportes, les Philoscies, les Porcellions et les Armadilles, n'ont de même que trois vésicules branchiales développées pour cinq lames operculaires. Le plus grand nombre normal, celui de dix lames branchiales, operculaires et vésiculeuses, n'existe dans aucun de ces genres.

Nous verrons d'ailleurs tout-à-l'heure, ainsi que nous l'avons annoncé dans nos généralités, que les lames operculaires doivent être considérées comme servant encore à la respiration.

1° *Lames branchiales operculaires des Cloportes.*—Les Cloportes proprement dits ont dix lames branchiales operculaires en double série, attachées sous les derniers anneaux du corps, à l'extrémité externe d'un article basilaire, sorte de petite côte dont l'extrémité interne est munie d'une apophyse saillante dirigée en arrière. Ces lames sont extrêmement minces, transparentes, et paraissent avoir, au moins dans leur feuillet intérieur

ou externe, la consistance du parchemin. Les cinq lames d'une série se recouvrent comme des tuiles.

Leur forme varie de la première à la cinquième. Larges à leur base, qui est en avant, elles se prolongent en arrière, en pointe aiguë par leurs bords interne et postérieur. Cette pointe est très saillante dans les deux premières lames des Cloportes femelles. Elle est encore saillante et obtuse dans la troisième et la quatrième. Elle est aiguë et peu saillante, ce n'est plus que l'angle du rhombe que forme la lame, dans la cinquième.

Dans les mâles, ces lames sont beaucoup plus allongées; leur angle postérieur surtout est long est très aigu.

La portion inférieure du segment abdominal, ou la côte, à l'extrémité externe de laquelle est articulée chaque lame, se termine en dedans par une petite apophyse dirigée en arrière.

Les deux premières lames semblent composées de deux portions : l'une interne, triangulaire, ou plutôt en croissant; l'autre externe, formant un segment de cercle. Ces deux portions se distinguent encore dans les trois plaques suivantes, mais elles ont changé de forme : l'interne s'élargit dans la troisième, et prend la forme rhomboïdale dans la quatrième, et surtout dans la cinquième; l'externe conserve sa forme arrondie, mais elle ne semble plus qu'un appendice de l'autre.

La forme que nous venons de décrire est celle de chaque plaque vue du côté supérieur ou interne; elle est un peu différente du côté inférieur ou externe.

En général, chaque lame a évidemment deux feuillets, un supérieur et interne, très mince et seulement membraneux; l'autre inférieur et externe, beaucoup plus consistant, ainsi que nous l'avons déjà dit. Ces deux feuillets forment le sac externe de la lame, en continuité avec les tégumens. Il est à supposer qu'elle en renferme un autre formant la lacune dans laquelle s'épanche une partie du fluide nourricier pour la respiration, et dont les parois sont en rapport de continuité avec celles des réservoirs du fluide nourricier. C'est ici une organisation que nous concevons *à priori*, mais que nous ne sommes pas encore parvenus à démontrer.

On peut séparer l'un de l'autre les deux feuillets évidens de

chaque lame, et étudier ainsi leur disposition : on voit alors que le feuillet supérieur ou interne, d'une minceur extrême, présente cependant encore une certaine résistance; attaché, d'une part, au bord interne de la lame, il se continue, en dehors, sur la portion externe et arrondie de la lame; puis, se repliant sur lui-même, il vient s'attacher au bord externe correspondant du feuillet inférieur. Il résulte de cette disposition, que la portion externe de chaque lame, celle qui forme un segment de cercle, est entièrement et uniquement constituée par la membrane délicate qui forme le feuillet viscéral; c'est pour cette raison que cette portion externe est beaucoup plus mince, plus transparente que le reste de la lame. Il est à supposer que c'est principalement dans cette portion externe que se fait l'hématose; on y distingue une apparence de réseau très fin, formé de traits en relief qui affectent une direction plus ou moins rayonnée.

Enfin, les lames branchiales operculaires, que nous décrivons en détail, sont soutenues et bordées par un cercle de substance plus consistante, analogue à celui que l'un de nous a décrit chez les Limules.

Leur bord est garni extérieurement d'une série de quelques soies, qui, sous certains aspects, produisent à l'endroit de leur insertion une apparence de trous. Nous avions même pensé, dans le cours de nos recherches, que c'était cette apparence qui avait fait illusion à Latreille sur l'existence de cette série d'orifices respirateurs qu'il indique dans les Cloportides, qui existent, en effet, dans les Porcellions et les Armadilles, mais que l'on n'observe pas dans les Cloportes propres.

Dans les mâles, les deux premières paires de lames operculaires ont des caractères particuliers d'organisation qui sont relatifs aux fonctions de la génération. Le stylet génital postérieur tient, comme à l'ordinaire, à la deuxième côte, dont il n'est réellement qu'un appendice.

2° *Vésicules branchiales.*—Les trois vésicules branchiales sont protégées par les trois dernières lames operculaires. Elles sont attachées à une portion du bord inférieur de l'article basilaire de ces lames, et à l'apophyse interne de cet article. Ces vésicules sont loin d'avoir les dimensions des lames operculaires.

Nous ne les regardons pas, avec Tréviranus, comme le siège unique de la respiration, et nous pensons que l'action de l'élément ambiant sur le fluide nourricier a lieu aussi dans toutes les lames branchiales operculaires, dont la lame interne ou supérieure est très mince, et dans lesquelles il se fait une circulation très active. La transparence et l'extrême minceur des lames operculaires permet d'observer les mouvemens rapides des globules sanguins dans la grande lacune qu'elles interceptent. Ces globules semblent y tomber comme des grêlons. Nous reviendrons sur cette circulation après avoir décrit les organes de respiration des Philoscies, des Porcellions et des Armadilles.

Appareil branchial des Philoscies. — L'appareil branchial des Philoscies tient en quelque sorte le milieu entre celui des Cloportes que nous venons de décrire, et celui des Porcellions et des Armadilles. Comme dans les Cloportes, les lames operculaires des Philoscies sont privées de ces corps blancs si remarquables, que l'on rencontre dans les deux autres genres; tandis que, par la forme des lames operculaires et par leur consistance, ces animaux se rapprochent plutôt des Porcellions que des Cloportes. Un fait digne de remarque, c'est que les rapports tirés des organes respiratoires qui lient les Philoscies aux Cloportes et aux Porcellions, se retrouvent dans les caractères extérieurs de ce genre. On sait, en effet, que les Philoscies ont, comme les Cloportes, huit articles aux antennes, tandis que leur corps rugueux et leur *habitus* tout entier les rapproche des Porcellions.

Il existe, dans les *Philoscies*, cinq lames operculaires en deux séries, se recouvrant régulièrement les unes les autres. Leur forme générale est celle d'un rhombe arrondi par son côté externe, ayant son angle interne et postérieur à peine prolongé en pointe. Les premières et dernières lames diffèrent des autres: la première de chaque série est plus petite et a ses côtés plus arrondis; la dernière affecte la forme d'un ovale dont le petit bout est très allongée et se dirige en arrière. Le bord postérieur de ces lames operculaires est garni de quelques poils très courts et très espacés.

Ces lames ne présentent, en dehors, aucune trace des lobes

que nous avons vus dans les Cloportes; leur consistance est, à proportion, plus grande que dans ces derniers animaux.

Chacune des trois lames postérieures protège une vésicule assez développée, très distendue pendant la vie, quand on observe l'animal sous l'eau. Il n'existe aux deux lames antérieures aucune trace de vésicule. (1)

Les mâles ont leurs lames sous-abdominales plus allongées, par suite du prolongement de leur angle postérieur interne. Les stylets générateurs sont disposés comme chez les Cloportes et les Porcellions.

Appareil de la respiration dans les Porcellions et les Armadilles. — Dans les Porcellions et les Armadilles, les lames branchiales operculaires, également au nombre de cinq par série, nous ont paru généralement plus larges et moins longues que celles des Cloportes. Elles sont de même partagées, mais d'une manière moins tranchée, en une portion interne triangulaire, et en une portion externe arrondie, formant comme un talon, du moins dans les deux premières lames.

Corps blancs des deux premières paires de lames operculaires. — Ces deux lames, au moins dans les deux genres en question, renferment entre leurs deux feuillets un corps ayant l'apparence générale blanc de lait, quelquefois même un peu jaunâtre. Ce corps se voit particulièrement dans la partie externe ou le talon de chacune de ces lames (2); il s'étend un peu au-delà en se rapprochant de la ligne médiane, et en se déployant de ce côté et en avant. Logé dans une fossette du feuillet externe ou inférieur, qui est plus consistant et comme corné, il produit dans la face externe ou aérienne de cette lame, une bosselure à l'endroit correspondant à la fossette.

Du côté interne ou supérieur de la même lame, le corps blanc

(1) Malgré l'extrême petitesse de ces animaux, nous avons très bien vu le mouvement des branchies, sous un grossissement de 50 diamètres. Les lames operculaires se séparent les unes des autres et de la ligne médiane, comme dans les Cloportes et les Porcellions. Pendant ce mouvement d'abduction, on voit les vésicules, distendus par le fluide nourricier, suivre ce même mouvement. La première lame operculaire ne nous a pas paru se mouvoir, et la seconde n'éprouvait qu'un écartement très faible.

(2) Planche 6, figure 12, *c*, *d*.

est recouvert par un feuillet mou et simplement membraneux. C'est surtout de ce côté que l'on doit étudier la structure de cet organe.

Un peu en deçà du bord de la lame branchiale, à-peu-près à la partie moyenne de la longueur transversale du corps blanc, se voit une fossette ovale (1), qui paraît comme une boutonnière. Observée au microscope, en posant la lame un peu de champ, cette fossette montre, dans le fond de sa cavité, quelques points noirs, qui ont paru à l'un de nous comme les embouchures des canaux que ce corps semblerait intercepter. Ce ne sont peut-être que des pores, irréguliers pour le nombre et la position, de la substance spongieuse de ce corps arborescent. Ses derniers ramuscules, qui se voient dans sa circonférence, prennent ici, par leur couleur argentée, l'apparence de fines trachées. (2)

On dirait que le feuillet membraneux des deux premières lames operculaires, se replie et se divise dans la lacune de cette lame, pour constituer ce singulier organe. Nous l'avons découvert, par exception, dans les cinq paires de lames operculaires d'une espèce de Porcellion (3) que nous croyons nouvelle, et qui a la faculté de se rouler complètement en boule, comme les Armadilles. Tout récemment, l'un de nous, M. Lereboullet, vient de rencontrer la même disposition dans une autre espèce du même genre qui se distingue par trois bandes de couleur pâle qui règnent le long du dos. (4)

Cette observation prouve du moins, une identité de fonction des cinq lames operculaires ; elle démontre qu'on aurait également tort de séparer, sous ce rapport, les trois dernières des deux premières, et réciproquement.

La véritable organisation des corps blancs est difficile à découvrir, et, malgré toutes les peines que nous nous sommes

(1) Planche 6, figure 14, *a*.

(2) Planche 6, figure 14, *c*.

(3) Planche 6, figure 13, *c*, *d*, *e*, *f*, *g*.

(4) M. Lereboullet, qui doit décrire en détail ces deux espèces, proposera de désigner la première sous celui de *Porcellion armadilloïde* (*P. armadilloïdes*), et la seconde sous celui de *Porcellion à trois bandes* (*P. trivittatus*).

données pour y parvenir, nous ne sommes pas convaincus que notre manière de voir soit le dernier mot de la science.

Il a paru à l'un de nous, M. Duvernoy, une sorte de trachée spongieuse circonscrite, ayant pour fonction d'absorber l'air chargé d'humidité et de le mettre en contact avec le fluide nourricier, sans cependant que cette fonction lui soit exclusive ; car le fluide nourricier qui circule dans la lacune dans laquelle s'avancent les ramifications du corps blanc, peut encore subir l'action du fluide ambiant (comme cela a lieu dans la plupart des cas et dans les trois dernières lames branchiales) à travers le feuillet membraneux de leur face supérieure. Ne pourrait-on pas comparer, en quelque sorte, ce corps blanc, du moins sous le rapport de la faculté absorbante de l'humidité, avec ces modifications, dans le même but fonctionnel, qui ont été décrites dans la membrane qui tapisse la cavité branchiale de certains Brachyures terrestres?

M. Lereboullet, qui a étudié ce corps avec beaucoup de soin, postérieurement à nos observations communes, pense qu'il sert à diviser le sang qui parvient dans la lacune, bien entendu que l'action du fluide respirable a lieu toujours à travers la paroi supérieure de cette lacune. Voici ce qu'il m'écrivait à ce sujet, le 31 mai dernier :

« J'en viens maintenant aux recherches longues, minutieuses « et fatigantes que j'ai faites sur la disposition et la structure « de ces prétendues poches aériennes.

« Le Porcellion armadilloïde, qui possède des corps blancs à « toutes ses lames, présente une disposition qui peut mettre sur « la voie. Les corps blancs de la quatrième et de la cinquième « paires sont petits et pour ainsi dire rudimentaires. Examinés « au microscope, on voit qu'ils sont constitués par une mem- « brane très fine, formant une sorte de sac dont les bords sont « attachés aux deux feuillets dont se compose la lame. Ayant sé- « paré ces deux feuillets, comme on séparerait deux feuilles de « papier collées l'une contre l'autre, j'ai mis le corps blanc à nu, « et j'ai pu en examiner les ramifications à l'aide d'un grossisse- « ment de 240 diamètres. Je me suis servi, pour cette recherche, « d'un excellent microscope de Pistor, que M. le professeur

« Widler a bien voulu mettre à ma disposition. Je me suis assuré « que les ramifications du corps blanc n'étaient nullement tu- « buleuses ; elles n'offraient aucune trace de cette ligne ombrée. « qui sert à reconnaître les vaisseaux les plus fins, mais elles « présentaient tout-à-fait l'aspect de membranes laciniées. Je « puis citer ici le témoignage de M. Widler, qui a beaucoup « d'habitude dans ces sortes de recherches ; après un examen « attentif, il est resté convaincu que ces ramifications étaient « purement membraneuses.

« Dans les lames antérieures, qui ont leur corps blanc plus « développé, le bord externe du feuillet viscéral ou supérieur « n'est pas de niveau avec le bord externe de la lame, il existe « entre les deux un intervalle occupé par une partie du corps « blanc. Celui-ci est donc à découvert dans cet endroit. En l'exa- « minant avec attention (à un grossissement de 50 diamètres), « on voit qu'il présente des plis transverses qui rappellent les « vésicules plissées des Sphérômes ; ces plis paraissent se pro- « longer dans l'intérieur de l'espace compris entre les deux « feuillets ; mais ici, les parois de la membrane plissée sont hé- « rissées de ramifications membraneuses d'une ténuité extrême.

« Dans le *Porcellio scaber*, le corps blanc est entièrement « caché entre les deux feuillets de la lame. Pour chercher à en « reconnaître la structure, j'ai fait un grand nombre de coupes « dans le sens de l'épaisseur de la lame, et j'ai examiné ces « coupes sous leurs deux faces. J'ai vu que le feuillet membra- « neux ou viscéral, arrivé au bord de la boutonnière, se replie « sur lui-même, se prolonge jusqu'au-delà de la moitié du corps « blanc ; puis, remontant vers le feuillet corné, atteint le bord « de ce feuillet et se confond avec ce bord libre. Il en résulte « une sorte de poche dont les parois sont recouvertes par les « nombreux appendices laciniés dont j'ai parlé plus haut. Les « trous qu'a figurés M. Milne Edwards ne sont pas toujours ar- « rondis, souvent ils sont plus ou moins ovales ou linéaires, et « alors il n'y a pas bien loin de cette disposition à celle qui se « voit dans le Porcellion armadilloïde. Pour exprimer clairement « ma pensée au sujet de ces organes, je crois que les trous que « l'on aperçoit au fond de la boutonnière, dans le Porcellion

« rude, sont produits par le *froncement* de la membrane ren-
« trée qui forme le corps spongieux : cette explication s'applique
« du moins au Porcellion armadilloïde, dans lequel, au lieu de
« trous, on voit distinctement les rainures qui séparent les plis
« les uns des autres. Je pense donc que les corps blancs sont
« constitués par des poches membraneuses formées ainsi que je
« viens de le dire, et destinées à recevoir de l'eau aérée ou à être
« simplement humectées par ce liquide; que les ramifications
« dont ces poches sont hérissées ne sont nullement tubuleuses,
« mais uniquement membraneuses. Ces membranes nombreuses,
« finement laciniées, serviraient à diviser le sang, afin que les
« globules arrivent, pour ainsi dire, isolément contre les parois
« humides des poches respiratrices. »

M. Lereboullet, dans des recherches subséquentes, faites tout récemment, a trouvé la composition des cinq corps blancs du *P. trivittatus* analogue, pour l'essentiel, à celle de ces mêmes organes dans le *P. armadilloïde ;* seulement les corps blancs du premier sont moins développés, et la partie de cet organe qui se trouve à découvert, ne présente pas de plis, ou du moins ceux-ci sont très peu sensibles. Dans les jeunes individus, le corps blanc est très simple et ne se compose que de ramifications rares et d'une ténuité extrême, sans aucune trace de poche ou de sac.

Cette espèce, de même que le Porcellion armadilloïde, n'a que trois vésicules branchiales de chaque côté, comme dans les Cloportes et les Porcellions ordinaires. Ces vésicules sont plus développées, plus épaisses dans le Porcellion à trois bandes que dans les autres.

C. Partie expérimentale.

1° *Observations sur la circulation du sang dans les lames branchiales.*

Nous avons vu facilement, au microscope, la circulation des globules sanguins, et conséquemment les courans du fluide respirant, dans le vide ou la lacune des lames branchiales opercu-

laires. Dans les Cloportes qui n'ont pas de corps blancs, on peut suivre les mouvemens des globules dans toute l'étendue des lames, mais il y a des parties où cette admirable circulation, où ces courans sont plus évidens.

Cette circulation, que nous avons étudiée ensemble pour la première fois, au mois d'octobre (1839), nous a donné la démonstration que ces lames sont de grandes lacunes, ainsi que l'avait présumé Treviranus, des lames vésiculeuses ou branchiales proprement dites, par suite de l'impossibilité où il s'était trouvé d'y découvrir des vaisseaux.

On observe un certain ordre dans les mouvemens des globules, qui indique une sorte de régularité dans les courans qui les entraînent. En général, c'est le long du bord externe des lames que paraît s'effectuer leur retour. Cependant il y en a aussi qui partent de ce bord pour se diriger vers la ligne médiane et comme pour parcourir, dans ce sens, toute l'étendue transversale de la lame.

Dans les lames des Porcellions qui renferment un corps blanc, ces courans se perdent sous ce corps blanc, ou se dégagent de dessous ses ramifications. Voici d'ailleurs les détails de quelques-unes de nos observations. Je les extrais de la correspondance de M. Lereboullet, parce que je les y trouve toutes rédigées et que les miennes que j'ai faites séparément, leur sont entièrement conformes, pour l'essentiel.

« J'ai cherché à voir cette circulation, dont vous me parlez, autour des corps blancs (1), et enfin j'y suis parvenu. Non-seulement j'ai vu distinctement, comme vous, les globules arriver par le bord antérieur *de la lame, de dehors en dedans*, se porter le long du bord interne, jusque vers la pointe et entourer les ramifications du corps blanc, en pénétrant même entre ces ramifications; mais encore, ayant redressé la lame, j'ai vu hier les globules traverser l'épaisseur du corps blanc, en se glissant entre ses ramifications, et se réunir à l'angle externe de la lame, à son point d'articulation avec la tête pour se porter delà vers l'intérieur de l'animal.

(1) Lettre de M. Lereboullet du 24 avril 1840.

Bien convaincu de cette circulation, j'ai fait sur le vivant des injections d'eau colorée avec du carmin, par les pattes et aussi par le cœur, en introduisant le tube entre le premier segment abdominal et le dernier segment thoracique (afin de mieux apprécier, selon vos désirs, la nature des corps blancs et le rôle qu'ils jouent dans la respiration). J'ai vu les corps blancs se colorer aussitôt en rouge. Les plaçant ensuite sous le microscope, leurs dernières ramifications m'ont paru de cette couleur.

Les intervalles des ramifications n'étaient pas colorés, la masse elle-même du corps spongieux était d'un rouge uniforme et persistant, malgré le lavage de la lame dans l'eau.

Après ces essais, j'ai eu l'idée de ne faire que des injections incomplètes, afin de voir par quelle partie le corps blanc commence à s'injecter?

J'ai vu que c'était d'abord l'angle externe de la plaque, puis la circonférence antérieure du corps qui devenait rouge; le reste conservait sa couleur blanche.

Enfin je me suis contenté de ne pousser dans l'arbre circulatoire qu'une quantité très minime de solution de carmin, afin de suivre la marche des globules colorés. J'ai vu un bon nombre de ces globules rouges arriver par le même chemin que vous avez observé avant moi, se porter entre les ramifications du corps spongieux et s'y perdre.

N'y aurait-il, dans toutes ces injections, qu'une simple *teinture* du corps blanc?

En comparant les Porcellions et les Armadilles, on voit que la marche du sang est absolument la même : le vaisseau afférent suit le bord antérieur de la lame, verse les globules dans la lacune; puis ceux-ci, après avoir été agités comme des grêlons dans la portion externe de la lame (chez les Cloportes), reviennent au cœur par l'angle externe et par un vaisseau situé au-dessus de la côte. »

Dans une lettre du 8 mai 1840, M. Lereboullet donne à M. Duvernoy de nouveaux détails des observations qu'il a continuées sur la circulation branchiale des Cloportes et des Porcellions. Ces détails résument les nombreuses observations faites à Paris

et à Strabourg par les auteurs du présent mémoire; ils devaient en faire partie.

J'ai étudié long-temps, et à plusieurs reprises, la circulation dans les Cloportes, le Porcellion rude, et celui que je continue de nommer Armadilloïde (à cinq paires de corps blancs). J'ai vu que cette circulation est la même dans tous.

Il existe à la base des lames sous-abdominales deux vaisseaux que l'on distingue très bien en redressant les lames. Le liquide contenu dans ces vaisseaux circule dans deux directions opposés. Dans l'un, le vaisseau antérieur, le sang marche de dedans en dehors et se rend dans l'épaisseur de la lame, en y pénétrant par son angle externe; dans l'autre, placé immédiatement derrière celui dont je viens de parler, les globules se portent de dehors en dedans : ce sont les globules qui reviennent de la lame et se rendent au cœur. On pourrait donc nommer le premier *vaisseau afférent* (par rapport à la branchie) et le deuxième *vaisseau efférent.*

L'existence de ces deux vaisseaux, dont je suis bien sûr, confirme une assertion avancée, sous forme de doute, par M. Milne Edwards (*Hist. nat. des Crustacés,* t. III, p. 117). — « Il paraît, dit cet auteur, dans ses généralités sur les Isopodes, exister aussi des canaux qui conduisent des lamelles respiratoires sous-abdominales au cœur. » — Mais le canal qui apporte le sang dans la lame ne m'a pas paru former de lacune hors de la lame et avant de se terminer dans la lacune de cette lame. C'est au bord antérieur de l'angle externe qu'on voit déboucher le gros vaisseau, et c'est là seulement que commence la lacune. Le sang, une fois arrivé dans cette cavité, suit son bord antérieur, puis se porte vers son bord interne; mais, dans ce trajet, on voit des globules quitter leur route et se précipiter vers le bord externe de la lame, d'où, après avoir été ballottés, ils s'échappent *sans doute* par un vaisseau situé à côté du vaisseau afférent. Je dis *sans doute*, parce que je n'ai pas vu *simultanément* les deux vaisseaux dans l'angle externe; on ne les distingue bien nettement que le long de la côte ou pièce basilaire du segment abdominal. Cette circulation une fois bien vue et bien comprise dans les Cloportes, je l'ai étudiée

dans des Porcellions. Même marche du sang, *ainsi que vous l'avez observé.* Le courant des globules débouche dans la lame par son angle externe, suit son bord antérieur, et se porte le long de son bord interne. Des globules s'en séparent pour se jeter autour des ramifications du corps blanc; j'en ai suivi plusieurs fois jusque vers le milieu de ce corps. En relevant la lame et en la regardant par transparence, sous le microscope, on aperçoit le courant des globules sortant de la lame; on voit ce courant à travers la membrane mince qui forme l'articulation de cette lame avec la côte. Le liquide coloré, injecté par les vaisseaux des membres, suit la même marche que le sang et vient baigner le corps blanc.

2° *Expériences sur la vitalité des* CLOPORTES, *des* PORCELLIONS *et des* ARMADILLES *dans l'air sec et dans l'eau.*

Lettre de M. Lereboullet à M. Duvernoy, du 16 juillet 1840. (1)

Première série d'expériences. (7 juillet à 3 h. 1/2.)

a. 10 Cloportes et 10 Porcellions mis dans un bocal à moitié rempli d'eau.

b. 10 Cloportes et 10 Porcellions mis dans un bocal à sec, et placés à l'ombre.

c. 20 Porcellions exposés au soleil dans un bocal (ciel nuageux, soleil pâle, donnant rarement).

d. 20 Porcellions dans un bocal contenant du sable humide et des écorces.

Résultats. — *a.* Les Porcellions se débattent pendant un quart d'heure, puis tombent au fond du vase; les Cloportes se débattent pendant une demi-heure environ (2); les lames sous-abdominales se meuvent avec rapidité et s'écartent fortement les unes

(1) Ces expériences ont été faites par M. Lereboullet sur l'invitation de M. Duvernoy.

(2) M. Duméril (*Dictionnaire des Sciences naturelles*, tome IX, page 418, Paris, 1817, article *Cloporte*) avait déjà remarqué que, « quand on fait plonger ces insectes sous l'eau, « à peine sont-ils déposés, qu'on remarque un mouvement rapide imprimé aux feuilles « membraneuses, qu'on suppose être des branchies ou une sorte de houppe de fibrilles. »

des autres. Ces mouvemens des lames durent jusqu'à 6 h. 1/2; alors je ne trouve plus que 2 Porcellions en vie.

Ainsi, durée de la vie : trois heures.

b. 4 heures : les Cloportes et les Porcellions sont entassés, sans mouvement, les uns sur les autres, au fond du vase; je ne puis distinguer aucun mouvement de leurs plaques abdominales.

6 h. 1/2. — Pas de changement.

Le 8 à 3 heures, 5 Cloportes et 2 Porcellions sont morts; à 7 heures, rien de nouveau.

Le 9 matin, tous les autres sont morts.

Ainsi, durée de la vie : 24 heures environ pour la moitié des Cloportes, plus de 30 h. pour les autres. Il résulte aussi de cette expérience, que les Cloportes périssent avant les Porcellions.

c. 4 heures : tous les Porcellions sont dans une agitation continuelle (on se rappelle que ceux exposés à l'ombre étaient tranquilles, et ceux plongés dans l'eau, agités). Les Porcellions cachés par les autres sont immobiles, mais dès qu'ils se trouvent à découvert, ils s'agitent de même. Sur les 20, 4 ont déjà leurs mouvemens ralentis.

6. h. 1/2 (3 heures après le commencement de l'expérience), 5 sont morts; les autres sont encore alertes.

Le 8 à 3 heures : tous sont morts, à l'exception de deux (ce jour-là, il n'y a pas eu de soleil). Ainsi, l'exposition *momentanée et à de longs intervalles* au soleil, par suite de l'état couvert du ciel, a hâté la mort de ces Porcellions; la durée de leur vie n'a pas été de 24 heures.

d. Tous les Porcellions placés dans les conditions indiquées ont continué à vivre et vivent encore aujourd'hui, 16 juillet.

Deuxième série d'expériences. (11 juillet à 2 h. 1/2.)

a. 10 Porcellions dans un bocal contenant un pouce d'eau.
b. 10 Porcellions dans un bocal à sec, à l'ombre.
c. 10 Porcellions armadilloïde dans les mêmes conditions.
d. 1 Armadille, idem.
e. 10 Porcellions rude; au soleil (par un ciel encore plus nuageux que précédemment).

Résultats. — *a.* Agitation continuelle pendant 1/2 heure; elle a lieu par intervalle, pendant la 1/2 heure suivante, puis cesse tout-à-fait; les lames sous-abdominales continuent à se mouvoir. Morts à 5 heures. — Durée de la vie : 2 h. 1/2.

b. 12 juillet, 9 h. : tous encore en vie; à 7 h. du soir, un seul est mort. 13 juillet, 9 h. : 4 vivent encore; à 2 h. 2 sont encore en vie; le lendemain matin, ils étaient morts. On peut donc admettre que ces Porcellions ont vécu, terme moyen, plus de 30 h.

c. 12 juillet, 9 heures du matin, 7 sont morts. — Le même jour, à 7 heures du soir, il n'en reste plus qu'un vivant.

Ainsi 20 heures de vie moyenne pour les Porcellions armadilloïdes.

d. L'Armadille vivait encore le 12 au soir; ainsi durée à-peu-près à celle des Porcellions ordinaires.

e. Le 12, 9 heures du matin, un seul était mort; le soleil n'a pas donné pendant cette journée : aussi ces Porcellions vivaient-ils encore le 12 au soir; le 13, à 9 heures, ils étaient *tous* morts, tandis qu'il restait encore 4 Porcellions de l'expérience *b*.

Troisième série d'expériences. (12 juillet, 10 heures du matin.)

a. 10 Porcellions et 10 Cloportes dans une boîte de deux pouces et demi de diamètre sur un pouce de hauteur.

b. 10 Porcellions et 10 Cloportes dans la boîte du microscope de Raspail.

Résultats. a. 12 juillet, 7 heures du soir (9 heures d'intervalle), 4 Cloportes sont morts; les Porcellions continuent à vivre.—13 juillet, 10 heures du matin, il ne reste plus que trois Porcellions. — Le même jour, à 2 heures, tous sont morts.

b. 12 juillet, 7 heures du soir, 6 Cloportes et 1 Porcellion sont morts. — 13 juillet, 10 heures du matin, tous les Cloportes sont morts : il reste encore 4 Porcellions; à 2 heures, il n'en reste plus qu'un.

On voit par là que les Porcellions résistent plus long-temps que les Cloportes; on voit aussi que, malgré la différence de capacité des deux boîtes, il n'y a pas eu de différence sensible dans la durée de la vie.

Quatrième série d'expériences. (13 juillet, à 3 heures.)

a. 10 Porcellions dans un local exactement fermé (luté).
b. 10 Cloportes dans les mêmes conditions.
c. 10 Porcellions armadilloïdes dans les mêmes conditions.
d. 3 Armadilles dans les mêmes conditions.
e. 10 Porcellions rudes, 5 Porcellions armadilloïdes et 10 Cloportes dans une boîte fermée.

Résultats. a, b, c, d. Le 14, à 9 heures du matin, tous sont en vie.

e. Le 14, à 9 heures du matin, les 10 Cloportes sont morts, 5 Porcellions armadilloïdes et 1 Porcellion rude sont aussi morts. A 2 heures, il reste encore 3 Porcellions vivans.

Ainsi les Cloportes et les Porcellions armadilloïdes sont morts plus tôt que les Porcellions rudes. Quant aux sujets des expériences *a, b, c, d,* ils vivent encore, la plupart, au moment où j'écris (16 juillet, à midi et demi). Je trouve, en effet, en vie 3 Armadilles, 8 Cloportes, 8 Porcellions et 1 Porcellion armadilloïde.

On peut attribuer cette longue durée de la vie, à l'humidité qui se conserve dans des bocaux fermés. Nous avons vu que, en général, ils résistent un peu plus long-temps dans des bocaux que dans des boîtes. (Comparez les expériences 1, 2 et 3.)

Cinquième expérience. (13 juillet, 3 heures 1/2.)

10 Porcellions mis dans l'eau comme précédemment; mêmes observations, seulement durée de la vie plus longue. Ainsi, à 5 heures, 3 sont morts; les 7 autres sont encore agiles. A 7 heures, 4 exercent encore quelques mouvemens. Admettons que ces 4 soient morts quelques instans après, la durée de la vie aurait été de 3 heures et demie, pour la plupart de ces Porcellions.

Sixième expérience. (15 juillet, par un soleil assez chaud et par un vent modéré.)

A 3 heures 20 minutes, 10 Porcellions sont placés dans un

bocal, ouvert et exposés en dehors d'une fenêtre, au soleil. Pendant une demi-heure, ces animaux sont dans une agitation continuelle. A 4 heures 20 minutes, 5 sont morts; un quart-d'heure après, 4 autres ne vivaient plus; le dixième mourut au bout de quelques minutes.

Ainsi la durée de la vie a été, pour son maximum, de cinq quarts d'heures; la mort est survenue bien plus promptement que dans l'eau.

Septième série d'expériences. (8 juillet, à 4 heures.)

a. Enlevé à 3 Porcellions leurs 4 corps blancs.
b. — 3 — 2 corps blancs.
c. — 3 — 1 seul corps blanc.

Ces 9 Porcellions mutilés sont mis dans un bocal à l'ombre, avec sable humide et bois pourri.

Résultats. a. 9 juillet, 1 heure, tous les trois sont morts.

b. Le même jour et à la même heure, un seul est mort.

c. Le même jour et à la même heure, tous les trois vivent et sont très agiles.

Aujourd'hui 16, ces 5 Porcellions mutilés (3 de l'expérience *c* et 2 de l'expérience *b*) continuent à vivre: ils se sont enfoncés dans le sable humide et ne paraissent nullement souffrir.

Huitième série d'expériences. (11 juillet, à 3 heures de l'après-midi.)

Elle fut entreprise, afin de m'assurer si la mort était causée par la perte du sang ou par la privation d'organes nécessaires à la vie.

a. Enlevé à 3 Porcellions les 4 corps blancs.
b. — 3 — 2 corps blancs.
c. — 3 — 1 corps blanc.
d. — 3 — 4 dernières pattes, près de la hanche.
e. — 3 — 8 dernières pattes.

Tous ces animaux sont placés dans les mêmes conditions que les précédentes, c'est-à-dire dans du sable humide, avec du bois pourri.

Résultats (12 juillet, 9 heures du matin). *a.* Tous sont morts.

b. Un seul est mort.

c. Tous sont vivans et vigoureux.

d et *e.* Tous sont très bien portans.

Le soir, à 7 heures, 2 des Porcellions de l'expérience *e* sont morts; du reste, point de changement.

Le 13, à 9 heures du matin et à 3 heures, même état.

Aujourd'hui 16, ces animaux mutilés continuent à vivre, excepté le dernier de l'expérience *e*.

Ces expériences prouvent déjà suffisamment l'importance des corps blancs comme organes nécessaires à la vie. La mort ne peut pas être attribuée seulement à la perte du sang, puisque les Porcellions de l'expérience *d*, ont dû perdre au moins autant de sang que ceux de l'expérience *a*, et ont cependant continué à vivre.

Neuvième série d'expériences. (12 juillet, 10 heures du matin.)

a. Enlevé à 6 Porcellions les trois dernières paires de lames sous-abdominales.

b. Enlevé à 3 Porcellions les 2 premières paires avec leurs corps blancs.

c. Enlevé à 3 Porcellions les 5 dernières paires de pattes (10 pattes sur 14).

Résultats. 6 h. 3/4.

a. 2 sont morts, les 4 autres sont très agiles.

b. Tous les 3 sont morts.

c. Tous vivent et paraissent agiles (autant que leur permettent leurs 4 pattes restantes).

13 juillet, 2 h. après-midi :

a. et *c.* Pas de changement.

Aujourd'hui 16, 4 jours après l'expérience, pas de changement; ceux même qui sont privés de 10 pattes continuent à vivre.

Dixième expérience. (14 juillet, 9 h. du matin.)

Enlevé à 6 Porcellions leurs 4 corps blancs.

A 2 heures, ils vivent encore, mais leurs mouvemens sont ralentis.

A 3 heures, 2 sont morts.

A 7 h. du soir, pas de changement.

Le 15 juillet, à 9 h., 2 nouveaux morts (sur les 4 restans).

A 4 h., il reste encore un Porcellion, mais c'est à peine si l'on observe quelques mouvemens dans ses pattes.

Quoiqu'il ne soit guère possible d'établir une moyenne rigoureuse, parce qu'on ne connaît pas exactement l'heure de la mort de chaque individu; on voit, cependant, en comparant cette expérience avec la précédente *b.*, que sur 9 Porcellions auxquels on a détaché les 2 premières paires de lames sous-abdominales, 5 n'ont pas vécu plus de 8 heures, 2 ont dépassé 24 heures. La moyenne de la durée de la vie peut, ainsi, être estimée à 15 ou 20 heures, au plus.

RÉSUMÉ DES EXPÉRIENCES PRÉCÉDENTES.

On peut déduire des expériences que nous venons d'exposer en détail, les conséquences suivantes:

A. *Sous le rapport du milieu dans lequel sont placés les Cloportes et les Porcellions.*

1. L'eau et l'air chauffés par les rayons directs du soleil, sont mortels à ces animaux. Ils éprouvent dans ces deux milieux la même agitation, qui décèle un malaise bien prononcé. (Exp. I, *a. c.*; II. *a. e.*; V.; VI.)

2. Les Porcellions périssent plus promptement au soleil que dans l'eau. (Exp. VI.)

3. Ils périssent plus promptement dans ce dernier liquide que dans l'air en nature. (Exp. I. *a. b.*; II. *a. b.*)

4. L'air en nature ne suffit pas pour entretenir la vie en eux; il faut que cet air soit fortement chargé d'humidité. (Exp. I. *b. d.*; II. *b.*)

5. Plus l'air est humide, plus la vie dure long-temps : ainsi nos Porcellions enfermés dans des boîtes ont péri plus tôt que ceux enfermés dans des bocaux en verre, lutés. (Exp. III et IV.)

B. *Sous le rapport de la durée comparative de la vie,*

6. Toutes les conditions étant les mêmes, les Cloportes périssent plus promptement que les Porcellions (exp. I et IV); après eux viennent les Porcellions armadilloïdes. (Exp. IV.)

C. *Sur le rapport de l'importance des corps blancs,*

7. L'ablation des quatre lames qui renferment les corps blancs est toujours plus promptement mortelle. (Exp. VII *a*; VIII *a*; IX *b*; X.)

8. L'ablation des lames sous-abdominales qui protègent les vésicules est moins nuisible. (Exp. IX. *a. b.*)

9. La mort qui survient par suite de l'extraction des corps blancs n'est pas l'effet de la perte du sang, puisque des Porcellions, auxquels on a enlevé jusqu'à dix pattes, vivent plus long-temps que ceux qui ont été privés de ces organes de respiration (Exp. VIII, IX). On est donc en droit de regarder ces organes comme indispensables à l'entretien de la vie.

Quant aux *Tylos*, dont M. Milne Edwards forme le type d'une sous-division de ses Cloportides terrestres, les *Tylosiens*, nous n'en avons eu qu'un seul exemplaire à notre disposition, provenant de la première expédition d'Alger et faisant partie d'une petite mais précieuse collection, dont M. Rozet, capitaine d'état-major, voulut bien gratifier le musée de Strasbourg, à son retour en France en 1831.

Il existe sous la région de l'abdomen 4 paires de plaques rectangulaires étroites et épaisses, serrées les unes contre les

recouvrant chacune une vésicule, peu développée pour la première, assez grande au contraire pour les suivantes. Ces vésicules sont supportées par le segment inférieur abdominal à l'extrémité externe duquel sont articulées les plaques; on ne les aperçoit facilement qu'en détachant ou en écartant fortement ces dernières.

Ces plaques rectangulaires présentent des bosselures, au nombre de huit à dix, qu'on voit sur les deux faces de la plaque, et qui sont dirigées dans le sens de l'axe de l'animal.

L'un de nous (1), qui a fait cette observation à la fin de mai, a cru apercevoir quelques trous sur le bord postérieur des plaques; mais il lui a été impossible de décider si ce sont des trous ou les intervalles des bosselures. Il n'a pu examiner le contenu de ces bosselures. Chacune d'elles renferme, d'après M. Milne Edwards (*Hist. nat. des Crust.*, tome III, p. 187 et 188, et l'*Institut*, 1839. n. 280, p. 152), une vésicule respiratrice, dont les parois sont couvertes d'une multitude de petits cœcums arborescens.

Les deux plaques postérieures, de chaque côté, sont cachées par des appendices cornés, ou prolongemens des troisième, quatrième et cinquième anneaux de l'abdomen.

Ces appendices, qui se détachent du côté de la face inférieure et latérale de ces segmens, se portent obliquement en dedans vers la ligne médiane, et forment comme autant de couvercles immobiles, dont le dernier est le plus long et le premier le plus court.

Tout-à-fait en arrière se voient deux pièces triangulaires, à côtés externes, arrondis, et dont les bases, coupées en ligne droite, se rencontrent et se touchent sur la ligne médiane. Le sommet du triangle s'articule en dehors, au bord latéral et inférieur du sixième ou dernier article de l'abdomen.

Ces deux pièces s'ouvrent comme deux battans de porte. On peut considérer tout cet appareil operculaire, comme le représentant de la grande pièce operculaire des Idotéides.

Dans le seul individu que nous ayons pu examiner, les stylets

(1) M. Lereboullet, lettre du 2 juin 1840.

générateurs, analogues par leur forme générale à ceux des Cloportes, étaient attachés à la côte ou segment inférieur abdominal, correspondant à la première plaque bosselée.

Cette description de l'appareil respiratoire des Tylos est une nouvelle preuve de la sévère exactitude des figures publiées par M. Savigny, dans le grand ouvrage sur l'Egypte.

Nous nous empressons de reconnaître, en même temps, que la structure intime de ces organes avait échappé aux investigations de ce savant, et que c'est à M. Milne Edwards que la science doit d'en connaître plusieurs des circonstances singulières.

Section II.

ISOPODES NAGEURS. . . { IV^e^ Famille. PRANIZIENS. / V^e^ Famille. SPHÉROMIENS. / VI^e^ Famille. CYMOTHOADIENS.

V^e^ FAMILLE. SPHÉROMIENS.

Genres.	*Espèces observées.*
Sphérome	*Sph. cinerea.*
	— *gigas.*
	— *dentatum.*
	— *Savignii.*
Cymodocée	*Cym. pilosa* M. Edw.
Cerceis.	
Nésée	*Nesea ovalis?* Say.
Campédocée.	
Cassinde.	
Amphoroïde.	

V. *Branchies de la famille des Sphéromides ou Sphéromiens.*

Les branchies des *Sphéromides* sont bien connues dans leur composition générale, dans le nombre, la forme et la disposi-

tion des lames, depuis les excellentes figures publiées par M. Savigny dans l'ouvrage sur l'Égypte. Cependant ce que nous en dirons prouvera que cet observateur, d'une sagacité et d'une pénétration bien reconnues, n'en avait pas aperçu la disposition la plus caractéristique, puisqu'elle ne se retrouve que dans cette famille : nous voulons parler des plis très singuliers, ou du moins très remarquables, des lames vésiculeuses appartenant aux deux dernières paires.

Nous avons étudié plus particulièrement, dans cette famille, le *Sphérome cendré* (*S. serratum* Leach), le *Sphérome géant*, et la *Cymodocée poilue.*

La première espèce servira à la description détaillée de l'appareil branchial. Nous indiquerons ensuite les différences que nous avons trouvées dans le dernier genre.

La région sous-caudale qui renferme les branchies forme une cavité assez profonde, qui rappelle la cavité branchiale des *Limules* (Pl. 6, fig. 16 et 17). Chaque série de lames branchiales se compose de dix lames réunies par paires (1). Les trois premières paires diffèrent beaucoup des deux dernières (2). Leurs deux lames sont petites, triangulaires, et de nature cornée. L'externe, ou la lame recouvrante, plus petite que l'interne, est pyriforme, et disposée très obliquement de dehors en dedans et d'avant en arrière. Elle est articulée au segment sous-abdominal correspondant par un pédicule qui répond au sommet de cette pièce triangulaire. De longs cils raides, qui garnissent le bord libre de cette lame, surtout à la base du triangle, viennent s'entrecroiser avec ceux de la lame correspondante de l'autre série.

La lame interne ou supérieure est très peu recouverte par la première, et remplit le vide que celle-ci laisse en dedans et en avant. Elle forme un triangle dont le sommet est, au contraire de l'externe, directement en arrière.

(1) Latreille dit que les branchies, dans cette section, sont vésiculeuses, à nu, et disposées longitudinalement par paires (*Règne animal*, tome IV, page 136). Ces généralités ne peuvent s'appliquer au *Sphérome cendré.*

(2) Voir notre Planche 6, figure 15, pour l'ensemble des lames en position, et figures 18, 19, 20, pour les trois premières paires de lames.

La lame interne de la deuxième paire (1) montre à sa base, du côté interne, un stylet coudé en arrière, et se portant dans cette direction, le long de la ligne médiane, au-delà de cette lame; on dirait voir un des appendices générateurs des Cloportes mâles, quoiqu'il ne soit pas dans la même position. (2)

Dans la troisième paire, la plaque interne est beaucoup plus grande que l'externe (Pl. 6, fig. 20).

La quatrième et la cinquième paires (3) se composent d'une lame operculaire extérieure et d'une lame branchiale respiratrice très particulière par sa structure. Les opercules de ces deux paires sont grands, concaves du côté de la branchie qu'ils protègent, de forme irrégulièrement triangulaire, ayant leurs angles arrondis et leur sommet dirigé en arrière et recourbé vers le haut (4). L'angle interne et postérieur de l'opercule de la cinquième paire porte cinq tubercules saillans (fig. 22, *t*), qui le distinguent.

Les deux seules lames branchiales, essentiellement respiratrices, qui existent dans cet appareil (fig. 21 et 22, *i*), et qui sont protégées, comme nous venons de le dire, par les deux dernières lames operculaires, doivent être décrites en détail. Toutes deux ont une assez grande étendue, moindre cependant que celle de leur lame recouvrante, à laquelle elles sont attachées par leur bord le plus avancé. Leur forme est celle d'un ovale qui aurait été replié en dedans, ou d'un triangle dont les angles auraient été plus ou moins tronqués et arrondis. Leur contour est un bourrelet d'où partent, du côté externe, un nombre variable de plis vésiculeux parallèles, qui vont aboutir, en se portant obliquement en arrière, vers le côté interne de la lame, celui de la ligne moyenne.

La première de ces deux lames respiratrices a six ou sept plis

(1) Planche 6, figure 19.

(2) Ce stylet n'existe probablement que chez les mâles, à en juger par ce que nous avons vu dans les Idotées, les Aselles, les Ligies, les Ligidies.

(3) Figures 21 et 22.

(4) Latreille semble avoir remarqué cette disposition, lorsqu'il dit des Spéromides : « Leurs appendices branchiaux sont recourbés intérieurement. »

semblables sur chaque face; la seconde, qui est plus étendue, en a dix. Ces plis forment autant de vésicules qui divisent la vessie principale; elles sont remplies d'un sang grumelé, blanc de lait (dans les individus conservés dans l'esprit-de-vin), dont leurs parois transparentes prennent la couleur, comme celle des poches branchiales ordinaires. Le bourrelet auquel elles aboutissent, ou celui duquel elles partent, paraît contenir leur vaisseau afférent ou efférent. C'est sans doute par ce vaisseau qu'elles communiquent entre elles. C'est aussi ce bourrelet qui maintient ces plis; dès qu'on l'enlève, de chaque côté, tous disparaissent, et la lame branchiale qu'ils divisaient se trouve réduite à une simple poche composée, comme à l'ordinaire, d'une double membrane.

On ne peut s'empêcher de faire remarquer ici combien ces deux lames respiratrices sont protégées : 1° par leur position enfoncée dans une cavité branchiale assez profonde; 2° par leur lame operculaire respective, dont l'étendue et la forme concave est si bien arrangée pour s'adapter à leur ampleur et à leur épaisseur; 3° enfin, par les trois paires précédentes de lames operculaires, qui sont petites et séparées, pour ne pas empêcher l'accès de l'eau aérée, jusqu'aux vésicules branchiales; mais dont le bord libre est garni de longues soies, propres à empêcher les corps étrangers d'y pénétrer.

Le Sphérome géant (*Sp. gigas* LEACH) a la même organisation branchiale.

Il en est de même du Sphérome denté (*Sph. dentatum*), et d'une autre espèce voisine, mais distincte du *Sph. Savignyi*. Dans cette dernière, chaque vésicule branchiale présente quinze plis.

Nous l'avons également reconnue dans la Cymodocée poilue (*Cym. pilosa* M. Edwards). Ici, les plis des deux paires de vésicules étaient plus nombreux et plus fins; il y en avait jusqu'à vingt-cinq pour chaque vésicule.

Enfin, nous avons encore reconnu l'existence des vésicules plissées dans une espèce de Nésée voisine de la *Nesea ovalis* Say.

Une disposition analogue paraît exister dans le genre *Am-*

phoroïde, à en juger par le passage suivant de l'*Hist. nat. des Crust.* de Milne M. Edwards (tome III, p. 223).

« Les deux appendices par lesquels se terminent celles (les « fausses pattes) de la quatrième et cinquième paire, sont tout « à-fait membraneux et régulièrement froncés en travers, de « façon à ressembler beaucoup à des branchies de Décapodes « brachiures. »

VI^e^ Famille. CYMOTHOADIENS.

	Genres.	*Espèces observées.*
I^re^ Tribu. Ravisseurs . . .	Sérole.	
II^e^ Tribu. Errans.	Cirolane.	
	Eurydice.	
	Ægа.	*Ægа bicarinata.*
	Conilère.	
	Rocinèle.	*R. Dehaysiana.*
	Ptérélas.	
	Alitrope.	
III^e^ Tribu. Parasites . . .	Nélocire.	*N. bivittata* M. Edw. *N. affinis* M. Edw.
	Anilocre.	*A. mediterranea* Leach.
	Livonèce.	
	Olencire.	
	Cymothoé.	*C. œstrum* Fabr. *C. parallela* Otto.
	Ourozeuctes.	

VI. *Branchies des Cymothoadiens.*

La famille des Cymothoadiens se divise en trois tribus, dans la méthode de M. Milne Edwards. Nous avons observé les branchies de plusieurs genres de la seconde tribu, celle des *Errans*, et de la troisième, celle des *Parasites*.

Nous n'avons pas eu l'occasion d'examiner les branchies des *Séroles*, seul genre de la première tribu, celle des *Ravisseurs*.

Les branchies des *Cymothoadiens* que nous avons pu étudier forment un appareil d'une grande conformité de composition. Ce sont toujours dix paires de lames bien développées, disposées sur deux séries, et insérées, chacune sur un pédicule commun; les premières sont protectrices ou operculaires, et les suivantes, respiratrices.

Il n'y a de différence que dans le nombre, la forme et l'étendue des lames protectrices ou operculaires, relativement aux lames respiratrices, et réciproquement.

Le nombre, ou, par compensation, l'étendue des premières est en raison des circonstances de mœurs qui pourraient mettre à sec l'animal, et l'obliger de protéger les lames respiratrices contre l'action desséchante de l'air.

Les *Cymothoadiens Errans*, quoique tous aquatiques, seraient, par exemple, plutôt dans ce cas, que les *Cymothoadiens Parasites*, qui vivent fixés sur les branchies ou d'autres parties du corps des poissons.

Cependant, malgré cette conformité d'organisation, nous avons trouvé des différences, relatives à chacun des groupes établis, différences qui pourraient, au besoin, servir à caractériser ces derniers.

C'est ainsi que dans les *Cymothoadiens parasites*, la lame la plus antérieure, grande et large, est conformée pour recouvrer toutes les autres; tandis que dans les *C. errans*, les lames antérieures sont loin d'avoir les dimensions suffisantes pour remplir cet usage.

On pourrait encore, dans les *C. parasites*, établir deux autres groupes, dont le premier aurait des lames vésiculeuses plissées (genres *Nérocile* et *Anilocre*); tandis que le second ne serait pourvu que de lames vésiculeuses simples (genre *Cymothoë*).

Les détails dans lesquels nous allons entrer, feront encore mieux ressortir ces différences.

Parmi les genres qui font partie de la deuxième tribu (celle des *Errans*), nous avons étudié le *Rocinela Deshaysiana* Edw., et l'*Æga Bicarinata*.

Il existe, dans la Rocinèle de Deshayes, cinq paires de lames disposées sur deux séries, ayant la forme d'un ovale allongé,

insérées sur un pédicule quadrilatère très développé pour les paires antérieures, de moins en moins pour celles qui suivent. Ce pédicule est lui-même articulé, et se meut librement sur le segment sous-abdominal correspondant.

Ces différentes paires de lames se recouvrent les unes les autres comme des tuiles, les antérieures étant plus étroites et plus courtes que les suivantes. Les deux lames dont se compose chaque paire, sont d'égales dimensions, et s'adaptent assez exactement l'une à l'autre ; la lame inférieure, ou recouvrante, est articulée par une extrémité anguleuse, au bord externe de son pédicule, tandis que la lame recouverte tient à ce même pédicule par une portion plus étendue de son bord antérieur. L'une et l'autre lame sont de consistance inégale : l'inférieure, celle qui remplit les fonctions d'opercule, toujours plus résistante ; la supérieure ou interne, plus mince et comme membraneuse. Cette différence dans la consistance s'observe jusque dans les dernières paires de lames, quoique la lame protectrice soit ici plus mince que dans les paires antérieures.

Le bord externe de toutes les lames operculaires est recourbé en dedans et soutenu par un filet corné ; un filet semblable, plus étroit, règne le long du bord interne des lames recouvertes des trois premières paires. Des cils très fins garnissent le bord postérieur de toutes ces lames ; ils sont plus longs et plus nombreux aux lames operculaires qu'aux autres.

Il résulte de cette organisation, que les lames recouvertes ne paraissent guère susceptibles de se renfler en vésicules ; on pourrait tout au plus en excepter celles des deux dernières paires.

Il n'existe pas de stylet à la lame interne de la deuxième paire ; l'individu observé était une femelle.

Nous aurons peu de chose à dire au sujet de l'*Æga bicarinata*, les lames branchiales de cette espèce étant construites et disposées sur le même plan que celles que nous venons de décrire.

En effet, nous retrouvons ici les mêmes lames allongées, ovalaires, ciliées, portées sur de grands pédicules, et se recouvrant comme des tuiles, les antérieures beaucoup plus étroites et plus

courtes que les suivantes. Une faible différence consiste en ce que la lame interne est très étroite et presque à découvert, du moins dans les deux paires antérieures. Dans les trois dernières paires, la lame extérieure recouvre exactement la lame sous-jacente. Celle-ci paraît susceptible de se développer plus facilement en vésicule que dans l'espèce précédente : nous avons vu, en effet, la lame interne de la troisième paire incomplètement renflée. Il n'existe pas de cils aux lames recouvertes des deux dernières paires. Une matière grenue, blanchâtre, est déposée entre les deux feuillets qui constituent ces lames.

Il est remarquable que dans ces deux genres, chez lesquels ceux des feuillets branchiaux qui prennent, par leur consistance, le caractère de lames operculaires, sont plus nombreux, le premier de tous ces feuillets, qui remplit plus essentiellement les fonctions d'opercule, soit plus petit et recouvre moins complètement les suivans, que lorsque ceux-ci ont plus besoin de protection par leur peu de consistance.

Parmi les Cymothoadiens de la troisième tribu, celle des parasites, nous avons étudié les branchies du *Nerocila bivittata* Edw., du *Nerocila affinis* Edw., de l'*Anilocra mediterranea* Leach., et de deux espèces de Cymothoés, le *C. œstrum* Fabr. et le *C. parallela* Otto.

Nous commencerons par l'*Anilocre de la Méditerranée,* dont les branchies se rapprochent encore, par leur disposition générale, de celles des Cymothoadiens de la deuxième tribu, quoiqu'elles en diffèrent par la structure de leurs lames vésiculeuses.

Les cinq paires de lames dont se compose leur appareil branchial sont encore imbriquées; cependant les lames antérieures sont plus larges que dans les genres précédens, en sorte qu'elles ne laissent à découvert qu'une petite portion du bord postérieur des lames suivantes. Ces lames, de forme ovale, sont portées sur de courts pédicules. Elles n'ont pas leurs bords garnis de cils; leur surface est ponctuée de petites aspérités noirâtres. Toutes les lames recouvrantes sont plus consistantes que les autres; cependant celle des trois dernières paires, et même déjà celle de la deuxième, paraissent susceptibles de se distendre en vésicule.

Les lames internes ou recouvertes sont presque aussi développées que les externes. Celle de la première paire est membraneuse; la deuxième peut se renfler en vésicule. Elle portait à sa base, dans l'individu qui a servi à notre description (une femelle) un petit stylet membraneux très court et délié, rudiment du stylet plus prononcé qu'on observe chez les mâles. Les trois dernières lames sont de plus en plus vésiculeuses. Celle de la cinquième paire, en particulier, présente des boursouflures ou de gros plis dirigés longitudinalement dans toute son étendue. Tout près de sa base, cette vésicule plissée se prolonge en une petite languette membraneuse, également plissée, qui déborde la lame operculaire et se porte en dedans et en avant, sur la ligne médiane. Les deux lames recouvertes qui précèdent la dernière sont aussi munies de ce petit prolongement membraneux en forme de languette, mais les plis y sont à peine sensibles pour la quatrième lame, et moins encore pour la troisième; il en est de même des plis de la vésicule, que l'on n'aperçoit qu'à sa base.

Nous allons retrouver, mais d'une manière bien plus apparente, dans le genre *Nerocile*, cette forme particulière de vésicules. (1)

Dans deux espèces de ce genre, le *Nerocila bivittata* Edw. et le *N. affinis* Edw., la lame operculaire de la première paire est assez développée pour recouvrir et protéger tout le reste de l'appareil. Cette lame, ainsi que les suivantes, de forme ovalaire, est insérée à côté de la lame recouverte, sur un pédicule assez court, mobile; leur bord est dépourvu de cils. L'extrémité externe du pédicule porte un lobule ovalaire, allongé, replié sur lui-même et paraissant double (Pl. 6, fig. 23, *c*); celui du pédicule de la première paire est plus petit et n'est pas replié. Un lobule beaucoup plus petite se voit à la base de la lame recouverte de la deuxième paire; ce n'est qu'une expansion membraneuse de cette lame.

(1) Elle a été indiquée par M. Milne Edwards pour les Anilocres, dans son *Histoire naturelle des Crustacés*, tome III, page 256 : « La lame postérieure de celles de la dernière paire (fausses pattes) froncée sur la face supérieure. »

Les lames recouvrantes sont de consistance cornée-membraneuse ; elles paraissent, à l'exception de la lame operculaire commune, susceptibles de remplir les fonctions de vésicules, à en juger par un dépôt de natière granulée, blanche, formant un réseau à mailles très fines, qu'on aperçoit dans leur épaisseur, et qui rappelle le réseau que présentent les feuillets branchiaux des Limules. Elles sont généralement plus grandes que les lames internes et les recouvrent entièrement.

La lame interne de la première paire n'offre rien de particulier ; celle de la deuxième paire présente quelques plis très fins, à peine sensibles et irréguliers. Les lames internes, ou plutôt les vésicules des trois dernières paires, sont sensiblement plissées, plus encore que dans les Anilocres. Ces plis, la plupart dirigés obliquement, ne ressemblent nullement à ce que nous avons vu dans les Sphéromides. Ils sont plus gros, irréguliers, et donnent quelquefois à la lame un aspect comme chiffonné. Ces plis sont d'autant plus étendus qu'ils sont plus rapprochés de la base de la lame ; ils s'effacent insensiblement vers sa partie postérieure et finissement par disparaître ; en sorte qu'il existe toujours une portion plus ou moins étendue de la lame qui reste lisse.

Chacune des vésicules dont nous parlons, se prolonge en dedans en un appendice membraneux, sorte de languette plissée, comme festonnée, dirigée en avant et en dedans sur la ligne médiane, et dépassant le bord interne de la lame protectrice. C'est cet appendice que nous avons déjà signalé dans les Anilocres, mais qui est ici beaucoup plus sensible.

Cette structure est la même pour les trois lames vésiculeuses, dans les deux espèce de *Nérociles* que nous avons examinées ; seulement la dernière vésicule a des plis plus gros et plus nombreux que la précédente, et celle-ci plus que la troisième.

L'un de nous a représenté la dernière paire de lames de *Nerocila affinis*, pour faire voir la membrane plissée avec son appendice interne, et pour montrer en même temps le disposition du lobule accessoire externe. (1)

(1) M. Milne Edwards a figuré cette même paire de lames, prise du *Nerocila bivittata*,

Cette forme des lamelles respiratrices indique qu'elles sont susceptibles de prendre une extension considérable pendant l'acte de la respiration. Il n'existe rien de semblable dans les Cymothoés propres.

Nous ajouterons, pour compléter cette description, que nous avons trouvé dans deux individus de sexe différent du *Nerocila affinis*, un stylet corné, tenant à la lame recouverte de la deuxième paire, tel qu'il se rencontre dans les mâles de plusieurs Isopodes. La présence de ce stylet, chez les femelles, est une exception à la règle générale.

Dans les *Cymothoés* proprement dits, et particulièrement dans le *Cymothoa œstrum* Fab., on trouve le même nombre normal de dix paires de lames branchiales sous-abdominales, bien développées. Elles sont larges, rapprochées les unes des autres, de manière à occuper un très petit espace, et portées sur un pédicule court.

La première lame est operculaire, non-seulement par sa position la plus extérieure, mais encore par sa consistance cornée et par son étendue, qui lui permet de recouvrir les neuf autres lames de la même série. Celles-ci sont minces et ont à-peu-près toutes la même consistance ; cependant les lames recouvrantes se reconnaissent à leur plus grande étendue et à leur insertion, qui a toujours lieu en dehors de l'article basilaire, tandis que les lames internes, plus étroites, s'insèrent vers la partie interne de cet article.

Toutes ces lames paraissent être susceptibles de se développer en vésicules : leur capacité semble être divisée en un réseau compliqué de petits canaux, qui s'anastomosent souvent entre eux et leur donnent un aspect uniforme. Elles vont en diminuant d'étendue de la première à la dernière.

Il existe, en outre, en dehors et en avant de chaque paire de lames, un lobule rudimentaire épimérien, que l'on aperçoit quand on écarte les lames les unes des autres.

dans la nouvelle édition du *Règne animal* (*Crustacée*, Pl. 66, fig. 5 *l*). Ici le prolongement interne de la lame n'a pas la forme que nous avons rencontrée dans les trois individus appartenant aux deux espèces que nous avons étudiées. Voyez aussi l'ouvrage sur l'Egypte (Pl. XI, fig. 10 et 11 des *Crustacés*) pour deux espèces de ce genre.

Deux individus de la *Cymothoa parallela*, Otto, trouvés dans la bouche d'une Mendole vulgaire, ne nous ont pas offert de différences essentielles; seulement la lame recouvrante était sensiblement plus consistante que la lame recouverte, dans toutes les paires, et le lobule accessoire bien prononcé dans le *Cymothoa œstrum*, n'existait pas ici.

Nous n'avons pas trouvé de stylet génital: les individus observés étaient tous des femelles.

Section III.

ISOPODES SÉDENTAIRES.

- VII^e^ Famille. BOPYRIENS.
- VIII^e^ Famille. KÉPONIENS, Duv.
- IX^e^ Famille. IONIENS.

VII^e^ FAMILLE. BOPYRIENS.

La première famille de cette section n'a que cinq lames branchiales par chaque série, placées, comme cela a lieu dans tous les Isopodes que nous avons décrits jusqu'ici, sous la région abdominale, et attachées aux cinq premiers anneaux de cette région.

Ces lames sont oblongues: elles diminuent considérablement de grosseur de la première à la dernière. Leur bord est entier, nullement divisé ni hérissé de cils. Elles se recouvrent très peu, sauf la pénultième, qui cache presque entièrement la dernière. Leurs bords se relèvent vers le haut, de manière à former un godet à leur base.

Toutes ces lames paraissent être respiratrices, à en juger par la souplesse de leur substance. Ce sont autant de petits sacs vésiculaires dans lesquels le sang vient respirer.

Chez un animal aussi bien protégé que le *Bopyre* contre la violence des chocs ou des agens physiques, il n'est pas étonnant de voir manquer les lames operculaires ou protectrices du plan général.

VIII^e^ Famille. KEPONIENS.

La seconde famille de cette section ou la huitième de l'ordre, celle des *Képoniens*, que l'un de nous (M. Duvernoy) a cru devoir établir tout récemment (1), est bien remarquable par son appareil branchial.

Il se compose de dix paires de lames à-peu-près sous-abdominales, dans les femelles, un peu plus portées en dehors dans les mâles; plus larges à leur base, très effilées à leur pointe, dans les premières; coniques, en partie simples, en partie bifurquées, dans les mâles. Cette première sorte d'appendices respirateurs, dont le dernier anneau du corps est privé, comme dans les autres Isopodes, paraît répondre aux lames operculaires du plan général de ces Crustacés. Ils ne jouent peut-être qu'un rôle accessoire dans l'acte de la respiration, à en juger, du moins, par leur développement proportionnel.

D'autres appendices en forme de feuilles allongées, dentelées par des tubulures ou des prolongemens foliacés, paraissent être les appendices les plus importans de cet appareil; ces appendices sont attachés, par paires, à chaque segment abdominal, jusqu'au dernier, ce qui est encore unique dans l'ordre des Isopodes.

Ils sont fixés plus en dehors que les premiers, absolument sur le côté du segment abdominal, et non en dessous; ils sont conséquemment déployés autour de l'abdomen : seconde disposition exceptionnelle dans l'ordre des Isopodes.

On la retrouve dans la famille des *Ioniens* (2), dont les branchies sont arborescentes et étalées autour de l'abdomen, au

(1) Voir le Compte rendu de l'Académie des Sciences, de la séance du 12 octobre 1840, le mémoire sur les *Képones*, inséré dans le cahier de février de ces Annales, page 110, et la planche 4 B annexée à ce Mémoire. Fig. 1. *e*, *f*, *g*, *h*, *i*, *k*, pour les lames branchiales principales de la femelle, et fig. 2. 8-12, pour ses lames branchiales accessoires. Les figures 7. 8. et 11. montrent les branchies du mâle.

(2) M. Milne Edwards a publié plusieurs figures originales de l'*Ione thoracique* et de ses branchies, dans la nouvelle édition du Règne animal, livr. 110, pl. 59 des Crustacés.

(*Note ajoutée après la lecture.*)

nombre de cinq paires seulement. Nous ne faisons qu'indiquer leur structure et leur disposition, n'ayant pas eu occasion de les observer.

RÉSUMÉ DE NOTRE MÉMOIRE. (1)

Le travail précédent comprend la description successive et détaillée de l'appareil de la respiration dans les sept familles suivantes des Crustacés Isopodes :

1° Les Idotéides;
2° Les Asellotes;
3° Les Cloportides;
4° Les Sphéromiens;
5° Les Cymothoadiens;
6° Les Bopyriens;
7° Les Képoniens.

Il n'y a que les deux familles des *Praniziens* et des *Ioniens*, que Latreille avait laissées dans l'ordre des Amphipodes, dont notre monographie ne donne point de description originale, relative aux organes de la respiration.

On sait que la dernière famille ne se compose que d'un genre et d'une espèce, dont les seuls individus connus et décrits par Montagu, sont conservés dans une collection de Londres.

Le mérite scientifique de ce travail, si tant est qu'on veuille bien lui en accorder un, étant surtout dans les détails des observations directes, il serait difficile d'en présenter un résumé qui en donnât une idée complète.

Cependant les faits qui y sont consignés, se rattachant aux trois parties principales dans lesquelles l'un de nous divise, depuis treize années, l'histoire naturelle des animaux, nous voulons parler de leur étude *anatomique* et *physiologique*, de leur étude *philosophique*, et de leur étude *systématique* ou *classique*, nous présenterons, sous ces trois points de vue, une partie des résultats de nos recherches, ou des conséquences qu'on peut en tirer.

(1) Ce résumé est, en grande partie, l'analyse imprimée dans les Comptes-rendus de l'Académie des Sciences, tome XI, page 883 et suivantes.

A. *Relativement à l'histoire naturelle anatomique et physiologique,*

La structure des organes de la respiration des Isopodes devait offrir un grand intérêt.

Il s'agissait d'étudier, dans ces organes, les rapports des différentes structures qu'ils pourraient présenter avec des genres de vie très différens.

La plupart des Isopodes vivent constamment plongés dans l'eau. Les uns sont libres, les autres sont parasites et ne se meuvent guère qu'avec les *Crustacés* ou les *Poissons* aux branchies et au palais desquels ils se cramponnent.

D'autres se tiennent sur les rochers ou dans le sable des plages maritimes, à des élévations qui les mettent à l'abri des hautes eaux, ou à des étages plus bas qui sont alternativement submergés et à découvert par les marées.

D'autres enfin vivent dans l'intérieur des terres, dans nos habitations, respirant l'air en nature, mais un air humide, à l'abri de la lumière solaire.

Voici les principaux résultats auxquels nous sommes parvenus, *sous le point de vue anatomique et physiologique*, c'est-à-dire *de la forme et de la structure de ces organes, de la composition générale de l'appareil qu'ils constituent et sous celui de leurs usages.*

La structure normale des organes de la respiration, dans l'ordre des *Isopodes*, comme dans toute la classe des *crustacés*, est celle des organes de respiration aquatique : ce sont des branchies.

Tout l'appareil, lorsqu'il a son plus haut degré de composition, consiste dans deux séries de cinq paires de lames, attachées symétriquement sous les cinq premiers anneaux de l'abdomen.

Chaque paire de lames a un pédicule commun, par l'intermédiaire duquel elle est articulée au segment inférieur correspondant de l'abdomen.

Une des deux lames de chaque paire est recouverte ou interne, et l'autre est recouvrante ou externe. Celle-ci peut servir

d'opercule, de lame protectrice, et prend dans ce cas plus de consistance.

La lame recouverte, au contraire, a généralement des parois très minces, à travers lesquelles se fait l'hématose; elle peut former une vessie, interceptant une grande lacune, dans laquelle le sang circule pour la respiration.

Des appendices extérieurs des segmens de l'abdomen viennent encore, dans quelques cas, s'ajouter à cet appareil comme opercules accessoires.

I. Il y en a une seule paire dans les *Idotées*, genre type de la famille des *Idotéides*, qui recouvre entièrement cet appareil. Ils tiennent au sixième ou dernier segment de l'abdomen et répondent aux appendices natateurs de ce même segment des autres *Isopodes marcheurs*. C'est un exemple remarquable, ainsi que l'a très bien compris M. Milne Edwards, des variétés de formes et d'usages que peut éprouver une même partie appartenant à un même plan de composition, qui caractérise un ordre naturel ou un groupe subordonné ou supérieur.

Cette paire de volets sous laquelle peut se trouver enfermé tout l'appareil branchial, à la volonté de l'animal, est encore aidée dans sa fonction protectrice, à l'endroit où son bord externe devient libre et cesse de former l'espèce de charnière qui le fixe au bord correspondant du segment abdominal, par un stylet plumeux qui n'avait pas encore été décrit.

Les opercules accessoires rendant inutiles la fonction protectrice des lames branchiales recouvrantes, celles-ci et les lames recouvertes paraissent dans les *Idotées*, à-peu-près de la même consistance; ce qui nous fait penser que l'hématose peut se faire encore dans les premières, sinon aussi complètement que dans les dernières, du moins accessoirement.

Dans les *Anthures*, genre anormal de cette famille, il paraîtrait que la première paire de lames est uniquement operculaire, et qu'il n'en reste que quatre paires pour la respiration; mais nous n'en jugeons que par les figures et les descriptions qui en ont été publiées.

Les *Idotéides* se tiennent sur les plantes marines et peuvent

être mises à sec momentanément avec ces plantes. De là les précautions prises dans l'arrangement de leurs branchies contre l'action desséchante de l'air ou contre les lésions des corps étrangers.

Le plan général de composition de l'appareil branchial des Isopodes que nous venons d'indiquer, en citant, en premier lieu, pour exemple les *Idotées*, varie dans les familles suivantes pour le nombre des lames branchiales operculaires et respiratrices, et ces différences sont toujours en rapport avec le genre de vie.

Il y a d'autant plus de lames protectrices que l'animal est plus aérien, d'autant moins qu'il est plus aquatique. Celles-ci manquent entièrement dans les *Bopyres*, dont l'appareil branchial est protégé par la carapace des *Palémons*, à l'abri de laquelle ils passent leur vie.

II. Les lames branchiales développées des *Asellotes* ne sont qu'au nombre de trois paires, dont la première a sa lame recouvrante essentiellement operculaire; les cinq autres sont respiratrices. Ces trois paires de lames développées, répondent aux trois dernières des *Idotés*. Ici l'appareil branchial proprement dit, réduit aux trois dernières paires des lames de l'appareil complet, n'a proprement que la première ou la plus extérieure de ces lames pour le protéger. Cette structure et cette composition répondent à un genre de vie entièrement aquatique.

Les deux premières paires de lames du plan général existent, mais à l'état rudimentaire, dans les mâles des *Asellotes*, et sont modifiées pour la fonction de la génération. Dans les femelles on ne trouve que la première de ces deux paires.

III. Chez les *Cloportides* la composition de l'appareil branchial est très uniforme pour le nombre des lames; mais il y a des différences remarquables dans leur structure.

Toutes les espèces de cette grande famille vivent dans les lieux humides, non submergés et respirent l'air en nature.

Elles n'ont, des deux premières paires de lames de chaque

série, que la lame recouvrante ou protectrice, et elles manquent de la lame recouverte ou vésiculeuse.

Nous dirions que celle-ci est représentée, dans les mâles, par un stylet très allongé, élargi à sa base, qui a son emploi dans la copulation, si d'un côté les analogues de ces appendices générateurs ne se retrouvaient dans les *Idotées*, chez lesquels nous avons décrit les lames recouvertes, vésiculeuses dans les deux premières paires en question, comme dans les trois suivantes; si de l'autre il restait dans les femelles quelques traces de cette composition, ce qui n'est pas.

Chez les *Cloportides* les trois dernières lames operculaires recouvrent seules chacune une vésicule branchiale.

Les lames operculaires sont composées de deux feuillets, un inférieur, aérien, beaucoup plus consistant, dans une grande partie de son étendue, que le feuillet abdominal, qui est extrêmement mince et à travers lequel l'hématose peut se faire.

Les *Porcellions* et les *Armadilles* ont, dans les deux premières paires de lames operculaires au moins, quelquefois dans toutes, selon les espèces, deux corps blancs ou jaunes, qui paraissent servir à la respiration de ces animaux.

Ces corps blancs ne se trouvent ni dans les *Cloportes*, ni dans les *Philoscies*, pas plus que dans les *Ligies* et les *Ligidies*.

Nous avons fait beaucoup de recherches et un grand nombre d'observations, sur les *Cloportides terrestres*, pour reconnaître l'organisation et l'usage de ce corps blanc, et afin de bien déterminer la manière dont se fait la circulation dans l'appareil de ces Isopodes, et le mécanisme de leur respiration. Nous avons soumis ces animaux, ainsi qu'on l'a vu dans le texte de ce Mémoire, à quelques expériences dans l'eau, dans l'air sec, et exposés, en même temps, à la lumière; nous les avons placés dans le vide, afin d'étudier leur vitalité dans ces diverses circonstances.

Voici un résumé de toutes ces recherches, au sujet de l'appareil de respiration et de cette fonction, chez les Cloportides terrestres, ou du moins chez les Cloportes, les Philoscies, les Porcellions et les Armadilles.

Il sera facile, en relisant l'historique que nous avons pré-

senté au commencement de l'article concernant cette famille, de juger en quoi nous nous rapportons avec les observateurs qui nous ont précédé et sur quels points nous différons?

1. Les Cloportides terrestres, que nous venons de nommer, ont cinq paires de lames branchiales operculaires, disposées en deux séries imbriquées, ou se recouvrant comme des tuiles, sous la région abdominale.

2. Le feuillet externe ou aérien a toujours beaucoup plus de consistance que l'interne, qui est uniquement membraneux. Ces deux feuillets, en continuité avec les tégumens, interceptent un vide ou une lacune en double communication avec le système sanguin, pour en recevoir le sang qui vient y respirer et lui rendre celui qui a respiré.

3. Les trois dernières paires seulement des lames operculaires recouvrent chacune une vésicule branchiale, ainsi que l'avait vu Treviranus.

4. Le corps jaune et filamenteux, c'est, du moins, la désignation que Latreille lui avait donnée, n'existe pas dans tous les Cloportides terrestres, comme il l'avait annoncé, puisqu'il manque dans les Cloportes et les Philoscies, qui sont organisés, sous le rapport de l'appareil respiratoire, comme les Cloportides marins ou les Ligies.

5. Nous avons constaté la présence de ce corps blanc (1), arborescent, d'apparence spongieuse et comme vasculaire, dans les deux premières paires de lames branchiales des Porcellions et des Armadilles, de l'un et de l'autre sexe. L'un de nous, en lisant au mois de novembre 1839, à la société d'histoire naturelle de Strasbourg, la note que nous avons citée dans notre historique, lui a fait voir un dessin de ce corps, pris du Porcellion rude, et montrant cette structure.

6. L'existence de ce corps blanc, bien constatée dans les deux premières paires de lames operculaires, au moins, des

(1) Nous le désignerons indifféremment par ces deux dénominations de corps blanc ou de corps jaune, parce qu'il est d'un blanc jaunâtre, et que cette dernière teinte varie en intensité.

Porcellions et des Armadilles, a pu être négligée par ceux qui considèrent ces deux premières paires de lames comme appartenant exclusivement à l'appareil mâle de la génération. Mais comme cet organe se trouve aussi dans les femelles, ils ont préféré n'en rien dire que d'en discuter ou d'en approfondir les usages.

7. On trouve des corps blancs dans toutes les lames operculaires du *Porcellion armadilloïde* et du *Porcellion à trois bandes*. C'est à notre avis une preuve indubitable d'une certaine identité de fonction de toutes ces lames; ce fait prouve aussi que les deux premières n'appartiennent pas uniquement à l'appareil de génération, suivant la détermination de Treviranus; ni exclusivement à la respiration, suivant celle de Latreille.

8. D'un autre côté l'abscence des corps blancs dans les lames operculaires des Cloportes propres et des Philoscies, genres si rapprochés d'ailleurs des Porcellions, au point que les naturalistes n'ont pu jusqu'ici leur assigner d'autre caractère différentiel facile à exprimer, qu'un article de plus aux antennes des Cloportes et des Philoscies (1), ou de moins à celles des Porcellions; cette absence, disons-nous, dans les deux genres en question, semblerait prouver que cet organe n'a pas une aussi grande importance que celle de changer entièrement la nature de l'appareil respiratoire dans ceux qui en sont pourvus, et de rendre cet appareil entièrement aérien dans ceux-ci, de branchial qu'il serait dans les autres.

9. Mais cette différence organique confirme la distinction de ces divers genres et pourra servir dorénavant à les mieux caractériser.

10. Notre description comprend celle d'une espèce de boutonnière, que nous avons observée dans le bord postérieur de la lame renfermant un corps blanc, et qui se voit facilement en soulevant un peu cette lame. L'un de nous a même vu cette boutonnière se dilater et se resserrer dans l'état de vie. Il s'en

(1) On donne encore pour caractères aux Philoscies d'avoir les antennes externes découvertes à leur insertion et les appendices styliformes internes de l'abdomen presque égaux aux externes.

échappe, suivant notre observation commune, de très petites quantités de liquide aqueux, dans lequel du moins, nous avons constaté qu'il n'existe pas de globules.

11. A l'époque de la communication de notre première note (1), nous n'étions pas encore parvenus à découvrir de très petits points, dont le nombre et la position varient, et qui paraissent être les orifices des conduits qui pénétreraient dans le corps arborescent. La description trop vague de Latreille nous avait induits en erreur sur la position de ces trous. Nous les avons reconnus, pour la première fois d'après l'indication de la figure du corps blanc déjà citée, et publiée par M. Milne Edwards, au fond de la boutonnière du bord postérieur de la lame, que nous avions précédemment déterminée.

12. Le feuillet membraneux interne ou supérieur de la lame operculaire semble être l'organe générateur du corps blanc, en se repliant entre lui-même et le feuillet aérien.

13. Des observations réitérées sur les animaux vivans nous ont fait voir les globules sanguins se mouvant, en apparence suivant le grossissement qui nous les démontrait, avec une grande rapidité, dans différens sens, et dans toute la largeur des lames branchiales operculaires des Cloportes. Ils disparaissaient derrière les ramifications du corps blanc, chez les Porcellions et les Armadilles.

14. Cette admirable circulation nous a démontré directement ce que Tréviranus avait présumé par l'absence des vaisseaux dans la lame branchiale, savoir, qu'elle intercepte un vide, une véritable lacune, dans laquelle se meut le sang pour la respiration.

15. Des globules y suivent cependant des courans assez réguliers, dont nous déterminons la marche dans la description détaillée de nos observations, faites ensemble d'abord, et continuées séparément.

16. Après bien des essais infructueux pour injecter le corps blanc et mettre en évidence sa composition vasculaire, après

(1) Voyez l'*Institut* du 27 novembre et du 19 décembre 1830.

l'avoir observé avec soin au microscope pour reconnaître sa structure intime, voici l'idée à laquelle nous nous arrêtons, en ce moment, sur cette structure et sur les usages de ce corps.

C'est une simple modification des lames branchiales operculaires, par le reploiement en dedans et la division du feuillet membraneux de ces lames, analogue à ce qui a lieu pour la membrane qui tapisse la cavité branchiale de certains décapodes.

Cette membrane spongieuse absorbe l'humidité de l'air et maintient humectée la lame branchiale. Mais l'action du fluide respirable a toujours lieu principalement à travers le feuillet membraneux interne de la lame branchiale qui forme dans cette lame, comme dans celles où les corps blancs n'existent pas, la paroi supérieure de la lacune dans laquelle le sang vient respirer.

17. Relativement au mécanisme de la respiration des Cloportides terrestres, nous avons remarqué que les mouvemens d'abduction des lames branchiales operculaires étaient bornés et n'étaient jamais assez étendus pour laisser échapper une lame d'eau, que ces animaux conservent entre leurs branchies, et qui empêche l'action desséchante de l'air.

Cette observation est importante pour comprendre que les Cloportides terrestres respirent l'air avec des organes de respiration aquatiques, ainsi que les effets promptement mortels, pour ces animaux, de la respiration d'un air sec.

18. En effet, les expériences que nous avons faites pour constater comparativement la durée de la vie des Cloportes et des Porcellions, dans un air sec et chaud, à l'ombre ou à la lumière ou dans l'eau, nous ont démontré que ces animaux périssent en peu d'instans (cinq quarts d'heures), exposés au soleil dans un bocal ouvert (6^{e} exp. du 15 juillet), tandis que, dans l'eau, la durée de la vie des Porcellions a été de 3 heures 1/2. (5^{e} exp. du 15 juillet.)

19. En général, dans toutes ces expériences, nous avons remarqué que les Porcellions résistent plus long-temps que les Cloportes à l'action desséchante de l'air ou de la lumière.

20. Les Porcellions privés de leurs corps blancs ne survivent

à cette mutilation que 18 ou 20 heures au plus, tandis qu'ils vivent long-temps quand on leur a coupé 10 pattes sur 14.

Sans doute ces expériences, qu'il sera facile de multiplier, ne suffisent pas encore pour en tirer des conclusions incontestables. Mais on peut au moins en déduire que l'eau et l'air sec et chaud, sans l'action de la lumière ou avec cette action, sont mortels pour ces animaux, et que leurs organes de respiration, quoique formés, pour l'essentiel, sur le modèle des branchies de cette classe, ne sont pas plus propres à respirer l'eau, ni l'air sec, que ceux de certains crabes terrestres. Leur respiration normale ne peut avoir lieu que dans un air humide, condition essentielle de la durée de leur existence.

IV. La quatrième famille des *Isopodes*, celle des *Sphéromiens*, a cinq paires de lames dans chaque série. De ces cinq paires de lames, huit sont operculaires ou protectrices. Il n'y a que la lame recouverte des deux dernières paires qui soit membraneuse ou vésiculeuse, et uniquement, essentiellement respiratrice.

On n'a pu voir sans étonnement, dans nos descriptions détaillées, toutes les précautions qui ont été prises pour préserver ces lames respiratrices des lésions des corps extérieurs, ainsi que leur structure particulière. Elles sont régulièrement divisées par des plis obliques, dont le nombre varie suivant le numéro des lames et les espèces de cette famille. Cette structure, qui les rend comme gaufrées, avait échappé aux recherches de M. Savigny.

V. Les branchies des *Cymothoadiens* que nous avons pu étudier forment un appareil d'une grande conformité de composition, sinon de structure.

Ce sont toujours dix paires de lames bien développées, disposées sur deux séries et insérées chacune sur un pédicule commun; les premières sont protectrices ou operculaires, et les suivantes respiratrices.

Il n'y a de différence que dans le nombre, la forme et l'étendue des lames protectrices ou operculaires, relativement aux lames respiratrices, et réciproquement.

Le nombre, ou, par compensation, l'étendue des premières est en raison des circonstances de mœurs qui pourraient mettre à sec l'animal et l'obliger de protéger les lames respiratrices contre l'action desséchante de l'air.

Les *Cymothoadiens errans*, quoique tous aquatiques, seraient, par exemple, plutôt dans ce cas, que les *Cymothaodiens parasites*, qui vivent fixés sur les branchies ou d'autres parties du corps des Poissons.

Cependant, malgré cette conformité d'organisation, nous avons trouvé des différences, relatives à chacun des groupes établis, différences qui pourraient, au besoin, servir à caractériser ces derniers. C'est ainsi que dans les *Cymothaodiens parasites* la lame la plus antérieure, grande et large, est conformée pour recouvrir toutes les autres; tandis que dans les *Cymothoadiens errans*, les lames antérieures sont loin d'avoir les dimensions suffisantes pour remplir cet usage.

On pourrait encore, dans *les Cymothoadiens parasites*, établir deux autres groupes dont le premier aurait des lames vésiculeuses plissées (genres *Nérocile* et *Anilocre*); tandis que le second ne serait pourvu que de lames vésiculeuses simples (genre *Cymothoé*).

VI et VII. Les familles parasites et entièrement aquatiques des *Bopyriens*, des *Képoniens* et des *Ioniens* s'écartent de plus en plus, par plusieurs circonstances organiques, de l'appareil respiratoire des Isopodes précédens.

Celle des *Bopyriens* n'a que cinq lames respiratrices dans chaque série, et manque de lames operculaires. Elle n'avait que faire de celles-ci, protégée comme elle l'est, par les parois de la cavité branchiale de l'animal aux dépens duquel elle vit.

Les *Képoniens* se distinguent de tous les autres *Isopodes* par le nombre, la disposition et la forme de leurs lames branchiales. (1)

(1) Voir ce que l'un de nous en a dit dans les Comptes-rendus de l'Académie des Sciences, du 12 octobre 1840, et le Mémoire inséré dans l'un des cahiers précédens de ces Annales.

B. *Relativement à l'histoire naturelle philosophique des* Isopodes,

Il était important d'étudier comparativement le plan d'organisation de l'appareil de respiration de ces animaux ayant des genres de vie si différens, et de constater si ce plan n'est que modifié, ou s'il est entièrement changé, pour ces diverses circonstances.

Nos propres observations répondent affirmativement à la première question, ainsi qu'on a pu le comprendre par la lecture de la première partie de cette analyse.

Elles montrent, dans le plan général de composition des organes de respiration des *Isopodes*, que ce sont des animaux aquatiques, comme toute la classe à laquelle ils appartiennent; et dans les diverses modifications de ce plan général, la raison de la distribution de ces animaux à la surface du globe, dans l'un ou dans l'autre milieu respirable.

C. *Relativement à l'histoire naturelle systématique ou classique*, on peut conclure de nos recherches :

1° Que la position abdominale des organes de la respiration, ou la suspension de ces organes, comme appendices, aux anneaux de l'abdomen, est le seul caractère commun qui subsiste, pour toutes les familles de cet ordre, tel qu'il est limité dans la classification que nous avons suivie;

2° Qu'en précisant davantage les caractères de position, de forme et de composition de l'appareil blanchial, on pourrait grouper ensemble les six premières familles, sous le nom d'*Isopodes normaux*. Elles se rapprochent en effet, sous le rapport des organes de la respiration, par la position sous-abdominale de leur appareil blanchial et par sa composition générale; cet appareil étant formé de lames branchiales vésiculeuses, recouvertes par des lames protectrices ou des opercules.

Le second groupe, celui des trois dernières familles des *Bopyriens*, des *Képoniens* et des *Ioniens*, formerait les *Isopodes anormaux*. Ils n'ont point de lames operculaires proprement

dites, pour protéger l'appareil branchial. Les seuls *Bopyriens* les ont toutes entières et sous-abdominales.

Les *Ioniens* les ont arborescentes et flottant autour de l'abdomen, double caractère tout-à-fait anormal parmi les Isopodes.

Les *Képoniens* les ont intermédiaires entre ces deux familles ; en partie sous-abdominales et entières ou presque entières, en partie flottant autour de l'abdomen et frangées. Enfin, dans cette dernière famille, la sixième paire d'appendices abdominaux flottans, est aussi convertie en branchie, ce qui n'a lieu dans aucun autre Isopode.

3° On peut encore conclure de l'étude détaillée de l'appareil respiratoire dans les *Crustacés isopodes*, que la disposition, la composition et la forme générale de cet appareil est la même dans chaque famille;

4° Que certains genres montrent dans leur appareil respiratoire des particularités de structure propres à les mieux caractériser qu'on a pu le faire jusqu'à présent. Tel est le genre *Porcellion*, que l'on pourra dorénavant distinguer des *Cloportes*, non-seulement par un article de moins aux antennes externes, mais encore par la présence d'un corps blanc dans les deux premières paires, au moins, des lames operculaires de son appareil respiratoire.

5° Un seul genre enfin, le genre *Tylos*, composé d'une seule espèce, se distingue par de singulières modifications dans la structure de son appareil respiratoire, dont la connaissance détaillée, due à M. Milne Edwards, nous fait penser qu'il devrait faire le type d'une famille distincte.

EXPLICATION DES FIGURES DE LA PLANCHE 6.

Fig. 1. Lame operculaire commune de l'*Idotea tricuspidata*, grossie deux fois pour montrer le style plumeux *c*, situé entre le rebord de l'abdomen et la partie libre de la lame. — *a*. Portion principale de la lame. *b*. Sa portion libre. *c*. Le stylet plumeux. *d*. Bord postérieur de l'abdomen

Fig. 2. Première paire d'opercules rudimentaires de l'*Aselle d'eau douce*, grossie 50 fois.

Fig. 3. Pièces représentant la deuxième paire de lames branchiales chez le mâle de l'*Aselle d'eau douce*. — *a*. Pédicule : on y aperçoit les faisceaux musculeux qui servent à mouvoir les autres pieces. — *b*. Pièce externe, correspondant à la lame operculaire du plan général. — *c*. Piece interne, tenant lieu de la lame vésiculeuse. — *d*. Appendice styliforme attaché à cette dernière pièce.

Fig. 4. Deuxième lame branchiale operculaire de la *Ligie océanique* mâle, du côté gauche, vue par sa face inférieure ou aérienne.—*a*. Lame operculaire. *b*. Lobe externe accessoire. *c* Stylet génital. *d*. Pièce transversale ou côte à laquelle le stylet est articulé. *e*. Débris de la membrane qui tapisse la face inférieure de l'abdomen. — Cette pièce a été dessinée au microscope avec un grossissement de 22 diamètres environ.

Figures 5-10. *Lames operculaires de la* Ligie des Hypnes (*Ligidium Persoonii* Brandt., *Ligia Hypnorum* Latr.), *femelle*.

La figure 5 est la première lame operculaire, la figure 6 la seconde, et ainsi de suite jusqu'à la cinquième lame représentée figure 10.

Fig. 7. *a*. Articulation de la troisième lame avec l'extrémité externe de la côte. *b*. Canal afférent. *d*. Canal efférent. *c*. Apparence de réseau capillaire, établissant une communication entre ces deux canaux.

Fig. 9. Quatrième lame dans l'abduction, vue de face. — *a*. La lame. *b*. Le crochet interne de la côte. La figure 8 représente la même lame dans l'adduction.

Fig. 10. Cinquième lame. — *a*. La lame principale. *b*. La côte. *c*. La lame accessoire, formée par un développement du crochet précédent.

Fig. 11. Stylet génital de la deuxième lame chez le mâle. *a*. Premier article, formé par la côte. *b*. Deuxième article ou stylet proprement dit.

Ces pièces sont grossies environ 23 fois: elles appartiennent au côté droit et sont vues par leur face inférieure ou aérienne.

Figures 12-14. *Appareil de la respiration dans les* Porcellions *et les* Armadilles.

Fig. 12. Lames branchiales operculaires dans le *Porcellio scaber*. — *c* et *d* sont les corps blancs des deux premières paires de lames.

Fig. 13. Les mêmes lames branchiales operculaires dans le *Porcellio armadilloides* (femelle). *c*. *d*, *e*, *f*, *g* indiquent les corps blancs dans les cinq paires de lames.

Fig. 14. Plaque operculaire de la deuxième paire, pour faire voir ce corps blanc par la face abdominale. Le bord postérieur *d* de cette plaque est en avant. — *a*. Ouverture en forme de boutonnière. *b*. Réseau de canaux qui longe le bord de cette boutonnière. *c*. Corps blanc arborescent.

Figures 15-22. *Appareil branchial du* Sphæroma cinereum.

La figure 15 fait voir la cavité branchiale garnie des cinq paires de lames operculaires et branchiales.

Fig. 16. Les lames operculaires et branchiales du côté droit ont été enlevées, de manière à montrer la cavité branchiale de ce côté. — *a*, *a*. sont les dernières pattes ambulatoires articulées au dernier segment thoracique. — *b*. est la cavité branchiale du côté droit. — *c*. La quatrième lame operculaire, portée en avant, pour découvrir la quatrième lame branchiale *d*, montrant les plis obliques. — *e*. Cinquième lame operculaire. — *f*. Cinquième lame branchiale.

Fig. 17. On voit dans cette figure *b* la partie droite de la cavité branchiale. — *e*. La cinquième lame operculaire, soulevée et portée en avant, pour mettre à découvert la cinquième lame branchiale *f*, dont les plis obliques sont plus nombreux que dans la précédente.

Fig. 18-22. Paires de lames operculaires et branchiales du côté droit. Dans toutes ces figures, *e* est la lame externe ou operculaire, et *i* la lame interne ou branchiale. On voit en *t*, fig. 22, les tubercules qui sont à l'angle interne et postérieur du cinquième opercule.

Fig. 23. Dernière paire de lames sous-abdominales du *Nerocila affinis* Edw., du côté droit, vue par sa face interne ou supérieure. — *a*. Pédicule. *b*. Lame recouvrante. *c*. Lame recouverte ou vésicule avec ses plis irréguliers. *d*. Appendice plissé de cette vésicule. *e*. Lobe membraneux externe, tenant au pédicule.

NOUVELLES RECHERCHES *concernant l'action de la Garance sur les os,*

Par M. FLOURENS.

(Quatrième Mémoire, lu à l'Académie des Sciences, le 8 février 1841.)

Développement des os en longueur.

Je me suis servi, dans un précédent Mémoire (1), de l'action de la garance pour suivre la marche de l'accroissement des os en grosseur. C'est ce que Duhamel, c'est ce que J. Hunter avaient déjà fait avant moi, du moins en partie. Mais ni Duhamel ni J. Hunter n'avaient songé à profiter de l'action de la garance pour démêler et suivre la marche de l'accroissement des os en longueur.

Et cependant l'action de la garance ne donne pas moins l'accroissement des os en longueur que leur accroissement en grosseur. On peut s'en assurer par les pièces que je mets sous les yeux de l'Académie.

La pièce n° 1 est le *tibia* d'un jeune porc.

L'animal a, d'abord, été soumis au *régime de la garance* (2) pendant un mois; puis il a été rendu à la nourriture ordinaire pendant quatre mois: enfin, il a été soumis de nouveau au *régime de la garance* pendant un mois, et il a été tué.

Le *tibia*, scié en long, offre selon toute sa longueur, trois lignes ou couches parfaitement distinctes: une interne, rouge; une intermédiaire, blanche; et une externe, rouge.

La couche interne est la portion d'os qui s'était formée pen-

(1) Voyez Annales des Sciences naturelles, deuxième série, tome XIII, page 104.

(2) *Régime de la garance*, c'est-à-dire garance mêlée à la nourriture ordinaire. Voyez mes précédens Mémoires, Annales des Sciences naturelles, tome XIII, page 39, etc.

dant le premier *régime de la garance* (1); l'intermédiaire est la portion d'os formée pendant l'usage de la nourriture ordinaire, et l'externe est la portion d'os formée pendant le second et dernier *régime de la garance.*

Mais, ce qui nous importe surtout ici, où il s'agit de démêler et de suivre, comme je l'ai déjà dit, l'accroissement de l'os en longueur, c'est que si l'on examine les deux extrémités de l'os, tant la supérieure que l'inférieure, on y voit deux masses ou portions de tissu spongieux ou réticulaire, juxtaposées et parfaitement distinctes l'une de l'autre par leur couleur.

La première de ces masses, celle qui touche au canal médullaire, est blanche (2); et la seconde, celle qui termine l'os, est rouge.

Or, de ces deux masses, l'interne, ou la plus ancienne puisqu'elle répond aux quatre mois du régime ordinaire (3), est blanche; et la terminale, ou la plus nouvelle puisqu'elle répond au dernier *régime de la garance,* est rouge. Donc les os croissent en longueur en allant du centre aux extrémités, par masses ou couches qui se juxtaposent, comme ils croissent en grosseur, en allant de dedans en dehors, par lames ou couches qui se superposent.

La pièce n° 2 est un *fémur* du même porc.

Le corps de l'os a été scié en travers, et l'on y voit très distinctement trois cercles ou couches: une interne, rouge (4), qui répond au premier *régime de la garance*; une intermédiaire, blanche, qui répond aux quatre mois de la nourriture ordi-

(1) Cette couche rouge est actuellement la couche la plus ancienne; mais elle avait été précédée par une autre, laquelle était blanche (car l'animal ne se nourrissait pas encore de garance), et a disparu par la résorption (Voyez mes précédens Mémoires, Annales des Sciences naturelles, tome XIII, page 104).

(2) Il y avait eu précédemment une couche rouge plus interne que la couche blanche actuelle, et qui répondait au premier régime de la garance, mais qui a déjà disparu par la résorption; car la résorption marche très vite dans le tissu spongieux des os.

(3) La couche, plus ancienne encore, et qui répondait au premier régime de la garance, a disparu par la résorption.

(4) Le cercle qui avait précédé cette couche rouge, et qui formait l'os avant le premier régime de la garance, a disparu par la résorption. (Voyez mes précédens Mémoires).

naire; et une externe, rouge, qui répond au dernier *régime de la garance.*

Les deux extrémités de l'os ont été sciées en long, et elles offrent deux masses distinctes : l'une interne et blanche, qui s'est formée pendant les quatre mois de la nourriture ordinaire ; l'autre externe ou terminale, et rouge, qui s'est formée pendant le dernier *régime de la garance.* Une masse plus ancienne, et qui s'était formée pendant le premier *régime de la garance*, a déjà disparu par la résorption.

Des deux masses qui restent, la plus ancienne est donc la plus interne; la plus nouvelle est la plus externe. Les os croissent donc en longueur par couches qui se juxtaposent, comme ils croissent en grosseur par couches qui se superposent.

Les os, contenus dans les bocaux 3, 4 et 5, appartiennent à un jeune porc qui, après un mois du *régime de la garance*, a été rendu à la nourriture ordinaire pendant six mois.

L'os du bocal n° 3 est le *fémur.* Ce *fémur* a été scié en long et l'on y voit, selon toute sa longueur, deux lignes ou couches, l'une interne, très mince et rouge; l'autre externe, très épaisse et blanche. La couche interne et rouge, presque entièrement résorbée sur quelques points, est celle qui s'était formée pendant le *régime de la garance ;* la couche externe et blanche, beaucoup plus épaisse, est toute la portion d'os qui s'est formée pendant les six mois de la nourriture ordinaire. Voilà pour l'accroissement de l'os en grosseur.

Pour juger tout aussi sûrement de l'accroissement en longueur, il suffit de remarquer que la couche rouge ne règne que sur le corps de l'os, et que tout ce qui est extrémité est blanc.

Or, ce qui est extrémité, ce qui est blanc, est ce qui s'est fait depuis que le *régime de la garance* a cessé, c'est ce qui s'est fait après ce qui est rouge, puisque le *régime de la garance* avait précédé la nourriture ordinaire, c'est donc par leurs extrémités que les os s'allongent.

Les bocaux 4 et 5 présentent quelques os du *carpe* du même porc.

Les os du bocal n° 4 sont sciés en long ; les os du bocal n° 5 sont entiers. Et partout, soit que l'on considère les os sciés en

long et que l'on voit à l'intérieur, soit que l'on considère les os entiers et que l'on voit à l'extérieur, partout la couche rouge marque par sa limite, et quelle était la longueur de l'os au moment où le *régime de la garance* a cessé, et quelle est l'étendue de la portion d'os qui s'est formée depuis que l'animal a été rendu à la nourriture ordinaire.

C'est donc, encore une fois, par couches externes et juxtaposées que les os croissent en longueur, comme c'est par couches externes et superposées qu'ils croissent en grosseur. En d'autres termes, et en un seul mot, c'est par l'addition de nouvelles couches, déposées à la surface externe des couches déjà formées, que l'accroissement des os s'opère (1).

L'action de la garance donne donc l'accroissement des os en longueur, comme il donne leur accroissement en grosseur.

Il est singulier que Duhamel et J. Hunter ne s'en soient pas aperçus, eux qui, d'ailleurs, pour découvrir et pour démontrer l'accroissement des os en longueur, ont imaginé des expériences si ingénieuses et susceptibles d'une si grande précision.

Duhamel perça le *tibia* d'un jeune poulet (2) de plusieurs trous, placés à une égale distance les uns des autres. Au bout d'un certain temps, la position respective des trous n'avait pas changé; tout l'accroissement s'était fait aux extrémités de l'os, et par delà les trous. Voici cette belle expérience de Duhamel, qui n'a pas été assez remarquée, et que lui-même a mal comprise (3).

» On choisit, dit-il, un poulet d'environ six semaines ; l'os de sa jambe avait deux pouces de longueur; on le perça avec un

(1) C'est même là ce qui fait tout l'accroissement ; c'est que les parties nouvelles, se formant par dessus les anciennes, sont nécessairement plus grandes.

(2) Je choisis cette expérience de Duhamel entre plusieurs autres, parce que, de toutes les siennes, c'est celle qui se rapproche le plus de l'expérience décisive de Hunter. (Voyez le Mémoire de Duhamel sur la *crue des os suivant leur longueur*, Mémoires de l'Académie des Sciences, année 1743.)

(3) Trompé par d'autres expériences, faites sur des animaux plus jeunes et dans lesquelles il avait cru voir les trous s'éloigner plus ou moins les uns des autres, moins à la partie moyenne et plus aux extrémités. D'où il concluait que les os s'allongent dans toutes leurs parties, mais surtout dans leurs parties extrêmes. (Voyez son Mémoire, déjà cité.)

foret à un demi-pouce de l'articulation du pied ; on fit un autre trou un demi-pouce plus haut, enfin on fit un troisième trou encore un demi-pouce plus haut; et ce dernier trou était éloigné de l'articulation du genou d'un demi-pouce; de sorte que toute la longueur de l'os était divisée par demi-pouces.

« Je fis passer un fil d'argent dans chacun de ses trous, et on en fit des anneaux qui embrassaient la moitié des chairs ou des muscles de la jambe.

« Ce poulet fut tué sept semaines après qu'on lui avait piqué l'os de la jambe....; et alors l'os tibia avait trois pouces de longueur au lieu de deux qu'il avait au commencement de l'expérience.

« Il est question de savoir, continue Duhamel, à quelle partie de cet os s'est fait cet allongement, et c'est ce qu'il est aisé de connaître par le moyen des trous qui divisaient l'os de la jambe en quatre parties égales. Le premier qui, au commencement de l'expérience, était à six lignes de l'extrémité inférieure, était à la fin de l'expérience à neuf lignes; ainsi l'os s'était allongé de trois lignes en cet endroit. Le deuxième trou était, à la fin de l'expérience comme au commencement, à six lignes du premier et du troisième trou ; il n'y avait donc eu aucun allongement entre le premier et le troisième trou. Mais ce troisième trou qui, au commencement de l'expérience, était éloigné de six lignes de l'extrémité supérieure du tibia, en était éloigné à la fin de quinze lignes; ainsi il y avait neuf lignes d'allongement à cette partie....»

L'expérience de J. Hunter brille par plus de clarté encore. Le *tibia* d'un jeune porc fut percé de deux trous. L'intervalle de ces deux trous fut exactement mesuré. Au bout de plusieurs mois, l'animal fut tué. Il avait beaucoup grandi, son *tibia* s'était fort *allongé*, et cependant l'intervalle entre les deux trous n'avait pas changé (1). Que l'on consulte donc les expériences mécaniques ou les expériences par la garance, la conclusion est toujours la même : c'est par leurs extrémités, et par leurs extrémités seules, que les os s'allongent.

(1) Voyez *Transactions of Society for the improvement of medical and chirurgical knowledge*, tome II, page 272.

Je reviens à mes expériences par la garance, et je cherche à voir, d'une vue générale, le mécanisme singulier par lequel les os croissent et se développent.

Or, ce mécanisme du développement des os consiste évidemment dans une *mutation continuelle* de toutes les parties qui les composent. Cet os, que je considère et qui se développe, n'a plus, en ce moment, aucune des parties qu'il avait il y a quelque temps, et bientôt il n'aura plus aucune de celles qu'il a aujourd'hui. Et dans tout ce renouvellement perpétuel de matière, sa forme change très peu. Là est une des premières et fondamentales lois qui régissent les organismes. Dans tout ce qui a vie, la forme est plus persistante que la matière.

Buffon l'avait déjà remarqué. « Ce qu'il y a, dit-il, de plus constant, de plus invariable dans la nature, c'est l'empreinte ou le moule de chaque espèce; ce qu'il y a de plus variable et de plus corruptible, c'est la substance (1). »

Georges Cuvier s'est plu à développer cette belle idée. « Dans les corps vivans, dit-il, aucune molécule ne reste en place, toutes entrent et sortent successivement : la vie est un tourbillon continuel, dont la direction, toute compliquée qu'elle est, demeure constante, ainsi que l'espèce des molécules qui y sont entraînées, mais non les molécules individuelles elles-mêmes ; au contraire, la matière actuelle du corps vivant n'y sera bientôt plus, et cependant elle est dépositaire de la force qui contraindra la matière future à marcher dans le même sens qu'elle. Ainsi la forme de ces corps leur est plus essentielle que leur matière, puisque celle-ci change sans cesse, tandis que l'autre se conserve (2). »

On peut dire que cette grande vue de la *mutation continuelle de la matière*, fruit d'une méditation abstraite plus encore que des faits mêmes pour Buffon et pour Cuvier, se convertit en un fait matériel dans mes expériences par la garance.

Si je considère, en effet, l'accroissement en grosseur sur un de ces os que j'ai mis sous les yeux de l'Académie, sur le *tibia*,

(1) Buffon, *Histoire du Cerf.*

(2) Rapport historique sur les progrès des Sciences naturelles.

sur le *fémur* de ce jeune porc, qui, après avoir été soumis au *régime de la garance* pendant un mois, a été rendu à la nourriture ordinaire pendant six mois, je vois à l'intérieur une couche rouge, mais avant que cette couche rouge se fût formée, il en existait une autre qui était blanche et qui a déjà disparu. Cette couche rouge qui est à présent la plus ancienne, était donc naguère la plus nouvelle; et quand elle était la plus nouvelle, elle qui bientôt ne sera plus, toutes les couches blanches qui se sont formées depuis n'existaient pas encore.

L'accroissement en longueur me donne le mêmes faits, et peut-être de plus surprenans encore. Les extrémités de l'os, ce qu'on appelle ses *têtes*, changent complètement pendant qu'il s'accroît. En effet, la *tête* ou extrémité de l'os qui se trouvait au point où finit la couche rouge, et qui avait alors elle-même une couche rouge, n'est plus; elle a été résorbée; et celle qui est maintenant n'existait pas alors; elle s'est formée depuis.

Tout change donc, dans l'os, pendant qu'il s'accroît. Toutes ses parties paraissent et disparaissent; toutes sont, successivement, formées et résorbées; et chacune, comme le dit admirablement G. Cuvier, est *dépositaire*, tandis qu'elle existe, de la *force* qui *contraint* celle qui lui succède, et à *marcher dans le même sens qu'elle*, et à revêtir sa forme.

Je ne présente le squelette du jeune porc, placé dans le bocal n° 6, que, pour donner une idée, par l'extrême vivacité de la couleur rouge des os, de l'action puissante que la garance exerce sur ces parties.

Le squelette n° 7 est celui d'un jeune pigeon qui n'a été soumis au *régime de la garance* que pendant six jours. Les os sont du rouge le plus vif.

A côté, dans le bocal n° 8, est le squelette d'un pigeon adulte qui a été soumis au même régime pendant plusieurs mois; et cependant les os sont à peine de couleur rosée.

Le mouvement par lequel s'opère l'accroissement dans le jeune animal se continue donc dans l'animal adulte, puisque les os de l'animal adulte se colorent par la garance; mais il ne s'y continue que très ralenti, puisque, après plusieurs mois du *régime de la garance*, les os de l'animal adulte sont beaucoup

moins colorés que ceux du jeune animal après quelques jours seulement de ce régime, et je pourrais dire même, en rappelant les expériences de mon premier Mémoire (1), après quelques heures.

L'action de la garance transforme donc, en faits visibles à l'œil, la marche de l'accroissement des os. Elle marque même et la rapidité première, et le ralentissement progressif de ce mouvement que Cuvier appelle le *tourbillon vital*, et par lequel toutes les parties des os se renouvellent et se succèdent.

Mais la garance n'agit que sur les os. On sent donc combien il serait important de trouver une substance qui agît aussi sur les autres parties, et qui nous démasquât, de même, et le mécanisme de leur accroissement, et la marche du *tourbillon particulier* qui les entretient et les régénère.

Je cherche et ne désespère point.

Déjà, parmi plusieurs substances non encore essayées sous le point de vue qui m'occupe ici, et que je dois à l'amitié de mon savant confrère M. Pelouze, il s'en est trouvé une, l'*acide aloétique*, qui colore les os en violet, comme on peut le voir par le squelette contenu dans le bocal n° 9.

Mais l'*acide aloétique* nous fournira-t-il enfin ce moyen d'exploration cherché depuis si long-temps pour les parties autres que les os? C'est ce que je n'oserais dire encore. Je dois pourtant ajouter, relativement au pigeon dont je présente ici les os colorés, que, bien qu'il n'ait pris qu'une seule fois de l'*acide aloétique*, qu'il en ait pris très peu, et qu'il soit mort quelques heures après en avoir pris, sa peau, son tissu cellulaire, ses cartilages, etc., offraient néanmoins déjà, autant que j'en ai pu juger par un premier examen, une couleur violette assez prononcée.

Je répète et je continue, en ce moment, ces nouvelles expériences.

(1) Voyez Annales des Sciences naturelles, tome XIII.

OBSERVATIONS *sur les vaisseaux lymphatiques de la Salamandre et de la Grenouille, extraites d'une lettre du docteur* RUSCONI, *membre de l'institut de Milan, adressée à M.* BRESCHET, *membre de l'Institut de France.*

« J'ai le plaisir de vous annoncer que je viens de découvrir un fait anatomique entièrement nouveau et des plus curieux, que je vous prie de faire connaître à vos collègues de l'Institut (Académie des Sciences); j'ai trouvé dans la Salamandre commune, que les vaisseaux lymphatiques des viscères abdominaux ne sont que des gaînes assez larges qui couvrent et renferment une artère, comme les doigts d'un gant enveloppent et contiennent les doigts de la main, de sorte que dans tous les vaisseaux lymphatiques des viscères de l'abdomen qui aboutissent au réservoir du chyle et au canal thoracique, il y a deux fluides qui circulent en sens contraire l'un de l'autre. M. B. Panizza, mon illustre collègue, a vu dans toutes les Tortues de mer, que l'aorte et les troncs qui en naissent (mais les troncs seulement et non leurs ramifications) sont renfermés dans le canal thoracique et dans les réservoirs de la lymphe : il dit positivement qu'ils y sont enveloppés de la même manière que le cœur est contenu dans le péricarde, et que, par conséquent, la lymphe n'est en contact ni avec l'aorte, ni avec les troncs qu'elle produit. Il pose en fait (p. 33) que les réservoirs et le canal thoracique sont les seuls canaux de la lymphe qui renferment dans leur intérieur les gros vaisseaux, savoir, l'aorte et les troncs qu'elle fournit. Or, d'après mes observations sur les Salamandres, l'aorte abdominale, les troncs qu'elle produit et toutes leurs ramifications (*diramationes*) jusqu'aux plus petites, sont non pas simplement enveloppés, mais renfermés dans les vaisseaux lymphatiques, de façon que la lymphe qui circule dans ces vaisseaux se trouve toujours en contact avec les artères. Injectez un liquide coloré en rouge dans le système artériel, et en blanc dans les vaisseaux lymphatiques d'une Salamandre,

et vous aurez le plaisir de voir les artères du mésentère à travers les parois de ces vaisseaux; ouvrez le réservoir du chyle, fendez deux ou trois vaisseaux lymphatiques tout de leur long, soulevez les artères avec une petite pince, et vous verrez qu'elles sont assujetties aux parois des vaisseaux chylifères par des brides tendineuses extrêmement ténues, et vous remarquerez que, dans le réservoir, elles sont unies entre elles et fixées par ces mêmes brides aux parois de ce dernier. Le fait que je vous annonce est de la plus grande exactitude, et c'est parce que j'ai acquis la certitude de cette disposition anatomique, que je vous prie d'en donner connaissance aux anatomistes français. J'ai parlé de cette disposition des vaisseaux lymphatiques des Salamandres devant l'Institut de Milan, ma communication vient d'être rendue publique par l'impression; mais en attendant que je puisse vous adresser mon opuscule, je vous prie d'annoncer ma découverte, afin que les savans qu'elle pourra intéresser puissent en constater la rigoureuse exactitude et étendre leurs investigations à d'autres reptiles.

« Si vous voulez faire des recherches sur les vaisseaux lymphatiques des *petits animaux*, je vous engage à ne point vous servir des tubes à injection de Sœmmerring, et de ne point employer le mercure pour les injections, parce que ce métal par son poids déchire très facilement les tissus des petits animaux, il sort des vaisseaux, s'extravase, après avoir dilaté, outre mesure, les canaux dans lesquels on l'avait introduit; en un mot, il altère tout. Au lieu de mercure, servez-vous de cire colorée en rouge ou en bleu, et mêlez-y de l'huile de noix, en plus ou moins grande quantité, selon le chaleur de la saison, et faites votre injection avec une petite seringue, je puis vous assurer, et d'après ma propre expérience, que vous en serez très satisfait.

« A la dernière réunion des naturalistes qui, comme vous le savez sans doute, a eu lieu à Turin, j'ai lu un petit mémoire sur la méthode dont je me sers pour disséquer les embryons extrêmement petits, laquelle consiste à les enchâsser dans de la cire, comme l'on enchâtonne des diamans, puis à disséquer ces embryons sous l'eau, après les avoir légèrement baignés avec

une liqueur acide, composée d'une partie d'acide nitrique et de huit parties d'eau. C'est à l'aide de ce procédé anatomique que j'ai pu suivre le développement de l'encéphale de la Grenouille, et je regrette beaucoup que M. le professeur Serres n'ait pas connu ce procédé à l'époque où il a fait ses observations sur l'encéphale considéré dans les quatre classes des animaux vertébrés. S'il l'eût connu, il n'aurait pas eu tant d'obstacles à vaincre, comme il le dit lui-même, pour suivre la formation et les évolutions successives de l'encéphale et de la moelle épinière chez le Tétard.

« Pavie, le 26 décembre 1840.

P. S. « Pendant que je vous écrivais cette lettre, l'on m'a apporté des Grenouilles communes assez grosses; je les ai disséquées sans délai, et j'ai remarqué, à l'aide de mes injections, que, sous le rapport du système lymphatique, elles sont organisées comme les Salamandres. J'ai même reconnu que sur les grenouilles l'on peut constater le fait que je vous annonce avec plus de facilité que sur les Salamandres. » (1)

NOTE *sur les globules sanguins du* CRYPTOBRANCHUS JAPONICUS (*Extrait d'une lettre de M.* J. VAN DER HOEVEN, *professeur de zoologie à Leyde, à M. le professeur* BRESCHET, *à Paris.*)

On connaît par divers écrits de naturalistes hollandais, au nombre desquels je citerai un mémoire de M. J. Van der Hœven, le singulier reptile du Japon, que ce savant professeur croit être un *Menopoma*, sans ouverture au cou, et qu'il a nommé *Cryptobranchus japonicus*: ce grand reptile batracien, rapporté vivant du Japon par M. de Siébold, a vécu à Leyde pendant plus de sept ans, dans un réservoir où il nageait et rampait, et où

(1) M. Breschet s'occupe en ce moment de vérifier par la dissection de plusieurs espèces de reptiles, la découverte importante de M. Rusconi: nous ferons plus tard connaître les résultats de ses investigations. (*Réd.*)

on le voyait venir à la surface du liquide, pour y respirer. La longueur de cet animal était, peu de temps après son arrivée en Hollande, de plus de trois pieds, du museau à l'extrémité de la queue, et depuis cette époque, cette grande Salamandre (*Salamandra maxima*) a encore pris du développement. Lors du froid rigoureux de janvier 1838, l'eau du réservoir fut couverte de glace pendant une nuit, et le reptile n'en parut pas souffrir.

M. Temminck a designé ce Batracien dans son coup-d'œil sur la Faune des îles de la Sonde et de l'empire du Japon, sous le nom de *Triton japonicus* et une belle figure lithographiée a été publiée dans la *Fauna japonica*.

Ce n'est point la grandeur seule qui rend cet animal remarquable; ce sont aussi ses formes bizarres, comme le fait très bien remarquer le naturaliste célèbre que nous venons de nommer. Bien que d'après ses formes extérieures et d'après quelques caractères secondaires, ce reptile paraisse devoir être rangé à côté des Salamandres, cependant, d'après l'histoire qu'en fait le savant M. Schlegel dans sa Faune du Japon, on peut croire avec M. Van der Hœven, que, dans l'état actuel de la science, ce reptile ne saurait être regardé comme une Salamandre (1). Mais nous nous abstiendrons dans cette simple note d'entrer dans des considérations relatives à la place réelle que doit occuper ce reptile dans un cadre zoologique. Nous renvoyons nos lecteurs aux travaux importans de MM. Temminck, Schlegel, J. Van der Hœven, etc., et nous nous bornerons ici à donner l'extrait d'une lettre qui nous a été écrite par notre savant ami le professeur J. Van der Hœven.

« Comme il est connu que les reptiles se distinguent par le volume de leurs globules sanguins, volume bien supérieur à celui des globules du sang des autres vertèbres, et comme on savait déjà que ceux du *Proteus anguinus* sont plus grands que ceux de tous les autres animaux, que l'on a jusqu'ici examinés, il était tout naturel de penser que les globules sanguins du *Cryptobranchus japonicus*, qui, suivant moi, sont plus près du *Proteus*, que des

(1) Fragmens zoologiques sur les Batraciens, § IV, sur un grand reptile du Japon, appelé communément *Salamandre*, page 7.

vraies Salamandres, auraient des dimensions très considérables, je voulus constater ce fait. »

« Ce reptile vit maintenant à Amsterdam, dans le jardin de la Société zoologique, bien que l'animal appartienne toujours au Muséum d'histoire naturelle de Leyde. Je crus devoir profiter d'un voyage que j'ai fait récemment à Amsterdam, pour examiner au microscope le sang du *Cryptobranchus japonicus*, et les résultats de mon examen ont confirmé mes prévisions.

« Avec un microscope simple et une lentille d'une puissance médiocre, je reconnus déjà parfaitement bien les globules ovales ainsi que leurs noyaux. Revenu à Leyde, je constatai d'une manière rigoureuse, avec un microscope de Plœssl, que les globules ont $\frac{1}{19}$ de millim. ou $\frac{1}{42}$ de ligne de longueur sur $\frac{1}{30}$-$\frac{1}{32}$ de millim. ou $\frac{1}{63}$ de ligne de largeur. Avec une loupe, grossissant environ huit fois, on distinguait déjà les globules, et un grossissement de vingt-sept fois est suffisant pour faire voir le noyau avec clarté. »

« Le *Chryptobranchus japonicus* est donc, après le Protée, le second exemple d'un animal vertébré à très grands corpuscules ou globules sanguins. »

Remarques *sur la phosphorescence de quelques animaux articulés, à l'occasion d'une lettre de M.* Forester *sur la phosphorescence des Lombrics terrestres.*

Par M. V. Audouin.

A l'occasion d'une lettre de M. Forester sur la *phosphorescence des Lombrics de terre*, adressée à l'Académie des Sciences le 2 novembre 1840 (1), j'ai émis un doute qui paraîtrait une contradiction trop formelle du fait avancé, si l'on croyait que

(1) L'auteur de cette lettre annonçait avoir vu, par une nuit obscure et très pluvieuse, un grand nombre de Lombrics qui brillaient d'une lumière blanche comparable à celle du fer chauffé à blanc. (R.)

j'ai prétendu nier formellement la réalité de cette phosphorescence; telle n'a pas été mon intention. En effet, je sais mieux que personne que ce phénomène n'a rien d'impossible, l'ayant étudié expérimentalement, et très souvent, sur plusieurs animaux articulés; mais j'ai dit que je n'avais pas été jusqu'ici assez heureux pour en être témoin chez les *vers de terre* ou *Lombrics terrestres.*

Je n'ignorais pas que M. de Flaugergues avait publié, il y a soixante ans, dans le Recueil de l'abbé Rozier (octobre 1780) des observations sur la *phosphorescence des vers de terre;* et que, douze ans plus tard, en 1792, Bruguière avait constaté un fait analogue. Depuis long-temps j'avais cherché à vérifier ce phénomène, lorsque, croyant enfin y être parvenu, je fus détrompé par la découverte de la phosphorescence chez un animal articulé d'un tout autre ordre que les Lombrics. Voici dans quelles circonstances :

J'étais en 1814 à Choisy-le-Roi près Paris, où je passais habituellement le temps des vacances scholastiques et je m'y occupais d'observations sur les mœurs des insectes qui me mettaient en rapports fréquens avec des cultivateurs. Le 16 août l'un d'eux vint me trouver à neuf heures du soir et me fit part d'un fait tout nouveau pour lui : la présence d'une foule innombrable de *vers de terre,* disait-il, qui vivaient dans une plate-bande plantée en chicorée, et répandaient une lumière de *charbon brûlant à blanc* : ce furent ces expressions. Il m'apporta un de ces vers dans un pot de terre, et c'était bien un *Lombric.* Toutefois ce Lombric n'était pas phosphorescent; le cultivateur en était surpris, et je m'en étonnais moi-même, quand, en examinant avec soin ce pot rempli de terre, j'y découvris bientôt cinq à six petites *Scolopendres* à corps très étroit (1) qui jetaient une vive lueur phosphorique. Curieux d'observer ce phénomène plus en grand, je me transportai aussitôt sur les lieux; d'abord je vis des lueurs phosphoriques à la surface du sol; mais l'ayant fait

(1) Ces Scolopendres appartenaient à l'espèce que Linné a désignée sous le nom d'*electrica.* Leach a créé, pour elle et pour quelques autres Myriapodes, le genre Géophile, *Geophilus* (*Transactions de la Société linnéennes de Londres*, tome XI).

bécher, j'assister à un spectacle vraiment éblouissant : la terre remuée était comme arrosée de gouttelettes phosphoriques et dans certaines places le liquide semblait couler comme de petits filets d'eau; brisait-on des mottes, elles jetaient une vive lumière phosphorique, et si l'on écrasait des parcelles de terre dans la main, elles y laissaient des traînées lumineuses qui ne disparaissaient qu'après 8, 10 et 20 secondes. Or il me fut très facile de constater que cette phosphorescence était uniquement due à de très petites *Scolopendres* et nullement aux vers de terre ou *Lombrics* qui cependant étaient très abondans dans ce terrain.

Je suis resté long-temps sous l'impression de ce fait, et quand on m'a dit quelquefois avoir rencontré des *Lombrics terrestres* lumineux, j'ai cité mon observation et j'ai engagé les personnes qui m'assuraient avoir été témoins de ce phénomène très curieux, à s'assurer s'il n'y avait pas méprise, et si les Lombrics en question n'étaient pas plutôt des petites Scolopendres.

Toutefois je m'empresse de dire à l'Académie qu'aujourd'hui, et seulement depuis la séance dernière, je ne conserve plus aucun doute sur la phosphorescence de certains *Lombrics* ou *vers de terre*. Evidemment ces annélides jouissent de cette propriété aussi bien que les Scolopendres; et ce qui me frappe, c'est que les Lombrics ont avec les Scolopendres ceci de commun qu'ils possèdent cette faculté de répandre une lueur phosphorique plus prononcée, au moment de leur reproduction. C'est à M. Moquin-Tandon, professeur de botanique à la Faculté des Sciences de Toulouse, et zoologiste très distingué, que je dois les renseignemens positifs qui ont établi ma conviction. J'en présenterai ici un court extrait.

Un grand nombre de petits animaux phosphorescens s'étant présentés, il y a trois ans, dans une allée du jardin de M. de Puymaurin à Toulouse, et pendant une soirée très chaude de l'été, MM. Saget et Moquin-Tandon les examinèrent et reconnurent positivement qu'ils appartenaient au genre *Lombric*. Ils avaient une longueur de 40 à 50 millimètres environ.

La lumière qu'ils donnaient paraissait blanchâtre et ressemblait beaucoup à celle du fer rougi au blanc. Quand on écrasait

un de ces vers avec le pied, la phosphorescence s'étalait sur le sol; elle produisait même à volonté, une longue traînée lumineuse, comme si l'on avait frotté le sol avec un morceau de phosphore.

Chacun de ces Lombrics présentait un *clitellum* assez développé, ce qui prouve que les individus observés étaient adultes et au moment de s'accoupler.

M. Moquin-Tandon recueillit quelques-uns de ces Lombrics, et les conserva vivans pendant plusieurs jours; il observa que leur propriété lumineuse résidait dans la substance du renflement sexuel, ou *clitellum* dont je viens de parler, et que cette propriété cessait d'exister immédaitement après l'accouplement.

Ce dernier fait est confirmé d'ailleurs par l'observation suivante, qui concerne un insecte bien connu de tout le monde, le *ver luisant, Lampyris noctiluca.*

Dans une belle soirée d'été, votre honorable correspondant M. Bérard, à Montpellier, avait réuni chez lui plusieurs professeurs et naturalistes de ses amis. M. le docteur Lallemand, qui était du nombre, rendit les personnes présentes témoins d'un phénomène très curieux. Il prit dans sa main une femelle du *ver luisant* de l'espèce nommée *Lampyris noctiluca;* il allongea le bras en dehors de la porte du salon qui donnait sur un jardin : quelques instans s'étaient à peine écoulés, qu'un Lampyre mâle vint s'abattre sur la femelle, qui, comme on le sait, est *vermiforme,* et s'accoupla immédiatement avec elle; mais aussitôt l'acte accompli, la lumière de la femelle s'éteignit. Ce phénomène physiologique curieux a eu pour témoins des savans très distingués, MM. Bérard, Dugès, Dubreuil, Balard et Moquin-Tandon.

Observations *sur le développement des zoospermes de la Raie,*

Par M. Lallemand,

Professeur à la Faculté de Médecine de Montpellier.

(Présenté à l'Académie des Sciences, dans sa séance du 7 juin 1841.)

Une foule d'analogies et quelques observations directes, m'avaient fait penser depuis long-temps que les premiers rudimens des zoospermes sont fournis par l'extrémité des canaux spermatiques, et se développent ensuite successivement dans le reste de leur trajet; mais je ne pensais pas qu'il fût possible d'arriver à la démonstration matérielle d'un fait qu'il semblait difficile de vérifier d'une manière incontestable. Le hasard m'a mieux servi que je n'avais osé l'espérer.

Parmi les poissons dont je desirais examiner la liqueur séminale, la Raie avait cet avantage, que le mâle est facile à reconnaître par les deux longs appendices qui lui servent à retenir la femelle. Mais l'époque de leur frai n'étant pas connue, je ne trouvai d'abord que des organes rudimentaires. Enfin, au commencement d'avril, ils acquirent en peu de jours un développement rapide, et le canal déférent, que je n'avais pu voir, devint énorme et très compliqué. Voici ce que j'ai observé alors (1):

Les testicules placés au-dessous des lobes latéraux du foie diffèrent par leur forme à mesure qu'ils deviennent plus turgescens, parce que le droit est gêné dans son développement par le volume du lobe correspondant du foie. La face supérieure (*a*, *a*, fig. 2, Pl. 10) est convexe, inégale et comme tuberculeuse; des mamelons blanchâtres et granuleux, du volume d'un petit pois,

(1) A l'époque de l'envoi de ce Mémoire à l'Académie, on n'avait pas encore reçu à Montpellier le cinquième cahier des Archives de Müller, pour l'année 1840, et, par conséquent, M. Lallemand ignorait l'existence des recherches du docteur Hallmann sur ce sujet: c'est pour cette raison qu'elles ne sont pas citées, et c'est au nom de l'auteur que nous nous empressons de réparer cette omission, en signalant à nos lecteurs le Mémoire intitulé: « *Uber den bau des Hodens und die Entwickelung der Saamenthiere der Rochen* », et contenu dans le recueil déjà mentionné. Rép.

sont séparés par des dépressions d'un gris plus ou moins foncé, au fond desquelles se voient des stries blanchâtres. Cette surface, ordinairement plane et lisse, devient d'autant plus bombée et granuleuse, que le rut augmente ; elle est formée par l'extrémité des vaisseaux sécréteurs du testicule, qui se terminent en ampoule sphérique. Ces dilatations ont environ vingt fois le diamètre des canaux spermatiques, dont ils sont la terminaison ; c'est dans leur cavité que se forment les zoospermes, dont les développemens successifs produisent les différens aspects que prennent ces culs-de-sac. Les ovaires présentent exactement les mêmes formes, les mêmes changemens, à la même époque ; seulement, les bosselures de la surface de l'ovaire sont dues à la présence d'ovules plus ou moins avancés, sur lesquels on distingue toujours le disque prolifère et le point central de la fécondation.

Le bord postérieur du testicule est blanchâtre, lisse, consistant, et représente le commencement de l'épididyme, uni au sommet du cloaque (fig. 1 *k*), par une expansion du péritoine (fig. 1 *l*) ; la face inférieure du testicule est blanchâtre et lisse dans toute son étendue, et parcourue par les vaisseaux sanguins et par les conduits excréteurs de l'organe. C'est un épididyme très étalé, d'où part le canal déférent (*c*, *c*, fig. 1), comme la tige d'une feuille de *Nymphæa* s'implante à sa face inférieure, en lui fournissant des nervures dans tous les sens. De là, le canal déférent (*c*, *c*, fig. 1) remonte jusqu'à la base du foie, enveloppé seulement par un repli du péritoine, après quoi il se prolonge en zig-zags (*d*, *d*, *d*, fig. 1) unis par du tissu cellulaire ; il passe ensuite sous une espèce de prostate (*e*, *e*, fig. 1) qui enveloppe ses circonvolutions, descend au côté interne du rein (*j*, *j*, fig. 1) en augmentant toujours de volume, et se termine par une dilatation considérable (*g*, fig. 1) qui s'ouvre d'une part dans le cloaque par l'ouverture (*t*), et de l'autre dans une vésicule séminale (*h*) remplie d'un liquide jaunâtre très abondant, contenant des zoospermes.

D'après ce que je viens de dire du testicule de la raie, on voit qu'il n'est, pour ainsi dire, composé que de deux surfaces, dont la supérieure (fig. 2) est presque entièrement couverte de mamelons dus au développement des ampoules par lesquelles

se terminent les canaux spermatiques; tandis que l'inférieure (fig. 1) est tout entière formée par l'épididyme. Entre ces deux surfaces, le trajet des canaux spermatiques doit être fort court; aussi est-ce dans les ampoules terminales que se forment les zoospermes, et, comme ce travail ne commence pas en même temps dans toutes ces parties à-la-fois, il est très facile d'en suivre les progrès successifs. C'est ce précieux avantage que je me suis efforcé de mettre à profit.

Chacun des mamelons blanchâtres de la surface supérieure du testicule, vu à la loupe, paraît composé d'une centaine d'ampoules (fig. 2 *a'*), bien entendu que les plus blanches, quand on les observe par réflexion, sont précisément celles dont la teinte est plus noire quand on les voit par transparence. Les ampoules qui constituent chaque mamelon, vues au grossissement de quarante fois (fig. 3), sont plus ou moins avancées, quoique d'un volume à-peu-près égal. Pour bien les observer, il faut éviter de les recouvrir d'une lame de verre, quelque mince qu'elle soit, parce que ce poids si léger suffit pour causer la rupture de leur enveloppe délicate. Les plus transparentes de ces ampoules, examinées au grossissement de 377, sont de beaucoup plus petites que les autres, complètement vides et diaphanes dans tous les points. Ce sont celles dans lesquelles aucun travail n'a encore commencé à se manifester. D'autres encore pellucides (fig. 4) laissent pourtant apercevoir à l'intérieur une foule de granulations presque diaphanes qui tapissent la face interne de la membrane. Un lambeau examiné isolément au grossissement de 800 diamètres, prouve que ces espèces de vésicules tiennent encore à la paroi interne de la membrane. Dans une autre ampoule un peu plus avancée (fig. 5), ces granulations sont devenues opaques, et commencent à se grouper vers le centre, d'où il résulte qu'elles sont déjà détachées. Dans une autre (fig. 6), des groupes distincts commencent à se former. Dans la suivante (fig. 7), ces groupes sont complètement isolés les uns des autres. Enfin la dernière (fig. 8) est presque toute noire, par suite du développement des faisceaux de zoospermes. Ils sont alors prêts à passer dans le canal spermatique.

Les zoospermes contenus dans les ampoules qui commencent à devenir opaques (fig. 5) sont roulés sur eux-mêmes (fig. 10, *a*, *b*, *c*, *d*) de manière à faire croire qu'ils sont contenus dans une vésicule très mince; mais avec un grossissement de 800 et beaucoup d'attention, on voit que la partie la plus mince de la queue est ce qui semble la circonférence d'une vésicule. En ajoutant une goutte d'eau, on établit des courans qui font varier la position de ces zoospermes ainsi pelotonnés, et ces changemens permettent de voir la fin de la queue (fig. 10, *c*, *d*). Dans les ampoules un peu plus avancées (fig. 6), les zoospermes se déroulent de plus en plus, et prennent différentes formes (fig. 10, *e*, *f*, *g*, *h*) dont quelques-unes donnent à l'extrémité antérieure, enroulée sur elle-même, l'aspect d'une tête lenticulaire (fig. 10, *e*, *f*). Dans les ampoules parsemées de taches noires bien circonscrites (fig. 7), les zoospermes sont déjà réunis en fascicules nombreux (fig. 11), quoique l'extrémité antérieure ne soit pas encore complètement déroulée. Enfin, dans les ampoules les plus avancées, les zoospermes sont complètement allongés, et les fascicules sont réunis en faisceaux plus volumineux (fig. 12) qui ne sont séparés que par une petite quantité de liquide visqueux et transparent. C'est dans cet état qu'on les retrouve dans toute l'étendue du canal déférent, et même dans le cloaque, où ils sont encore unis en groupes nombreux; seulement ils ont des dimensions à-peu-près doubles de celles qu'on trouve dans le testicule, à ceux qui ont acquis le plus grand développement, et ils exercent des mouvemens ondulatoires très variés, quoiqu'ils soient encore très intimement unis (fig. 13).

Les zoospermes qu'on trouve dans la vésicule séminale sont presque tous isolés; ce qui doit faire penser que le liquide jaunâtre fourni par cette poche sert à leur dissociation. Il est probable que pendant la vie ils n'arrivent au cloaque qu'après cette dilution; mais, après la mort, la moindre pression exercée sur des organes aussi distendus doit faire passer directement ces groupes dans le cloaque. L'addition d'une goutte d'eau permet de voir comment les zoospermes se séparent; c'est toujours par la queue que le faisceau se dissocie, et ce n'est quelquefois

qu'après de longs efforts que les têtes se trouvent complètement isolées : on en voit qui restent très long-temps bout à bout avant de pouvoir se décoller. Quand les zoospermes sont isolés, ils s'agitent avec une grande vivacité, à la manière des reptiles, et par de rapides oscillations, principalement de la partie antérieure qui est opaque; tandis que, quand ils sont réunis en groupes, c'est la partie mince et transparente, ou la queue, qui est la plus mobile.

On n'observe jamais de mouvement dans les zoospermes de la raie provenant du testicule; mais, au contraire, vers la fin du canal déférent, on en trouve encore de vivans sur des individus dont la putréfaction exhale déjà une odeur insupportable. Leurs dimensions comparatives ont été prises à la *camera lucida* par M. Milne Edwards, qui a bien voulu vérifier une partie des détails indiqués ci-dessus.

En résumé, les zoospermes de la raie se forment dans les ampoules qui terminent les vaisseaux spermatiques. Ils paraissent d'abord adhérens à la face interne de l'ampoule, soit dans une vésicule, soit en simulant une vésicule par leur enroulement. Quand ils sont libres, ils se déroulent successivement, en formant des figures très variés, et commencent à se grouper en fascicules à mesure qu'ils se redressent. Ils forment des faisceaux plus nombreux, plus serrés encore, quand ils sont tout-à-fait redressés. C'est dans cet état qu'ils parcourent tout le canal déférent, acquérant seulement des dimensions à-peu-près doubles, et des mouvemens de plus en plus prononcés, malgré leur état d'aggrégation, dû sans doute à la viscosité des vésicules. La dissociation ne commence qu'à l'aide du liquide fourni par la vésicule séminale. Ces détails viennent donc confirmer pleinement tout ce que j'ai dit (*Annales*, t. xv, p. 30) de la production et du développement successif des zoospermes, avec cette circonstance que les yeux peuvent suivre ce que l'analogie et le raisonnement avaient fait pressentir.

EXPLICATION DE LA PLANCHE 10.

Fig. 1. *a*, *a*. Testicule, vu en place par sa inférieure; — *b*, *b*. épididyme, naissant des deux tiers inférieurs de la circonférence du testicule et couvrant presque toute cette face inférieure.

—*c*, *c*. Canal déférent libre et droit ;— *d*, *d*. continuation du canal déférent très flexueux, de plus en plus dilaté, enveloppé de tissu cellulaire ;—*e*, *e*. continuation du canal déférent, enveloppé d'un tissu glanduleux, qui paraît jouer le rôle de prostate;—*f*, *f*. le même, encore plus gros, placé au côté interne des reins; *g*. dilatation considérable, terminant le canal déférent et communiquant avec la vésicule séminale *g*, près de l'ouverture *h* du cloaque. — *h*. Vésicule séminale, contenant un liquide jaunâtre et des zoospermes ; *i*. ouverture du canal déférent et de la vésicule séminale dans le cloaque fendu et renversé. — *j*. Rein, divisé en masses glandulaires et rougeâtres.—*k*. Cul de-sac du cloaque, déplacé,—*l*. péritoine unissant le testicule au sommet du cloaque.

Fig. 2. — *a*, *a*. Testicule, vu par sa face supérieure ; — *b*, *b*, *b*. Circonférence de l'épididyme ; *a'* une des bosselures du testicule, vue à la loupe.

Fig. 3. Portions de la surface du testicule, dépouillée de péritoine et vue au grossissement de 40 fois. Les ampoules les plus noires sont celles qui paraissent blanches à l'œil nu (fig. 2).

Fig. 4, 5, 6, 7, 8. Ampoules terminales des canaux sécréteurs du testicule aux différens degrés de développement des zoospermes. Grossissement 377 fois.

Fig. 9. Surface interne d'une des ampoules les moins avancées.

Fig. 10. Différens degrés de développement des zoospermes. Grossissement de 810 fois.

Fig. 11. Zoospermes presque déroulés, commençant à se réunir en faisceaux. Même grossissement.

Fig. 12. Zoospermes déroulés, prêts à passer de l'ampoule (fig. 8) dans le conduit excréteur.

Fig. 13 (*a* et *b*). Zoospermes, encore réunis dans le cloaque, exécutant en commun divers mouvemens fort étendus et très rapides.

Fig. 14 et 15. Dimensions comparatives des zoospermes, pris dans diverses ampoules du testicule (14) et dans le cloaque (15), dessins pris à la *Camera lucida* par M. Milne Edwards. Grossissement linéaire d'environ 500 fois.

OBSERVATION *sur le rôle des Zoospermes dans la génération*,

Par M. LALLEMAND,

Professeur à la Faculté de Médecine de Montpellier.

§ I.

Dans un précédent mémoire (1), nous avons fait voir que les zoospermes sont fournis par le testicule comme les ovules par l'ovaire; qu'ils se développent de la même manière; qu'ils sont libres ou agglomérés, suivant la nature des fluides qui leur sont fournis par les organes accessoires; enfin, qu'ils arrivent en

(1) Voyez ci-dessus, page 30.

même temps à l'époque de leur parfait développement. Ces rapprochemens doivent déjà faire supposer que les premiers sont au mâle ou à l'organe mâle, ce que les seconds sont à la femelle ou l'organe femelle; qu'ils jouent, par conséquent, un rôle également important, dans l'acte de la fécondation. Cette première donnée est déjà d'un grand poids; car la question relative aux fonctions des zoospermes est intimement liée à celle de leur origine. Burdach n'a défendu la génération spontanée des *spermatozoaires*, que pour faire de ces *infusoires* de véritables *parasites*; en effet, s'ils vivent dans le sperme pour leur propre compte, ils ne peuvent plus avoir avec la génération aucun rapport direct, nécessaire; ce qui le conduit successivement à conclure que la fécondation est un acte *purement dynamique*.

Afin de montrer plus sûrement la *nécessité* d'admettre cette hypothèse, le chef de l'école spiritualiste allemande cherche à prouver que la liqueur séminale n'a pas besoin de se trouver en contact *immédiat* avec l'ovule pour *éveiller* une vie nouvelle. En conséquence, il fait ressortir avec le soin le plus minutieux toutes les difficultés que le sperme doit rencontrer pour arriver jusqu'à l'ovaire, surtout dans certains vices de conformation du vagin, malgré lesquels la conception a cependant eu lieu. Il serait superflu de s'arrêter à des faits bien connus et dont chacun peut facilement se rendre compte; mais je dois dire quelques mots de plusieurs cas dans lesquels la fécondation avait eu lieu, quoiqu'il fût absolument *impossible*, suivant l'auteur, que le sperme pénétrât dans la matrice (*Traité de Physiologie*, t. II, p. 207).

Dans la première observation, il s'agit d'une femme qui devint enceinte, quoique le vagin fût *oblitéré* par des adhérences *au-dessus de l'orifice de l'urètre* (pag. 208). Burdach ne parle pas de la menstruation; mais il faut admettre qu'elle avait lieu comme à l'ordinaire; car, sans cela, le sang eût été retenu dans la matrice, et l'œuf le mieux fécondé n'eût pu y contracter des adhérences pour s'y développer. Mais si le sang des règles pouvait s'écouler au dehors, pourquoi la liqueur séminale n'aurait-elle pas pu s'introduire au dedans?

Chez la seconde femme, la menstruation avait lieu, quoique *l'ouverture* de la matrice fût *obstruée* par des *adhérences* qu'il

fallut détruire au moment de l'accouchement. Pendant sept ans, l'écoulement des règles avait paru peu abondant; mais il devait avoir été assez libre pour que le sang ne s'accumulât pas dans la cavité de l'utérus.

Dans le troisième cas, les accoucheurs trouvèrent le segment inférieur de la matrice saillant dans le vagin sous la forme d'un corps globuleux *sans ouverture,* qu'il fallut inciser, etc. Chez cette femme, les règles avaient paru tard; elles étaient peu copieuses, mais leur retour avait lieu aux époques ordinaires. Le col de la matrice n'était donc pas réellement *sans ouverture,* comme on l'a pensé.

J'ai parlé de ces observations, parce qu'elles pourraient faire impression sur l'esprit de ceux *qui* n'ont pas eu l'occasion de s'occuper spécialement des cas de cette nature. J'ai vu avec Dupuytren, et depuis dans ma pratique, plusieurs oblitérations complètes du vagin ou du col de la matrice; j'ai dû rechercher les exemples analogues qui sont disséminés dans les auteurs, et j'ai toujours vu que le sang, retenu dans l'utérus, l'avait distendu progressivement, en donnant lieu, tous les mois, à des accidens de plus en plus graves. J'ai cru rencontrer une exception à cet égard chez une dame de Marseille; mais elle n'était qu'apparente, car l'utérus manquait complètement, comme je m'en suis assuré à travers le rectum, et je n'ai plus été surpris de l'absence de tout accident périodique, malgré l'occlusion congéniale de la moitié supérieure du vagin. Il faut conclure de ces faits, que tout obstacle *absolu* au passage des règles, amène une distension croissante de la matrice. La menstruation avait lieu chez la première malade dont parle Burdach, puisque l'œuf a pu contracter des adhérences avec les parois de la matrice; chez les autres, les règles s'écoulaient au dehors : il n'était donc pas *absolument impossible,* comme il l'affirme, que le sperme *pénétrât* dans la cavité utérine.

Le quatrième fait est encore moins concluant : « Dans un autre cas, dit Burdach, la *forme totale* de la matrice ne permettait pas de douter qu'elle ne fût originairement *adhérente,* cependant la fécondation eut lieu et l'enfant se développa dans la cavité abdominale, où on le trouva pétrifié après la mort, *qui*

n'eut lieu que dans un âge avancé. » (Pag. 209.) Qu'est-ce qu'une matrice adhérente? Comment a-t-on pu juger de cette adhérence par la forme totale de l'organe, etc.?

Enfin, Burdach cite des cas de grossesse, malgré l'oblitération des orifices utérins des trompes; mais il est facile de comprendre que cette oblitération était le résultat d'une inflammation survenue après la conception.

Voici, cependant, les conclusions que Burdach tire de tous ces faits : « La condition indispensable de la fécondation est la *simple* rencontre du sperme avec la partie inférieure de l'organe qui fait saillie dans le vagin, et non sa pénétration dans la cavité même. » (Pag. 209).

Burdach a eu tort de s'arrêter en si beau chemin; puisqu'il a rapporté un cas dans lequel le vagin était *oblitéré* par des adhérences *au-dessus de l'orifice de l'urètre,* il aurait dû en conclure que le contact du sperme avec la vulve suffit pour opérer la fécondation. Cette conséquence n'était pas plus hardie que la première; elle était aussi facile à expliquer par la *dynamisme:* elle était même plus favorable à la théorie *dynamique* et plus rigoureusement déduite des faits invoqués pour le défendre.

Mais c'est assez s'occuper de l'hypothèse nébuleuse à laquelle Burdach a tout subordonné. Quelques faits pathologiques suffisent pour la juger. J'ai vu, par exemple, à la suite de maladies syphilitiques traitées superficiellement, des hommes sains en apparence, qui n'avaient rien transmis à leur femme, en avoir des enfans cacochymes chez lesquels se manifestaient bientôt des symptômes vénériens. Ces cas ne sont pas extrêmement rares, car plusieurs praticiens m'en ont cité de semblables. Il est évident qu'alors le père transmet à l'ovule autre chose qu'une excitation dynamique.

Parmi les physiologistes qui regardent les zoospermes comme des *parasites,* la plupart cependant veulent bien tenir compte de leur présence dans toute liqueur séminale propre à la fécondation, et de l'infécondité des individus dont les zoospermes sont rudimentaires. Mais ces deux phénomènes, si constans et si remarquable, ne diminuent pas à leurs yeux l'importance de la *liqueur* séminale; elle est toujours, pour eux, la cause essen-

tielle de la fécondation. Les *animalcules* n'y contribuent qu'indirectement, en agissant pour leur propre compte, comme tous les infusoires *parasites*.

Celui qui a le plus contribué, par ses recherches microscopiques, à répandre cette opinion, M. Bory Saint-Vincent, pense que « par leur agitation continuelle, ils contribuent au mélange de tous les élémens chimiques qui doivent porter à tel ou tel point de mixtion un sperme apte à féconder (1) ». Mais on ne voit pas pourquoi les zoospermes seraient d'autant plus nombreux qu'ils auraient moins de travail à faire ; cependant ils sont d'autant plus rapprochés, qu'ils se trouvent dans un liquide plus rare et plus homogène : à l'extrémité des canaux sécréteurs, ils sont entassés les uns contre les autres, et presque à sec. D'un autre côté, la liqueur qui provient des testicules, ne peut être brassée par les zoospermes avec les produits de la prostate, des glandes de Cowper et des follicules de l'urètre; sans compter les fluides si abondamment fournis, dans d'autres espèces, par des vésicules accessoires, et même par les reins. Enfin, on ne voit pas de quelle importance peut être cette mixtion si intime, puisque le sperme puisé dans les testicules des Batraciens est aussi fécondant que celui qui est éjaculé pendant l'acte normal.

M. Bory Saint-Vincent pense que les zoospermes contribuent par leur présence à l'orgasme vénérien. En cela, je suis complètement de son avis, et j'ajouterai à ce que j'ai dit dans plusieurs endroits de cet ouvrage, que j'attribue aux zoospermes la violence des desirs du mâle, son ardeur dans la copulation, etc.; phènomènes qu'on n'observe jamais au même degré chez la femelle, dans aucune espèce.

Enfin, M. Bory Saint-Vincent suppose que les *animalcules* pourraient bien contribuer à la fécondation des ovules, par la liqueur séminale qu'ils doivent entraîner partout avec eux après l'éjaculation, « comme les Cynips vont au fond de la figue porter sur le stigmate le pollen des étamines dont ils se sont chargés, en pénétrant dans le calice turbiné qui sert de vaisseau com-

(1) *Dictionnaire classique d'histoire naturelle*, article *Zoosperme*, page 737.

mun à une association de fleurs où les mâles se tiennent à l'entrée (1). »

Malheureusement cette description poétique ne repose absolument sur rien : car ce n'était pas pour avoir des graines fertiles qu'on employait la caprification, mais pour hâter la maturité des figues; et leurs graines ne sont pas moins fertiles, depuis qu'on néglige cette opération. D'un autre côté, ce n'est pas par l'ouverture de la figue que s'introduit le Cynips, mais à travers ses parois, et c'est même cette piqûre qui hâte le développement du fruit; enfin, le Cynips ne s'y introduit que pour déposer ses larves dans les ovules de la figue, et, à mesure que ces larves se développent, elles dévorent toute la substance intérieure de la graine, avant d'en sortir par un petit trou qu'elles pratiquent vers le sommet de la membrane, alors complètement vide. (2)

Cependant, si la comparaison est mal choisie, il ne s'ensuit pas que la pensée soit fausse; elle est même adoptée par beaucoup de physiologistes, pour expliquer la *présence constante des parasites* dans la liqueur *fécondante* de tous les animaux. Sur quoi donc repose cette hypothèse? Ce ne peut être que sur la distance à parcourir, chez les Mammifères, pour que le sperme arrive jusqu'à l'ovule. Mais il faut bien se garder de juger du déplacement que peut éprouver un zoosperme, par ce qu'on voit au microscope; il est évident que ses mouvemens sont en réalité bien insuffisans pour le porter à de telles profondeurs, en supposant la locomotion toujours dirigée dans le même sens, ce qui est contraire à l'observation. Quant aux Poissons, aux Batraciens, à divers Crustacés, etc., chez lesquels la fécondation n'a lieu qu'après la ponte, le concours des zoospermes était bien inutile, puisque la liqueur séminale est répandue immédiatement sur l'ovule. Chez les Insectes, chez beaucoup de Mollusques, elle est déposée, pendant la copulation, dans une vésicule qui communique avec l'oviducte ou l'ovicanal, et le

(1) *Dictionnaire classique d'histoire naturelle*, article *Zoosperme*, page 737.

(2) J'ai vu plusieurs fois ces Figues ainsi ravagées par les larves de Cynips, entre les mains de mon ami M. Delile, professeur de botanique à la Faculté de Montpellier.

sperme se trouve en contact immédiat avec chaque ovule, au moment de son passage. A quoi servent donc les zoospermes de toutes ces espèces?

On est, en général, vivement frappé de tous les phénomènes qui se passent chez les Mammifères, parce qu'ils nous touchent de plus près, parce qu'ils sont plus saillans, mieux connus, et depuis plus long-temps; mais les Mammifères ne forment pas la centième partie des animaux qui se reproduisent par le concours des deux sexes; ainsi les zoospermes seraient complètement inutiles dans l'immense majorité des cas, s'ils ne devaient servir que de *colporteurs* à la liqueur séminale. Cependant ils sont aussi constans dans ces espèces que chez les Mammifères; et les expériences de Bonnet, de Spallanzani, et surtout de MM. Prévost et Dumas, prouvent que la liqueur séminale des Batraciens, déposée sur l'ovule *sans les zoospermes*, est inféconde, tandis que ceux-ci, restés seuls sur le filtre, opèrent la fécondation comme à l'ordinaire!!...

Quelles sont donc les raisons qui peuvent empêcher d'admettre que le zoosperme est l'agent essentiel de la fécondation de l'ovule, un des deux élémens qui doivent produire un être nouveau? Voici les plus saillantes de celles qui ont été mises en avant.

Le volume des zoospermes n'est pas en rapport avec celui de l'individu auquel ils appartiennent.

Le fait est incontestable; il est même frappant par les énormes disproportions qu'on peut citer à cet égard. Ainsi, Burdach fait remarquer (tome 1, page 137), d'après la table des mesures prises par MM. Prévost et Dumas, que les *spermatozoaires* du Colimaçon ordinaire sont cinquante-quatre fois plus grands que celui du Chien, ce qui paraît foudroyant au premier coup-d'œil. Cependant cette disproportion gigantesque n'est rien encore, si on la compare à celle de l'ovule par rapport à la mère: ainsi, par exemple, lorsque l'ovule de la Poule se détache de l'ovaire, il est plusieurs milliers de fois plus gros que celui de la Jument au moment de la fécondation; et cependant personne ne doute de la part que prend l'ovule à l'acte de la reproduction. Pourquoi donc les dimensions des zoospermes devraient-

elles être dans une proportion plus rigoureuse avec le mâle, que celles de l'ovule avec la femelle.

Au reste, ce n'est pas là qu'est la question. De quoi s'agit-il en effet? De savoir si le zoosperme est réellement l'agent essentiel de la fécondation, le rudiment de l'embryon : c'est donc à l'embryon qu'il faut comparer le zoosperme, et non à l'animal parfait. Or, précisément, l'embryon du Colimaçon a déjà des dimensions remarquables le lendemain de l'expulsion de l'œuf; deux jours après, il commence à former sa coquille, et, quatre jours plus tard, il sort avec tous les organes, avec toutes les formes qu'il doit conserver, et se rend aussitôt sur de jeunes feuilles dont il se nourrit sans préambule. Le zoosperme du Coq est trois fois plus grand que celui de l'Homme; mais aussi, au deuxième jour de l'incubation, on distingue déjà dans l'embryon du Poulet, les premiers rudimens du système cérébro-spinal; bientôt après, paraissent les lames des vertèbres, et le développement marche avec une telle rapidité, que l'organisme se modifie d'heure en heure. Chez l'Homme, au contraire, les premiers rudimens de l'embryon ne commencent à être bien distincts qu'au bout de trois semaines.

Suivant Burdach, les *spermatozoaires* « ont la même forme dans des animaux différens : ainsi, par exemple, leur forme est la même dans le *Chien* et dans l'*Homme*. D'un autre côté, on en trouve quelquefois plusieurs de forme différente, chez un seul et même individu » (tome 1, page 137). La première partie de cette proposition prouve tout simplement que Burdach n'a pas étudié les zoospermes par lui-même, et qu'il n'a jamais vu ceux du *Chien* en particulier, surtout à l'état vivant; car il n'y en a pas de plus caractéristiques par les alternatives de transparence et d'opacité que présente leur tête, suivant qu'elle se montre à plat ou de champ, dans leurs singuliers mouvemens de progression : ce sont donc précisément ceux qu'on peut le moins confondre avec d'autres.

Je conçois cependant que les personnes peu habituées à ces sortes de recherches, doivent trouver, au premier coup-d'œil, une grande ressemblance entre tous les zoospermes des Mammifères et des Oiseaux. Il existe même un air de famille entre ceux

de tous les vertébrés, quoique la queue s'allonge de plus en plus dans les Batraciens, dans les Reptiles et dans les Poissons, en même temps qu'elle devient d'une ténuité excessive. Mais quand on multiplie les observations, on remarque bientôt des différences qu'on n'avait pas aperçues entre les formes qui, au premier coup-d'œil, se ressemblent le plus. Quant aux zoospermes des Crustacés, des Insectes, des Mollusques, ils ont des caractères bien tranchés, qui ne se bornent même pas aux formes extérieures, puisqu'il est impossible de les conserver entre deux lames de verre, comme ceux des vertébrés, et qu'ils se décomposent rapidement dans l'urine et même dans l'eau la plus pure. Il est donc évident que la texture des zoospermes est plus molle, plus lâche dans les classes inférieures; plus compacte, plus parfaite, à mesure qu'on s'élève. On voit dès-lors qu'il existe entre les diverses espèces à l'état normal, des différences semblables à celles que j'ai fait remarquer entre l'homme sain et l'homme malade.

Il est vrai que tous les zoospermes des vertébrés portent l'empreinte d'un même type; mais il en est exactement de même pour tous les embryons de cette grande famille, et la ressemblance est d'autant plus grande, qu'on les observe à une époque plus voisine de la fécondation. Ils présentent toujours alors une grosse extrémité, globuleuse ou ovoïde, à laquelle succède une tige plus ou moins longue, plus ou moins grêle, le tout représentant assez bien une épingle ordinaire, dont les proportions varient seulement suivant les espèces. Cette configuration particulière de tous les embryons des vertébrés dans les premiers instans de leur apparition, est peut-être la seule circonstance sur laquelle les ovologistes soient d'accord, ce qui prouve sa constance dans toutes ces espèces; et cette forme est précisément celle des zoospermes dans toute cette famille des vertébrés. Bien plus, les zoospermes des Couleuvres, parvenus à la fin du canal déférent, roulent en spirale l'extrémité de leur queue, comme l'embryon le fait dans l'œuf dès les premiers instans de son apparition.

D'un autre côté, le docteur Prévost, ayant soumis à un froid de 8 à 10 degrés au-dessous de zéro des testicules de Grenouille,

et les ayant fait dégeler lentement dans de l'eau froide, y a trouvé des animalcules pleins de mobilité ; et l'on sait que les individus parfaits reprennent également leurs mouvemens dans les mêmes circonstances. Il a vu aussi que les poisons produisent sur les animalcules les mêmes effets que sur l'adulte : l'acide cyanhydrique abolit immédiatement leurs mouvemens ; la strychnine leur donne des crispations, ils se roulent et se tordent en tous sens avant de perdre tout mouvement. (1)

Sans doute, on ne trouve pas dans toutes les espèces une concordance parfaite entre les zoospermes et les premiers rudimens de l'embryon ; mais, dans le Poulet, on observe encore bien plus de différence entre l'embryon de la veille et celui du lendemain, et l'œuf des Batraciens change d'aspect de moment en moment après la fécondation. De plus grandes métamorphoses s'opèrent même après l'éclosion, chez les Batraciens anoures, et les Insectes en éprouvent de bien plus nombreuses et de plus extraordinaires encore. Il serait impossible de croire, sans l'avoir bien constaté, qu'une Grenouille vient d'un têtard, et la larve d'un insecte ne peut faire prévoir ce que seront la chrysalide et l'animal parfait. Ce dont il faut seulement s'étonner, c'est qu'il existe encore, après l'acte prodigieux de la fécondation, tant de ressemblance entre la forme des zoospermes et celle des embryons. Il ne faudrait donc pas s'étonner si l'on trouvait, dans certaines espèces, autant de différence entre le zoosperme et l'embryon, qu'il en existe entre la chenille et le papillon.

Quant aux différences qu'on peut observer dans les *spermatozoaires* d'un même individu, j'en ai donné l'explication en faisant l'histoire du développement des *zoospermes*, et en parlant des *capsules séminales*, des *spermatophores*, qu'on a pris quelquefois pour d'énormes animalcules spermatiques, d'autres fois pour des parasites, ce qui est la même chose aux yeux de Burdach. J'ajouterai seulement qu'il ne faut pas regarder comme des variétés de forme ces particules de matière visqueuse qui adhèrent quelquefois pendant long-temps à la surface des zoospermes, surtout vers leur extrémité antérieure ; ces débris de

(1) Compte rendu des séances de l'Académie des Sciences, 30 novembre 1840.

mucus sont d'autant plus communs, que la liqueur est plus gluante; on les remarque particulièrement autour des zoospermes récemment séparés des faisceaux dont ils faisaient partie; ils disparaissent peu-à-peu, à mesure que la densité du liquide diminue, circonstance qui a trompé bien des micrographes.

Voyons ce qu'on objecte aux expériences de Spallanzani, et surtout à celles de MM. Prévost et Dumas, si remarquables par leur enchaînement logique et par les inductions rigoureuses que les auteurs en ont tirées. (1)

1° La vapeur du sperme de Grenouille recueillie sur un verre de montre, n'est que de l'eau; elle devait être impropre à la fécondation, puisqu'elle ne contenait pas la partie essentielle de la liqueur séminale.

L'objection est fondée; mais le fait est concluant contre l'hypothèse des fécondations produites par un *aura seminalis;* hypothèse presque aussi subtile que celle du *dynamisme*, et qui compte encore des partisans.

2° Des étincelles électriques assez puissantes pour tuer les animalcules, ont dû modifier la composition chimique du sperme, et lui faire perdre, avec ses qualités intimes, sa propriété fécondante.

Cette influence étant possible, l'expérience n'est pas, en effet, suffisamment concluante.

3° Le sperme délayé, qui a passé à travers cinq filtres, n'y laisse pas seulement ses *parasites;* il y perd sa composition intime, ses qualités essentielles, et c'est ce qui le rend impropre à la fécondation.

Cependant, le sperme des Batraciens ne perd pas ses propriétés fécondantes aussi facilement qu'on le pourrait croire. L'urine est sans influence sur lui, puisqu'il passe par les uretères; puisque, par conséquent, c'est l'urine qui est chargée de

(1) Ces importans travaux, qu'il faut étudier dans les mémoires originaux, ont servi de point de départ à ceux qui ont été entrepris depuis sur le même sujet, et feront toujours époque dans la science. (Voyez *Annales des Sciences naturelles*, première série, tome I, page 1; tome II, page 100; tome III, page 113; tome IV, page 47; tome XII, page 415.)

sa dilution. On n'observe aucune diminution dans le nombre des fécondations, tant que l'eau ajoutée au sperme ne dépasse pas cinquante fois le poids des œufs soumis à l'expérience. Il est donc difficile de concevoir que cette même liqueur séminale ait été décomposée par la simple action mécanique des filtres. Mais, en admettant cette supposition, il resterait à expliquer comment ce qui est resté sur le filtre a pu opérer la fécondation comme auparavant. Après avoir été délayée dans une aussi grande quantité d'eau, une partie de la liqueur séminale serait-elle demeurée sur le filtre, comme on le prétend? Mais, dans cette hypothèse même, comment n'aurait-elle subi aucune altération, si tout le reste avait été décomposé? Il n'y a dans la liqueur séminale que des zoospermes, des globules de mucus, ou des débris d'épithélium, qui puissent être arrêtés par le filtre sans éprouver aucun changement, et personne ne peut être tenté d'attribuer la fécondation à des matériaux qu'on retrouve dans toutes les sécrétions. Il ne reste donc que les zoospermes pour expliquer le phénomène.

D'autres phygiologistes sont encore arrêtés par diverses considérations. Ainsi, par exemple, ils trouvent que le nombre des zoospermes serait en disproportion avec celui des ovules à féconder, comme si ces rapports numériques n'étaient pas toujours les mêmes, soit que des animalcules parasites portassent le sperme jusqu'à l'ovule, soit que la liqueur séminale servît, au contraire, de véhicule aux zoospermes.

Il est vrai que ceux-ci sont innombrables, même dans les espèces qui ne produisent qu'un petit; mais aussi, à quelle profondeur ne doivent-ils pas pénétrer chez les Mammifères! Là disproportion est encore très grande dans les espèces dont la ponte est la plus abondante, lors même que le sperme est répandu sur les ovules, comme chez les Batraciens, les Poissons, etc.; mais, dans un grand nombre d'espèces, les mâles sont infiniment moins nombreux que les femelles; d'un autre côté, la fécondation ne peut avoir lieu que sur un point très circonscrit, et les zoospermes distribués sur tout le reste de la surface sont absolument sans action; enfin l'eau en disperse au loin un bien plus grand nombre. Ce qu'il y a de certain, c'est que, malgré

cette multitude de zoospermes, il y a toujours beaucoup d'ovules de Grenouille qui échappent à la fécondation et ne tardent pas à se décomposer, quoique le mâle ait répandu sa liqueur sur eux comme sur les autres. Ainsi le nombre des zoospermes n'est pas encore suffisant chez les Batraciens pour assurer la fécondation de tous les ovules. Que doit-il donc arriver dans les cas où la liqueur séminale ne peut pas être déposée directement sur les ovules? L'abondance des zoospermes devait, par conséquent, être proportionnée aux difficultés de la fécondation, plutôt encore qu'au nombre des ovules à féconder.

Au reste, il n'arrive ici que ce qu'on observe dans toutes les classes de végétaux et d'animaux ; car les moyens de reproduction sont toujours proportionnés aux causes de destruction auxquelles les êtres vivans sont soumis. Ainsi, non-seulement les œufs et les graines semblent se multiplier à mesure que les causes de destruction augmentent; mais encore la reproduction s'opère aussi par scission longitudinale ou transversale, par bourgeon interne ou externe, et même par tout accident qui détache une partie plus ou moins considérable de l'organisme.

Il fallait même qu'il en fût ainsi, sans quoi les espèces que nous voyons vivantes auraient disparu, faute de pouvoir se reproduire, comme tant d'autres ont péri faute d'une nourriture, d'un milieu, d'une température, etc., appropriés à leurs besoins. Elles auraient été rejoindre les innombrables espèces perdues, dont on ne retrouve plus de traces qu'à l'état fossile, et dont quelques-unes diffèrent complètement de tout ce qui vit aujourd'hui. Cette harmonie, que nous admirons entre les êtres soumis à notre observation, eût été modifiée, comme elle l'a été continuellement depuis la première apparition des végétaux et des animaux les plus simples, jusqu'à présent, sans cesser pourtant, malgré la destruction de ces espèces. Ainsi, quand je dis qu'il fallait que le nombre des zoospermes fût proportionné aux difficultés de la fécondation, ce n'est pas pour justifier les causes finales, les lois de la nature, les plans de la Providence; car tout ce qui est possible existe, comme tout ce qui n'a plus été possible a cessé; je dis seulement que, sans cette profusion de

zoospermes, les espèces que nous observons vivantes n'auraient pu se reproduire jusqu'à présent.

Enfin, les physiologistes ont invoqué jusqu'à la morale dans cette question de fait. M. Bory-Saint-Vincent, par exemple, repousse de toutes ses forces la pensée choquante, qu'un seul de ces zoospermes privilégié pendant la copulation, se souderait à un ovule, à l'exclusion de plusieurs milliers d'individus, ses pareils, mais comme réprouvés (*Loc. cit.* page 745). L'auteur a sans doute oublié que des pollens, bien autrement nombreux, couvrent quelquefois le sol de manière à simuler une pluie de soufre, et que chacun de ces grains de pollen contient une immense quantité de granules spermatiques, également réprouvés, puisqu'ils sont perdus pour la fécondation, sans compter les graines étouffées dans l'ovaire par l'injuste nutrition d'une privilégiée, celles dont la germination est empêchée par le développement d'une plus heureuse voisine, etc.

Examinons maintenant la question sous un autre point de vue. L'hypothèse suivant laquelle la liqueur séminale serait l'agent essentiel de la fécondation a-t-elle du moins l'avantage d'en expliquer mieux les phénomènes? En aucune façon : elle ne permet pas même de concevoir l'influence constante du mâle sur le produit de la conception ; influence pourtant si profonde et si universellement reconnue.

On conçoit parfaitement qu'une trame élémentaire déjà organisée et vivante, fournie par le mâle, est complétée, en s'unissant à une autre, provenant de la femelle, et qu'il résulte de ces deux rudimens d'organisation un tout qui porte l'empreinte des deux origines. Mais comment un liquide amorphe pourrait-il transmettre à l'ovule des formes, des couleurs, des vices et des qualités, provenant du mâle, comme on le voit d'une manière si évidente et si constante dans les croisemens de race? Comment cette influence du mâle se retrouverait-elle dans l'ensemble de la constitution, dans la trame intime de tous les organes, dans la disposition aux mêmes maladies, aux mêmes goûts, etc.? L'expérience de tous les jours prouve que des habitudes imposées au mâle se transmettent héréditairement à ses descendans. Ainsi, par exemple, dans l'Amérique du Sud, où le pas de l'amble

est recherché des voyageurs, on donne au cheval cette allure insolite, en le forçant, par des entraves, à faire agir toujours en même temps les deux jambes du même côté; mais l'engorgement qui en résulte fait négliger ces chevaux comme monture: on ne les élève ainsi que pour servir d'étalons, les poulains qui en proviennent prenant tout naturellement le pas de l'amble. Les chiens offrent journellement des exemples aussi remarquables de la transmission héréditaire des habitudes imposées aux parens par l'éducation. Or, il est impossible d'imaginer qu'une ressemblance si profonde, si durable, puisse être transmise de la part du mâle par un fluide amorphe. Un fluide ne peut évidemment transmettre la forme et la vie qu'il n'a pas.

Au reste, cette prétendue action de la liqueur séminale sur l'ovule n'est que la dernière moitié d'une erreur aussi ancienne que la science, et dont on peut suivre les phases avec facilité, je dirai même avec utilité; car le passé doit servir d'enseignement à l'avenir.

Les plus anciens observateurs ont été frappés de la ressemblance des enfans avec leur père et leur mère, ressemblance plus ou moins prononcée, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, mais également partagée, quand on l'envisage dans l'ensemble des faits. Ils en ont conclu judicieusement que le père et la mère avaient une égale part à l'acte mystérieux de la reproduction. Jugeant ensuite de ce qu'ils ne pouvaient apprécier par ce qu'ils voyaient, ils ne doutèrent pas que la femme n'eût aussi sa liqueur séminale, et ils la firent venir des ovaires, attendu que celle de l'homme est fournie par les testicules. L'embryon se développant dans la matrice, ils pensèrent que les deux semences se rencontraient dans cette cavité, et que de leur union résultait l'être nouveau, portant plus spécialement l'empreinte de celui des deux sexes qui avait le plus contribué à sa formation. C'était là une idée simple, claire, saisissante: elle partait d'un aperçu large et vrai: aussi fut-elle adoptée dans son essence. On ne discuta, pendant des siècles, que sur des propositions accessoires.

Cependant la supposition d'un sperme chez la femme ne reposait que sur une induction fournie par ce qui se passe chez l'homme. Elle fut ébranlée, dès qu'on eût remarqué que les

ovaires des oiseaux fournissent des ovules au lieu de liqueur séminale. Peu-à-peu on étendit cette observation aux reptiles, aux poissons, aux insectes; enfin on constata directement ce que l'analogie avait fait soupçonner, c'est-à-dire que les Mammifères rentrent dans la loi générale. Il fallut bien alors abandonner une partie de l'opinion des anciens, celle qui est relative au rôle de la mère dans la génération; mais on n'avait encore aucune raison de modifier l'autre moitié de cette hypothèse, puisque le sperme était toujours pour tout le monde une liqueur parfaitement homogène, dans laquelle on était loin de soupçonner l'existence de corps organisés et vivans. D'un autre côté, l'importance de la liqueur séminale dans l'acte de la fécondation étant incontestable, il fallut bien admettre qu'elle agissait sur l'ovule, et l'on supposa qu'elle y excitait la vie, qu'elle en imprégnait les rudimens du fœtus, auparavant inertes; mais il était difficile de concevoir qu'un liquide pût donner la forme et la vie dont il n'était pas lui-même doué. Si le sperme n'était qu'un agent d'impulsion, comment expliquer l'immense influence du mâle sur le produit de la conception?

Ces difficultés étaient vivement senties, lorsque Louis de Hammen, Leuwenhoeck et Hartsœker observèrent, presque en même temps, des êtres vivans dans le sperme d'une foule d'animaux. Cette découverte fit naître une réaction contre l'opinion qui avait donné à la femelle une importance exagérée. Boërhaave, Buffon, Keil, Cheyne, Wolf, Lieutaud, etc., virent avec Leuwenhoeck, dans ces êtres vivans, de véritables *animalcules*, c'est-à-dire, des embryons qui n'avaient plus besoin que de croître pour devenir des animaux complets. On conçoit que dès-lors l'ovule ne pouvait plus être qu'un magasin de nourriture préparé pour le développement de l'*animal en miniature*, et le rôle de la femelle devint aussi accessoire que l'avait été celui du mâle.

Des exagérations de toute espèce nuisirent au progrès de la vérité, et l'on trouva plus facile de nier les faits que de les vérifier. On objecta d'ailleurs, avec raison, que la nature des alimens ne suffit pas pour rendre compte de l'influence de la mère sur le fœtus, attendu que la matière vitelline se ressemble dans

des ovules appartenant à des classes différentes, que les alimens des Herbivores produisent des nerfs, des muscles, etc., comme ceux des Carnassiers. Enfin, l'ovule était regardé comme un corps inerte, et il était impossible de concevoir comment un *animal* se serait identifié avec un corps privé de vie. Ce rôle exclusif qu'on voulut faire jouer aux zoospermes fut donc précisément ce qui les fit tomber ensuite dans l'oubli.

Cependant, lorsqu'on reprit les études microscopiques avec de meilleurs instrumens, il fallut bien convenir que le sperme contient, en effet, des êtres vivans, conformes aux descriptions des premiers observateurs. Alors, pour ne pas revenir à des idées discréditées, on supposa que les zoospermes étaient des *parasites;* mais, en rencontrant constamment ces parasites dans la liqueur séminale de tous les animaux, on comprit qu'ils ne pouvaient pas être entièrement inutiles à la fécondation. Les expériences de Spallanzani ne le conduisirent pas à la vérité, parce qu'il était dominé par les idées de Bonnet; mais ces expériences étaient trop décisives pour laisser aucun doute sur la nécessité de l'intervention des zoospermes dans la fécondation. Il fallut donc chercher des occupations à ces *parasites*, et on leur accorda celles de brasser la liqueur *fécondante*, et de la charrier sur les ovules. Cette dernière trace de l'opinion des anciens doit disparaître aussi en présence des faits les plus multipliés, les plus incontestables.

Personne n'admet plus depuis long-temps l'existence d'une véritable liqueur séminale chez aucune femelle, parce que les dimensions des ovules ont permis de les étudier facilement, de vérifier les assertions émises sur leur développement, leur structure, etc. Tout le monde fut donc bientôt convaincu que les ovaires sécrètent des ovules et non du sperme; que l'ovule représente la femelle ou l'organe femelle dans la fécondation. Il était impossible d'arriver aussi promptement à la même unanimité par rapport au rôle du mâle, parce que les zoospermes ne pouvaient être bien étudiés qu'à l'aide d'excellens microscopes; ce n'est donc que depuis peu de temps qu'on possède des résultats incontestables; encore doivent-ils être adoptés de confiance par la plupart des lecteurs. Toutefois, ce qui est arrivé pour les

ovules, indique bien clairement ce qui adviendra tôt ou tard par rapport aux zoospermes : plus les observations deviendront faciles et précises, plus elles se multiplieront dans toutes les directions, plus on verra que la loi est générale, constante, du côté du mâle comme du côté de la femelle ; et alors tout le monde sera convaincu que le mâle ou l'organe mâle intervient dans la fécondation par ses zoospermes, comme la femelle ou l'organe femelle y contribue par les ovules; que le mâle est représenté par les zoospermes *seuls*, et que le fluide dans lequel ils nagent, leur sert uniquement de véhicule, comme le fluide prostatique, le mucus urétral, etc.

C'est ainsi que s'achèvera la transformation de l'opinion des anciens, fondée sur l'observation incontestable d'une *égale* influence des deux sexes dans la production de l'être nouveau. Au lieu de dire que l'embryon résulte de la combinaison des deux liqueurs séminales provenant des testicules et des ovaires, on dira qu'il est dû à l'union d'un zoosperme et d'un ovule, fournis par des organes analogues chez le mâle et chez la femelle.

Mais, pour que cette union soit possible, il faut que l'ovule soit vivant, comme le zoosperme; car une adhérence ne peut s'établir qu'entre des parties douées de vie : c'est ce qui arrive en effet, ainsi que je l'ai démontré ailleurs.

Il est surtout un point de l'ovule, dont l'organisation est plus compliquée et la vitalité plus active : c'est l'écusson, disque épais, saillant, blanchâtre, à surface villeuse ou tomenteuse, comme celle de la membrane caduque. Cette surface veloutée est celle qui, la première, se couvre de vaisseaux après la fécondation, ce qui l'a fait appeler membrane vasculaire. Elle est donc disposée de manière à favoriser l'union du zoosperme et de l'ovule, comme la membrane caduque à établir l'adhérence de l'œuf avec la paroi interne de la matrice. Aussi est-ce sur ce point que se développent toujours les premiers rudimens de l'embryon, ce qui lui a valu le nom de *surface prolifère*. Lorsque le vitellus est enveloppé d'une membrane dure, scarieuse, résistante, il existe un trou dans cette enveloppe externe ou, du moins, un amincissement considérable à l'endroit qui correspond au centre du disque. Ce micropyle manque aux œufs, dont les membranes

sont très minces (Mammifères), ou dont la membrane externe ne se durcit qu'après la fécondation (Oiseaux). Tout semble donc disposé pour favoriser l'adhérence du zoosperme à l'ovule, et pour lui ménager un passage jusqu'à cette surface proligère. Aussi, son développement ne s'opère-t-il jamais sur aucun autre point.

Le premier changement qu'on observe à la surface de l'écusson chez les Poulets, c'est le soulèvement d'une bandelette renflée à l'extrémité qui doit devenir la tête, et terminée en pointe à l'autre. Bientôt, de chaque côté de cette bandelette primitive s'élève une saillie qui doit contenir les premiers rudimens des lames vertébrales, et la bandelette, qui était saillante, paraît en conséquence déprimée. Les membranes cérébro-spinales ont la forme d'une épingle, dont la tête correspond à l'endroit où va bientôt se développer le cerveau et la pointe à l'extrémité de la moelle. Une substance blanchâtre, opaque, se dépose à leur surface interne, et quatre ampoules se dessinent où doivent être le cerveau, le cervelet, les tubercules quadrijumeaux et la moelle allongée, tandis que, le long de la tige, deux lames opaques se rapprochent des parties latérales vers le centre, pour former la moelle, dont la cavité diminue rapidement..... C'est autour de cet axe cérébro-spinal que se manifestent ensuite les changemens qui se succèdent avec rapidité; c'est cet axe qui détermine la double direction de la circulation vers les deux extrémités, l'allongement du sac vitellin pour fournir l'œsophage, le rectum, etc.

On voit que tous ces phénomènes dépendent de l'influence qu'exercent l'un sur l'autre le zoosperme et l'ovule, au moyen du disque proligère par lequel l'union s'établit entre eux. L'appareil fluxionnaire qui s'établit autour de ce centre d'activité a même quelque chose qui ressemble au développement d'un point inflammatoire dans un tissu blanc. L'embryon ne s'enfonce dans l'intérieur de l'œuf que beaucoup plus tard, et il s'éloigne d'autant plus de la surface, qu'il appartient à une espèce plus élevée: le fœtus humain est celui dont le cordon ombilical est le plus long.

Il est vrai que le zoosperme n'apporte pas à l'ovule un sys-

tème cérébro-spinal tout formé, puisque les membranes du cerveau et de la moelle sont parfaitement distinctes avant l'apparition de la substance nerveuse à leur surface interne; mais le vitellus ne fournit pas non plus à l'embryon un système digestif tout développé, et cependant personne ne doute aujourd'hui que les organes digestifs et leurs dépendances se développent aux dépens du vitellus, parce que les dimensions et la consistance de cette membrane permettent de suivre parfaitement toutes les phases de sa métamorphose, ce qui est impossible pour le zoosperme. Les investigations patientes des ovologistes ont appris que bien des organes n'ont qu'une existence purement temporaire, et que les autres subissent, comme les animaux eux-mêmes, des transformations d'autant plus nombreuses, qu'ils sont plus compliqués: il faut donc renoncer à l'idée que ces organes existent tout formés dans l'ovule ou le zoosperme, et n'ont besoin que de se développer pour acquérir leur état parfait; mais la première trame que nous pouvons apercevoir distinctement, à l'aide du microscope, a dû nécessairement être précédée d'une autre, aussi invariable dans sa texture, puisqu'elle amène toujours les mêmes résultats définitifs. Si le zoosperme n'est pas un système cérébro-spinal et le vitellus un système digestif, ils possèdent en eux les élémens nécessaires au développement ultérieur de ces deux bases essentielles de l'animalité, pourvu qu'elles se complètent l'une par l'autre, afin d'exercer l'une sur l'autre une influence réciproque, qui amène le développement ultérieur du tout. C'est le système vasculaire qui leur sert bientôt de lien commun, et fait disparaître de plus en plus les traces de cette fusion.

On conçoit ainsi, d'une manière claire, complète, comment les deux agens de la fécondation influent également sur le produit commun, puisque chacun d'eux fournit une matière déjà organisée et vivante, ce qui est inexplicable par toute autre hypothèse. Je dis plus: chacun de ces deux élémens de la fécondation représente bien l'agent qui l'a produit, et la part qu'il prend à l'acte même. En effet, le mâle, plus ardent que la femelle dans toutes les espèces, fournit le zoosperme, dont l'activité n'est jamais plus grande qu'au moment de la copulation, et celui-ci de-

vient sur l'écusson le premier élément du système cérébro-spinal, c'est-à-dire de toute la vie extérieure. Que voit-on, au contraire, du côté de la femelle? Des ovaires toujours cachés profondément, même chez les Mammifères, un ovule qui reçoit le zoosperme comme la femelle reçoit le mâle; dans cet ovule, des matériaux de nutrition; enfin les élémens d'un système digestif, par conséquent, de toute la vie intérieure. Plus tard, quand le rôle du mâle est terminé, survient la gestation ou l'incubation; plus tard encore la lactation, le soin des petits toujours spécialement dévolu à la mère. Le zoosperme représente donc le mâle aussi exactement que l'ovule représente la femelle.

Voyons maintenant si la soudure, la fusion du zoosperme et de l'ovule est une hypothèse contraire à toute analogie. Il existe dans l'acte même de la génération beaucoup d'autres exemples d'unions semblables entre des parties vivantes. L'œuf fécondé se soude à la matrice pendant tout le temps de la gestation. Quand il s'en rencontre deux à-la-fois, les deux placenta se fondent quelquefois d'une manière si complète, que l'expulsion de l'un des fœtus peut être suivie de la mort de l'autre, si l'on néglige de lier le cordon ombilical après l'avoir coupé : le fœtus, resté dans la matrice, est bientôt pris de convulsions et vient au monde complètement privé de sang. Bien entendu que ces deux placenta peuvent être injectés par le système artériel ou veineux de l'un ou l'autre cordon. Les doigts des mains ou des pieds sont souvent unis par leurs bords dans une étendue variable; les deux membres inférieurs sont quelquefois fondus en un seul, de sorte qu'il n'existe plus qu'un fémur, un tibia et un rudiment de pied informe. Mais, ce qui est plus concluant que tous ces exemples, c'est l'étude des monstruosités dues à la soudure de deux fœtus, toujours par des parties similaires, suivant la remarque de M. Geoffroy Saint-Hilaire.

Une pièce de ce genre que possède la Faculté de Montpellier, est surtout remarquable en ce que les deux squelettes sont unis par leurs os coxaux, de manière à ce que chaque symphyse des deux bassins est formée de deux os iliaques appartenant à l'un et à l'autre sujet; il en est de même des deux membres qui s'y articulent : le droit est d'un fœtus et le gauche de l'autre. Il est

impossible de se tromper à cet égard, parce que l'un des fœtus ayant pris moins de développement que l'autre, les deux moitiés de chaque bassin n'ont pas les mêmes dimensions; les deux membres abdominaux placés l'un à côté de l'autre ne sont pas d'ailleurs de même longueur; les deux moitiés du bassin et les deux membres abdominaux les plus développés appartiennent au sujet le plus fort, et ils sont écartés à droite et à gauche pour compléter les parties congénères de l'autre fœtus. Il y avait une vèssie dans chaque bassin, un canal de l'urètre sous chaque pubis, etc. : ces organes avaient donc été formés aussi par des parties similaires provenant des deux individus.

Lorsque deux fœtus ne sont unis que par une faible surface, ils prennent, en général, un développement égal; quand l'union est plus intime, il arrive ordinairement que le plus vigoureux nuit à l'accroissement de l'autre; quelquefois même le plus faible reste à l'état embryonaire. La tête, le col peuvent s'atrophier ou rester ensevelis dans le corps de l'autre, de manière que le reste pend au dehors avec des formes plus ou moins irrégulières. En fin, le plus vigoureux peut même engloutir l'autre complètement et le recevoir dans sa cavité abdominale, fermée plus tard que celle de la poitrine. Un semblable fœtus, retrouvé dans le bas-ventre d'un *garçon*, comme cela est arrivé avant et après Dupuytren, a pu donner lieu à bien des discussions; mais ce cas ne présente rien de plus extraordinaire que le précédent et ne peut recevoir d'autre explication; c'est seulement un degré de plus du même phénomène.

Ainsi, l'œuf se soude à la matrice pour y puiser les matériaux de son développement ultérieur; deux placenta se fondent pour n'en faire qu'un; deux moitiés de bassin, de vessie, d'urètre s'unissent pour se compléter réciproquement; enfin, un fœtus peut être englouti dans l'abdomen d'un autre, de la même manière que l'est un vitellus chez l'embryon à l'état normal.

Je n'ai cité que des exemples tirés de l'acte de la génération chez l'homme, parce que ce sont les plus connus et les plus décisifs; mais les soudures de deux parties, de deux individus sont très multipliées dans les animaux et les végétaux inférieurs, même à l'état adulte. Tous les jours des masses d'éponges se

soudent dès qu'elles sont en contact; et tout le monde connaît les phénomènes de la greffe non-seulement dans les végétaux, mais encore dans des Vertébrés d'un ordre élevé, tels que le Coq, par exemple. Il est remarquable que toutes ces soudures sont d'autant plus faciles, que les individus sont plus jeunes et que leur organisation est plus simple. En voilà beaucoup plus qu'il n'en faut pour expliquer la fusion du zoosperme et de l'ovule.

Tous ces faits, ainsi que les précédens, confirment donc parfaitement l'opinion de MM. Prévost et Dumas, sur le rôle du zoosperme dans la fécondation. Toutefois, je ne puis être complètement de leur avis sur plusieurs propositions *accessoires*, qu'ils ont trop généralisées; car tout ce qui est *accessoire*, est susceptible de varier, sans rien changer à ce qui est véritablement *fondamental* dans la fonction. J'ai besoin, avant d'aller plus loin, d'entrer dans quelques détails à cet égard.

Les exemples de grossesse ovarique ne sont pas extrêmement rares dans l'espèce humaine, et ils prouvent, d'une manière incontestable, que l'ovule peut être fécondé dans l'ovaire même. Les cas de grossesse péritonéale ont à-peu-près la même valeur; car l'ovule devait être fécondé avant de tomber dans la cavité séreuse, et c'est en se détachant de l'ovaire qu'il a dû manquer l'ouverture de la trompe. J'admets que, dans les expériences de MM. Prévost et Dumas, la fécondation s'est opérée dans les trompes ou dans les cornes de la matrice, et je sais que cette opinion est appuyée par beaucoup de faits semblables, observés sur des espèces différentes de celles qui ont servi à MM. Prévost et Dumas. Mais, il ne s'ensuit pas qu'on doive en faire l'application rigoureuse à l'espèce humaine; car l'analogie ne saurait prévaloir contre des faits directs et péremptoires. Ici même l'analogie fournit un argument de plus contre cette application.

Le lieu dans lequel s'opère la fécondation est une circonstance tout-à-fait *accessoire*, qui varie, par conséquent, suivant les espèces. Mais ces variations semblent soumises à une loi générale, subordonnée à la place qu'occupe chaque espèce dans la série des animaux. Chez les Oursins, les Méduses, les Actinies, etc., les zoospermes et les ovules sont disséminés dans l'eau, sans que le mâle ou la femelle puisse les diriger à la rencontre l'un

de l'autre. Dans les Poissons, la fécondation s'opère aussi, en général, après l'expulsion des ovules et sans le secours de la femelle; mais le mâle la suit de près, et dépose immédiatement sa laitance sur le frai. Dans les crustacés, le rapprochement est déjà un peu plus intime. Chez les Batraciens anoures, le mâle tient la femelle fortement embrassée, et féconde les ovules aussitôt qu'ils sont hors de l'oviducte. Chez les Insectes, l'imprégnation a lieu dans l'oviducte même, mais seulement un peu avant l'expulsion. Chez les Oiseaux, c'est dans la partie supérieure de l'oviducte, car la membrane externe de l'œuf s'incruste plus bas de carbonate de chaux. Chez les Mammifères, elle s'opère encore plus profondément dans les cornes ou les trompes utérines. Cette progression constante doit donc faire supposer que, dans l'espèce humaine, les zoospermes remontent jusqu'à l'ovaire même pour opérer la fécondation. Ainsi, l'analogie s'accorde parfaitement avec les observations directes fournies par la pathologie, observations contre lesquelles il n'y a d'ailleurs aucune objection possible.

MM. Prévost et Dumas ont encore conclu de leurs expériences que la fécondation, chez les Mammifères, s'opère seulement plusieurs jours après l'arrivée des zoospermes dans l'utérus et les trompes. Ces inductions me paraissent irréprochables par rapport aux Mammifères employés dans ces expériences, et même applicables à d'autres espèces sur lesquelles des faits analogues ont été observés. Mais il ne faut pas se hâter d'étendre cette proposition à l'espèce humaine. Le temps qui s'écoule entre la copulation et la fécondation est encore une circonstance *accessoire*, par conséquent très variable dans l'échelle des animaux.

La reine des Abeilles, par exemple, pond encore des œufs féconds plusieurs mois après la mort des derniers mâles, et beaucoup d'Insectes fournissent des faits analogues. Il est facile, au reste, de s'en rendre compte depuis les belles observations de M. Audouin sur le réservoir séminal dont ces femelles sont toutes pourvues. La Poule, après un seul accouplement, peut fournir douze ou quinze œufs féconds, et l'on ne saurait supposer qu'ils ont été fécondés tous immédiatement, car les derniers pondus ne pouvaient être développés quand l'accouple-

ment s'est opéré. Les expériences faites sur divers Mammifères ne sont donc pas rigoureusement concluantes pour tous les autres, et en particulier pour l'espèce humaine. Voici des faits pathologiques bien plus péremptoires que toutes les analogies.

J'ai rapporté ailleurs (1) une observation de grossesse extra-utérine, due évidemment à la violente émotion causée à la mère par l'entrée subite d'un étranger immédiatement après des rapports conjugaux. J'ai vu à Bordeaux un second cas semblable. La femme avait été saisie de frayeur, quelques instans après le coït, par l'apparition dans sa chambre d'une vive lumière provenant d'un incendie. Des symptômes de péritonite se manifestèrent comme dans le cas précédent, des fistules se formèrent autour de l'abdomen, et la malade succomba long-temps après le terme de la grossesse. On trouva le fœtus dans le bassin, comme je l'avais prédit d'après l'exploration du vagin et du rectum. Le docteur Marc rapporte un fait exactement semblable (2). Une femme, entrée à l'hospice de la Maternité pour une grossesse extra-utérine, racontait, avant sa mort, que la crainte d'être surprise dans les bras de son amant, en entendant remuer la clef de la porte de sa chambre, lui fit éprouver la plus vive émotion, à l'instant même où elle a dû concevoir.

Astruc pense que les grossesses extra-utérines sont plus communes chez les filles et les veuves qui ont passé pour sages, parce que la crainte, la honte, le saisissement ont beaucoup de part à ces accidens, ce qui prouve qu'Astruc avait connaissance de plusieurs faits analogues.

La cause première de ces grossesses extra-utérines est trop frappante, trop uniforme pour être douteuse; mais de quelle manière la frayeur peut-elle agir? C'est sans doute en faisant cesser l'état d'orgasme qui maintenait les franges des trompes appliquées contre l'ovaire, ce qui ne permet pas à l'ovule de rencontrer l'ouverture du canal qui devait le conduire dans l'utérus. L'ovule était donc fécondé quand il est tombé dans la cavité du péritoine, et cependant les émotions qui ont causé

(1) *Observations pathologiques propres à éclairer plusieurs points de physiologie*, Paris, 1818.
(2) *Dictionnaire des Sciences médicales*, tome XIX, page 239.

l'accident sont survenues immédiatement après le coït, ce qui doit faire admettre nécessairement que la fécondation est un phénomène très rapide, presque instantané, dans l'espèce humaine.

D'autres faits moins frappans, mais plus nombreux, ont fait admettre cette opinion aux accoucheurs. Il en est peu qui n'aient rencontré des femmes assez impressionnables pour avoir, à l'instant même, la conscience de leur imprégnation, et la plupart prétendent qu'elles ne se sont jamais trompées à cet égard. Il en est une foule d'autres qui éprouvent un changement subit dans toute leur économie, et même dans leur moral.

Comment les zoospermes peuvent-ils arriver si rapidement à de telles profondeurs? Quoique leurs mouvemens soient activés pendant la copulation, ils ne peuvent évidemment expliquer seuls le phénomène; mais il faut tenir compte de toutes les circonstances concomitantes.

L'impulsion donnée par l'éjaculation suffit pour expliquer l'introduction subite d'une certaine quantité de sperme dans la matrice. Il est bien reconnu qu'un hypospadias trop étendu est un obstacle à la fécondation, de même que tout rétrécissement notable de l'urètre. Il faut en dire autant de l'induration partielle des corps caverneux, des brides, des cicatrices, etc., qui empêchent la rectitude de la verge pendant l'érection; de la brièveté du frein qui tire en bas l'ouverture de l'urètre; de la petitesse excessive de verge, etc. Quant à la femme, la stérilité est souvent causée par une déviation de la matrice, par des brides du vagin, etc., parce que la liqueur ne peut arriver dans la direction de la cavité utérine, et, ce qui le prouve, c'est que la fécondation a souvent eu lieu, dès que ces dispositions vicieuses ont été corrigées. Des mucosités abondantes, qui bouchent le col, des polypes, etc., produisent le même effet.

Il serait facile de multiplier les faits de cette nature; mais tout le monde est d'accord sur l'importance de la projection du sperme jusque dans le col de la matrice. On connaît la structure musculeuse de cet organe. Ce que je viens de dire des grossesses extra-utérines prouve que, pendant la conception, les trompes sont dans le même état d'éréthisme que le clitoris : il est donc facile de concevoir que le sperme, introduit dans le col de l'utérus,

l'excite d'une manière spéciale et y détermine des contractions en harmonie avec le but à atteindre; or, la plus légère contraction de la matrice suffit pour pousser le sperme dans les trompes, qui, se resserrant aussi successivement sous la même influence, peuvent achever rapidement ce mouvement progressif.

Pour peu qu'on réfléchisse à la disposition opposée des organes génitaux dans les deux sexes, on voit que chez l'homme tout se trouve à l'extérieur, tout est disposé pour l'expulsion convulsive du sperme, pour sa transmission subite aussi loin que possible. Chez la femme, au contraire, tout est intérieur, tout est préparé pour recevoir, pour conserver la liqueur séminale. Cette disposition inverse indique assez une action opposée dans la fonction; car il est impossible de supposer qu'un appareil aussi puissant, aussi compliqué, reste dans l'inaction sous l'influence du sperme. L'impression que la matrice en éprouve est suffisante pour lui faire sécréter une membrane accidentelle, car la caduque n'est pas un produit de l'œuf; elle n'est même pas provoquée par la présence de l'œuf, puisqu'elle existe avant son arrivée dans l'utérus et même dans les grossesses extra-utérines. La cavité de la matrice est fortement impressionnée par le sperme, puisque son passage suffit pour provoquer une pareille sécrétion. Quel sera donc le rôle de cet appareil en état d'orgasme? Il sera nécessairement opposé à celui du mâle, puisque l'appareil est disposé d'une manière inverse.

Nous ne pouvons pas avoir la preuve de ce mode d'action, parce que tout s'opère hors de la portée de nos sens; les contractions spasmodiques du vagin peuvent seules nous donner un indice de ce qui se passe plus profondément. Il est cependant chez certains animaux des phénomènes qui montrent, de la manière la plus patente, l'espèce d'absorption exercée par les organes de la femelle. Chez les Salamandres aquatiques, la fécondation s'opère sans qu'il y ait jamais contact immédiat entre les deux sexes. Le mâle se place à côté de la femelle quand il la voit disposée, en laissant cinq à six lignes d'intervalle entre les deux parois abdominales. Après une agitation plus ou moins vive, une émission de sperme trouble l'eau qui sépare les deux

organes, et un état de collapsus s'empare du mâle. Or, puisque les ovules sont fécondés dans le corps de la femelle, il faut bien que ses organes génitaux absorbent une partie du sperme poussé jusqu'à l'ouverture extérieure. Chez les Raies, les Lombrics, etc., il n'y a pas dans le mâle de parties saillantes qui puissent s'introduire dans les organes femelles, et cependant les ovules sont fécondés à l'intérieur.

Tous ces faits prouvent donc que le sperme détermine, dans les organes de la femelle, des mouvemens qui favorisent sa progression à l'intérieur, et complètent ceux que le mâle a exécutés pour le pousser aussi loin que possible. Cette seconde impulsion peut seule expliquer comment chez les Oiseaux le sperme peut arriver jusqu'au haut de l'oviducte. Si l'on tient compte de la puissance de l'utérus chez la femme et de l'éréthisme des trompes, des pavillons et des franges, on comprendra comment la fécondation peut s'opérer subitement par le concours de deux actions aussi puissantes et aussi instantanées.

Je sais qu'on cite des exemples de grossesse survenue pendant la catalepsie, l'ivresse, le narcotisme, un viol ou d'autres circonstances analogues; je sais ce qu'on a dit de la fécondité de certaines femmes très froides, de l'aversion même de quelques-unes pour l'acte ou pour l'agent de la fécondation, et je ne repousse pas ces faits, bien qu'on en ait abusé dans des circonstances fort équivoques. Mais ils ne prouvent rien contre l'influence de l'utérus et des trompes sur la marche du sperme. Les fonctions de toutes ces parties dépendent du système nerveux ganglionnaire; la volonté n'a aucun empire sur elle, il suffit que l'ovaire contienne des ovules à l'état de maturité, pour qu'il exerce son action sur le reste de l'appareil; comme le sperme contenu dans les vésicules séminales détermine des érections, des rêves érotiques et trop souvent des pollutions nocturnes, malgré tous les efforts de la volonté. Comment l'état comateux le plus complet pourrait-il empêcher la matrice de se contracter sous l'impression du sperme, puisque la syncope, la mort même n'empêchent pas cet organe d'achever *seul* le travail de l'accouchement, qui exige pourtant bien d'autres efforts de sa part?

On pourrait inférer de la rapidité de la fécondation dans l'es-

pèce humaine et des phénomènes nerveux qui l'accompagnent, qu'elle consiste en un acte semblable à celui de la saturation des deux fluides électriques; et cette hypothèse doit se présenter à l'esprit d'autant plus naturellement, que les phénomènes nerveux et électriques se confondent de plus en plus, et jouent tous les jours un rôle plus important; mais il suffit, pour détruire cette hypothèse, de rappeler que, dans les Insectes, il peut s'écouler plusieurs mois entre la copulation et la dernière ponte. Il n'y a donc que l'union du zoosperme avec l'ovule qui puisse rendre compte de la fécondation.

Voyons maintenant si cette opinion peut s'appuyer sur des considérations plus générales et par conséquent plus sûres encore.

§ II.

La génération est, avec la nutrition, la plus universelle de toutes les fonctions, puisque tous les êtres qui vivent se reproduisent. Malgré la diversité des phénomènes observés dans son accomplissement, il doit y avoir quelque chose de commun dans un acte qui est commun à tous. C'est ce qu'il s'agit de trouver, car c'est la condition *essentielle* de la fonction. Tout le reste n'est qu'accessoire, puisque tout le reste peut manquer dans les différentes espèces, sans que la reproduction en souffre.

C'est dans les êtres les plus simples qu'il faut chercher cette condition fondamentale de la génération, puisque c'est chez eux que la fonction est réduite à ses derniers termes, débarrassée de tout ce qui n'est pas indispensable à son accomplissement.

Le mode de la génération le plus simple est, sans contredit, celui qui s'opère par l'action isolée d'un seul individu, d'un seul organe. Voyons donc ce que présentent les différentes formes de *monogénie*.

Dans la *scissiparité* un individu se divise spontanément en deux ou plusieurs parties, qui reproduisent ensuite ce qui leur manque pour se compléter. Quand la scission a lieu longitudinalement, comme cela se voit chez divers Infusoires polygastriques, les deux moitiés sont parfaitement égales, symétriques,

en sorte qu'il est impossible de dire qu'une moitié produit l'autre ou qu'elle procède de l'autre; c'est certainement le cas le plus simple, puisqu'il n'y a là ni *générateur* ni *engendré*, il y a seulement deux moitiés d'un être vivant, qui se sont séparées pour continuer à vivre isolément. Cette séparation commence tantôt par une extrémité, tantôt par l'autre, mais dans tous les cas, elle ne s'achève que quand les deux moitiés sont en état de pouvoir suffire *seules* à leur nutrition, à la reproduction de ce qui vient de se séparer. C'est bien au moment de cette séparation que ces deux moitiés jouissent d'une existence individuelle, indépendante, qu'elles constituent réellement deux êtres distincts; mais ce n'est pas seulement de ce moment qu'elles vivent, elles vivaient également dès l'origine, et d'une vie aussi complète, aussi énergique, il n'y a donc eu que *séparation* de deux parties *vivantes*.

La scissiparité transversale s'observe chez les végétaux composés de tubes articulés et chez les animaux formés de zoonites. Quand les tubes de certaines Conferves ont pris tout leur développement, ils se séparent à l'endroit des cloisons, puis chaque tube isolé se cloisonne à son tour, s'étend, etc., jusqu'à ce que son développement ait atteint ses dernières limites; alors le même phénomène se reproduit, parce que chaque cellule possède, quand elle se sépare, tout ce qui est nécessaire à sa nutrition et à sa reproduction. La même séparation peut avoir lieu dans les animaux à chaque anneau, quand ils sont composés de zoonites semblables et complètes. Si l'organisation est plus compliquée vers la tête, la séparation n'a plus lieu qu'en deux parties, et c'est ordinairement la portion postérieure qui est la plus petite, quoique chacune reproduise bientôt tout ce qui lui manque pour se compléter. Il y a donc dans ce mode de reproduction quelque chose qui ressemble au développement ordinaire des Annélides, et en particulier des Myriapodes, dont le corps s'allonge par la formation de nouveaux anneaux, armés de pattes comme les autres.

Dans cette espèce de scissiparité, comme dans la précédente, la séparation n'a lieu que quand chaque partie peut continuer à vivre et à se développer isolément. Mais avant de jouir de

cette existence indépendante, chaque partie vivait d'une manière aussi complète; la vie ne leur a pas été donnée instantanément comme à une matière inerte; leur séparation est un résultat de la nutrition qui, ne pouvant plus être utile à l'accroissement de l'individu, est employée à la conservation de l'espèce.

Chez les êtres sphéroïdes, dont les dimensions sont à-peu-près égales dans tous les sens, la séparation peut se faire de tous côtés, en autant de parties qu'il y a d'organismes distincts, semblables entre eux et à la souche commune. C'est ce qui a lieu pour la Truffe, dont chaque truffinelle, à l'époque de la maturité, représente une truffe en miniature.

Dans la *gemmiparité*, c'est une partie de la surface interne ou externe qui développe un être vivant semblable au type qu'il doit continuer. Chez l'hydatide acéphalocyste de l'homme, de petits granules se manifestent à la surface interne des parois du kyste, par suite du développement des cellules du tissu intermédiaire aux deux surfaces. Ces points transparens se remplissent de sérosité, deviennent pédiculés en se gonflant, se séparent enfin pour tomber dans la cavité commune et donner lieu aux mêmes phénomènes. J'ai vu souvent de ces vésicules, encore adhérentes à la paroi commune contenir déjà, sur leur surface interne, d'autres vésicules au-dedans desquelles il s'en formait de nouvelles. Ce fait, invoqué en faveur de l'emboîtement des germes, prouve seulement, comme tant d'autres, que la reproduction est une conséquence de la nutrition. (1)

Ce mode de reproduction par gemmiparité interne rappelle exactement les fonctions des ovaires tubuleux et surtout des ovaires vésiculeux. La formation des ovules dans la baudroie

(1) Des observateurs distingués ont nié l'existence des mouvemens spontanés dans les Hydatides; mais je puis affirmer que c'est une erreur. J'ai constaté pendant plusieurs heures des contractions évidentes dans les parois des vésicules d'une moyenne dimension, exposées au soleil immédiatement après leur extraction du foie d'un individu mort la veille. Ces contractions se manifestaient par des cercles concentriques, partant de points différens et décomposant la lumière solaire avec des variations continuelles; cependant ces ondulations se voyaient moins bien sur les petites vésicules et n'existaient pas du tout sur les grandes, qui avaient probablement été étouffées par le développement de leur progéniture.

n'a pas lieu d'une autre manière que celle des vésicules dans l'acéphalocyste de l'homme. Chez d'autres hydatides, communes surtout dans le Bœuf, la reproduction s'opère par la surface extérieure du kyste; mais du reste les phénomènes sont toujours les mêmes, c'est toujours une cellule du tissu cellulaire placé entre les deux surfaces qui se développe; seulement la vésicule se porte au-dehors et tombe à l'extérieur, quand son pédicule se rompt; c'est exactement ainsi que sont produits les ovules dans les ovaires celluleux et parenchymateux.

Les Polypes d'eau douce, très faciles à observer, ont permis à Trembley de constater l'influence remarquable d'une alimentation abondante sur leur développement. C'est ainsi qu'il a pu voir un de ces bourgeons en pousser un second à sa surface, et celui-ci en reproduire un troisième, qui en portait déjà un quatrième quand le premier s'est séparé. Cette gemmation n'est donc encore qu'un accroissement porté au-delà des besoins de l'individu et employé au développement de l'espèce : c'est la nutrition continuée au profit de la reproduction. D'un autre côté, les premiers bourgeons ont à peine des bras, qu'ils saisissent aussi des proies au profit de la communauté ; car ces cavités digestives communiquent ensemble jusqu'à ce que le pédicule très rétréci soit sur le point de se séparer. Quand la même proie est saisie à-la-fois par les bras du Polype et par ceux de son bourgeon, elle est aussi disputée que si elle ne devait pas servir au développement des deux individus. Ainsi, non-seulement la vie existe dans le bourgeon dès le moment de son apparition, mais il jouit bientôt d'un commencement d'indépendance, et même il manifeste, avant de se séparer, un véritable antagonisme. Ce n'est donc pas de cette séparation qu'il faut faire dater son existence: il devient seulement indépendant.

Divers zoophytes produisent dans certaines saisons, à la surface interne de leur tube, des corps ovoïdes, que Grant, Ellis, Cavollini, etc., ont décrits sous le nom d'œufs, à cause de leur forme, mais qui ne sont évidemment que des gemmes développés, comme ceux des Hydatides, dans une cellule voisine de la surface. Les véritables œufs ne sont jamais pourvus de cils vibratiles et ne jouissent d'aucun mouvement spontané. Les gemmes

les Eponges se séparent successivement par la rupture de leur pédicule, et sortent l'un après l'autre par la même ouverture que les matières fécales. Leurs mouvemens sont d'abord très rapides; ensuite ils diminuent peu-à-peu, cessent complétement, et l'embryon se fixe pour reproduire la souche. Dans les *Campanularia dichotoma, plumaria, falcata*, etc., il y a plusieurs de ces gemmes enfermés d'abord dans la même capsule: ils en sortent ensuite pour se comporter de même que ceux des Eponges.

N'est-ce pas exactement ainsi que se forment, que se développent, que se meuvent les zoospermes avant de se fixer pour reproduire l'espèce? Les uns ne sont-ils pas toujours libres et isolés depuis le moment de leur séparation des canaux spermatiques, tandis que d'autres sont enveloppés dans des kystes plus ou moins compliqués, avant de pouvoir exercer leurs mouvemens en toute liberté, par suite de la rupture du kyste? Je ne connais pas de rapprochement plus frappant.

Indépendamment de ces différens modes de génération, les Polypes, les Rhizopodes, les Arcelles, etc., se reproduisent par les plus petites parcelles qui sont détachées de leur corps.

Quant aux végétaux, la reproduction par monogénie présente les mêmes caractères, soit qu'elle ait lieu par développement de bourgeons ordinaires ou adventifs, soit qu'elle s'opère à l'aide de tubercules, de turions, de propagules, de drageons, etc. C'est toujours une partie vivante qui se sépare du type, quand elle est en état de se développer isolément sous l'influence de circonstances favorables. Dans tous ces cas, la reproduction est encore le résultat d'une nutrition exubérante.

Les Conferves présentent, comme les animaux les plus inférieurs, des exemples de tous les modes de reproduction. Pour le moment, je ferai seulement remarquer que les unes émettent des globules de matière verte, complètement immobiles, qui, disséminés dans tous les sens, reproduisent l'individu, comme des graines, tandis que d'autres espèces, très voisines pour la structure, pour l'aspect extérieur, etc., fournissent des globules très mobiles au moment de leur expulsion, quoiqu'ils soient verts et semblables d'ailleurs aux premiers. Nees d'Esenbeck,

Treviranus, Dithmar, Gruithuisen, Carus, MM. Bory-Saint-Vincent et Desmazières ont constaté sur diverses espèces que ces globules se meuvent avec vivacité à la manière des monades, qu'ils recherchent l'ombre, puis ralentissent leurs mouvemens, et se fixent, au bout de quelques jours, par des radicules, pour développer enfin des tiges creuses, de véritables Conferves. M. Bory-Saint-Vincent a cru voir dans les mouvemens de ces globules verts des caractères suffisans d'animalité pour créer la famille des Zoocarpées. Mais on observe, entre les granules polliniques d'espèces très voisines, les mêmes différences qu'entre les globules reproducteurs des Conferves. Parmi ces granules polliniques, les uns sont complètement immobiles, et les autres, au contraire, jouissent de mouvemens spontanés très évidens. Ainsi l'étude de la reproduction par monogénie nous dévoile successivement le mode de formation des deux élémens de la fécondation dans la digénie.

Les sporules ne diffèrent des autres corps reproducteurs qu'en ce qu'ils sont fournis par un organe spécial, *sporange:* je ne m'y arrêterai donc pas.

En parlant de l'individu *générateur,* j'ai toujours dit le *type* ou la *souche*, et non pas la *mère*, parce que cette expression, généralement employée, est tout-à-fait fausse. Il n'y a de mère que chez l'individu qui possède des organes femelles, et l'on ne trouve des organes femelles que dans les espèces où il existe des organes mâles. L'individu qui produit son semblable par monogénie n'est donc pas plus une mère qu'un père.

C'est cependant d'un tel abus de langage que sont partis Swammerdam, Malpighi, Vallisneri, Harvey, Haller, Bonnet et autres ovaristes purs, pour attribuer presque toute la génération à la femelle. Fondés sur cette idée qu'il existe une chaîne non interrompue depuis le Polype jusqu'à l'Homme, ils ajoutent que le Polype se reproduit sans l'action fécondante du mâle, et ils en concluent que toute la génération est presque entièrement dans la femelle, l'action du mâle devant être infiniment restreinte. (1)

(1) Haller, *Elementa physiologiæ*, liber XXIX.

Burdach est tombé dans la même exagération, par un autre raisonnement qui revient exactement au même. Selon lui, quand l'un des deux sexes disparaît dans l'échelle des êtres, c'est toujours le mâle, la femelle restant seule chargée de la reproduction. Étrange pouvoir des mots!!! Mais, lorsque ce même polype se partage, suivant sa longueur, en deux parties parfaitement égales, il est impossible de dire que l'une ait engendré l'autre : où donc alors sera la mère?

C'est qu'en réalité, la *monogénie*, quelque forme qu'elle affecte, n'est qu'une séparation de parties vivantes pour la reproduction du type; ce n'est qu'une nutrition exubérante, employée au profit de l'espèce quand elle n'est plus nécessaire à l'individu; c'est toujours le même phénomène qui s'étend au dehors, quand il ne peut plus servir à l'économie.

Mais ce mode de reproduction n'est possible que dans les espèces les plus simples. A mesure que les tissus deviennent plus distincts, qu'ils forment des organes spéciaux, plus nombreux, plus compliqués, les fonctions de chaque tissu, de chaque organe et même de chaque partie d'un organe, deviennent aussi plus spéciales, plus précises, en un mot plus parfaites, comme l'a fait observer depuis long-temps M. Milne Edwards. Toutefois, à côté de ces immenses avantages, se trouve l'inconvénient attaché, dans nos fabriques, à toute division excessive du travail; chaque partie devient de plus en plus impropre à remplir d'autres fonctions que celles qui lui ont été dévolues. Dans le polype, tous les tissus sont fondus, de telle sorte que chaque portion de l'animal sent, se contracte, absorbe, respire et digère; a peau peut remplir les fonctions de l'estomac, et réciproquement; chaque particule, séparée du reste, contient tout ce qui lui est nécessaire pour continuer à vivre et pour réparer ce qui lui manque; aussi le polype peut-il se reproduire par tous les modes connus. Dans les végétaux et les animaux Articulés, dont chaque cellule, chaque zoonite ressemble aux autres, la reproduction peut s'opérer dans chaque division. Chez les animaux Rayonnés, chaque rayon possédant des ganglions nerveux, des muscles, etc., comme tous les autres, peut aussi reproduire ceux ceux qui lui manquent pour que l'agrégat soit complet. Mais,

quand la vie d'ensemble est confiée à trop d'organes distincts, l'individu ne peut plus produire son semblable par la séparation d'une partie de son corps, parce qu'aucune de ces parties ne possède en elle tout ce qui lui serait nécessaire pour vivre; elle pourra tout au plus être reproduite par l'action simultanée de tout ce qui reste. Ainsi, la Limace refait la face, la bouche et les yeux, pourvu que la section soit pratiquée sans endommager le ganglion œsophagien, qui représente le cerveau; ainsi, les pattes repoussent chez les Crustacés, les membres chez les Salamandres, la queue chez les Lézards; mais, au-dessus des Reptiles, il n'y a plus que les parties sécrétées qui puissent être reproduites.

La monogénie est donc impossible dans les espèces un peu compliquées, puisque toute la puissance de l'économie se borne à la reproduction de certaines parties. Ce qui prouve d'ailleurs directement cette impossibilité, c'est que la monogénie ne s'observe dans aucune espèce un peu élevée.

Cela ne veut pas dire que la *digénie* ne se puisse rencontrer avec la *monogénie*. On conçoit, au contraire, que le concours de deux organes distincts pourra facilement amener la reproduction de l'espèce, dans tous les cas où le même phénomène a pu être produit par l'action spontanée d'un seul individu, d'une seule partie; et c'est, en effet, ce qui arrive dans les végétaux et les animaux des classes inférieures.

Lorsqu'un seul individu ne peut plus reproduire l'espèce, parce que les tissus sont devenus plus distincts, les organes plus nombreux, les diverses fonctions plus spéciales, etc, il faut bien que la reproduction elle-même soit confiée à des organes spéciaux, et que ces organes diffèrent d'autant plus dans les deux sexes et soient eux-mêmes d'autant plus compliqués, que le reste de l'économie est aussi plus complexe : c'est, en effet, ce qui existe, ainsi que je l'ai fait remarquer ailleurs.

C'est chez les Mammières que les organes génitaux du mâle et de la femelle sont le plus compliqués, et qu'ils diffèrent davantage par leur structure propre et par le caractère spécial de leurs fonctions.

Dans l'espèce humaine, chaque pièce des deux appareils est

elle-même encore plus distincte. Chez la femme, les ovaires sont plus homogènes, plus compactes, plus exactement sphériques que chez les femelles d'aucun autre Mammifère; les franges sont plus séparées des ovaires; la matrice est plus circonscrite, plus globuleuse, plus saillante entre les trompes et dans le vagin; elle est enfin plus éloignée des mamelles. Chez l'homme, les canaux sécréteurs des testicules sont plus distincts, plus longs, plus faciles à déplisser; chez lui seul, le testicule est enveloppé d'une membrane séreuse complètement isolée de la cavité péritonéale, circonstance que la station bipède rend encore plus remarquable; c'est enfin chez lui que la verge et le scrotum sont plus détachés de l'abdomen et des pubis. Aussi, est-ce dans l'espèce humaine que les organes génitaux ont le plus d'influence sur toutes les fonctions de l'économie, sur tous les actes de la vie, et que la sexualité est empreinte plus profondément dans tous les tissus, même avant la puberté.

Il existe donc une harmonie remarquable entre les modifications des organes génitaux et celles que subit l'économie dans la série des êtres vivans; ou plutôt, les organes génitaux portent l'empreinte de l'économie propre à chaque espèce; ce qui devait être, puisque ce sont eux qui sont chargés de reproduire le type. Mais il est naturel de penser que cette structure spéciale des organes génitaux influe aussi puissamment, aussi directement sur les produits qui en résultent, que l'ensemble de l'économie influe sur la structure spéciale des organes génitaux; et c'est certainement ce qui a lieu, puisque ces matériaux reproduisent toujours l'espèce, et même les nuances les plus délicates qui distinguent les individus de la même espèce. L'exemple du Mulet et de la plupart des Hybrides, prouve combien la plus légère modification dans ces organes peut apporter de différence dans leurs produits; car le testicule du Mulet ne diffère pas sensiblement de celui du Baudet, et le microscope lui-même ne permet d'apprécier le moindre caractère distinctif dans l'organisation intime de l'un et de l'autre: cependant, le premier ne fournit jamais de zoospermes complets. A plus forte raison les produits doivent-ils présenter un cachet particulier, quand les organes ont des caractères distinctifs qui frappent à la première vue.

Mais, parmi les matériaux fournis par le mâle et par la femelle, quels sont ceux qu'on peut regarder comme essentiels, comme propres à maintenir invariablement le type de l'espèce? Est-ce la partie liquide, transparente? Sont-ce les granules de toute espèce, les débris d'épithélium, etc., qui n'ont aucune forme déterminée, constante, ou bien n'est-ce pas plutôt la partie organisée, qui présente des formes invariables, déjà compliquées, et tous les caractères de la vie? Abstraction faite de toute observation directe, le plus simple raisonnement permettrait de choisir entre ces deux hypothèses; car la forme et la vie ne peuvent être transmises par ce qui est privé de forme et de vie.

Ce n'est pas non plus dans la fécule de l'ovule végétal, dans le vitellus de l'ovule animal, et moins encore dans le fluide ambiant, qu'il faut chercher la part d'influence de la femelle sur l'être nouveau qui doit résulter de la fécondation, pas plus qu'on ne peut trouver dans les matériaux divers qui accompagnent les zoospermes, la part de vitalité et d'organisation fournie par le mâle. Il n'est plus permis d'admettre aujourd'hui dans l'ovule ou dans le zoosperme des germes invisibles de tous les organes, tels qu'ils sont à l'état parfait, puisqu'ils doivent éprouver une foule de transformations avant d'y arriver, et que d'autres disparaissent après une existence purement transitoire; mais il faut bien que le mâle et la femelle fournissent les premiers élémens de la trame qui doit amener leur ressemblance, de même que les premiers linéamens appréciables contiennent les rudimens de toutes les métamorphoses subséquentes. On arrive donc, par le simple raisonnement, à la même conclusion que par l'analyse rigoureuse des faits les plus constans et les mieux observés, et cette conclusion est parfaitement conforme à la loi établie pour la reproduction par monogénie.

En effet, qu'avons-nous observé à cette occasion?

1° Dans la Monogénie, la génération n'est qu'un développement exagéré; la nutrition n'est employée à l'entretien de l'espèce qu'après avoir satisfait aux conditions d'existence de l'individu; la fécondité est en raison des alimens, etc. Il en est exactement de même dans la digénie: les organes génitaux n'achèvent

leur évolution que quand l'existence de l'individu est assurée, et la fécondité est d'autant plus grande, que le mâle et la femelle ont moins à lutter contre les causes extérieures de destruction : de là l'influence des alimens abondans et réparateurs chez les animaux, de l'engrais dans les végétaux, d'une température appropriée, etc., etc., pour les uns et les autres.

2° Dans la monogénie, la reproduction consiste essentiellement dans la séparation d'une partie déjà vivante, qui ne fait qu'acquérir une existence indépendante, en sorte que la vie n'est pas un instant interrompue entre la souche et le corps reproducteur qui s'en sépare. Les mêmes phénomènes s'observent dans la digénie; seulement ils s'opèrent dans deux organes distincts, parce que la complication de l'organisme ne permet plus que la fonction soit remplie par un seul. Bien plus, la production des ovules et des zoospermes, leur développement successif jusqu'au moment de la fécondation, ressemblent exactement à tout ce que j'ai fait remarquer des différens modes de reproduction par monogénie. L'ovule et le zoosperme ne sont-ils pas doués de vie? Ne se détachent-ils pas de parties vivantes avec des circonstances semblables à celles qui accompagnent la reproduction par monogénie?

Plus on étudiera l'ovule et le zoosperme, plus on verra qu'ils représentent, jusqu'au moment de la fécondation, tous les phénomènes de la monogénie dans les espèces les plus inférieures. Les travaux de Carus, de Tréviranus, de MM. Geoffroy-Saint-Hilaire, de Serre, etc., ont démontré que les espèces supérieures passent transitoirement par l'état permanent des espèces inférieures. C'est une pensée profonde, large et vraie, autant que féconde; mais, jusqu'à présent, on n'était parti que du moment de la fécondation : il faut évidemment y ajouter l'histoire antérieure du développement de l'ovule et du zoosperme, pour que la série soit complète, pour qu'elle commence réellement aux derniers degrés de l'échelle; c'est alors seulement que la loi sera générale et sans exception.

3° Dans la monogénie, la séparation a lieu quand l'individu nouveau peut continuer à se développer isolément; dans la digénie, chaque partie vivante se sépare de l'organe qui l'a pro-

duite, quand elle peut s'unir à l'autre pour la compléter et en être complétée. Mais cet état nouveau, à l'état le plus rudimentaire, au point initial de son existence, aurait péri, s'il avait dû puiser les matériaux de son prochain développement dans les agens extérieurs; car il ne pouvait seul acquérir une organisation plus compliquée que celle des êtres les plus simples; d'ailleurs, ce mode de reproduction n'eût toujours été qu'une monogénie semblable à celle qui a lieu par des sporules. Il fallut donc que, en se séparant du mâle et de la femelle, l'ovule et le zoosperme trouvassent ces matériaux de développement ailleurs que dans les agens du dehors, puisqu'ils devaient être autre chose qu'une Hydatide ou un Polype. Mais chacune des deux moitiés ne pouvait être chargée du même rôle; car elles n'auraient pas eu d'action l'une sur l'autre, et chacune aurait pu se développer sans le secours de l'autre, comme dans la monogénie des classes inférieures. Il a donc fallu nécessairement que l'une des deux moitiés fût chargée spécialement de pourvoir à la nutrition commune jusqu'à ce que l'être nouveau fût en état de puiser par lui même dans le monde extérieur, et ce rôle a toujours été rempli par la femelle.

L'ovule végétal se munit de fécule avant la fécondation, au moyen de son podosperme, qu'on a mal-à-propos appelé *cordon ombilical*, et il continue ensuite à s'en remplir jusqu'au moment où l'embryon et l'embryotrophe sont assez développés pour pouvoir puiser au dehors les élémens d'un développement complet. Alors les vaisseaux du podosperme se dessèchent, la graine se détache, etc. Ces matériaux, étant presqu'à l'état de siccité, ne réagissent que difficilement les uns sur les autres, et la faculté de germer se conserve pendant long-temps. L'embryotrophe est constamment alimentaire, non-seulement pour l'embryon, mais encore pour tous les animaux granivores. On peut en dire autant du vitellus dans tous les animaux; seulement comme il est plus liquide, il prête plus facilement à la fermentation putride et l'incubation doit suivre de près la ponte, à moins qu'une température très basse ne suspende les phénomènes, comme chez les insectes. Le vitellus est très petit dans les Mammifères, parce qu'il n'est utile que dans les premiers

jours de la gestation; mais l'utérus et les mamelles complètent le rôle de la femelle, dont le caractère distinctif est toujours de servir à la nourriture de l'embryon.

Toutefois l'ovule n'est pas seulement un magasin d'alimens; il est encore, et avant tout, une partie vivante. C'est comme tissu vivant, que le rôle de l'ovule est le plus important, puisque, chez les Mammifères, l'ovule sert très peu à la nourriture de l'embryon; c'est comme complément vivant du zoosperme, que l'ovule doit être considéré, si l'on veut embrasser dans son ensemble la loi fondamentale de la génération.

Quant aux zoospermes, il est évident qu'ils sont vivans, seuls vivans dans la liqueur séminale, et peuvent seuls, par conséquent, transmettre la vie; ils ont seuls une organisation plus ou moins avancée, suivant les classes, et des formes invariables pour chaque espèce; eux seuls peuvent donc transmettre aux descendans l'influence propre du mâle avec ses plus légères nuances.

Les mêmes considérations sont exactement applicables aux végétaux. Avant la fécondation, l'ovule vit, chez eux, de la vie de l'ovaire, puisqu'il a déjà subi de nombreuses transformations, et que son organisation est très compliquée avant qu'il ait pu recevoir l'influence du pollen; d'ailleurs sa continuité avec l'ovaire ne cesse que bien long-temps après. Quant aux granules polliniques, j'ai montré leur analogie avec les globules reproducteurs des Conferves, ce qui s'accorde avec le rôle de ces granules comme agens de reproduction, quoique les uns soient immobiles; tandis que les autres jouissent de mouvemens spontanés très obscurs dans certaines espèces, plus évidens et même très étendus dans d'autres. J'ai fait voir aussi la ressemblance remarquable des grains de pollen, à une ou deux enveloppes, avec les simples capsules spermatiques et les spermatophores les plus compliqués, non-seulement par leur manière de se comporter sous l'influence de l'humidité, mais encore par leur mode de formation dans les organes mâles.

Quant au rôle des granules polliniques dans la fécondation, il avait déjà été comparé à celui des animalcules spermatiques par Needham, Gleichen, Geoffroi, de Jussieu, etc.; mais M. Ad. Brongniart a démontré l'exactitude de cette opinion par

des observations plus précises, plus multipliées, faites avec de meilleurs instrumens et enchaînées par une logique plus sévère. (1)

Voici ce qui résulte des faits incontestables qui ont été publiés à ce sujet. Les granules polliniques sont, comme les zoospermes, d'une constance remarquable pour leurs formes et leurs dimensions dans la même espèce, constance reconnue aujourd'hui par ceux même qui n'attachent aucune importance à ces granules. Ils manquent sur les plantes conservées dans les serres sans donner de graines, comme les zoospermes manquent dans la semence du Mulet, etc... Les grains de pollen sont alors remplis d'une matière mucilagineuse, et dépourvus de granules à formes et à dimensions constantes, comme ceux qu'on observe dans toutes les plantes phanérogames dont la fécondation a lieu d'une manière régulière. (2)

Quant à leurs mouvemens spontanés, je suis loin d'y attacher la même importance que MM. Ad. Brongniart, Brown, Amici, etc., attendu qu'ils sont très obscurs dans beaucoup d'espèces, qu'ils manquent absolument dans d'autres, et ne me paraissent nullement nécessaires pour compléter leur analogie avec les zoospermes. Il me semble même plus naturel de retrouver, dans les agens de la fécondation, le caractère qui distingue le plus éminemment les végétaux des animaux, et j'ai besoin de me rappeler les mouvemens spontanés des globules reproducteurs de certaines Conferves, pour comprendre ceux des granules de plusieurs pollens. Aussi bien des micrographes, Gleichen lui-même, ont-ils pris ces granules mobiles pour des *animalcules d'infusion*. Les différences qu'on observe, à cet égard, d'une espèce à une autre, ne doivent donc pas plus étonner que celles

(1) Ces travaux remarquables ont besoin d'être médités dans les Mémoires originaux, comme ceux de MM. Prévost et Dumas, dont ils sont, en quelque sorte, le complément. (Voyez *Annales des Sciences naturelles*, tome XII, page 14, 145, 225; tome XIII, page 146; tome XV, page 381; tome XXIV, pages 113, 263.)

(2) A Toulon, un dattier mâle existe près d'un dattier femelle, sans qu'il en résulte cependant fécondation, et les noyaux ne contiennent pas d'embryon. Le professeur Delile a constaté que les grains de pollen sont tous vésiculeux, demi transparens et non farineux, opaques comme ceux d'Afrique.

qu'on retrouve dans les corps reproducteurs des Conferves, dans les formes et les dimensions des divers granules polliniques. Les mêmes différences existent entre les zoospermes, entre les ovules, même dans les espèces les plus voisines, et cela devait être, puisque ces matériaux devraient représenter le mâle et la femelle de chaque espèce. Ce sont même ces différences constantes, antérieures à la fécondation, qui expliquent comment les deux élémens de cette fonction peuvent reproduire, d'une manière si exacte, le caractère spécial du type avec ses nuances les plus délicates.

Ici l'histoire des Hybrides montre, encore mieux que chez les animaux, l'influence du mâle sur la production de l'embryon. Kœlreuter et Gærtner ont remarqué que la fécondation par le pollen, d'une espèce voisine, ne change en rien le volume, la couleur, la saveur du *fruit*, etc., ne hâte ou ne retarde nullement l'époque de sa maturité; que l'aspect même de la graine ne présente pas la moindre différence appréciable. C'est seulement sur les produits de cette graine qu'on peut constater les changemens apportés dans les caractères de l'espèce par l'intervention d'un pollen étranger. Un grand nombre d'expériences semblables ont donné les mêmes résultats en France, en Belgique, etc., et tous nos vignerons savent parfaitement que des pepins de raisins blancs, par exemple, donnent souvent des ceps à raisin noir, quand ces espèces sont mêlées dans une vigne.

Ces résultats sont très faciles à concevoir, puisque c'est l'ovaire qui fournit tout ce qui est destiné au développement de l'embryon, la nutrition étant toujours l'attribut de la femelle ou de l'organe femelle : l'embryon *seul* peut donc conserver les traces de l'influence d'un pollen étranger, et ces différences portent sur des parties trop exiguës pour pouvoir être appréciées même au microscope. Il n'y a donc que le développement ultérieur de la plante qui puisse mettre en évidence ces modifications ; c'est ce qui explique pourquoi les semis ne répondent pas toujours à l'attente des horticulteurs.

Ici, je dois répéter ce que j'ai dit à l'occasion des zoospermes : on ne peut attribuer l'influence du mâle ou de l'organe mâle sur

l'embryon, à la matière *amorphe* qui accompagne les granules polliniques, et moins encore à une simple *excitation dynamique*. L'empreinte particulière et constante du mâle ne peut s'expliquer que par l'intervention d'un tissu déjà suffisamment organisé pour porter le cachet de son origine, c'est-à-dire du mâle représenté par l'anthère.

Quant aux autres circonstances de la fécondation, elles sont essentiellement les mêmes que chez les animaux. C'est sur un point constant de la *vésicule* embryonnaire que se manifestent toujours les premiers rudimens de l'embryon. Ce n'est jamais que plusieurs jours après l'action du pollen sur le stigmate qu'on aperçoit sur cette vésicule les premiers linéamens de l'embryon. Cet intervalle de temps varie, comme chez les animaux, suivant les espèces; l'embryon s'enfonce aussi de plus en plus dans l'intérieur du *sac* embryonnaire, en absorbant les matériaux encore visqueux dont il est entouré. Les membranes de l'ovule s'entr'ouvrent constamment à l'époque de la fécondation (*endostome*, *exostome*) pour laisser saillir le *mamelon d'imprégnation* de l'amande; en sorte qu'on peut suivre les granules polliniques depuis le stigmate jusqu'à la vésicule embryonnaire, à travers le *tissu conducteur*, le micropyle et le mamelon d'imprégnation, aussi bien qu'on peut suivre, dans l'espèce humaine, le trajet des zoospermes jusqu'à l'ovaire. Les circonstances *fondamentales* de la fécondation sont donc les mêmes dans les végétaux et dans les animaux; elles consistent essentiellement dans la soudure, dans la fusion de deux parties vivantes fournies par le mâle et par la femelle, ou plutôt par les organes spéciaux qui représentent le mâle et la femelle.

J'ai fait voir ailleurs que la production et le développement de l'ovule et du zoosperme ont lieu comme dans la monogénie, et que la première période de leur existence, celle qui précède la fécondation, représente la génération et la vie dans les espèces les plus inférieures. Le même phénomène préside donc à la reproduction par *monogénie* et par *digénie*; il permet de ramener à une seule loi le principe *essentiel* de la génération, puisqu'on le retrouve dans tous les cas. Le raisonnement seul eût suffi pour indiquer qu'il en devait être ainsi; car la plupart

des végétaux et beaucoup d'animaux se reproduisent par *monogénie* et par *digénie*, et ils ne pouvaient pas être soumis à deux lois différentes pour une seule et même fonction. Quand une formule n'embrasse pas l'universalité des faits, elle est fausse ou pour le moins incomplète.

Ainsi, les considérations les plus générales confirment parfaitement les inductions fournies par l'analogie et par l'observation directe, sur l'origine, le mode de développement et les fonctions des deux élémens de la fécondation.

Les zoospermes sont produits par les testicules, comme les ovules par les ovaires; les uns et les autres se développent de la même manière, et ils se complètent réciproquement.

CONCLUSIONS.

La fécondation n'est pas un acte à l'aide duquel une matière inerte soit tout-à-coup vivifiée par un liquide *amorphe*, ou par une influence *électrique*, *nerveuse*, *vitale*, *dynamique*, etc.; car la vie ne se produit pas instantanément par une seule *impulsion* donnée à la matière, comme on imprime le premier mouvement au pendule en repos : des fluides amorphes, inertes, ne peuvent donner à la matière la forme et la vie dont ils sont privés. La vie se développe d'une manière lente et progressive dans l'individu, pour se continuer ensuite au profit de l'espèce, comme une conséquence, une extension de la nutrition. La matière *inerte* s'organise, se perfectionne lentement, devient de plus en plus vivante dans l'organisme souche avant d'acquérir une existence indépendante, et la vie se propage ainsi sans interruption possible.

La fécondation *est l'union de deux parties vivantes pour se compléter réciproquement et se développer en commun.*

Quand on embrasse d'un seul coup-d'œil la reproduction de *tous les êtres vivans*, on arrive à cette formule plus générale.

La génération *est la* séparation *d'une partie* vivante *pour se développer isolément ou puiser dans une autre les élémens nécessaires au développement ultérieur d'un être semblable au type.*

Enfin, en généralisant encore davantage l'expression des phé-

nomènes par lesquels la vie se développe et se propage, on voit que la conservation du type est due à l'extension du même acte qui a produit l'évolution de chaque être particulier.

La génération est à l'espèce ce que la nutrition est à l'individu.

RECHERCHES *sur divers ossemens fossiles attribués par Cuvier à deux* PHOQUES, *au* LAMANTIN, *et à deux espèces d'*HIPPOPOTAME, *et rapportés au* MÉTAXYTHÉRIUM, *nouveau genre de Cétacé, de la famille des Dugongs,*

Par J. DE CHRISTOL,

Professeur de minéralogie et de géologie à la faculté des Sciences de Dijon. (1)

(Présenté à l'Académie des Sciences, le 21 septembre 1840.)

§ I.

Dans ses Recherches sur les ossemens fossiles, Cuvier a établi deux espèces ou deux sortes de Phoques fossiles, au moyen de deux moitiés d'humérus, découvertes aux environs d'Angers par M. Renou, professeur d'histoire naturelle dans cette ville.

Après avoir rappelé qu'à une époque où on confondait toutes les espèces de terrains, et où, les considérant toutes comme des produits de la mer, on devait être naturellement porté à attribuer à des animaux marins les ossemens, qui sont si répandus dans quelques-uns de ces terrains, Esper, Targioni Tozetti le père, Buffon, et les naturalistes du margrave d'Anspach avaient

(1) Ce Mémoire avait été présenté à l'Académie des Sciences et se trouvait entre les mains de la commission chargée de l'examiner, lorsque M. de Blainville, l'un des membres de cette commission, a publié et a présenté à l'Académie des Sciences son *Ostéographie des Phoques récens et fossiles:* je n'ai donc pu consulter ce travail, dans lequel se trouvent rapportées plusieurs observations qui m'appartiennent et qui sont consignées dans mon Mémoire.

faussement rapporté au Phoque des ossemens fossiles des cavernes, des brèches osseuses ou des terrains tertiaires, Cuvier observe que les seuls ossemens de Phoque bien constatés qu'il ait pu obtenir sont ceux des environs d'Angers, trouvés par le professeur Renou.

Ces os d'Angers, décrits et figurés dans le tome v, Pl. XIX, fig. 24, 25, 26, 28 et 29, des *Recherches sur les ossemens fossiles*, consistent, l'un, en une extrémité supérieure d'humérus, que Cuvier rapporte à un Phoque à-peu-près deux fois et demie aussi grand que notre Phoque commun des côtes de France (*Phoca vitulina* L.), l'autre, en une extrémité inférieure d'humérus, que Cuvier rapporte à un Phoque un peu plus petit que le premier.

En signalant ces deux Phoques fossiles, dont le premier serait un peu plus grand que le second, Cuvier ne dit point s'il les considère seulement comme deux individus de la même espèce ou comme formant deux espèces dont les différences ne seraient annoncées que par celles de la taille. Les expressions dont il s'est servi et la circonstance que, dans d'autres cas, où il a réellement établi dans un même genre plusieurs espèces, qui ne diffèrent que par la grandeur, il s'est exprimé à-peu-près dans les mêmes termes, seraient plus favorables à la dernière interprétation : aussi M. Lesson, dans son *Manuel de mammologie*, ne révoque-t-il point en doute que Cuvier n'ait établi deux espèces de Phoques fossiles au moyen des os d'Angers. D'un autre côté, plusieurs auteurs, en indiquant, d'après Cuvier, les débris fossiles du genre Phoque, ne signalent qu'une seule espèce. Quoi qu'il en soit, comme on pourrait choisir entre les deux interprétations auxquelles se prêtent les expressions de Cuvier, je combattrai également les résultats que l'une et l'autre fournissent, en sorte que le résultat définitif sera le même dans l'une et l'autre hypothèse.

Après avoir attentivement étudié les caractères très remarquables que présentent les dessins des os d'Angers et la description qu'en donne Cuvier; après avoir comparé les uns et les autres aux caractères et aux dessins des humérus de Phoque, de Dugong et d'un animal fossile que j'ai découvert à Mont-

pellier, je crois pouvoir montrer: 1° que les deux moitiés d'humérus décrites par Cuvier ne proviennent pas ou de deux espèces distinctes ou de deux individus de taille différente de la même espèce de Mammifère marin, mais bien d'un seul humérus, ou, tout au plus, de deux humérus, tous deux de taille pareille et d'une seule espèce de Mammifère marin; 2° que ce Mammifère marin n'est point un Phoque, ainsi que le pense Cuvier, mais un Mammifère marin herbivore, un Cétacé de la famille des Dugongs.

Nous allons discuter successivement chacune de ces deux propositions.

Restitution de l'humérus d'Angers.

Si l'on voulait rapporter à un même Phoque, à un même individu, les os d'Angers, l'extrémité supérieure d'humérus paraîtrait peut-être un peu trop forte pour l'extrémité inférieure: aussi Cuvier a-t-il rapporté ces portions d'os à deux Phoques d'inégale grandeur. Mais les dimensions de ces deux portions d'os se rapportent très bien les unes aux autres, si on attribue, ainsi qu'on doit le faire, les deux moitiés d'os qui les ont fournies, non à un Phoque, mais à un animal fort différent, à un Cétacé de la famille des Dugongs. Il suffit, en effet, de comparer dans nos diverses figures les dimensions des moitiés d'humérus d'Angers aux dimensions de l'humérus de Dugong, pour acquérir la preuve qu'elles rentrent les unes et les autres dans une règle commune.

D'un autre côté, si, en calquant les deux dessins de Cuvier (fig. 25 et 29 de la Pl. XIX des *Recherches*), on applique le bout cassé de l'extrémité inférieure d'humérus sur le bout cassé de l'extrémité supérieure, on voit clairement que ces deux moitiés d'humérus, ainsi placées bout à bout, s'adaptent de la manière la plus naturelle et donnent le dessin d'un humérus entier et très bien proportionné dans toutes ses parties, tel enfin que nous la reproduisons figure 1.

Ces bouts cassés des deux moitiés d'humérus étant tous deux

taillés en biseau en sens inverse l'un de l'autre, comme cela arrive fréquemment dans un os rompu en deux, j'ai eu soin, en plaçant bout à bout les deux dessins, de faire empiéter en quantité suffisante l'un sur l'autre, de manière à ce que les surfaces obliques et opposées des deux biseaux s'appliquassent l'une contre l'autre, ainsi qu'elles devaient l'être avant la rupture de l'os. Toutefois je ne saurais répondre que, dans mon dessin, les deux morceaux ne fussent pas mathématiquement trop ou trop peu rapprochés. Tout ce que je puis assurer, c'est que l'erreur que je pourrais avoir commise dans l'évaluation du véritable degré de rapprochement des deux bouts réunis, ne dépasse pas sensiblement les limites des différences individuelles.

Il suffirait déjà de ce dessin pour qu'un naturaliste un peu versé dans la matière, pût à l'instant même y reconnaître que les deux moitiés d'humérus qui ont servi à la former proviennent d'une même espèce d'animal et très probablement du même individu. En effet, ces deux moitiés d'humérus, trouvées toutes deux dans le même gisement, sont toutes deux du même côté, du côté droit; toutes deux se terminent par des cassures qui coïncident précisément au même point de la longueur de l'humérus entier; la largeur des deux bouts réunis est la même au point où j'en ai opéré la réunion, c'est-à-dire un peu au dessous de la moitié de la longueur totale de l'humérus; la courbure des arêtes de la moitié inférieure est exactement la continuation de la courbure des arêtes de la moitié supérieure; la torsion sur son axe, que l'on voit commencée dans le prisme triangulaire que forme la moitié supérieure, se continue et croît graduellement dans l'autre portion du prisme triangulaire que forme la moitié inférieure; toutes les formes, ainsi que les dimensions de la moitié inférieure sont parfaitement en rapport avec les formes et les dimensions de la moitié supérieure; la longueur totale de l'humérus est parfaitement proportionnée à la largeur des deux extrémités articulaires, et la force de chacune de celles-ci est en rapport avec le degré d'étranglement qu'éprouve le corps de l'os dans sa région moyenne. Ajoutons à ces observations la remarque déjà faite précédemment, que les bouts cassés des deux moitiés d'humérus paraissent tous deux taillés en biseau

en sens inverse l'un de l'autre, comme le seraient deux moitiés d'un os rompu en deux.

Mais on peut démontrer encore que ces deux portions d'humérus ne proviennent pas de deux Phoques de taille différente, en montrant, comme nous le ferons incessamment, qu'elles ne proviennent pas même du genre Phoque, mais que, séparées ou réunies, elles présentent si évidemment les caractères de l'humérus du Dugong, à l'exclusion des caractères de l'humérus du Phoque, qu'elles ne peuvent réellement appartenir qu'à un seul animal de la famille des Dugongs.

En décrivant d'une manière générale, c'est-à-dire générique, les caractères ostéologiques des diverses espèces de Phoques, dont il possédait le squelette, Cuvier a eu soin, lorsqu'il y a eu utilité de le faire, d'indiquer pour chaque os en particulier les différences qui pouvaient être propres à quelqu'une de ces espèces; et comme, en décrivant l'humérus de ces espèces et figurant celui du Phoque à ventre blanc, il ne signale d'autre différence dans l'humérus des diverses espèces que l'absence du trou condylien dans le Phoque à ventre blanc et dans l'Otarie, je dois croire que les figures et les descriptions qu'il donne doivent servir de type à tout le genre, et qu'elles peuvent, par conséquent, servir de base aux comparaisons que je pourrais entreprendre. Privé que je suis de tout moyen de comparaison effective, je ne puis que prendre les faits tels que nous les a fournis Cuvier, et je crois pouvoir d'autant plus en agir ainsi dans la circonstance actuelle que, dans ses déterminations des os d'Angers, Cuvier n'a pas puisé à d'autres sources.

Ce sera donc à l'humérus des diverses espèces de Phoques vivans, tel qu'il a été décrit par Cuvier, et au dessin de celui du Phoque à ventre blanc, que je comparerai les os d'Angers.

Néanmoins, comme on pourrait supposer, et peut-être avec quelque fondement, que tous les humérus de Phoques peuvent ne pas être entièrement semblables, et que, dans le nombre de ceux qui n'ont pas été décrits par Cuvier, il peut s'en trouver qui ressemblent à celui d'Angers, il est utile d'observer d'abord que ce n'a pu être à ces derniers humérus que Cuvier a assimilé les os d'Angers, et ensuite qu'on ne doit pas perdre de vue qu'on

peut encore montrer que les os d'Angers ne peuvent provenir du Phoque, en établissant l'identité de leurs caractères avec les caractères si saillans de l'humérus du Dugong.

Avant d'entreprendre la comparaison de l'humérus restitué d'Angers avec ceux des Phoques vivans, j'établirai l'identité de ses caractères avec ceux d'un humérus fossile, que j'ai découvert à Montpellier et qui lui-même offre les caractères des humérus de Dugongs. Cet humérus étant en ma possession, se trouvant entier et étant, par conséquent, pourvu de la tête articulaire supérieure, qui manque dans celui d'Angers, m'offrira plus de facilités dans les comparaisons que je pourrai entreprendre, aussi puis-je le substituer dans mes comparaisons à l'humérus d'Angers.

Description de l'humérus de Montpellier.

L'humérus de Montpellier (Pl. 7, fig. 2), vu par devant, et (fig. 3) vu par derrière, est du côté gauche, tandis que celui d'Angers est du côté droit. Il est gros et court, comme cela devait être dans un humérus de mammifère marin. Il offre, comme celui d'Angers (fig. 1), et celui du Dugong (fig. 4 et 17), la forme d'un prisme triangulaire, irrégulier, à arêtes mousses, tordu en spirale sur son axe, comme si l'extrémité supérieure, en pivotant sur son axe, avait fait un peu plus d'un quart de révolution sur l'extrémité inférieure restée fixe. Il est étranglé dans le milieu de sa longueur, et très renflé ou dilaté à ses deux extrémités.

Son corps est plein et solide, et non fistuleux ou spongieux dans l'intérieur, particularité indiquée dans les dessins des os d'Angers, et commune, du reste, à tous les Mammifères marins.

Les trois arêtes du prisme qui constitue le corps de l'os sont formées, l'une, l'antérieure, par la crête deltoïdienne, qui est fortement arquée et très obliquement dirigée de dedans en dehors; les deux autres, les latérales, par les bords interne et externe du corps de l'os. Les deux dernières arêtes sont aussi très arqués, surtout l'interne, et aboutissent par leurs

extrémités inférieures et supérieures, l'interne à la petite tubérosité et au condyle interne ; l'externe à la tête articulaire et au condyle externe, et beaucoup plus bas que dans le Phoque.

La face externe de l'os est la plus large, surtout à sa partie supérieure, où elle est fortement concave, soit dans le sens de sa longueur, soit dans le sens de sa largeur; la face interne est la plus étroite ; la face postérieure, bien qu'intermédiaire, seulement, pour sa largeur, entre les deux faces précédentes, est néanmoins encore très large, à-peu-près plane dans ses deux tiers supérieurs, et contournée en plusieurs sens dans son tiers inférieur.

Qu'on se figure la force énorme du triceps brachial de cet humérus, telle que l'indiquent et la largeur de la face postérieure et la brièveté si grande de l'os, et l'on verra que, n'eût-on point connu l'humérus du Dugong, il eût été impossible de n'en pas conclure que l'animal auquel cet humérus a appartenu était un animal essentiellement nageur, particularité à l'appui de laquelle viennent encore, et la forme si décidément prismatique de l'os à arête tournée en avant, et l'absence de canal médullaire.

La crête deltoïde est très saillante à sa partie supérieure, où elle forme un grand crochet, fortement recourbé en dehors, à-peu-près comme dans le Rhinocéros.

La grosse tubérosité, par sa réunion avec la partie supérieure de la crête deltoïdale, forme une protubérance rhomboïdale A, B, C, D, très grande, à surface plane, tournée en avant et un peu en dehors. Le bord supérieur de cette tubérosité forme une crête très saillante, très épaisse, non tranchante et nettement détachée du col de la tête articulaire. Son sommet est l'un des angles de la figure rhomboïdale, qu'elle forme, et est bien plus élevée que la tête articulaire.

Il est inutile d'observer que cette élévation du sommet de la grosse tubérosité, bien au dessus de la tête articulaire, est un caractère assez généralement répandu parmi les Herbivores, comme on le voit dans les Ruminans, les Rhinocéros, les Hippopotames, les Tapirs, les Cochons, le Dugong, les Lamantins, etc., et est très loin d'exister au même degré dans les Car-

nassiers, comme on le voit dans les Ours, les Chiens, les Félis, les Phoques, etc.

Le résultat de cette grande élévation de la grosse tubérosité est d'empêcher le bras de s'éloigner du corps, c'est-à-dire de s'élever par côté, état de choses qui convient très bien aux mouvemens bornés du bras de la plupart des Herbivores, mais qui ne peut convenir à la liberté des mouvemens dont jouit toujours, quoiqu'à des degrés plus ou moins grands, le bras des Carnassiers, et, par suite, du Phoque lui-même.

Ce qu'il y a de bien certain, du reste, c'est que, dans le Phoque, le sommet de la grosse tubérosité est loin de s'élever au dessus de la tête articulaire autant que dans le Dugong, l'animal d'Angers et celui de Montpellier.

La petite tubérosité est aussi saillante latéralement au dessus de sa base que la grosse; mais elle est beaucoup moins volumineuse. Son sommet est comme tronqué et arrondi, et, chose importante à observer, il s'élève beaucoup moins haut que le sommet de la grosse tubérosité, *beaucoup moins haut même que la tête articulaire,* contrairement à ce qui a lieu dans le Phoque.

Entre ces deux tubérosités se trouve une coulisse bicipitale très profondément encaissée, dont les parois sont, dans le haut de la coulisse, exactement parallèles entre elles, contrairement à ce qui a lieu dans le Phoque, où cette coulisse est très évasée.

L'extrémité inférieure est très aplatie d'avant en arrière, très élargie d'un côté à l'autre, et presque plane à sa face postérieure: elle est beaucoup moins volumineuse que la supérieure, et proportionnellement moins renflée que dans les Phoques. Vue par sa face postérieure, elle offre une certaine ressemblance avec celle d'un humérus humain. Le condyle interne est très saillant, bien que son sommet soit un peu cassé. L'externe ne dépasse pas sensiblement la poulie sur le côté, mais s'élève verticalement au dessus d'elle, d'une quantité environ moitié moindre, proportions gardées, que dans le Phoque.

La poulie articulaire est oblique, oblongue, deux fois plus large qu'épaisse; en d'autres termes, la longueur de son axe est le double de son diamètre pris aux points les plus renflés. Sa gorge est très évasée, très peu profonde et divise la poulie en

deux moitiés, dont l'interne est un peu plus grande que l'externe, contrairement à ce qui a lieu dans le Phoque. La moitié externe de cette poulie est d'ailleurs fort loin d'être globuleuse, comme elle l'est dans le Phoque. Au dessus de la poulie, à la face antérieure de l'os, se trouve une légère dépression destinée à loger le bord de la tête supérieure du radius dans la flexion forcée; mais cette dépression, si grande dans le Phoque, est ici si peu marquée, qu'on la distingue à peine. Il est à remarquer qu'on ne la voit même pas dans le dessin de l'humérus d'Angers, publié par Cuvier. La cavité olécranienne est très peu profonde, large, peu étendue de bas en haut et de forme semi-lunaire, ou d'arceau très surbaissé.

Toutes ces particularités se retrouvent de la manière la plus complète dans l'humérus d'Angers et dans celui du Dugong. (1)

Ressemblance de l'humérus de Montpellier avec celui d'Angers et celui du Dugong.

On voit en effet, sur nos figures 1, 3 et 4 (Pl. 7), que le crochet deltoïdal A de l'un quelconque de nos humérus correspond au crochet deltoïdal A des autres; qu'au dessus de ce crochet, dans les trois figures, s'élèvent successivement les sommets B, C, D, des angles saillans de la grande tubérosité, de forme rhomboïdale; qu'au dessous du dernier de ces sommets paraît, dans les trois figures, le commencement E de la coulisse bicipitale qui est par derrière, et, à côté, la petite tubérosité F, qui surmonte l'arête concave du bord interne de l'os. En I, dans les trois

(1) Il est possible que la comparaison effective fît reconnaître entre notre humérus de Montpellier et celui du Dugong quelque légère différence, comme on en voit, par exemple, entre les os des Rhinocéros vivans et ceux des Rhinocéros fossiles; mais les descriptions et les figures de l'humérus du Dugong vivant ne m'offrent pas les moyens de rien prononcer de positif à cet égard.

Ainsi, entr'autres particularités, je vois dans l'humérus de Dugong, figuré par Cuvier, une bifurcation très profonde du bord postérieur de la grosse tubérosité, qui est à peine marquée, ou ne paraît que comme une faible échancrure dans les humérus d'Angers et de Montpellier; mais cette différence n'est pas de la nature de celles dont on peut décider, sur une simple figure et d'après un seul individu, si elles sont accidentelles ou constantes.

figures, est la tête articulaire de l'humérus, ou sa place dans l'humérus d'Angers, où elle est cassée.

Dans les trois figures, on remarque le même élargissement de l'extrémité inférieure, la même saillie *anguleuse* du condyle externe *a*, *b*, la même courbure *c* du bord externe de l'humérus, la même saillie *arrondie* du condyle interne *d*, la même forme semi-lunaire de la cavité olécrânienne.

Il facile de voir, en comparant ces trois figures, que les formes et les dimensions de la moitié inférieure de l'humérus d'Angers sont tout aussi bien en rapport avec les formes et les dimensions de la moitié supérieure que les mêmes parties et les dimensions correspondantes le sont entre elles dans l'humérus de Montpellier et dans celui du Dugong.

Il est presque superflu d'observer que, dans la comparaison de ces trois figures, on doit tenir compte de cette circonstance que l'humérus de Montpellier et celui du Dugong sont exactement représentés par leur face postérieure, tandis que celui d'Angers est représenté un peu par côté, et montre presque toute sa face externe, surtout dans la moitié supérieure, qui me paraît encore plus représentée par côté que l'extrémité inférieure.

Il résulte de cette circonstance que l'arête H de l'humérus de Montpellier et de l'humérus de Dugong (fig. 3 et 4) se trouve juste au bord externe de l'os, tandis que la même arête H de l'humérus d'Angers (fig. 1) est placée comme si elle formait un bord postérieur de l'os ; mais si, par la pensée, on fait tourner de gauche à droite ce dessin de l'humérus d'Angers, son arête H viendra se placer sur le côté de la figure et représentera, d'une manière mieux entendue et pareille à celle des deux autres figures, le bord externe de l'os.

Cuvier ayant représenté l'extrémité supérieure de l'humérus d'Angers, vue en dessus (fig. 26 de la Planche XIX des *Recherches*), nous reproduisons le même dessin (fig. 5) de notre planche, afin de le comparer à celui de la même partie (fig. 6) de notre humérus de Montpellier.

Dans ces deux figures, nous retrouvons la même forme de la petite tubérosité, la même concavité, A, de l'un de ses bords, la même convexité de son sommet B, le même aplatissement de

celui de ses côtés, C, qui forme l'une des parois de la coulisse bicipitale, D; la même forme et la même direction de la grosse tubérosité E, F, G, H, la même crête, I, dirigée dans le même sens, enfin la même place pour la tête articulaire, K.

De ces diverses comparaisons, il résulte évidemment :

1° Que les deux morceaux de l'humérus d'Angers ne proviennent pas de deux animaux de taille différente, comme le pense Cuvier, mais qu'ils appartiennent ou à deux individus de même taille et de même espèce, ou, bien plus probablement encore, à un seul individu, c'est-à-dire qu'ils sont les deux moitiés du même humérus rompu en deux.

2° Que cet *humérus restitué*, offrant tous les caractères génériques de l'humérus de Montpellier, provient nécessairement du même genre que ce dernier. (1)

3° Que ces deux humérus fossiles, offrant la plus grande ressemblance avec celui du Dugong, ne peuvent provenir que d'un animal très voisin du Dugong.

Comparaison des humérus d'Angers et de Montpellier avec l'humérus des Phoques.

Si maintenant on compare à l'humérus des Phoques vivans cet humérus de Montpellier, si semblable à celui d'Angers et à celui du Dugong, il sera facile de voir qu'il diffère autant du premier qu'il ressemble aux deux autres.

Dans les Phoques vivans, la physionomie de l'humérus offre bien une certaine ressemblance avec l'ensemble des humérus

(1) Ce n'est point depuis 1838 seulement que j'ai reconnu la ressemblance qui existe entre mon humérus de Montpellier et l'humérus du *Dugong*. J'avais décrit cet humérus de Montpellier et je l'avais rapporté au *Dugong* dans mon Mémoire sur le *moyen Hippopotame fossile*. Il est encore signalé comme humérus du *Dugong* dans le rapport qu'en 1834, feu M. Frédéric Cuvier a fait sur ce Mémoire.

Je n'ai donc pu, lorsque, plus tard, j'ai reconnu que l'humérus d'Angers ressemblait à l'humérus de Montpellier, ne pas reconnaître en même temps que cet humérus d'Angers ressemblait aussi à l'humérus du *Dugong*. C'est dans ce sens et en employant uniquement le nom de *Dugong*, que j'en parlais au docteur Coste dans ma lettre, qu'il communiqua à M. de Blainville, en 1838.

d'Angers, de Montpellier et du Dugong, comme elle en offre, quoiqu'à un moindre degré, avec l'humérus de plusieurs autres animaux de genres fort différens; mais les caractères de plusieurs parties très importantes sont fort différens. On conçoit, en effet, que le Phoque étant un Mammifère marin, dont les membres antérieurs ne servent pas seulement à la natation, mais encore à la locomotion sur le sol et à la préhension, a dû présenter dans l'organisation de son bras une certaine analogie avec l'organisation du bras du Dugong, de l'animal d'Angers et de l'animal de Montpellier, bras qui n'est pas seulement propre à la natation, mais qui présente aussi des formes susceptibles de se prêter, quoique à un faible degré, aux mouvemens que nécessitent la préhension et la locomotion sur le sol. (1)

Toutefois, le Phoque étant un carnassier, on doit retrouver dans son bras, comme on le retrouve dans son crâne, dans ses mâchoires, dans ses molaires, dans son omoplate, quelque chose du type des carnassiers, tout comme aussi on doit retrouver dans le bras du Dugong et des animaux d'Angers et de Montpellier, qui sont herbivores, quelques-uns des caractères fondamentaux des animaux herbivores, comme on en retrouve dans la forme de leurs mâchoires et de leurs molaires. Dans le premier, le cubitus devra tourner sur le radius; dans les autres, cette rotation sera impossible, et il y aura soudure du cubitus au radius. De là, des modifications correspondantes dans les caractères essentiels des humérus de ces divers genres, malgré la ressemblance qu'ils peuvent présenter dans l'ensemble de leur physionomie.

Ainsi, dans l'humérus du Phoque vivant figuré par Cuvier et reproduit dans notre figure 7, l'extrémité supérieure est à proportion moins renflée, tandis que l'inférieure l'est plus, principalement d'avant en arrière; le corps de l'os est moins tordu en spirale sur son axe, en sorte que l'extrémité supérieure ne semble plus avoir fait un quart de révolution sur son extrémité

(1) Cuvier remarque que le Dugong se sert avec beaucoup d'adresse et de force de ses pieds, pour s'accrocher à la terre et pour porter ses petits. Les humérus des animaux d'Angers et de Montpellier, étant semblables à l'*humérus du Dugong*, indiquent que le bras de ces animaux a pu accomplir les mêmes mouvemens que le bras du Dugong.

inférieure restée fixe ; la coulisse bicipitale, E, est plus large, plus ouverte ; la face externe de l'os, B, A, *c*, est moins concavé d'un côté à l'autre, et moins arquée dans sa longueur. La poulie est creusée d'une gorge beaucoup plus profonde, et en est partagée en deux moitiés ou portions beaucoup plus inégales ; la portion externe de cette poulie, ou petite tête de l'humérus, est beaucoup plus globuleuse et plus large à proportion, tandis que, au contraire, la portion interne est beaucoup plus petite.

Cette forme globuleuse de la moitié externe de la poulie est des plus caractéristiques ; elle se retrouve dans tous les carnassiers, et annonce la possibilité de la rotation du radius sur le cubitus, et par conséquent la non-soudure de ces deux os.

La fosse qui surmonte la poulie, à la face antérieure de l'os, et qui est destinée à recevoir le bord de la tête supérieure du radius dans la flexion forcée du bras, est bien plus profonde et bien plus nettement limitée sur ses bords, et, surtout, sur ses bords supérieurs. La forme des condyles de l'extrémité inférieure n'est plus la même ; le condyle externe, *a*, est plus élevé, et la courbure, *c*, de l'arête qui le surmonte n'est plus la même. Le crochet, A, de la crête deltoïdale n'a plus la même forme ; il n'est plus autant recourbé vers le côté, et ne forme plus avec la grosse tubérosité une protubérance rhomboïdale, A, B, C, D, si caractéristique dans les humérus fossiles et dans celui du Dugong. Le sommet, *c*, de cette grosse tubérosité ne forme plus un angle saillant ; il ne s'élève pas aussi haut au-dessus de la tête articulaire, I, et, au contraire, la petite tubérosité, F, paraît plus volumineuse, plus élevée, et n'a plus la même forme à son sommet.

L'extrémité supérieure vue en dessus (fig. 8) ne diffère pas moins des parties correspondantes (fig. 5 et 6) des humérus d'Angers et de Montpellier. La petite tubérosité, A, B, C, y est bien moins étranglée à la base ; la coulisse bicipitale, C, D, E, n'y forme plus un canal profondément encaissé, mais au contraire une gorge très évasée, ouverte latéralement. La crête, I, de la grosse tubérosité est oblique et non verticale, par rapport à la position de la figure ; par suite, elle n'est plus parallèle à

l'axe vertical de la petite tubérosité; différences qui sont une conséquence de celles que présente la forme de la grosse tubérosité. On voit d'ailleurs que cette crête, I, de la grosse tubérosité, va joindre directement la tête articulaire, K, ce qui n'a pas lieu dans les humérus fossiles, où elle forme un coude à angle droit.

Mais, dira-t-on, peut-être, cet humérus d'Angers peut différer des humérus de Phoques décrits par Cuvier, et n'en provenir pas moins pour cela de quelque Phoque inconnu.

Je répondrai que cela n'est pas possible. Et, en effet, nous avons vu que la poulie de l'humérus du Phoque différait essentiellement de celle des humérus d'Angers et de Montpellier, par une gorge beaucoup plus profonde, et, ce qui est bien plus important, par la forme globuleuse de sa portion externe. Or, cette forme globuleuse de la portion externe de la poulie, est intimement liée à la possibilité de la rotation du radius sur la poulie humérale et sur le cubitus, en même temps qu'elle exclut la possibilité de la soudure du radius au cubitus. En d'autres termes, cette forme de la poulie de l'humérus des Phoques connus, est un caractère commun à tous les carnassiers, et doit, par conséquent, se retrouver dans toutes les espèces connues ou inconnues du genre Phoque. Et, au contraire, la forme presque cylindrique, ou, pour mieux dire, conique de la portion de la poulie de l'humérus d'Angers qui s'articule avec le radius, indique un radius aplati, qui n'a pu tourner ni contre la poulie humérale, ni sur le cubitus, et qui a dû, par suite, être soudé, à un degré quelconque, au cubitus, caractère propre aux Herbivores, et par conséquent au Dugong et aux espèces vivantes ou fossiles des genres voisins.

Il suffit d'un coup-d'œil sur cette poulie de l'humérus d'Angers et de celui de Montpellier, pour être bien convaincu que le bras de l'animal auquel elle a appartenu n'a pu exécuter complètement d'autres mouvemens que ceux d'extension et de flexion, comme dans les Pachydermes, par exemple, et qu'il n'a pu accomplir des mouvemens alternatifs de pronation et de supination comme dans les carnassiers et, par conséquent, dans les Phoques.

Enfin, dans sa description de l'humérus d'Angers attribué au Phoque, Cuvier observe que le *condyle externe* est troué comme dans le Phoque.

Mais, en examinant les deux dessins de l'extrémité inférieure de cet humérus d'Angers (fig. 28 et 29 de la planche XIX des *Recherches*) figures 9 et 1 de notre planche, on voit que le trou T qui est marqué sur le dessin qui représente l'os par sa face antérieure, ne paraît nullement sur l'autre dessin qui représente l'os vu par sa face postérieure. Ce trou ne traverserait donc point de part en part le condyle; il n'aurait, par conséquent, pas livré passage à l'artère cubitale, et ne présenterait, en définitive, aucune analogie avec le véritable trou condylien des Phoques.

En supposant que ce trou existât réellement, il y aurait encore fort loin de sa forme, telle qu'elle est représentée dans le dessin de Cuvier, à la forme de véritable arcade que l'on retrouve dans le trou condylien de ceux des carnassiers qui en sont pourvus, tels que les Félis, le Glouton, le Blaireau et le Phoque lui-même.

Mais ce n'est pas tout encore : Cuvier assure, comme on l'a vu, que c'est le *condyle externe* qui est perforé dans l'humérus d'Angers; or, on trouve dans la description qu'il donne des humérus des diverses espèces de Phoques vivans, que c'est le condyle *interne* et non l'*externe*, qui porte le trou destiné au passage de l'artère cubitale. Ce trou condylien manque dans quelques espèces de Phoques; mais dans les espèces où il existe, il est, ainsi que dans une foule d'autres genres, toujours placé sur le condyle *interne* et non sur l'*externe*.

La position de ce trou sur l'humérus d'Angers, éloignerait donc plutôt ce dernier de l'humérus de Phoque qu'il ne l'en rapprocherait.

Après avoir montré que les os d'Angers ne proviennent ni de deux Phoques de taille différente, ni même du genre Phoque; après avoir montré qu'ils n'offrent aucune différence avec l'humérus de Montpellier, et que, comme ce dernier, ils appartiennent à un Cétacé de la famille des Dugongs, je dois faire part

de quelques renseignemens que j'ai obtenus du docteur Coste, qui, à ma prière, a bien voulu vérifier directement sur les os d'Angers si l'opinion que je m'en étais formée était fondée.

Présumant que Cuvier avait placé dans la galerie du Muséum d'histoire naturelle les os d'Angers qu'il avait obtenus du professeur Renou, je priai mon ami et compatriote le docteur Coste, ancien aide-naturaliste du Muséum, de vérifier les résultats auxquels m'avaient conduit l'examen de leurs dessins et de leurs descriptions, et je joignis à ma lettre le dessin de l'*humérus restitué* tel que je l'ai reproduit fig. 1. Je priai en même temps le docteur Coste de comparer ces os d'Angers à l'humérus du *Dugong*, et de me faire connaître son sentiment ou celui de M. de Blainville sur cette comparaison.

Après avoir communiqué ma *lettre* et mon *dessin* (fig. 1) à M. de Blainville, qui voulut bien faire lui-même dans les galeries du Muséum la comparaison que je réclamais de son obligeance, le docteur Coste me fit savoir, par sa lettre du 6 novembre 1838, que ma *détermination était parfaitement exacte; que l'os dont je lui avais envoyé le dessin appartenait bien positivement à un Dugong;* que M. de Blainville ayant fait exécuter le modèle en plâtre des deux fragmens qui sont au Jardin du Roi, et le sculpteur ayant rempli les lacunes que les bouts cassés de ces os laissaient entre eux, il en était résulté un humérus *tellement semblable à l'humérus du Dugong, que l'homme le moins expérimenté ne pourrait s'empêcher d'admettre mon opinion comme l'expression de la vérité.* (1)

(1) Je dois observer que ce modèle en plâtre des deux moitiés d'humérus d'Angers n'ajoute absolument rien à l'autorité des fragmens originaux, et ne peut, par conséquent, montrer mieux que les originaux eux-mêmes que ceux-ci font partie d'un même os, et que cet os ne provient pas du genre Phoque. Il tombe sous les sens que ce que la représentation en plâtre peut prouver, l'original représenté le prouve aussi bien, pour ne pas dire mieux. Du reste, j'ai toujours pensé que ce modèle en plâtre n'avait été exécuté, dans l'origine, d'après les ordres de M. de Blainville, que pour m'être envoyé, afin que, selon les expressions de la lettre du docteur Coste, du 6 novembre 1838, *j'eusse les moyens de juger par moi-même et* DE VISU; car il est facile de concevoir que, pour ceux qui possédaient les fragmens originaux, le modèle en plâtre devenait parfaitement inutile. J'ai attendu en vain, pendant deux ans, ce modèle, qui m'avait été offert en 1838, et j'ai dû adresser mon Mémoire à l'Académie, sans l'avoir encore reçu.

Le docteur Coste ajoute : *Tout annonce aussi que ces deux portions d'humérus proviennent d'un même os, quoique l'on observe une assez grande différence dans leur conservation. La partie supérieure est en assez bon état ; l'inférieure, au contraire, a subi beaucoup d'altération. Il semblerait, d'après cela, que cette dernière a été enfouie dans un terrain beaucoup plus humide que la première, et que cette humidité l'aurait altérée et lui aurait donné un aspect rugueux et micacé.*

Dans un voyage que j'ai fait à Paris, en 1839, j'ai cherché à voir au Muséum les os d'Angers; mais comme ils avaient été momentanément déplacés à l'époque où on les avait moulés pour moi, je n'ai pu les examiner. M. de Blainville m'ayant confirmé tout ce que le docteur Coste m'avait dit à leur égard, m'assura que, dans son opinion, il manquait une petite portion d'os intermédiaire entre les bouts cassés, mais que cette lacune avait été facilement remplie sans rien changer à la configuration de l'os. M. de Blainville pensait aussi que les deux portions d'os provenaient du même humérus, bien que l'un fût plus altéré que l'autre.

Il me paraît que cette différence dans le degré d'altération des deux moitiés d'os est une preuve de plus qu'elles ont dû faire partie du même humérus. J'ai, en effet, plusieurs fois observé dans des escarpemens naturels des terrains meubles, ou contre les parois des carrières, des ossemens en partie saillans en dehors des couches et en partie engagés dans la couche; la partie saillante, c'est-à-dire mise à nu, étant exposée aux influences atmosphériques depuis un temps plus ou moins considérable, était presque toujours altérée et présentait une surface rugueuse, tandis que celle qui était restée enfouie ne présentait pas de traces d'altération et offrait une surface unie. Tout porte à penser que l'humérus d'Angers s'est trouvé dans des circonstances analogues, et qu'en voulant l'extraire de la couche, où il était encore engagé jusqu'aux deux tiers de sa longueur, on a cherché à l'arracher en le saisissant par son extrémité libre, opération qui a dû en occasioner la rupture. La rupture de l'os a dû alors se faire ras-de-terre, c'est-à-dire à la limite de la portion dégagée et de la por-

tion enfouie, à la limite de la portion altérée et de la portion non altérée (1).

Maintenant que nous avons comparé entre eux, sous le rapport de leur forme, les humérus d'Angers et de Montpellier, il nous reste à les comparer sous le rapport de leurs dimensions.

Dimensions des humérus d'Angers et de Montpellier.

	Humérus d'Angers, d'après Cuvier.	Humérus de Montpellier.
Plus grande largeur de la crête deltoïdale. .	0,080	0,005
Saillie de la petite tubérosité.	0,040	0,030
Largeur transverse de l'extrémité inférieure .	0,085	0,061
Largeur transverse de la poulie.		0,041
Plus grande longueur de l'humérus entier, prise du sommet de la grosse tubérosité à la partie inférieure et externe de la poulie.		0,156

Il résulte de ce tableau que l'humérus de Montpellier est beaucoup moins fort que celui d'Angers. Mais j'ai un second humérus, également trouvé dans nos sables marins de Montpellier, qui est sensiblement plus grand que le premier, bien qu'il soit d'un jeune individu. Les épiphyses n'ayant pas été soudées manquent, à l'exception de la moitié environ de l'épiphyse inférieure.

Cet humérus est donc au moins intermédiaire pour la grandeur entre notre humérus adulte de Montpellier et celui d'Angers. S'il fût arrivé au terme naturel de sa croissance, rien n'indique qu'il n'eût pu égaler celui d'Angers, ou, du moins, en approcher jusqu'à un degré compris dans les limites des différences individuelles, de sexe ou de variété; en sorte qu'en s'en tenant aux humérus seulement, il serait fort difficile de décider si l'a-

(1) D'après quelques observations géologiques, communiquées à Cuvier par le professeur Renou, les couches de calcaire grossier dans lesquelles ont été découverts les os d'Angers seraient formées d'un calcaire coquillier, assez semblable à celui des environs de Paris, et tantôt assez solide pour former de belles pierres de taille, tantôt composé de petits fragmens de toutes sortes de corps marins assez durs, quoique grossièrement agglutinés et pouvant servir alors de véritable falun.

nimal d'Angers et celui de Montpellier forment deux espèces ou seulement deux variétés d'une même espèce. La seule chose bien démontrée jusqu'à présent, c'est qu'ils appartiennent au même genre. Mais d'autres faits que je ferai connaître plus tard, et la circonstance que les humérus d'Angers et de Montpellier ont été trouvés, le premier, dans l'étage inférieur, le second, dans l'étage supérieur du terrain tertiaire, me portent à penser qu'il faudra établir deux espèces dans ce genre.

Les portions d'humérus d'Angers étaient d'abord les seuls os qui eussent paru à Cuvier propres à constater la présence du genre Phoque parmi les animaux fossiles; mais dans les additions placées à la fin du dernier volume des Recherches se trouve l'annonce et de la découverte faite dans le calcaire grossier de la Hongrie d'un pied de derrière de Phoque, et de l'envoi fait au Muséum d'un modèle peint de ce pied (1). Sans cette découverte, il eût fallu rayer le genre Phoque de la liste des animaux fossiles publiée par Cuvier.

§ II.

De l'avant-bras de l'animal d'Angers.

Lorsque je découvris mon humérus, je fus, à l'instant même, frappé de son analogie avec celui du Dugong; mais ce ne fut que long-temps après que je m'aperçus de sa ressemblance avec les portions d'humérus des Phoques fossiles de Cuvier, et que je fus porté à réunir ces deux portions en un seul os.

En étudiant cette question, je reconnus bientôt que les portions d'humérus d'Angers n'étaient pas les seuls os de mon nouveau genre de Cétacé que Cuvier eût eu en sa possession et qu'il eût attribuée à un genre auquel ils n'appartenaient pas. Cuvier a,

(1) Cuvier observe que c'est à la complaisance de M. Schreibers, directeur du cabinet impérial de Vienne, qu'il doit le modèle de ce magnifique morceau, trouvé à Holisch, bourg de la Hongrie, sur la rive gauche de la Morava, à dix lieues au nord-est de Vienne. Cuvier pense que ce pied, dans tout ce qu'on en voit, diffère très peu de celui de notre Phoque ordinaire.

C'est donc à Cuvier que la science doit la première indication authentique du genre Phoque l'état fossile.

en effet, possédé, entre autres os de notre animal, un avant-bras entier qu'il a rapporté au Lamantin.

Cet avant-bras, décrit et figuré dans les Recherches sur les ossemens fossiles (t. v, Pl. XIX, fig. 19, 20 et 21), et reproduit dans nos fig. 10 et 11, a été aussi découvert par le professeur Renou, aux environs d'Angers, avec les prétendus os de Phoques, et a été attribué par Cuvier à un Lamantin *différent de ceux que nous connaissons* parmi les espèces vivantes.

Cuvier observe, au sujet de ces os, que *la grande brièveté à proportion de la grosseur*, la forme transversale de la tête du radius, la soudure du cubitus au radius à des points semblables, sont des caractères que présentent aussi les mêmes parties dans les Lamantins; *mais que la grosseur supérieure du cubitus, le plus grand aplatissement du radius, surtout à sa partie inférieure, une proéminence du cubitus vers son articulation supérieure, sont des caractères distinctifs de l'avant-bras fossile.*

Rien n'est certainement mieux fondé que la dernière partie de ces remarques de Cuvier, car les différences qu'il signale sont plus que suffisantes pour distinguer cet avant-bras de celui du Lamantin; mais ces différences, ainsi que beaucoup d'autres qui ont été négligées par Cuvier, s'évanouissent, si, au lieu de comparer cet avant-bras à celui du Lamantin, on le compare à celui du Dugong. C'est ce que nous allons démontrer.

1° Dans l'avant-bras fossile (fig. 10), comme dans celui du Dugong (fig. 12), la facette sigmoïde, l'apophyse coronoïde et l'olécrane paraissent beaucoup plus obliques, par rapport à l'axe du radius, que dans l'avant-bras du Lamantin (fig. 13); 2° le radius, vu par sa face antérieure, est très large, même dans le milieu de sa longueur; dans le Lamantin cet os est comparativement très-étroit et en quelque sorte étranglé dans la région située entre ses deux têtes, en sorte que celles-ci paraissent plus renflées proportionnellement à la grosseur du corps de l'os; 3° dans le radius d'Angers et dans celui du Dugong, la largeur du corps de l'os est à-peu-près le double de son épaisseur (fig. 11 et 14); dans le Lamantin, la largeur du corps du radius ne dépasse pas sensiblement son épaisseur (fig. 15); 4° dans le Dugong, ainsi que dans l'avant-bras d'Angers, la surface articulaire

supérieure, ou humérale, est très large d'un côté à l'autre; cette même surface articulaire est au contraire étroite dans le Lamantin.

J'insisterai sur cette dernière circonstance, parce qu'elle me paraît être le caractère distinctif le plus concluant que présentent le radius d'Angers et celui du Dugong, celui, surtout, dont on se rend plus facilement raison. Ce caractère est, en quelque sorte, générateur de tous les autres, et nous dévoile la forme de plusieurs os qui ont été en connexion avec celui-là, de l'humérus en particulier.

Si dans le Lamantin la surface articulaire supérieure du radius est étroite, c'est que dans le Lamantin la poulie de l'humérus est elle-même très étroite, comme on peut le voir dans notre fig. 16, empruntée à Cuvier; si cette tête articulaire du radius est large dans le Dugong et dans l'animal d'Angers, c'est que dans le Dugong et dans l'animal d'Angers la poulie de l'humérus est large (fig. 17 et fig. 9).

Dans sa description de l'humérus du Lamantin, Cuvier remarque que la tête inférieure est en simple poulie un peu oblique, et que *sa largeur* ne dépasse point son *diamètre antéro-postérieur :* or, il suffit de voir la grande largeur de la surface articulaire du radius d'Angers (fig. 10), pour être bien convaincu que la poulie humérale qui a dû s'articuler avec elle, a dû présenter une *largeur double* environ de son *diamètre antéro-postérieur* (fig. 11), et que, par conséquent, cette poulie humérale, pas plus que le radius qui lui a appartenu, n'a pu provenir du Lamantin. Et, au contraire, on voit que cette large surface articulaire du radius d'Angers, si semblable à celle du radius du Dugong, est parfaitement en rapport avec la largeur de la poulie de notre humérus d'Angers, si semblable lui-même à l'humérus du Dugong.

On voit donc que la forme de cette surface articulaire du radius offre un caractère des plus importans, puisqu'elle nous permet de reconnaître la forme de l'humérus avec lequel elle a dû s'articuler.

Restitution du bras de l'animal d'Angers.

L'humérus d'Angers est malheureusement du côté droit, en sorte qu'on ne peut pas le mettre en connexion avec le radius d'Angers qui est du côté gauche; s'ils étaient du même côté, il est du dernier degré d'évidence qu'ils s'articuleraient ensemble de la manière la plus exacte, et offriraient par là la preuve la plus convaincante qu'ils proviennent, sinon du même individu, au moins de la même espèce d'animal. (1)

Toutefois, comme l'avant-bras d'Angers doit probablement se trouver, ainsi que l'humérus, dans les galeries du Muséum d'histoire naturelle de Paris, on pourrait, en coulant du plâtre dans sa surface articulaire supérieure, obtenir le modèle d'une partie de poulie humérale, qui ne pourrait manquer d'être en tout semblable à la partie correspondante de la poulie de l'humérus d'Angers; leur forme, leur largeur transverse, et leur diamètre antéro-postérieur, n'offriraient aucune différence, seulement cette partie de poulie humérale serait du côté gauche, tandis que celle do l'humérus d'Angers est du côté droit.

Et, à l'inverse, si on coulait du plâtre contre la partie inférieure de la poulie de l'humérus d'Angers, on obtiendrait une empreinte en creux qui reproduirait exactement la forme de la surface articulaire supérieure de l'avant-bras d'Angers; c'est là une expérience qu'on pourrait facilement tenter; le succès n'en serait pas douteux.

Ne pouvant employer ce moyen de contrôle, j'ai cherché à lui en substituer un autre qui, à mes yeux, est tout aussi concluant.

Dans sa planche XIX, Cuvier a donné deux dessins de l'extrémité inférieure de l'humérus d'Angers, l'un, celui de notre humérus entier (fig. 1 de notre planche)*représentant cet os vu

(1) Les figures de l'humérus et du radius d'Angers représentent incontestablement, dans les planches de Cuvier, un humérus droit et un radius gauche; mais, si les dessins originaux ont été retournés par la gravure, l'humérus serait du côté gauche et le radius du côté droit. La même remarque s'appliquerait à celles des figures de ma planche qui pourraient être retournées par le fait du graveur.

par sa face postérieure, l'autre, que nous n'avons pas reproduit, représentant l'os vu par sa face antérieure. Ce dernier dessin ne pouvant s'articuler avec le dessin du radius, puisqu'il est du côté droit et que le radius est du côté gauche, je l'ai calqué à l'envers, en sorte que j'ai obtenu le dessin d'une moitié inférieure d'humérus gauche qui a pu alors s'articuler avec le dessin du radius d'Angers, comme on peut en juger par notre fig. 9. J'aurais bien désiré pouvoir compléter ce bras en donnant le dessin de l'humérus entier, vu par sa face antérieure, mais la moitié supérieure d'humérus, représentée par sa face antérieure dans la figure publiée par Cuvier, n'étant pas exactement représentée dans le même sens, ou, en d'autres termes, n'étant pas retournée au même degré que l'extrémité inférieure, ne permet pas de raccorder deux les dessins, pour en faire un humérus entier. Néanmoins, on voit dans notre dessin ce fait principal, qu'il s'agissait de constater, la connexion de l'avant-bras, que Cuvier avait rapporté au Lamantin, avec l'humérus qu'il avait rapporté au phoque.

On voit en effet dans ce dessin, 1° que la largeur de la surface articulaire du radius d'Angers est rigoureusement égale à la largeur de la poulie de l'humérus d'Angers; 2° que les contours de la surface articulaire du radius correspondent si exactement aux contours de la poulie humérale, qu'on dirait ces deux surfaces articulaires moulées l'une sur l'autre; 3° que la force du radius est on ne peut mieux proportionnée à celle de l'humérus; 4° que ce bras ainsi restitué n'offre aucune différence appréciable avec celui du Dugong, tandis qu'il diffère essentiellement de celui du Lamantin et encore plus de celui du Phoque. (1)

(1) Cet avant-bras ne peut être trop petit pour l'humérus, avec lequel je l'articule; car, s'il était trop petit, sa surface articulaire ne coïnciderait pas, dans toute son étendue, avec la surface de la poulie de l'humérus; or, les dessins montrent évidemment que cette coïncidence des surfaces articulaires des deux os est complète dans toute l'étendue de celles-ci. On pourrait, à la vérité, supposer que les figures de Cuvier sont inexactes, quant aux dimensions, et qu'elles peuvent coïncider entre elles, sans que les originaux coïncident entre eux; mais cette supposition ne peut être admise quand on voit que ces figures s'accordent avec les dimensions des originaux, indiquées dans le texte de Cuvier.

Il ne faudrait donc pas s'en laisser imposer par l'apparence de petitesse relative que pourrait présenter cet avant-bras; car l'avant-bras du Métaxythérium ne peut qu'être

Mais nous n'avons pas encore épuisé, d'une part, toutes les différences génériques qui existent entre l'avant-bras d'Angers et celui du Lamantin, et, d'une autre part, tous les caractères de ressemblance que cet avant-bras peut avoir avec celui du Dugong.

En examinant de profil ces trois avant-bras, on remarque, en effet, les caractères suivans : 1° le radius d'Angers, fig. 11, est droit comme celui du Dugong, fig. 14, tandis que celui du Lamantin, fig. 15, est fortement arqué, convexe en avant, concave en arrière; 2° de cette circonstance résulte, dans l'avant-bras d'Angers et dans celui du Dugong, un espace inter-osseux très rétréci d'un côté à l'autre, tandis que cet espace inter-osseux est très élargi dans le Lamantin; 3° dans l'avant-bras d'Angers et dans celui du Dugong le radius est à proportion *plus aplati, surtout à sa partie inférieure*, que dans le Lamantin; 4° dans l'avant-bras d'Angers et dans celui du Dugong le *cubitus est plus gros* que celui du Lamantin *et offre, vers son articulation supérieure, une proéminence* qui n'existe pas chez le Lamantin, remarques en partie déjà faites par Cuvier; 5° le cubitus du Lamantin paraît beaucoup plus étranglé dans le milieu de sa longueur que les cubitus d'Angers et du Dugong; 6° la forme générale du cubitus d'Angers est la même que celle du cubitus du Dugong, tandis qu'elle est bien différente de celle du cubitus du Lamantin; si j'en juge d'après les dessins de Cuvier, la cambrure postérieure des deux premiers os, la forme de la facette sigmoïde, celle de l'olécrane semblent taillées sur le même patron, et diffèrent des parties correspondantes dans le Lamantin; 7° on observe à la partie inférieure et antérieure des cubitus d'Angers et du Dugong une forte proéminence au point où le cubitus se soude au radius; cette proéminence paraîtrait au contraire, d'après le dessin de Cuvier, appartenir au radius et non au cubitus chez le Lamantin; 8° Dans le Lamantin, le radius a vers le bras, à sa face externe, deux crêtes aiguës qu'on ne retrouve ni dans le radius d'Angers, ni dans celui du Dugong.

proportionnellement petit, puisque, dans le Dugong et encore plus dans le Lamantin, selon la remarque faite par Cuvier, l'avant-bras est assez court pour sa grosseur et encore plus pour la taille de ces animaux.

Il est donc bien démontré que l'avant-bras d'Angers diffère essentiellement, par tout son ensemble et, surtout, par la forme de sa surface articulaire humérale, de celui du Lamantin; qu'il ressemble à celui du Dugong au même degré que l'humérus d'Angers ressemble à l'humérus du Dugong; qu'il s'articulerait très bien avec l'humérus d'Angers s'il était du même côté que ce dernier; que, par conséquent, l'humérus et l'avant-bras proviennent de la même espèce d'animal, opinion à l'appui de laquelle vient encore la circonstance que l'humérus et l'avant-bras ont été trouvés, tous deux, par le professeur Renou, dans les mêmes couches du terrain tertiaire inférieur des environs d'Angers.

§ III.

Indications sur le crâne, la mâchoire, les défenses, les molaires supérieures et inférieures, les côtes et autres os du Cétacé d'Angers et de Montpellier, le METAXYTHÉRIUM.

D'autres os, trouvés également par M. Renou, aux environs d'Angers, avec ceux dont nous venons de parler, sont aussi rapportés par Cuvier au Lamantin (1). Je me bornerai, pour le moment, à observer que le seul de ces débris fossiles dont Cuvier donne la figure, et qui consiste en une partie supérieure de crâne, appartient bien, ainsi que le pense Cuvier, au même animal que l'avant-bras, mais qu'il ne provient pas plus que ce dernier du genre des Lamantins. Ceux des os de ce crâne que Cuvier a considérés comme étant des os du nez analogues à ceux

(1) Parmi ces os se trouvent une côte et une vertèbre, que Cuvier a d'abord rapportées au Lamantin, et qu'après un nouvel examen des os d'Angers, il a rapportées au Morse. Les caractères signalés par Cuvier dans cette côte me paraissent être aussi ceux des côtes du Dugong et de Metaxythérium; mais je ne puis rien conclure de positif de cette particularité, parce que Cuvier n'a donné aucune figure de ces pièces.

Je remarquerai, au sujet de la vertèbre, qui est un atlas, qu'elle n'a pu présenter quelque ressemblance avec l'atlas du Lamantin, comme l'avait d'abord pensé Cuvier, sans en présenter aussi avec l'atlas du Dugong, qui, d'après Cuvier, ressemble à celui du Lamantin.

La question serait donc aujourd'hui de savoir si cet atlas ressemble réellement plus à celui du Morse qu'à celui du Dugong. S'il en était autrement, cet atlas pourrait provenir aussi du Métaxythérium.

du Lamantin, sont, non des *os du nez*, mais les extrémités postérieures des *intermaxillaires*, qui vont s'implanter dans les frontaux absolument comme dans le Dugong; d'où il suit que ce crâne a dû nécessairement présenter, comme le Dugong, d'énormes intermaxillaires.

Du reste, ce crâne ne diffère pas à un plus haut degré de celui du Dugong vivant que le crâne du Lamantin d'Amérique ne diffère du crâne du Lamantin du Sénégal. C'est là une assertion dont je donnerai plus tard les preuves les plus convaincantes, et sur laquelle je devrai d'autant plus insister, que Cuvier, après avoir observé que ce crâne d'Angers ne vient pas des deux Lamantins dont nous connaissons l'ostéologie, assure qu'il vient *encore moins du Dugong*, et qu'il ne peut appartenir qu'à quelque espèce inconnue du genre Lamantin.

N'ayant pas à ma disposition toutes les pièces qui doivent servir à compléter cette troisième partie de mon travail, je suis forcé d'en renvoyer la description et la discussion à une autre époque. Toutefois, je puis annoncer, dès à présent, que ces pièces, dont j'ai fait déjà tous les dessins, forment une bonne partie du squelette de mon nouveau genre de Cétacé, d'Angers et de Montpellier, que je nomme *Metaxytherium*, de μεταξὺ (*inter*), et de θηρίον (*fera*), pour rappeler qu'il est *interposé*, placé, entre le Dugong et le Lamantin (1).

(1) En reportant les Dugongs, les Lamantins et les Stellères dans l'ordre des Cétacés, et en formant de ces trois genres une famille à part, qu'il a désignée sous le nom de *Cétacés herbivores*, Cuvier a aussi indiqué que cette famille, très différente des Phoques, est à-peu-près aux *Cétacés ordinaires* ce que les Pachydermes sont aux Carnassiers.

Dans le cours de ce mémoire et ailleurs, j'ai insisté sur cette analogie, qui lie les Pachydermes et les Cétacés herbivores, et l'on a pu juger qu'elle n'a pas été inutilement rappelée dans la question des os d'Angers. Nos humérus fossiles, si différens de ceux des Carnassiers et par conséquent de ceux des Phoques, nous ont montré une certaine analogie avec ceux des Pachydermes, des Rhinocéros entre autres, comme les humérus, les molaires et le crâne même des Lamantins, en offrent avec les mêmes parties des Tapirs, comme le crâne du Métaxythérium et celui des Dugongs en offrent, par l'énorme développement de leurs intermaxillaires, par l'existence des défenses et l'absence de canines, avec l'Eléphant.

Le Métaxythérium prend naturellement sa place dans cette famille des *Cétacés herbivores*, que l'on pourrait aussi désigner du nom de l'un des genres qu'elle renferme, comme l'a fait M. de Blainville, en employant les expressions de *famille des Dugongs*. Toutefois je dois

Ces pièces que je ferai incessamment connaître, et qui toutes ont été trouvées dans les sables marins du terrain tertiaire supérieur de Montpellier, sont les suivantes :

1° Un crâne fort mutilé, mais dans lequel subsistent la région supérieure, ressemblant à la partie supérieure du crâne attribuée par Cuvier au Lamantin; l'ouverture des narines tournée vers le ciel, les maxillaires, les molaires, qui sont assez semblables à celles des Lamantins et identiques avec celles de l'*Hippopotamus Dubius* de Cuvier, les inter-maxillaires, qui sont recourbés comme ceux du Dugong et munis de grandes alvéoles pour loger les défenses.

2° Le temporal d'un autre crâne.

3° La mâchoire inférieure, que j'ai décrite et rapportée au genre des Dugongs, dans un mémoire présenté à l'Académie des sciences, en 1834, et qui porte des molaires semblables à celles des Lamantins et identiques avec celles de l'*Hippopotamus Medius* de Cuvier.

4° Une vertèbre lombaire, plusieurs autres vertèbres dorsales et caudales.

5° Plusieurs côtes, une portion d'omoplate, des os en V, et un os qui me paraît être un os rudimentaire du bassin; pièces dans lesquelles, comme dans la plupart des précédentes, on ne peut, sans le secours de la comparaison effective, reconnaître aucune différence appréciable avec celles qui leur correspondent dans le Dugong.

Le *Metaxytherium* sera donc un Cétacé herbivore ressemblant au Dugong par tout son squelette et ses défenses, et au Lamantin par ses molaires.

Il aura 1° le crâne rapporté par Cuvier au Lamantin; 2° les molaires supérieures rapportées par Cuvier à l'*Hippopotamus dubius*; 3° les molaires inférieures rapportées par Cuvier à l'*Hippopotamus medius*; 4° les deux moitiés d'humérus rappor-

observer que le Métaxythérium, étant plus voisin du Dugong que des Lamantins, devrait peut-être n'être considéré que comme un sous-genre, qui serait à-peu-près aux vrais Dugongs ce que les Phacochœres sont au genre Cochon.

tées par Cuvier à deux Phoques; 5° l'avant-bras rapporté par Cuvier au Lamantin; 6° et peut-être enfin, une côte et une vertèbre rapportées par Cuvier d'abord au Lamantin, puis au Morse.

Ce genre comprendra peut-être deux espèces, qui différeraient principalement par la taille; la plus grande proviendrait du terrain tertiaire inférieur d'Angers et de Nantes, l'autre du terrain tertiaire supérieur de Montpellier.

Jusqu'à présent je n'aurai décrit que le bras, la mâchoire et les molaires inférieures du *Metaxytherium*. Le bras a été suffisamment décrit dans ce mémoire; la mâchoire et les molaires inférieures l'ont été dans mon mémoire présenté à l'Académie des sciences en 1834, et inséré à cette époque dans les Annales des Sciences naturelles (1).

Je montrai dans ce mémoire qu'une mâchoire inférieure, que j'avais découverte dans les sables marins supérieurs de Montpellier, et qui portait des molaires identiques avec celles de l'*Hippopotamus medius* de Cuvier, présentait tous les caractères de la mâchoire du Dugong, en même temps que ses molaires, fort différentes de celles du Dugong, offraient une grande analogie avec celles des Lamantins.

Je conclus de ces faits que le *Moyen Hippopotame* devait être rayé de la liste des animaux fossiles, opinion qui a été admise par feu M. Frédéric Cuvier dans son rapport, et consignée par lui dans la dernière édition des Recherches de G. Cuvier.

J'avais cru pouvoir conclure des caractères de la mâchoire inférieure de Montpellier, que le crâne de l'animal auquel elle avait appartenu devait ressembler à celui du Dugong, c'est-à-dire présenter de très grands intermaxillaires recourbés et munis de défenses. Or, plusieurs années après la publication de mon travail, les ouvriers d'une sablonnière de Montpellier ont apporté à M. Marcel de Serres le crâne mutilé de mon animal, offrant les caractères que je lui avais assignés et s'adaptant parfaitement à la

(1) Dans le rapport qu'il fit à l'Académie des Sciences en 1834, feu Frédéric Cuvier émit l'opinion que les pièces que j'avais décrites dans mon Mémoire suffisaient à elles seules pour l'établissement d'un nouveau genre, et il m'engagea à donner un nom à ce genre.

mâchoire inférieure que j'avais décrite. Ce crâne est celui dont j'ai parlé précédemment et que je me propose de faire incessamment connaître.

J'avais cru pouvoir conclure de l'analogie que les molaires de la mâchoire inférieure de Montpellier (celles de l'*Hippopotamus medius* de Cuvier) offraient avec d'autres molaires dont Cuvier avait pris l'*Hippopotamus dubius*, que ces dernières devaient être les molaires de la mâchoire supérieure de mon animal. Or, les molaires qui se trouvent au crâne de Montpellier confirment, de la manière la plus complète, ma manière de voir.

J'avais conclu des caractères de la mâchoire inférieure de Montpellier, et des caractères de plusieurs os, de l'humérus entre autres, que j'avais décrits dans le même Mémoire, que l'animal de Montpellier constituait une espèce distincte de celle du Dugong vivant, mais devait être placé dans le même genre que cette dernière. Je reviendrai plus tard sur cette question, lorsque j'aurai pu compléter les renseignemens qui m'ont été transmis sur les caractères, encore si incomplètement connus, des molaires du Dugong. J'observerai toutefois que, même sans le secours du crâne de Montpellier, qui démontre clairement aujourd'hui que mon animal est très voisin du Dugong, on pouvait déduire, ainsi que je l'avais fait, qu'il était un Cétacé de la famille des Dugongs, et des caractères de la mâchoire inférieure de Montpellier, et de ceux de mes deux humérus, des vertèbres, des côtes et de l'os rudimentaire du bassin que j'avais décrits dans le Mémoire de 1834. Je ne craindrais même pas d'avancer qu'on pouvait déduire tout cela de la forme seule de l'humérus, car l'humérus est, à mes yeux du moins, de tous les os du squelette de tous les Mammifères et de beaucoup d'autres Vertébrés, celui qui dévoile le plus sûrement l'ensemble de l'organisation d'un animal. (1)

(1) Cette proposition est vraie d'une manière absolue et dans toute sa généralité : il faudrait ne pas la comprendre pour vouloir la restreindre.

Elle peut surprendre par sa nouveauté, au moins; car, quoiqu'on en puisse dire, elle n'a jamais été avancée ailleurs que dans cet écrit.

Pour la nier, il faudrait montrer qu'il existe dans le squelette, chez les Mammifères et

EXPLICATION DES FIGURES DE LA PLANCHE 7.

Fig. 1. Humérus droit de *Métaxythérium*, d'Angers (*Phoques fossiles* Cuv.), empruntée aux figures 25 et 29 de la planche XIX du tome V des *Recherches sur les ossemens fossiles*, par G. Cuvier, troisième édition.

Fig. 2. Humérus gauche de *Métaxythérium* de Montpellier.

Fig. 3. Le même os, vu par derrière.

Fig. 4. Humérus de *Dugong*, vu par derrière.

Fig. 5. Tête supérieure de l'humérus de *Métaxythérium*, d'Angers (*Phoque fossile* Cuv.), vue en dessus et empruntée à la figure 26 (*loc. cit.*).

Fig. 6. Tête supérieure à l'humérus de *Métaxythérium*, de Montpellier, vue en dessus (grandeur naturelle).

Fig. 7. Humérus de *Phoque à ventre blanc.*

Fig. 8. Tête supérieure du même os, vue en dessus.

Fig. 9. Extrémité inférieure de l'humérus de *Métaxythérium*, d'Angers (*Phoque fossile* Cuv.), articulée avec l'avant-bras de *Métaxythérium*, d'Angers (*Lamantin fossile* Cuv.), et empruntée aux figures 28 et 30, *loc. cit.*

Fig. 10. Avant-bras gauche de *Métaxythérium*, d'Angers (*Lamentin fossile* Cuv.), emprunté à la figure 20, l. c.

Fig. 11. Le même os, vu de profil.

Fig. 12. Avant-bras de *Dugong.*

Fig. 13. Avant-bras de *Lamantin.*

Fig. 14. Avant-bras de *Dugong*, vu de profil.

Fig. 15. Avant-bras de *Lamantin*, vu de profil.

Fig. 16. Humérus de *Lamantin.*

Fig. 17. Humérus de *Dugong*, vu par devant.

beaucoup d'autres vertébrés, quelque autre os qui dévoilât, toujours et dans tous les cas, aussi sûrement que peut le faire l'humérus, l'ensemble de l'organisation d'un animal.

Jusqu'à ce qu'on ait nommé cet os, on n'est point fondé à nier cette suprématie de l'humérus sur tous les autres os.

J'ajouterai à ces remarques que c'est mon humérus de Montpellier qui m'a servi de base et de point de départ dans tout ce que j'ai reconnu du genre Métaxythérium, et cela, en n'appliquant d'autre doctrine que celle de l'immortel Cuvier.

NOTES ANATOMIQUES *sur divers organes d'une Baleinoptère,*

Par F. P. RAVIN,

Docteur en médecine de la Faculté de Paris, Membre correspondant de l'Académie de médecine.

Dans un Mémoire qui fut inséré en mai 1836 dans les Annales des Sciences naturelles, j'ai donné la figure d'une Baleinoptère qui vint échouer en 1829 à l'embouchure de la Somme. J'ai décrit les organes dont sa bouche était composée; j'ai fait connaître la forme et les dimensions de ses mâchoires, sa langue, ses membranes buccale et palatine, et ses fanons.

Je donnerai dans ce second Mémoire les observations qu'il m'a été possible de recueillir sur d'autres organes, à travers le dépècement de l'animal, parmi des travailleurs empressés, dont l'intérêt ne souffrait pas de longs retards. Malgré ce qu'ils ont pu avoir de complaisance, on sentira aisément qu'il ne m'a pas été possible de consacrer beaucoup d'instans à l'examen des objets divers qui me sont venus sous les yeux. Mes observations rapides ont dû se ressentir de la hâte inévitable avec laquelle il m'a fallu les faire; aussi n'ont-elles pas pu être complètes, mais elles ne sont pas pour cela inexactes. Une autre circonstance m'a été désavantageuse, c'est l'état avancé de putréfaction où les viscères étaient parvenus. J'aurai donc peu à dire sur les parties molles de cette Baleinoptère; mais, dans un sujet aussi peu connu que celui-ci, j'espère que mes notes, toutes brèves qu'elles sont, inspireront encore assez d'intérêt pour ne pas être mal accueillies.

I. Pour ce qui est de la peau, ne pouvant rien ajouter à la belle description qu'en ont faite MM. Breschet et Roussel de Vauzème, je me dispenserai d'en parler. (1)

(1) Annales des Sciences naturelles, *Recherches sur l'appareil tégumentaire des animaux*, septembre, octobre et décembre 1834.

II. 1. Le tissu cellulaire sous-cutané s'est présenté sous un aspect remarquable : il était évidemment fibreux. Les plus grandes mailles étaient composées de lames compactes, brillantes et linéamenteuses, à-peu-près comme des aponévroses. L'éclat des mailles, d'une grandeur médiocre, ne laissait non plus aucun doute sur leur nature fibreuse, et c'était à peine si l'on pouvait en concevoir pour les dernières subdivisions du réseau.

Ce tissu aponévrotique soutenait-il un autre tissu? Ses mailles fibreuses étaient-elles tapissées d'une membrane différente, chargée de la sécrétion du fluide graisseux? Je n'en ai pas fait l'examen d'assez près pour l'affirmer, mais il y a lieu de le penser. Si l'on adopte les idées de J. Hunter et de Béclard sur le tissu adipeux, cette disposition paraîtra moins étrange. Suivant eux, il s'en trouverait une toute pareille, ou du moins analogue, dans le tissu sous-cutané des Mammifères terrestres et de l'Homme. Les vésicules microscopiques dont ils ont reconnu, avec Monro et Wolff, que le tissu adipeux était composé, auraient des parois minces, transparentes et très distinctes de la graisse qu'elles renferment. « Un tissu cellulaire très délié semble « exister *entre* ces vésicules et autour d'elles. Ce tissu devient « plus apparent dans les *intervalles* des molécules visibles à l'œil « nu, qu'il réunit les unes aux autres; les pelotons qui en ré- « sultent sont rassemblés au moyen d'un tissu plus dense, « *presque fibreux* dans certaines régions, manifestement liga- « menteux à la paume des mains, etc. »(1)

2. Tout ce réseau fibro-adipeux était rempli d'une graisse huileuse dans notre Baleinoptère. Placé entre la peau et une vaste aponévrose qui enveloppait entièrement l'animal, il formait autour de lui une couche dense et ferme, dont l'épaisseur n'était pas égale partout.

Les lèvres devant être immobiles, et par conséquent dépourvues de muscles, n'étaient faites que d'une couche de ce tissu, dont la densité y était fort considérable. Il y formait une masse

(1) P. A. Béclard, *Additions à l'Anatomie générale* de Xav. Bichat, page 14. Paris, in-8, 1821.

compacte, dure, fort peu élastique, et diminuait d'épaisseur depuis les commissures jusqu'à la pointe des mâchoires.

Sur la convexité de la mâchoire supérieure, la couche adipeuse n'était pas épaisse d'un pouce; elle l'était d'un pied au-dessus du cou et de la queue, de trois à quatre pouces au-dessus du dos et des lombes, d'environ trois pouces vers le milieu des côtés, et de deux pouces seulement au-dessous de la poitrine et de l'abdomen.

3. Elle formait plusieurs expansions remarquables.

La première était la petite bosse qui devançait les évens; une autre était la nageoire dorsale. Toutes les deux étaient de simples élévations du tissu fibro-adipeux, revêtues de la peau. Ce tissu y conservait la même disposition que dans les autres parties de l'animal.

La nageoire dorsale commençait à la dernière vertèbre lombaire, et s'étendait de là horizontalement sur la queue, en s'élevant un peu et prenant une forme à-peu-près triangulaire. La base de ce triangle était tournée vers la queue; elle n'était haute que d'un demi-pied, très amincie, et courbée en arc fort creux. Le sommet se confondait avec le dos, et le côté libre, qui formait la crête de la nageoire, avait une longueur de plus de trois pieds (trois pieds huit pouces). La peau n'y conservait pas sa couleur noire sur tous les points; elle y faisait une tache oblongue, de couleur blanche et rosée, comme celle d'une cicatrice unie sur la peau humaine d'Europe.

Le sommet de la nageoire était placé vis-à-vis de l'anus.

Deux autres expansions de même espèce, mais plus considérables, terminaient la queue : c'étaient les nageoires caudales. Elles avaient aussi la forme d'un triangle curviligne; elles s'attachaient par leurs bases sur les dernières vertèbres coccygiennes. Un de leurs côtés était épais et convexe; l'autre, au contraire, était concave et mince; il terminait l'animal, dont il limitait l'extrémité postérieure. L'un et l'autre se recouvraient un peu à leur rencontre, et y formaient une échancrure qui n'était profonde que d'environ trois pouces. C'était de cette longueur seulement que les nageoires dépassaient le dernier os du rachis.

Leur direction était horizontale. Leur base avait une longueur

de deux pieds neuf pouces. On comptait du sommet de l'une de ces nageoires à celui de l'autre, une distance de huit pieds quatre pouces. Leur enfourchure ne présentait pas un arc régulier; ce n'était pas un croissant, mais, comme l'a dit exactement M. de Fleurieu, une espèce d'accolade à la manière des écrivains (*Voyage de Marchand*, tome II, page 598). Dans ces nageoires, le tissu adipeux était plus dense que partout ailleurs; ses mailles avaient peu de largeur, et étaient composées de fibres très grosses, très fortes et très brillantes. La peau était décolorée sur leur bord épais; on y voyait une tache longue et blanche, comme sur la crête de la nageoire dorsale. (Annales des Sciences naturelles, t. v, Pl. 2, fig. 1.)

4. Sous la moitié antérieure du corps, à la poitrine, à la gorge et sous la mâchoire inférieure, le tissu adipeux était sillonné de traits ou de fentes longitudinales presque parallèles. Une distance de deux pouces séparait ces sillons les uns des autres; leur profondeur était de six lignes, et ils pouvaient s'ouvrir d'autant. La peau s'y repliait pour les revêtir; elle y était très mince, et y prenait une teinte noire, au lieu de conserver la couleur nacrée qu'elle avait partout ailleurs au-dessous du corps. Ces plis ou sillons dilatables permettaient à l'enveloppe graisseuse, qui était dense et peu extensible, de s'élargir convenablement dans les mouvemens de la respiration, et aussi lorsque l'animal voulait remplir le réservoir ou poche sous-maxillaire dont il est pourvu.

III. Plusieurs auteurs ont douté de l'existence de cette poche; d'autres l'ont admise; MM. Bald et Souty rapportent qu'ils l'ont vue. D'après M. Souty, elle avait, dans un Rorqual qu'il a observé, une forme allongée et une longueur d'environ huit pieds (1). Elle a été décrite par Lacépède sur des notes de Bachstrom, que Joseph Banks lui avait transmises. (2)

Je crois aussi que cette poche existe. Je ne puis pas dire, à la vérité, que je l'ai positivement vue, que je l'ai ouverte, soule-

(1) Lesson, *Cétacés*, page 253. — Frédéric Cuvier, *Histoire des Cétacés*, page 323.
(2) Lacépède, *Histoire naturelle des Cétacés*, tome I, page 203.

vée, disséquée, mesurée; la rapidité avec laquelle le dépècement s'est effectué ne me l'a pas permis. Mais voici les raisons qui m'ont déterminé à me ranger de cette opinion :

1° Quand notre Baleinoptère fut échouée sur la plage, on remarqua tout d'abord qu'elle avait la mâchoire inférieure déjetée à gauche, et que la bouche restait entr'ouverte, parce que la membrane buccale faisait à droite, entre les lèvres, une énorme saillie, de forme à-peu-près cylindrique. La faible teinte de rouge bleuâtre dont cette membrane était colorée, la rendait apparente autant que son volume entre les lèvres noires de l'animal. Elle était fortement tendue, et résonnait quand on frappait dessus.

La mer, en se retirant, avait laissé l'animal couché à demi sur le côté gauche au milieu du rivage. Il en était résulté que le dessous de la mâchoire inférieure avait été comprimé de ce côté, de telle sorte que le fluide amassé sous la membrane buccale avait été refoulé à droite. La figure 1 de la planche 9 représente exactement cette disposition.

Ceci confirme d'abord le fait rapporté par divers auteurs, suivant lesquels une vessie considérable remonterait dans la bouche des Rorquals après leur mort, et forcerait les mâchoires à s'écarter (1). On y trouve ensuite l'explication de la singulière disposition que présente la figure de Baleine à bec, produite par Lacépède sur les dessins de Bachstrom, et la preuve que cette figure, inexacte en beaucoup d'autres parties, a du moins de la vérité sur ce point.

2° Quand les travailleurs eurent enlevé toute la graisse qui couvrait le dos et le flanc droit, ils songèrent à recueillir celle qui était au-dessous du ventre et de la poitrine; et lorsqu'ils enlevèrent des lambeaux près de la gorge, il arriva que le gros bourrelet formé entre les mâchoires par la membrane buccale s'affaissa, puis disparut. Le fluide qu'il contenait avait trouvé une issue du côté de la gorge.

3° Enfin la mâchoire inférieure, garnie de toutes ses chairs,

(1) Frédéric Cuvier, *de l'histoire naturelle des Cétacés*, introduction, page xv, in-8°, Paris, 1836.

fut détachée de la tête et laissée à terre dans l'état où je l'ai représentée (premier Mémoire, fig. 2), à cela près que son fond ou plancher, au lieu d'être un peu concave et suspendu, se trouvait tout-à-fait plat, parce qu'il était comprimé sur le sol contre lequel il appuyait. Alors la membrane buccale n'offrait plus de saillie ni de rides en aucun point : elle était uniformément étendue dans le vaste espace qu'elle recouvrait. Quand on marchait dessus, il fallait prendre garde à soi pour se tenir debout, non pas à cause de la surface lisse et humide de la membrane, mais à cause des lames singulièrement lâches du tissu celluleux sous-jacent qui glissaient les unes sur les autres et entraînaient le pied sur lequel on posait. Eh bien ! en donnant de cette manière à la membrane buccale des mouvemens de distension forcée par lesquels elle était poussée en avant, les lames tiraillées du tissu celluleux laissaient voir en arrière leurs grandes mailles écartées, et au milieu de ces mailles je pouvais distinguer une ouverture transversale comme celle d'une poche qui aurait occupé toute la largeur de la mâchoire.

Les travailleurs étant venus prendre ma place, il ne m'a pas été possible de pousser plus loin mon observation. J'ai dû me retirer avant d'avoir acquis une conviction entière; mais il me semble que la boursouflure de la membrane buccale entre les lèvres, depuis leur commissure jusqu'à leur pointe, et la disparition de cette boursouflure à l'ouverture de la gorge, indiquent d'une manière assez certaine qu'il existait là une vaste poche qui occupait pour le moins tout le dessous de la mâchoire inférieure.

On peut renouveler la question qu'Otto Fabricius a déjà posée : Est-ce de l'air ou de l'eau que cette poche reçoit? Tout ce que je puis dire, c'est qu'elle contenait un fluide gazeux dans le Cétacé que j'ai vu.

Ce fluide provenait-il de la putréfaction avancée de l'animal? En voyant des lames cellulaires si lâches sous la membrane buccale, j'avais pensé un moment que le fluide aériforme qui l'avait soulevée aurait bien pu s'être accumulé dans leurs mailles, et provenir de gaz putrides qui seraient sortis du tissu même dont elles étaient formées. Mais évidemment il n'y avait pas de tissu plus sain que celui-là dans tout l'animal : il ne portait aucune

marque profonde d'altération; il avait conservé son apparence naturelle et toute sa consistance. Examiné sur des parties différentes, à de grandes distances les unes des autres, entre les muscles, le même tissu avait partout un bon aspect; il n'était boursouflé nulle part.

« Aucun des écrivains qui ont admis l'existence d'une poche sous la gorge des Rorquals, a dit M. Van Breda, n'a réfléchi que la vessie se remplissant d'air, l'animal serait aussitôt tourné le ventre en haut. » L'objection est spécieuse, mais elle ne me paraît pas solide, supposé même qu'il ne doive entrer que de l'air dans cette poche. Son principal usage n'est peut-être pas d'augmenter le volume de la partie antérieure du corps et de diminuer la pesanteur relative de la tête; mais en produisant ce double effet, que la volonté de l'animal peut sans doute modérer à son gré, elle doit l'aider à se tenir dans une position plus ou moins oblique ou verticale. Ce n'est pas au dos, c'est à la queue que cette vessie fait équilibre : elle n'est pas placée sous le ventre, elle n'occupe que le dessous de la tête.

Les plicatures de la peau et du tissu sous-cutané ne sont pas bornées au dessous de la gorge; elles s'étendent au contraire sous le corps de l'animal, depuis la pointe de la mâchoire inférieure jusqu'au nombril. C'est une preuve qu'elles n'ont pas été établies uniquement à cause des dilatations possibles de la gorge et de la poche submaxillaire, mais aussi pour servir à celles de la poitrine et de l'abdomen.

Divers auteurs ont pensé avec Fabricius et Lacépède que ces plicatures résultaient de la contraction de la poche submaxillaire, que la peau contribuait à la formation de cette poche, et qu'elle se déplissait quand la gorge se dilatait; mais on peut voir facilement qu'il n'en est pas ainsi. Hunter et M. Van Breda ont bien reconnu que ces plicatures devaient être permanentes. Cependant si elles ne s'effacent pas, elles s'écartent, à-peu-près comme le feraient des rayons d'éventail (premier Mémoire, Pl. XI, fig. 2, *g*, *h*). Les fentes qui les séparent ne varient pas à leur sommet, tandis qu'elles s'élargissent à leur base; elles sont, comme je l'ai déjà dit, profondes de six lignes, et elles peuvent couvrir d'autant : je m'en suis bien assuré.

La peau est tellement unie sur les Rorquals, qu'elle n'y forme aucune espèce de rides, excepté sur les paupières : elle est si tendue, qu'il ne paraît pas possible de l'étendre davantage. Le tissu sous-cutané auquel elle s'attache, étant de nature fibreuse, ne doit pas être non plus fort extensible. De là est venue probablement la nécessité de tracer des sillons longitudinaux aux endroits du corps qui étaient le plus exposés à subir des distensions; d'une part, pour que le jeu des organes intérieurs ne fût pas gêné; d'une autre part, afin que la peau pût céder à leurs mouvemens sans se rompre. Il est vrai que les Baleines et les autres Cétacés ont la peau aussi lisse et aussi bien tendue que celle des Rorquals; mais peut-être leurs mouvemens de dilatation ont-ils moins d'étendue. On ne leur connaît pas de poche submaxillaire (1); et d'ailleurs, leur tissu adipogène étant plus épais, se trouve peut-être aussi d'une nature moins fibreuse et plus élastique.

IV. *Aponévrose commune ou d'enveloppe générale.* — Les lames fibreuses du tissu adipeux de la Baleinoptère étaient comme des expansions d'une vaste aponévrose à laquelle elles se rattachaient, et dont tout le corps de l'animal était enveloppé. Cette aponévrose, cet immense *fascia lata*, était formée de deux espèces de fibres : les unes transversales, allant obliquement de l'échine à la ligne médiane du dessous du corps; les autres longitudinales, allant directement de la tête à la queue. Les premières étaient fort grosses comparativement aux secondes : placées à-peu-près parallèlement à quelque distance les unes des autres, elles formaient des cordons nombreux de la grosseur d'une penne de cygne. Entre ces cordons se trouvaient les fibres de la seconde espèce, s'attachant des uns aux autres, dans le sens opposé, petites, courtes, plates, minces, et assez faibles pour qu'il fût aisé de les rompre en tirant à soi les premières. Ces petites fibres ne se touchaient pas; il restait entre elles de petits intervalles, des fentes étroites d'inégales longueurs. Il résultait de là que ces deux sortes de fibres ne formaient pas, en s'unis-

(1) Lacépède en a parlé, mais avec doute, *Histoire naturelle des Cétacés*, tome 1, page 92.

sant, un tissu compacte et uni comme celui de nos aponévroses, mais une véritable toile à jours et à côtes, comparable à un tissu de Berlin, les cordons transversaux étant en relief sur le fond de cette toile.

V. *Tissu lamineux.* — La couleur des muscles était d'une nuance rouge éclatante, beaucoup plus vive que dans les Phoques et les grands Mammifères terrestres. Les faisceaux de fibres dont ils étaient composés m'ont paru être proportionnellement plus distans que les nôtres.

Entre les faisceaux de fibres musculaires, entre les muscles eux-mêmes et autour des organes intérieurs, se trouvait un tissu cellulaire d'un aspect tout différent de celui qui renfermait la pannicule graisseuse; c'était un véritable tissu lamineux pour l'aspect et pour les produits. Il était composé de lames d'un blanc-grisâtre, à demi opaques, onctueuses, formant partout des cellules lâches qui n'étaient remplies que de sérosité. Dans les endroits où ce tissu avait beaucoup de développement, ses lames avaient une épaisseur remarquable et beaucoup de consistance.

VI. *Les yeux.* — Les yeux étaient placés dans la direction des lèvres, très près des commissures (Pl. 9, fig. 1, *c*). Recouverts des paupières, ils faisaient extérieurement une saillie convexe et elliptique, dont le grand diamètre était long de six à sept pouces. Les paupières pouvaient se plisser et s'écarter d'une pouce l'une de l'autre; la fente qui les séparait avait de quatre à cinq pouces; elles étaient complètement dépourvues de cils. — Les globes oculaires avaient près de quatre pouces de diamètre, et leurs cornées un pouce. L'iris détendue et fermée, paraissait très large; la pupille était très petite, et avait la forme d'une fente étroite, oblongue et transversale. — Le nerf optique était fort gros.

Ces organes ayant été réservés pour le Muséum, je n'en ai pas fait la dissection.

Ils ont paru petits à tous les assistans, relativement au volume de l'animal. C'est un effet qui se produit sur toutes les person-

nes qui ont l'occasion de voir des Cétacés. Les auteurs qui en ont écrit ont fait aussi la même remarque; et ils ont été conduits par cette raison, plus encore que par la position des yeux et le faible écartement des paupières, à mettre en doute si les Baleines jouissaient de la finesse de vue que les marins qui en font la pêche s'accordent à leur donner. Mais, à mon sens, pour bien juger cette question, c'est moins au volume qu'à la sensibilité de l'organe qu'il faut avoir égard. D'ailleurs des yeux dont les globes ont de dix à douze pouces de circonférence, et dont les nerfs optiques sont gros d'un pouce, ne sont pas des organes visuels de petites dimensions. Quant aux paupières, ne suffit-il pas qu'elles puissent s'ouvrir autant que la cornée a de largeur, pour ne pas gêner la vue? Dépourvues de cils chez les Baleines, il en est d'autant moins besoin de les écarter pour admettre dans l'œil tout ce qu'il peut recevoir utilement de rayons lumineux.

VII. *Les oreilles.* — Si je n'avais cherché avec le plus grand soin l'orifice externe de l'ouïe, je ne l'aurais pas vu. C'est une ouverture presque imperceptible, qui n'est environnée d'aucun appareil et qui se trouve sur la partie latérale et postérieure de la tête, deux pieds en arrière de l'œil, mais sur une ligne plus élevée. Cet orifice, extrêmement petit, aboutissait à un conduit auditif qui était fort long, et devait avoir beaucoup de largeur.

L'os de l'oreille était distinct des autres os de la tête; c'était lui-même un os à part. Placé en dehors du crâne, il en touchait la base, et se développait dans une rainure ménagée exprès entre l'occipital et le temporal, qui étaient plus bas soudés l'un à l'autre. (Pl. 9, fig. 2 et 7.)

Cet os était vacillant dans la place qu'il occupait; il n'y était pas fixé d'une manière ferme et immobile par des articulations étroites; cependant il n'aurait pas été possible de l'en extraire sans écarter les autres os.

Il était composé de deux parties, le rocher et la caisse.

Dans la position où il se trouvait, le rocher n'était pas visible; il n'en paraissait que les deux apophyses, l'une externe et l'autre interne. L'externe avait une forme pyramidale et anguleuse;

elle était grêle, se terminait en pointe, se trouvait placée horizontalement dans la rainure occipito-temporale et contribuait à la formation du conduit auditif externe; elle était longue de neuf pouces sur un pouce d'épaisseur. L'interne était beaucoup plus grosse, plus large et plus courte : elle se dirigeait à-peu-près verticalement en dedans, où elle était libre dans une partie de son étendue. Ces deux branches du rocher avaient une surface rugueuse, principalement l'interne qui en était comme striée; mais leur tissu ne paraissait pas plus dense que celui des autres os. (Pl. 9, fig. 2 et 3, *c*, *d*.)

L'apparence de la caisse était toute différente. Au poli de sa surface, à la blancheur et à la finesse de son grain, on jugeait qu'elle devait être formée d'une substance compacte et dure; elle avait la figure d'un ellipsoïde; elle était creuse et fermée de toutes parts, excepté en haut et en devant, sur le milieu. L'ouverture qu'elle présentait en cet endroit avait ses bords comme plissés. J'ai pu, sans peine, y introduire un doigt et l'y faire pénétrer assez profondément. Les conduits auditifs externe et interne venaient s'y rendre. (Pl. 9, fig. 7, *r*, fig. 2 et 3, *r*, *a*, *b*.)

Le conduit auditif interne, *b*, se présentait sous la forme d'un tube membraneux assez étroit; il naissait du bord de la caisse du tympan, et se courbait, en se dirigeant en devant, pour venir horizontalement joindre et traverser le conduit osseux pratiqué dans le temporal, en *b* fig. 2. Au-delà, il n'existait plus.

Le conduit auditif externe devait être formé, à l'état frais, d'un tube membraneux ou cartilagineux assez long pour se rendre à l'orifice extérieur de l'ouïe à l'entrée de la caisse; mais comme la tête était entièrement dépouillée de ses chairs quand je faisais ces observations, je n'ai pu rien voir de ce tube, non plus que de la membrane du tympan. Seulement j'ai pu remarquer dans le squelette qu'une gouttière profonde, longue de plus d'un pied, large de dix-huit lignes, était creusée dans la substance du temporal, en avant de l'apophyse longue ou externe du rocher, fig. 2, *a*. Cette gouttière conduisait à la caisse du tympan; elle devait former une voûte au-dessus du conduit membraneux et en couvrir la partie supérieure et antérieure. La

longue apophyse du rocher pouvait en soutenir la partie postérieure; mais il était libre dans le reste de sa circonférence.

Il me paraît douteux que ce tube contienne de l'air : l'orifice externe n'est pas propre à lui en fournir. Il n'est peut-être rempli, comme la caisse, que d'un liquide gélatineux, plus apte que l'air lui-même à transmettre les sons. Les ondes sonores passent, comme on le sait, avec plus de force et plus de vitesse dans l'eau que dans l'air (Franklin, Biot); et l'expérience de Scoresby, d'après laquelle il est constant que les Baleines entendent plus aisément le cliquetis des vagues agitées par le sillage du navire ou le battement des rames, que le bruit même d'un coup de canon, semble indiquer que l'eau est un intermédiaire, sinon indispensable, au moins utile aux fonctions de l'oreille des Baleines, qui est faite pour agir dans ce liquide.

La tête de la Baleinoptère avait été séparée du tronc et renversée à peu de distance; comme elle gênait les travailleurs, il devint nécessaire de la déplacer. Pour soulever cette masse osseuse, qui était longue de neuf pieds et avait un mètre de haut, il fallut des leviers et plusieurs hommes. On lui fit faire plusieurs tours sur elle-même, afin de l'éloigner suffisamment, et on la laissa inclinée sur le côté droit. Dans cette position, je pouvais encore voir très bien la base du crâne. Or, quand je m'en fus approché, je dus être surpris d'y trouver un organe qui, assurément, n'y était pas visible quelques instans auparavant. Les secousses occasionées à toute la masse par le déplacement avaient fait sortir du fond de l'oreille une poche ou vésicule d'assez grandes dimensions : je dis du fond de l'oreille, car j'en avais plusieurs fois exploré l'entrée avec les doigts sans y rien sentir. Cette poche suspendue au milieu de l'ouverture de la caisse, qu'elle traversait, avait trois pouces de long sur un de large, et la forme d'un sac ovoïde. Elle était plissée sans être aplatie, bien qu'elle ne contînt alors aucun fluide. Ses parois étaient lisses, épaisses, compactes, résistantes à la manière du parchemin; elles avaient une couleur grise et luisante, d'un éclat métallique, comparable à celle de la peau des Orvets. Elle se terminait par une espèce de col, auprès duquel elle était ouverte, en arrière, par une déchirure. (Fig. 2 et 3, *e*.)

En pressant cette poche sur le fond pour savoir ce qu'elle renfermait, j'en fis sortir deux corps solides, blanchâtres, opaques, enveloppés d'une matière épaisse, jaunâtre, onctueuse, qui y était adhérente. Il y avait un de ces petits corps de forme cubique, mousse sur les angles et les arêtes, avec des faces légèrement concaves et de dimensions à-peu-près égales, deux lignes environ. L'autre était d'une forme moins régulière, tenant du prisme et de la pyramide, plus large qu'épais et d'une épaisseur variable en divers points de sa longueur. Voici ses dimensions : longueur, neuf lignes; largeur, deux lignes; épaisseur, variable d'une à deux lignes.

Comme il se faisait tard, je dus songer à repartir pour Saint-Valery. Je laissai la vésicule en place, ne voulant pas la détacher avant d'en avoir bien reconnu les connexions. Mais le lendemain, à mon retour, la vésicule était enlevée, et malgré toute la peine que j'y ai prise, il me fut impossible de savoir ce qu'elle était devenue.

Qu'était-ce donc que cette poche et ce qu'elle contenait? — Etait-ce la membrane du tympan renversée avec ses osselets? J'en doute. — Etait-ce le sac membraneux du labyrinthe avec ses pierres auditives? Je n'ose le dire et j'en doute également. Il est vrai que cette poche avait bien une forme qui pouvait convenir au sac auriculaire, que sa membrane présentait bien la nature particulière et l'espèce de rigidité que M. le professeur Breschet a reconnues dans les tissus du labyrinthe (1); mais celle qui tapisse l'intérieur de la caisse pouvait être, ce me semble, d'une nature analogue.

Je n'ai pas vidé entièrement cette poche et ne sais pas très exactement ce qu'elle contenait : il est possible qu'il y soit resté d'autres corps solides que ceux que j'en ai fait sortir. Ceux-là présentaient, à la vérité, des rapports de configuration avec les pierres qui existent dans les oreilles des poissons osseux (*microlithe* et *paralithe*); mais ils avaient aussi quelques analogies avec des osselets de l'ouïe. Quant à la substance onctueuse et

(1) Voyez ce travail, dont il vient de paraître une nouvelle édition dans les *Mémoires de l'Académie royale de médecine*, tome v, pages 237, 239, 303, 304 et 347.

gélatineuse qui formait l'enduit dont ils étaient couverts, elle pouvait appartenir à l'intérieur de la caisse aussi bien qu'à celui du labyrinthe.

Je regrette beaucoup de ne pas être en mesure de résoudre cette question, à laquelle s'en rattache une autre d'une grande importance, celle de savoir si les pierres auditives ont plus de volume dans les Mammifères aquatiques que dans les Mammifères terrestres (1).

VIII. *Les évents.* — Ils étaient au nombre de deux, séparés comme les narines par une cloison peu épaisse, et situés dans un enfoncement derrière la petite bosse de la mâchoire supérieure. Cette cloison était double, et marquée en son milieu d'un sillon longitudinal qui indiquait les deux parties dont elle se composait : elle était formée par les évents eux-mêmes dont les parois venaient se toucher en s'appuyant sur les os du nez. Chaque évent avait un pied de large, était cylindrique intérieurement et se courbait en arrière pour se rendre à la gorge. Une peau noire et fort lisse en couvrait en dedans la partie supérieure. Leurs orifices étaient indiqués sur la tête par deux lignes courbes, semi-lunaires, symétriquement opposées l'une à l'autre par leur convexité, de chaque côté de la cloison. (Prem. mémoire, fig. 1.) Ces ouvertures étaient fermées par des lèvres solides qui s'appliquaient très fortement l'une à l'autre. La lèvre externe devait être la seule mobile, la seule qui s'ouvrît ou s'écartât pour laisser passer la colonne d'eau que l'animal voulait rejeter : elle appuyait ses mouvemens sur la lèvre interne qui était fixe.— Un petit bord saillant, en forme d'ourlet, marquait le contour des deux lèvres à chaque évent. (Pl. 9, fig. 1, *e*.)

IX. *Viscères de la poitrine.* — Je n'ai pas pu me rendre à Cayeux dans la matinée du jour où la poitrine fut ouverte; mais M. Baillon y assistait. Il a recueilli quelques tronçons des grosses artères pour le Muséum de Paris dont il est correspondant, et sans contredit l'un des plus savans et des plus actifs. Il m'a

(1) Breschet, même ouvrage, page 353.

assuré que tout le reste était méconnaissable, tant la putréfaction l'avait altéré.

X. *Viscères abdominaux.* — Un vaste mésentère, sans glandes lymphatiques, comme dans les Phoques.

Dans le mésentère, près de ses attaches à la colonne vertébrale, de très gros ganglions nerveux qui étaient plats, larges et longs : il en sortait des filets d'un volume remarquable.

L'estomac multiple; l'intestin grêle d'une longueur extraordinaire; un cœcum; le gros intestin fort court. Le petit intestin avait une circonférence de huit pouces huit lignes; celle du gros était de quinze pouces trois lignes, presque double. L'anus restait ouvert, et paraissait fort large; il s'en écoulait des matières d'une couleur jaune rougeâtre, comparable à celle du safran.

Toute la masse intestinale fut liée, arrachée à force de bras et jetée à la mer du même mouvement. Impossible de songer à les retirer de l'eau pour en voir l'intérieur; ils étaient rapidement entraînés par le courant. — Je ne pus découvrir la rate, ni le foie, ni les reins, ni les testicules : ils étaient les uns putréfiés, les autres enlevés dans les grands lambeaux que les travailleurs détachaient de la bête.

Le balénas, long de plusieurs pieds, était logé dans une gaîne. Sa partie préputiale, ou le gland, avait une longueur d'environ un pied et la forme d'un étroit fuseau, présentant à la base un diamètre de douze à seize lignes, et se terminant en une pointe tronquée, au bout de laquelle on voyait une petite ouverture transversale qui était l'orifice de l'urètre.

— Dans un troisième mémoire je ferai la description du squelette et tâcherai d'établir les différences qu'il présente avec les autres squelettes de Rorquals que nous possédons. On pourra d'avance reconnaître une partie de ces différences dans les figures de la tête osseuse, qu'il m'a paru convenable de produire dès à présent (Pl. 9, fig. 4, 5, 6, 7 et 8.)

EXPLICATION DES FIGURES DE LA PLANCHE 9.

Fig. 1. Tête de *Baleinoptère* ou *Rorqual*, revêtue de ses chairs et présentant entre ses lèvres un bourrelet *a*, *a'*, formé par la membrane buccale et la poche submaxillaire; *b*. fanons : ils sont blancs dans le quart antérieur de la lèvre jusqu'en *a'*, ils sont ensuite d'un bleu noirâtre; *c*. œil; *d*. bosse fibro-adipeuse de la mâchoire supérieure; *e*. orifice de l'évent du côté droit; *f*. partie humérale du bras; *g*, *g*. plicatures ou sillons de la gorge : il en existe jusqu'au dessous de l'œil.

Fig. 2. Oreille : *a*. gouttière creusée dans l'os temporal et formant la voûte du conduit auditif externe; *b*. orifice d'un canal osseux que traverse le conduit auditif interne; *c*. apophyse longue ou externe du rocher; *d*. apophyse interne du rocher; *e*. poche membraneuse, sortie de la caisse du tympan *r* et renfermant des osselets ou des otolithes; *h*, *h*. parties de l'occipital; *m*. partie de l'os temporal; *r*. caisse du tympan.

Fig. 3. Os de l'oreille isolé : *r*. caisse du tympan; *b*. conduit auditif interne; *c*. apophyse externe du rocher; *d*. apophyse interne du rocher; *e*. poche membraneuse sortie de la caisse du tympan.

Fig. 4. Tête osseuse de la Baleinoptère, vue de profil par le côté droit : *a*. os maxillaire supérieur; A. apophyse zygomatique de l'os maxillaire supérieur; *f*. frontal; *g*. pariétal; *h*. occipital; *k*. jugal; *m*. temporal; *o*. lacrymal.

Fig. 5. Branche gauche de la mâchoire inférieure, vue du côté externe.

Fig. 6. Même branche, vue du côté interne.

Fig. 7. Tête osseuse, vue en dessous : *a'*, *a'*. os maxillaires supérieurs, creusés en carènes; A, A. apophyses zygomatiques des maxillaires supérieurs; *b*. vomer; *f*, *f*. frontaux; *g*, *g*. pariétaux; *i*. trou occipital, condyles; *k*. jugaux; *m*, *m*. temporaux, leurs faces glénoïdes; *m'*, *m'*. leurs apophyses zygomatiques; *p*, *p*. os palatins; *q*. os basilaire; *r*, *r*. os de l'oreille; *s*, *s*. os ptérigoïdiens; *t*. sphénoïde.

Fig. 8. Même tête, vue en dessus : *a*, *a*. os maxillaires supérieurs; *a''*, *a''*. leur apophyse montante; *c*, *c*. intermaxillaires; *d*. ouverture des narines; *e*, *e*. os du nez; *f*, *f*. os frontaux; *o*, *o*. os lacrymaux; *h*. os occipital, ayant sa crête en *h'* et ses condyles en *i*; *m*, *m*. os temporaux; *n*, *n*. branches de la mâchoire inférieure.

OBSERVATIONS *sur les métamorphoses du* CERCERIS BUPRESTICIDA, *et sur l'industrie et l'instinct entomologique de cet Hyménoptère,*

Par M. LÉON DUFOUR.

(Lettre adressée à M. AUDOUIN.)

Je pense, mon ami, que vous attacherez quelque intérêt à des observations qui rentrent dans votre manière d'envisager l'étude de l'entomologie ; aussi je ne balance pas à vous en faire hommage. Vous savez avec quelle industrie, quelle intelligence, je dirais presque avec quel savoir, plusieurs Hyménoptères prédateurs et fouisseurs approvisionnent leurs nids; vous avez admiré comme moi le tact qui préside au choix de ces provisions. Il en est qui ne donnent à leur progéniture que des individus d'une seule espèce d'insectes; d'autres, à défaut de celle-ci, qui ne se rencontre pas toujours assez abondamment dans les diverses localités qu'ils habitent, choisissent des espèces différentes du même genre ou d'une même famille. Enfin, nous en connaissons qui, ne respectant les limites ni du genre, ni de la famille, puisent dans l'enceinte d'un même ordre des espèces de genres et de familles très dissemblables.

Notre célèbre Réaumur a consacré un de ses beaux Mémoires à l'histoire de sa *Guêpe solitaire* (1), que dans mon travail sur les *Odynères* (2) j'avais crue être une espèce à laquelle j'ai attaché son nom, mais que vos recherches plus heureuses ont rapportée à l'*Odynerus spinipes* Fabr. (3). Notre observateur modèle nous apprend donc que sa Guêpe solitaire distribue à chacun de ses petits une brochette de douze Chenilles de la même espèce. Vous avez, avec sagacité, complété cette histoire, en

(1) Tome VI, page 247.

(2) Annales des Sciences naturelles, deuxième série, tome II, février 1839.

(3) L. c.

poursuivant le ravisseur de ces Chenilles jusque sur le théâtre de ses déprédations ; vous l'avez surpris saisissant sur la luzerne une de ces larves, et vous en avez obtenu un *Curculionite*, le *Phytonomus variabilis* Schonb. Suivant Latreille, le *Philanthus triangulum* Fabr., qu'il appelle *apivorus*, enfouit des Abeilles à miel pour nourrir sa progéniture. Le *Cerceris arcuaria*, dans le même but, saisit à la chasse des *Curculionites* du genre *Pachygaster* et le *C. ornata* des Andrenes et des Halictes. Le *Tripoxylon figulus* fournit d'Araignées les cellules de ses larves. Le *Solenius rubicola*, dont M. Perris et moi avons publié l'histoire dans notre Mémoire *sur les Hyménoptères qui nichent dans les tiges de la ronce*, ne donne à ses petits que des Diptères, et presque exclusivement la *Lauxania ænea*. Tout récemment, je viens de constater que la *Palarus flavipes* apporte à sa couvée une foule d'Hyménoptères appartenant à divers genres, et même à des familles, à des sections très différentes. J'ai compté parmi ces victimes dix-huit espèces des genres *Ichneumon*, *Tiphia mutilla*, *Scolia*, *Philanthus*, *Cerceris*, *Crocisa*, *Lyrops*, *Sphecodes*, *Ammobates*, *Myzine*, *Andrena*, etc. (1)

Mais je ne vois dans l'histoire des insectes aucun fait aussi curieux, aussi extraordinaire que celui dont je vais vous entretenir. Il s'agit d'une espèce de *Cerceris* qui a un goût des plus recherchés, puisqu'il n'alimente sa famille qu'avec les espèces les plus distinguées, les plus somptueuses du genre *Richard* ou *Buprestis*. Permettez-moi de vous associer, et aux vives impressions que m'ont procurées ces recherches, et aux conquêtes précieuses que m'a valu l'étude de cette entomologie souterraine inconnue jusqu'à ce jour. Ces faits, qui sont positifs et matériels, paraîtront presque un roman à ceux qui n'en ont jamais constaté de semblables : abordons-les, en suivant tout simplement l'ordre de leur succession. Je vous ferai ensuite connaître,

(1) Ajoutons à cette longue liste le nom de la *Cerceris aurita* (♀ de la *Quinquecincta*), que M. Leduc, de Versailles, a fréquemment suivie au moment où elle revenait à son nid, chargée d'individus appartenant aux espèces *Otiorhynchus raucus* et *Phytonomus punctatus*.

(Rd.)

par la description et les figures, les métamorphoses du *Cerceris*, qui sont aussi une acquisition nouvelle pour la science.

En juillet 1839, M. Diris, un de mes amis qui habite la campagne, m'envoya deux individus du *Buprestis bifasciata* Oliv., insecte alors nouveau pour ma collection, en m'apprenant qu'une espèce de Guêpe qui transportait un de ces jolis Coléoptères l'avait abandonné sur son habit, et que peu d'instans après, une semblable Guêpe en avait laissé tomber un autre à terre. A cette époque, je rédigeais le Mémoire précité sur les Hyménoptères qui nichent dans la ronce, et j'y insérai une note sur ce fait.

En juillet 1840, étant allé faire une visite, comme médecin, dans la maison de M. Diris, je lui rappelai sa capture de l'année précédente, et je m'informai des circonstances qui l'avaient accompagnée. La conformité de saison et des lieux me faisait espérer de renouveler moi-même cette conquête; mais le temps était, ce jour-là, sombre et frais, peu favorable, par conséquent, à la circulation des Hyménoptères. Néanmoins, nous nous mîmes en observation dans les allées du jardin, et, ne voyant rien venir, il me restait la ressource de me courber sur le sol pour y chercher des habitations d'Hyménoptères fouisseurs. Un léger tas de sable récemment remué et formant comme une petite taupinière, arrêta mon attention. En le grattant, je reconnus qu'il masquait l'orifice d'un conduit qui s'enfonçait profondément. Au moyen d'une bêche, nous défonçons avec précaution le terrain, et nous ne tardons pas à voir briller des élytres éparses du Bupreste si convoité. Bientôt ce ne sont plus des élytres isolées, des fragmens, que je découvre, c'est un Richard tout entier, ce sont trois, quatre Richards qui étalent leur or et leurs émeraudes. Je n'en croyais pas mes yeux. Mais ce n'était là qu'un prélude de mes jouissances. Dans le chaos des débris de l'exhumation, un Hyménoptère se présente et tombe sous ma main : c'était le ravisseur des Buprestes, qui cherchait à s'évader du milieu de ses victimes. Dans cet insecte prédateur et fouisseur, je reconnais une vieille connaissance, un *Cerceris* que j'ai décrit comme nouveau dans mes Recherches anatomiques sur les Hyménoptères, et

que j'ai trouvé deux cents fois dans ma vie, soit en Espagne, soit dans les environs de Saint-Séver.

Mon ambition était loin d'être satisfaite. Il ne me suffisait pas de connaître et le ravisseur et l'objet ravi, il me fallait le consommateur de ces opulentes provisions. Après avoir épuisé ce premier filon buprestigère que j'avais suivi jusqu'à un pied de profondeur, je courus à de nouvelles fouilles, je sondai avec un soin plus scrupuleux; je parvins enfin à démêler deux larves qui complétèrent la bonne fortune de cette campagne. En moins d'une heure, je bouleversai trois repaires de *Cerceris*, et mon butin fut une quinzaine de Buprestes entiers avec des fragmens d'un plus grand nombre encore. Je calculai, en restant, je crois, bien en deçà de la vérité, qu'il y avait dans ce jardin vingt-cinq nids, ce qui faisait une somme énorme de Buprestes enfouis. Que sera-ce donc, me disais-je, dans des localités où en quelques heures j'ai pu saisir sur les fleurs des Alliacées jusqu'à soixante *Cerceris* femelles dont les nids, suivant toute apparence, étaient dans le voisinage, et approvisionnés sans doute avec la même somptuosité? Ainsi mon imagination, d'accord avec les probabilités, me faisait entrevoir sous terre, et dans un rayon peu étendu, des *Buprestis bifasciata* par milliers, tandis que depuis plus de trente ans que j'explore l'entomologie de nos contrées, je n'en ai jamais trouvé un seul dans la campagne. Une fois seulement, il y a peut-être vingt ans, je rencontrai, engagé dans un trou d'un vieux chêne, un abdomen de cet insecte revêtu de ses élytres. Ce dernier fait, tout insignifiant qu'il m'avait paru jusqu'alors, cessa de l'être en ce moment et devint pour moi un trait de lumière. En m'apprenant que la larve du *B. bifasciata* devait vivre dans le bois de chêne, il me rendait parfaitement raison de l'abondance de ce Coléoptère dans un pays où les forêts sont exclusivement formées par cet arbre. Mais comme le *Cerceris buprestícida* est rare dans les collines argileuses de cette dernière contrée, comparativement aux plaines sableuses peuplées par le Pin maritime, il devenait piquant pour moi de savoir si cet Hyménoptère fouisseur, lorsqu'il habite la région pinicole où les chênes ne s'observent qu'isolément et de loin en loin, approvisionnait ses nids comme

dans la région quercicole. J'avais de fortes présomptions qu'il ne devait pas en être ainsi, et vous verrez bientôt avec quelque surprise combien est exquis le tact entomologique de notre *Cerceris* dans le choix des nombreuses espèces du genre Bupreste.

Avant d'exécuter mon projet d'excursion dans nos forêts de Pins, je voulus, profitant d'un jour sans nuages, visiter de nouveau les mines buprestifères des collines quercicoles. M. Diris avait découvert des tannières de *Cerceris* dans un sol arénoso-argileux, à une petite distance de son jardin. Au lieu de filets et de pinces pour cette course entomologique, il fallut nous armer de piques, de bêches et de pelles en fer. J'exploitai ces tannières avec un succès inespéré. J'eus le plaisir de surprendre et d'abattre plusieurs de ces Hyménoptères emportant chacun dans les airs une riche victime plus grande et plus pesante que le ravisseur lui-même. Non-seulement je rapportai de cette expédition, sur un théâtre de six ou sept mètres carrés au plus, un butin d'une trentaine de *bifasciata* dans le plus bel état de conservation, mais j'exhumai aussi dix *B. pruni* Panz., espèce que je voyais pour la première fois, et qui est peu connue des entomologistes. La découverte de celle-ci, qui rentre avec le *bifasciata* dans le genre moderne *Agrilus*, et qui est bien distincte du *rubi* Fabr., corrobora puissamment ma confiance dans l'instinct entomologique de notre *Cerceris*, et me confirma dans l'espoir de trouver d'autres espèces du même genre dans la région pinicole.

Hâtons-nous donc de nous rendre dans cette dernière pour moissonner de nouvelles jouissances, et, comme on dit, frappons le fer quand il est chaud. M. de Basquiat, que vous connaissez, possède dans la commune de Soupro-se, à quatre lieues au nord-ouest de Saint-Sever et au milieu des forêts de Pin maritime, une propriété où il réside habituellement. C'est sur les fleurs des Alliacées et des Ombellifères de son jardin, que chaque année je trouve en juillet une quantité prodigieuse de *Cerceris*, de *Palarus*, de *Crabro*, de *Philanthus*, de *Larra* et autres Hyménoptères fouisseurs. M. Alphonse de Toulouzette, qui vous est pareillement connu, m'accompagna dans cette ex-

pédition entomologique, et ne contribua pas peu à en assurer les heureux résultats.

Les repaires du *Cerceris* furent bientôt reconnus. Ils étaient exclusivement pratiqués dans les maîtresses allées du jardin, où le sol plus battu, plus compacte à sa surface, offrait à l'Hyménoptère fouisseur des conditions nécessaires de solidité pour l'établissement de son domicile souterrain. Nous en visitâmes une vingtaine environ, et je puis le dire, à la sueur de mon front. C'est un genre d'exploitation plus long et plus pénible qu'on ne le croirait. Les nids, et par conséquent les provisions, ne se rencontrent qu'à un pied de profondeur. Aussi, pour éviter leur dégradation, il convient, après avoir enfoncé dans la galerie du Cerceris un chaume de Graminée ou une tige grêle de plante qui servent de jalon et de conducteur, d'investir la place par une ligne de sape carrée, dont les côtés soient distans de l'orifice ou du jalon d'environ sept à huit pouces. Il faut saper avec une pelle de jardin, de manière que la motte centrale, bien détachée dans son pourtour, puisse s'enlever en une ou deux pièces que l'on renverse sur le sol pour la briser ensuite avec circonspection. Telle est la manœuvre qui m'a réussi.

Vous eussiez partagé, mon ami, notre enthousiasme, à la vue des belles espèces de Buprestes que cette exploitation si nouvelle étala successivement à nos regards empressés. Il fallait entendre nos exclamations, nos acclamations, toutes les fois qu'en renversant de fond en comble la mine, on mettait en évidence de nouveaux trésors, rendus plus éclatans encore par l'ardeur du soleil, ou lorsque nous découvrions, ici des larves de tout âge attachées à leur proie, là des coques de ces larves toutes incrustées de cuivre, de bronze ou d'émeraudes. Moi qui suis un entomophile praticien, et depuis, hélas! trois ou quatre fois dix ans, je n'avais jamais assisté à un spectacle si ravissant, je n'avais jamais vu pareille fête : vous y manquiez pour en doubler la jouissance. Notre admiration, toujours progressive, se portait alternativement de ces brillans Coléoptères au discernement merveilleux, à la sagacité étonnante du Cerceris qui les avait ainsi enfouis et emmagasinés. Le croiriez-vous, sur plus de quatre cents individus de ces Co-

léoptères, l'investigation la plus scrupuleuse n'a jamais aperçu un seul fragment, le plus mince débris, qui n'appartinssent point au vieux genre Bupreste. La plus minime erreur n'a point été commise par notre savant Hyménoptère prédateur, par cet habile buprestiside. Quels enseignemens à puiser dans cette intelligente industrie d'un si petit insecte! quel prix Latreille n'aurait-il pas attaché au suffrage de ce Cerceris en faveur de la méthode naturelle! quelle critique n'y voyons-nous pas de cette manie germanique de multiplier les noms des genres en détruisant jusqu'à celui du type principal, pour surcharger la mémoire de noms plus ou moins baroques, lorsqu'on pourrait se borner à établir dans le même groupe générique des divisions pour faciliter l'étude des espèces!

Mais reprenons mes exploitations entomologiques dans la région pinicole. Jugez si notre bonheur fut grand, puisqu'elles nous fournirent neuf espèces bien tranchées du genre *Buprestis* de Fabricius, savoir :

1° *B. 8-guttata* (*Ancylocheira* Esch.). En très grande abondance, quoique jusque-là je ne l'eusse jamais trouvé dans mes chasses. Sa larve vit dans le Pin.

2° *B. flavo-maculata* (*Ancylocheira*). Quelques rares individus. Sa larve, que j'ai élevée, est parasite de ce dernier arbre résineux.

3° *B. pruni* Panz (*Agrilus* Mey.). Bien plus fréquent que dans nos collines. Je soupçonne qu'il passe son premier âge, celui de larve, dans le chêne Tauzin (*Quercus tozza* Bosc.), qui croît dans les deux régions.

4° *B. micans* (*Eurythyrea* Serv.). En petit nombre. C'est une des plus riches et des plus rares espèces de ce pays. Je crois que sa larve se nourrit dans le peuplier.

5° *B. tarda* (*Phœnops* Mey.). En assez nombreux individus. Sa larve est pinicole.

6° *B. biguttata* (*Agrilus*), dont la larve est quercicole.

7° *B. bifasciata* (*Agrilus*). Infiniment moins commun que dans les collines de Saint-Sever. J'ai déjà dit qu'à l'état de larve, il habite le bois de chêne.

8° Un seul *B. chrysostigma* (*Chrysobothris* Esch.), dont j'ai

depuis peu fait connaître les métamorphoses dans un Mémoire que je vous ai adressé. Sa larve vit dans le chêne mort. (1)

9° Enfin, plusieurs individus mutilés ou fragmentaires du *B. 9-maculata* (*Ptosima* Serv.)

Voici une petite statistique qui vous indiquera la proportion numérique de ces espèces, en vous observant que je ne porte en compte que les individus intégralement conservés, résultant de l'exploitation d'une trentaine de nids, soit dans la région pinicole, soit dans la quercicole :

B. 8-guttata	70 individus.
B. bifasciata	56
B. pruni	37
B. tarda	15
B. biguttata	12
B. micans	7
B. flavo maculata	4
B. chrysostigma	1
9-maculata	Fragmens.
Total	202 individus.

Les individus mutilés ou les innombrables fragmens, d'après un calcul fondé sur le nombre de cellules qui est de cinq par nid, et sur le nombre des Buprestes destinés à leur approvisionnement qui est de trois par cellule, sont représentés par la somme 248.

En sorte que j'ai exhumé dans les trente nids 450 individus du vieux genre Bupreste.

N'est-ce pas un fait bien curieux, bien extraordinaire, que cette collection monographique faite par notre Cerceris? Et que ne dois-je pas espérer à l'avenir, en guettant ce ravisseur, ce pourvoyeur de Buprestes, en violant son domicile en temps opportun pour m'emparer de son gibier? N'est-il pas vraisemblable que si je parviens à découvrir ses nids dans des localités peuplées d'arbres différens, je finirai par connaître et posséder

(1) Annales des Sciences naturelles, deuxième série, tome XIV, page 111.

tous les Buprestes de grande et moyenne taille qui habitent le pays? D'après cela, mon ami, vous voyez que si je veux trouver des Richards, il faut que je cherche les Cerceris, leurs implacables ennemis. C'est là une insecticeptologie d'un genre tout nouveau.

Passons maintenant aux diverses manœuvres du Cerceris pour établir et approvisionner ses nids. J'ai déjà dit qu'il choisit les terrains dont la surface est battue, compacte et solide; j'ajoute que ces terrains doivent être secs et exposés au grand soleil. Il y a dans ce choix une intelligence ou, si vous voulez, un instinct qu'on serait tenté de croire le résultat de l'expérience. Une terre meuble, un sol uniquement sableux, sont, sans doute, bien plus faciles à pénétrer; mais comment y pratiquer un orifice qui pût rester béant pour le besoin du service, et une galerie dont les parois ne fussent pas disposées à s'ébouler à chaque instant, à se déformer, à s'obstruer à la moindre pluie? Ce choix est donc rationnel ou parfaitement calculé. Notre Hyménoptère fouisseur creuse sa galerie au moyen de ses mandibules et de ses tarses antérieurs, qui à cet effet sont garnis de piquans raides faisant l'office de rateaux. Il ne faut pas que l'orifice ait seulement le diamètre du corps du mineur, il faut qu'il puisse admettre une proie bien plus épaisse que lui. C'est une prévoyance admirable. A mesure que le Cerceris s'enfonce dans le sol, il amène au-dehors les déblais, et ce sont ceux-ci qui forment le tas que j'ai comparé plus haut à une petite taupinière. Cette galerie n'est pas verticale, ce qui l'aurait infailliblement exposée à se combler, soit par l'effet du vent, soit par bien d'autres causes. Non loin de son origine, elle forme un coude qui le plus souvent m'a semblé dirigé du midi au nord pour revenir ensuite obliquement vers l'axe perpendiculaire. Elle a de sept à huit pouces de longueur. C'est au-delà de sa terminaison que l'industrieuse mère établit les berceaux de sa postérité. Ces derniers sont cinq cellules séparées et indépendantes les unes des autres, disposées en une sorte de demi-cercle, creusées de manière à avoir la forme et presque la grandeur d'une olive, polies et solides à leur intérieur. Chacune d'elles est assez grande pour contenir trois Buprestes, qui sont la ration ordi-

naire pour chaque larve. Il paraît que la mère pond un œuf au milieu des trois victimes, et bouche ensuite la cellule avec de la terre, de manière que quand l'approvisionnement de toute la couvée est terminé, il n'existe plus de communication avec la galerie.

Quand le Cerceris revient de la chasse avec son gibier entre les pattes, il met pied à terre à la porte de son logis souterrain, et l'y dépose momentanément. Il entre tout aussitôt à reculons dans sa galerie, saisit la victime avec ses mandibules et l'entraîne au fond du clapier. Je l'ai aussi surpris souvent pénétrant dans sa tannière sans aucun butin. Dans ce cas, lorsque les cellules sont en construction ou tout récemment approvisionnées, on conçoit sa présence pour des travaux avec des matériaux qu'elle trouve à pied-d'œuvre. Mais lorsque, vers la mi-août, les provisions sont consommées et les larves hermétiquement récluses dans leurs cocons, vous voyez encore entrer le Cerceris dans sa galerie sans y rien apporter. Il est évident alors que cette vigilante mère va s'assurer, par des visites réitérées, qu'aucun ennemi, qu'aucun accident ne menace ou ne dérange le précieux réceptacle de sa progéniture. Il m'est souvent arrivé de la rencontrer au fond de sa galerie vers la fin du jour, et il est probable qu'elle y passe la nuit.

J'ai constaté plusieurs fois le nombre de trois Buprestes par cellule de Cerceris; mais il est possible que pour les petites espèces comme le *tarda* et le *biguttata*, ce nombre soit plus considérable. Au reste, je suis persuadé que la différence de taille dans les individus de la même espèce d'insectes, tient en général à la quantité d'aliment consommée par les larves. Je n'entends pas parler ici de la taille respective des sexes; elle est de fondation organique.

Le *Cerceris bupresticida*, dont je n'ai pas encore eu l'occasion de suivre les manœuvres prédatrices, doit être un adroit, un intrépide, un habile chasseur. La propreté, la fraîcheur des Buprestes qu'il enfouit dans sa tannière, portent à croire qu'il les saisit au moment où ces Coléoptères sortent des galeries ligneuses où vient de s'opérer leur dernière métamorphose. L'anatomie prête son puissant appui à cette conjecture, car je

n'ai trouvé dans le canal digestif de ces Buprestes aucune substance alimentaire qui eût été puisée au-dehors. Cet organe ne contenait que ce liquide de couleur ambrée, ce méconium que l'on rencontre dans les insectes récemment transformés, et surtout dans les nymphes.

Mais quel inconcevable instinct pousse le Cerceris, qui, lui, ne vit que du pollen des fleurs, à se procurer par mille difficultés une nourriture animale pour des enfans carnivores qu'il ne doit jamais voir, et à venir se placer en arrêt sur les arbres si dissemblables qui recèlent dans la profondeur de leurs troncs les insectes destinés à devenir son inévitable proie? Quel tact entomologique plus inconcevable encore lui fait une rigoureuse loi de se renfermer, pour le choix de ces insectes, dans un seul groupe générique dont il semble l'ennemi né; pour capturer des espèces qui ont entre elles des différences considérables de taille, de configuration et de couleur? Car voyez, mon ami, combien se ressemblent peu le *biguttata* à corps mince et allongé, à couleur sombre; l'*octo-guttata* ovale-oblong, à grandes taches d'un beau jaune sur un fond bleu ou vert; le *micans*, qui a trois ou quatre fois le volume du *biguttata* et une couleur métallique d'un beau vert doré éclatant! Il m'est parfois venu à l'esprit que l'odorat, qui n'a point d'organe spécial dans les insectes, mais qu'il faut considérer physiologiquement comme une modification du toucher, contribue pour beaucoup à cette sagacité élective du Cerceris. Les Buprestes exhalent peut-être une odeur *sui generis* que notre membrane olfactive est inhabile à saisir, mais que le Cerceris, mieux doué sous ce rapport, flaire et suit à la piste.

Il est encore dans les manœuvres de notre assassin des Buprestes un fait fort singulier, analogue à celui que vous avez publié dans l'histoire déjà citée de l'*Odynerus spinipes*. Les Buprestes enterrés, ainsi que ceux dont je me suis emparé entre les pattes de leurs ravisseurs, sont toujours dépourvus de tout signe de vie; en un mot, ils sont décidément morts. Je remarquai avec surprise que, quelle que fût l'époque de l'inhumation de ces cadavres, non-seulement, comme je l'ai dit, ils conservaient toute la fraîcheur de leur coloris, mais ils avaient les

pattes, les antennes, les palpes et les membranes qui unissent les parties du tronc parfaitement souples et flexibles. On ne reconnaissait en eux aucune mutilation, aucune blessure apparente. On croirait d'abord en trouver la raison, pour ceux qui sont ensevelis, dans la température fraîche des entrailles du sol dans l'absence de l'air et de la lumière, et, pour ceux enlevés aux ravisseurs, dans une mort très récente. Mais observez, je vous prie, que lors de mes exploitations, après avoir placé isolément dans des cornets de papier les nombreux Buprestes exhumés, il m'est souvent arrivé de ne les enfiler avec les épingles qu'après trente-six heures de séjour dans les cornets. Eh bien! malgré la sécheresse et la vive chaleur de juillet, j'ai toujours trouvé la même flexibilité dans leurs articulations. Il y a plus, c'est qu'après ce laps de temps, j'ai disséqué plusieurs d'entre eux, et leurs viscères étaient aussi parfaitement conservés que si j'avais porté le scalpel dans les entrailles encore vivantes de ces insectes. Or, une longue expérience m'a appris que, même dans un Coléoptère de cette taille, lorsqu'il s'est écoulé douze heures depuis la mort en été, les organes intérieurs sont ou desséchés ou corrompus, de manière qu'il est impossible d'en constater la forme et la structure. Il y a donc dans les Buprestes mis à mort par le Cerceris quelque circonstance particulière qui les met à l'abri de la dessiccation et de la corruption pendant une ou peut-être deux semaines? Voyons si nous pourrions arriver à la solution de cette question.

J'ai observé que quelques-uns de ces Buprestes, un petit nombre à la vérité, avaient la tête déviée sur un côté et comme luxée. J'étais d'autant plus porté à attacher quelque importance à ce fait, que je venais d'être témoin du suivant. Dans le même temps où j'exploitais les mines de Buprestes, je rencontrai plusieurs nids de *Palarus flavipes* approvisionnés, comme je vous l'ai déjà dit, avec des espèces et des genres très variés d'Hyménoptères. Ceux-ci, morts, mais flexibles dans leurs articulations, avaient tous, sans exception, la tête tordue comme si on les avait étranglés; et pour peu qu'on les maniât sans précaution, ils se décapitaient facilement. Vous le savez, dans les Hyménoptères, la tête, très mobile, n'est unie au prothorax que par un

pédicelle, un col fibro-membraneux; en sorte qu'il n'est pas difficile au *Palarus* de la tordre avec violence, de la luxer. Cette sorte de strangulation amène inévitablement la lésion intérieure du cordon nerveux qui unit le ganglion céphalique au premier ganglion thoracique. Par l'effet de cette lésion, l'innervation est interceptée, il y a perte absolue de la sensibilité, ce qui détermine à l'instant une paralysie générale suivie tout aussitôt de la mort. C'est absolument comme ce qui arrive dans les grands animaux par la blessure profonde ou la section de la moelle épinière entre la première vertèbre cervicale et le trou occipital. Je suis donc très porté à croire que le Cerceris occasionne la mort prompte du Bupreste en piquant avec son dard vénénifère sa moelle épinière entre la tête et le prothorax. Ce genre d'assassinat est sans doute rendu plus exécutable au moment où ce Coléoptère s'efforce de sortir de son étroite prison, ce qui rend sa défense et même ses mouvemens impossibles. Il me reste à constater *ex visu* ce meurtre et ses circonstances, ce qui n'est pas facile.

Abordons le phénomène, tout aussi digne de nos recherches, de l'incorruptibilité du cadavre. Dans votre intéressant Mémoire sur l'*Odynerus spinipes*, vous avez observé, ainsi que Réaumur, ainsi que moi-même, que les Chenilles destinées par l'Odynère à la nourriture de ses larves, avaient la faculté de se conserver fort long-temps fraîches et, dites-vous, dans un état de léthargie. Vous avez même acquis la certitude que cet état d'engourdissement peut se prolonger près d'une année, ce qui est un fait inouï. Vous pensez que le ravisseur peut bien inoculer aux Chenilles une liqueur conservatrice, et vous observez judicieusement qu'il était de toute nécessité que ces dernières fussent inertes ou paralysées, car les jeunes et tendres larves deviendraient, sans cette condition, infailliblement leur victime. Cette explication est parfaitement applicable à nos Buprestes et à nos larves de Cerceris, toutefois avec cette circonstance que ces Buprestes sont bien positivement morts.

La femelle du Cerceris, comme celles de l'immense majorité des Hyménoptères, est pourvue d'une glande vénénifique composée de vaisseaux sécréteurs, d'un réservoir et d'un canal ex-

créteur qui aboutit à un dard rétractile placé dans le voisinage de l'anus. Vous aurez pu voir, dans mes Recherches sur l'anatomie des Hyménoptères (1), les formes et la composition aussi variées que parfois élégantes de cet organe. Mais croyez-vous que cet appareil se borne à être une arme offensive, et ne pensez-vous pas avec moi que le liquide subtil qu'il excrète peut avoir cette précieuse qualité conservatrice dont il vient d'être question? Pour moi, j'ai cette conviction intime. Il serait bien curieux que l'analyse chimique pût s'exercer sur cette liqueur, et surtout qu'on parvînt à composer un aussi puissant antiseptique. Malgré les découvertes de M. Gannal sur la conservation des chairs, on pourrait peut-être tirer parti de l'observation fournie par nos Hyménoptères.

Je crois avoir épuisé, mon ami, et l'industrie et les hauts faits de notre précieux ravisseur des Buprestes; il sera temps de vous en exquisser les métamorphoses. Je vous ai déjà dit que, dans chaque cellule souterraine du Cerceris, il y avait une larve avec sa ration de trois Buprestes. Voici le signalement de cette larve parvenue au dernier degré de son développement :

LARVA apoda, cephala, brevi antennata, elongata, albida; subglabra, anticè attenuata, incurvo, hamata; segmento postico paulò angustiore, oblongo. Long. 6-lin. (Pl. 11 A, fig. 3).

Il lui faut peu de jours (sept ou huit) pour arriver au terme de son accroissement. Sa forme est remarquable, ainsi que dans beaucoup d'Hyménoptères fouisseurs, par la courbure en hameçon de la partie antérieure du corps, courbure qui comprend les trois segmens constitutifs du thorax. Ceux-ci sont plus étroits que les suivans. La tête, dans cette situation, regarde en arrière, ainsi que l'exprime la figure ci-jointe (Pl. 11 A, fig. 3). Mais quand l'animal est inquiété ou qu'il marche, il s'allonge et devient droit. Le corps se compose de treize segmens bien distincts, sans compter la tête. Ces segmens paraissent glabres à l'œil nu ou même à la loupe simple, mais au microscope ils sont couverts

(1) Ce travail, dont l'impression est terminée, paraîtra très prochainement dans le VII^e^ volume des *Mémoires des Savans étrangers*, publiés par l'Académie des Sciences. (RÉD.)

d'un duvet très fin et fort court. Le dernier est rétréci en une sorte de queue oblongue, et ce trait distingue surtout la larve du Cerceris de celle du *Palarus*, qui, avec la même taille, la même configuration générale, a ce dernier segment arrondi et non saillant.

La tête de notre larve, au lieu d'être enfoncée dans le premier segment du corps, comme on le voit dans plusieurs Hyménoptères, est au contraire dégagée de tous côtés, mobile, avec le contour occipital apparent. Elle est ovale-arrondie, tronquée en avant, et de texture un peu cornée. On y voit un *chaperon* transversal subquadrilatère, un *labre* demi circulaire, et de chaque côté de la face une *antenne* fort petite, rudimentaire, d'une seule pièce, constatable seulement avec le secours des verres amplifians, et placée au centre d'un point obscur qui pourrait en imposer pour un œil. Les *mandibules* sont cornées, d'un brun clair, assez longues, acérées, susceptibles d'un grand écartement, et munies d'une petite dent près de leur pointe. Les autres parties qui composent la bouche ont un développement remarquable, et peuvent, au gré de l'animal, exécuter des mouvemens assez étendus de protraction et de rétraction. Vous verrez bientôt qu'elles ne servent pas seulement à la manducation. Les *máchoires* sont deux pièces ovales-oblongues, semblables, à cause de leur texture contractile, à un mamelon, et terminées par un *palpe* rudimentaire d'une seule pièce. Le microscope y découvre quelques aspérités piliformes. La *lèvre*, susceptible de s'avancer au niveau des mâchoires, ressemble à celles-ci par la forme et la grandeur. Elle se termine par deux points saillans qui sont les vestiges des *palpes labiaux*.

La larve du Cerceris attaque ordinairement par la bouche les Buprestes qui lui sont destinés, et, une fois la brèche pratiquée, elle s'insinue dans les cavités splanchniques de sa victime dont elle dévore les viscères. L'atténuation et la courbure de la partie antérieure du corps lui servent admirablement pour cela. Elle a déjà pris un grand développement lorsqu'elle consomme le Bupreste de son dernier repas, et il n'est pas rare de la trouver alors entraînant autour de son corps le prothorax ou quelque anneau de l'abdomen du Coléoptère.

Avant d'avoir découvert le cocon de la larve du Cerceris, la dissection de celle-ci m'avait déjà appris qu'elle devait en fabriquer un, puisque je lui ai reconnu des glandes sérifiques très développées et rameuses. Parmi les nombreuses larves de tout âge que j'ai exhumées et transportées vivantes dans mon laboratoire pour les étudier, j'ai été assez heureux pour constater la manière dont elles procèdent à cette fabrication. J'en ai surpris qui, émettant leur fil par la bouche, le dirigeaient dans tous les sens, soit par la grande mobilité de la tête, soit à la faveur du concours des mâchoires et de la lèvre, qui, par leur souplesse, leur faculté de se porter en avant, et les imperceptibles aspérités de leur surface, déploient une aptitude singulière à disposer les fils pour tisser l'étoffe du cocon. Voici le signalement de celui-ci :

Folliculus sericeo-membranaceus, pallidè rufescens, oblongus, lageniformis, posticè rotundatus, anticè in collum, apice truncatum occlusum attenuatus. Long. 6 lin.

Ce cocon est presque toujours revêtu en dehors par de la terre et par de brillantes dépouilles de Buprestes qui y sont incrustées. Cette enveloppe accessoire, mais qui a aussi une destination protectrice, masque la force réelle de ce berceau du Cerceris. Quand on l'a bien mis à nu en le nettoyant avec la pince et le pinceau, on voit qu'il est ovale-oblong, pyriforme ou plutôt semblable à ces capsules à goulot dont le chimiste se sert pour les placer au bain de sable. Le couvercle qui ferme le col est plane. Le tissu de ce cocon est mince, serré, lisse et glabre, soit en dehors, soit en dedans, comparable à de la pelure d'oignon, assez résistant et scarieux, c'est-à-dire résonnant au toucher. Il est blond ou d'un roux pâle.

Je devrais à présent, pour compléter l'histoire des métamorphoses du Cerceris, vous parler de sa nymphe, mais j'ai vainement attendu deux mois cette transformation. L'observation vous a appris, ainsi qu'à moi, que dans un très grand nombre d'Hyménoptères, l'état de nymphe est ajourné à l'été de l'année suivante. C'est donc une lacune que je remplirai plus tard.

Dans la coque du Cerceris, comme dans celle de l'Odynère

je trouve en ce moment une larve engourdie, contractée et vouée à un jeûne austère d'environ onze mois de durée. Ce second âge de la larve présente des différences notables avec celui où elle prend de la nourriture et de la croissance. Sa couleur est d'un jaune soufré, et ses anneaux sont tellement contractés, que le corps est tétraèdre et garni de quatre séries longitudinales de tubercules triangulaires. Elle est toujours courbée en hameçon, mais la tête est plus appliquée contre la poitrine, les mandibules sont condamnées au repos, et les mâchoires ainsi que la lèvre retirées et invisibles. La tête de la larve correspond au gros bout du cocon.

Il y a dans la mission innée du Cerceris, de placer à une si grande profondeur du sol les berceaux de sa progéniture, un instinct presque sublime. Cette profondeur est l'indice que les larves devaient passer toute la mauvaise saison dans leurs clapiers. Ne croirait-on pas que la sollicitude maternelle de ce faible insecte a eu pour but, dans ses travaux souterrains, de prémunir le corps délicat et l'existence passive de ses larves incarcérées, contre les glaces et les inondations de l'hiver? Et cependant la nature, dont il faut respecter jusqu'à ses rigueurs ou ses injustices apparentes, a dénié à cette mère si soigneuse le bonheur de voir, de connaître ses enfans! et cependant l'expérience n'a pas appris au Cerceris qu'il devait exister un hiver et des frimas, puisqu'il vient au monde à l'époque des plus fortes chaleurs de l'été, puisque après avoir satisfait à l'impérieuse loi de la reproduction de l'espèce, et avoir réglé les destinées actuelles et futures de sa famille, l'individu meurt avant la cessation de la température élevée! O sagesse infinie, il ne nous est pas donné de pénétrer la portée de tes desseins.

Comme vous ne le voyez que trop, mon ami, ma lettre, par l'inspiration et l'entraînement du sujet, a pris, sans le vouloir, la forme d'un long mémoire ou d'une dissertation. Vous comprenez, vous excusez une semblable extension, de semblables écarts, quand il s'agit de dérouler des faits aussi curieux. Je n'ai pas encore mis un terme à votre patience, et il me reste à vous faire connaître, par une description succincte, le héros de la pièce, le désormais célèbre Cerceris.

Cerceris bupresticida. Pl. 11 A, fig.
Cerceris bupresticide.

Atra punctata, vix pubescens; facie albido-subsericea; thorace immaculato; abdominis fasciis quatuor dorsalibus, faciei maculis tribus, tegulis, pedibusque flavis; femoribus dimidiatim nigris; crista inter antennas integra; alis apice nigro fumosis. Long. 6 lin. Sic fœmina.

Mas paulò minor; antennis 13-articulatis; tarsis anticis haud rastellatis; abdominis segmento ventrali penultimo utrinque unispinoso.

Hab. æstate in floribus Galliæ meridionali-occidentalis (S. Sever) et Hispaniæ.

La plupart des espèces de Cerceris ont des taches soit au corselet, soit à l'écusson, tandis que dans le bupresticide, ces parties sont tout-à-fait noires, ainsi que le premier segment nodiforme de l'abdomen. Ce dernier est noir en dessous. La première bande jaune du dos a une petite échancrure en arrière, comme si elle résultait de la confluence de deux taches; les autres en ont une large en devant, et la seconde est bien plus distante de la première que des suivantes. Il n'est pas rare que les cuisses, surtout les postérieures, soient noires avec leur extrémité seule jaune. Le mâle est fort rare.

EXPLICATION DES FIGURES.

PLANCHE 11 A.

Fig. 1. *Cerceris bupresticida* femelle, avec la mesure de sa longueur naturelle placée à côté.

Fig. 2. Tête détachée et vue de face.

Fig. 3. Larve de ce Cerceris, avec la mesure de sa longueur naturelle placée à côté.

Fig. 4. Tête considérablement grossie de cette larve, pour mettre en évidence les antennes, les mandibules, le chaperon, le labre, les mâchoires et la terre.

Fig. 5. Un cocon grossi de cette larve.

Fig. 6. Etat particulier de la larva renfermée dans le cocon et vue en trois quarts sa face inférieure.

NOTE *sur les mœurs du* CANARD EIDER (*Anas mollissima* Latham), *et sur des moisissures développées, pendant la vie, à la surface interne des poches aériennes d'un de ces animaux,*

Par M. EUDES DESLONGCHAMP.

(Lettre adressée à M. AUDOUIN, le 16 octobre 1840, et communiquée à l'Académie des Sciences le 24 juin 1841.)

Je viens d'observer une matière végétale parfaitement caractérisée, développée à la surface d'une membrane animale, et dont le développement a eu lieu, à n'en pas douter, pendant la vie de l'oiseau qui a présenté ce singulier phénomène.

Cette observation a piqué d'autant plus vivement ma curiosité, que je ne connaissais rien de semblable dans les animaux vertébrés, et que, d'un autre côté, l'établissement d'un végétal vivant sur un animal vivant, me semble un fait de nature à intéresser au plus haut point la physiologie générale et la philosophie naturelle.

La Muscardine, dont vous avez fait connaître la nature, et dont vous avez décrit si exactement les divers modes de reproduction et de transmission, est sans doute, en tant que végétal enté sur un animal, un phénomène de même ordre que les moisissures développées à l'intérieur des poches aériennes de mon Eider; mais je ne crois pas qu'il y ait, dans les deux cas, identité parfaite, ou, pour parler le langage des naturalistes, que ces deux phénomènes soient de la même espèce.

Au reste, vous en jugerez beaucoup plus sainement que je n'ai pu le faire moi-même, si vous voulez bien prendre connaissance des remarques suivantes, ainsi que des dessins et des pièces qui les accompagnent.

Je tracerai en peu de mots l'historique de mon Eider, et les symptômes qui ont précédé sa mort; mais avant de présenter

ces détails, je ferai connaître quelques particularités relatives aux Eiders de nos côtes.

Pendant la saison rigoureuse, les pêcheurs de notre côte (1) tendent, à marée basse, de grands filets de forme carrée, qu'ils maintiennent dans une position horizontale et à une certaine distance de la surface du sable, pour prendre sous cet appareil, lors du retour du flot, certains oiseaux Palmipèdes, tels que Milouinans, Macreuses, Morillons, etc., qui se nourrissent particulièrement de Donaces et autres petits Mollusques vivant dans le sable. Ces oiseaux plongent obliquement pour chercher dans le sable leur nourriture; en revenant à la surface de l'eau afin de respirer, ils sont arrêtés par le filet sous lequel ils se sont engagés : les Eiders, que l'on voit quelquefois sur nos côtes, viennent se faire prendre sous ces sortes de filets. Lorsque les pêcheurs vont, à mer basse, visiter leurs appareils, ils y trouvent presque constamment les Milouinans et les Macreuses noyés; les Eiders, au contraire, s'y rencontrent presque toujours vivans, et ils échapperaient très aisément à l'investigation des pêcheurs, si ceux-ci n'y regardaient de très près. Voici comment les Eiders parviennent à se cacher : Quand il ne reste presque plus d'eau sur le sable où est situé le filet qui le retient prisonnier, l'oiseau se met à piétiner rapidement sur la place où il se trouve; pendant cette opération, le sable fuit pour ainsi dire sous ses pieds; une fosse se creuse, l'oiseau s'y enfonce de plus en plus, et bientôt le sable, suspendu par l'eau, revient sur le dos de l'Eider, qui finit par s'ensabler si bien, qu'il ne reste dehors que la mandibule supérieure et le sommet de la tête. Je tiens ces renseignemens du garde-pêche de la côte d'Ouistreham, homme fort intelligent, qui m'a déjà fourni quelques faits curieux touchant les habitudes des poissons et des oiseaux qui fréquentent nos côtes.

Au mois de décembre dernier, on donna à l'un de mes amis, M. le docteur Blot, qui habite la campagne à peu de distance de la mer, un Eider vivant, qui venait d'être pris dans un filet à Macreuses. Son plumage annonçait une femelle ou un jeune

(1) Celle du Calvados. R.

mâle. Il n'était nullement farouche. On lui présenta du pain trempé destiné pour les poules; il se mit à manger sans hésiter, sans regarder autour de lui. On lui coupa quelques plumes des ailes pour qu'il ne pût s'envoler, et on le laissa aller dans la basse-cour avec d'autres Canards, Oies, Poules, etc. Il fut bientôt accoutumé à ses nouveaux compagnons; il se montrait même tyran de ses congénères les Canards, les poursuivant à coups de bec lorsqu'ils avaient attrapé quelque pitance qu'il convoitait. Il mangeait de tout, pain, viande, vidanges de volailles, limaçons, légumes cuits, etc.; lorsqu'il avait saisi quelque chose, il courait vite à la mare, où il trempait, avant de le manger, tout ce qu'il avait pris. Il était presque toujours à l'eau. Lorsque la mare fut gelée, on cassa la glace pour qu'il pût se baigner; quand il était las de plonger et de barboter, il montait sur un glaçon, s'y accroupissait tout à plat, et paraissait se complaire dans cette position.

Au printemps suivant, il changea de plumage, mais incomplètement; les nouvelles plumes étaient noires sous le ventre et gris-cendré sur la tête; on put juger alors que c'était un jeune mâle : il n'a jamais manifesté de passion pour les Canes.

Trois semaines ou un mois avant sa mort, il paraissait moins actif qu'à l'ordinaire; il mangeait moins et n'allait presque plus à la mare. On le voyait souvent alors allonger le cou, étaler ses ailes, comme s'il eût respiré difficilement; bientôt cette gêne de la respiration fut très manifeste : le pauvre animal appuyait à terre l'extrémité de ses ailes étendues, et faisait de grands efforts pour faire pénétrer l'air dans sa poitrine. En tenant l'oiseau entre les mains, on sentait facilement les fortes contractions musculaires qu'il exerçait pour dilater ses cavités aériennes. On s'aperçut également qu'il était devenu fort maigre de très gras qu'il était auparavant.

Le 2 juillet 1840, M. Blot, n'apercevant point son Eider dans la cour, le trouva mort dans l'endroit où il se retirait ordinairement pendant la nuit. *Il était encore chaud.* Il me fut envoyé le jour même (1), et je procédai immédiatement à sa dissection.

(1) J'avais manifesté à M. Blot le desir de disséquer son Eider en cas qu'il vint à mourir,

Comme mon but était d'étudier le cœur et les gros vaisseaux, et de reconnaître les particularités qu'ils pourraient présenter, j'employai toutes précautions pour ne déranger aucuns rapports. Les sacs aériens furent largement ouverts. Je fus fort surpris de trouver leurs parois tapissées de nombreuses plaques de moisissures. La plupart de ces plaques étaient circulaires, relevées en saillie, surtout en leur centre (Pl. 11 B, fig.....); il y en avait de diverses grandeurs, depuis 2 ou 3 millimètres jusqu'à quelques centimètres; les plus grandes avaient une circonférence irrégulière et résultaient manifestement de la confluence de plusieurs plaques voisines dont les centres saillans laissaient deviner les points où elles s'étaient primitivement et isolément développées. Quoique plus nombreuses sur les parois du thorax, les plaques de moisissures se montraient partout où la membrane séro-muqueuse des cavités aériennes se prolonge; ainsi il y en avait sur les reins, sur les intestins, sur les os du bassin, dans les prolongemens des sacs aériens qui se rendent aux membres antérieurs; mais il n'y en avait point à la surface externe du péricarde, ni sur les gros vaisseaux; il n'y en avait pas non plus dans la trachée-artère, ni dans le larynx inférieur; mais ceux des canaux bronchiques, qui traversent directement les poumons pour s'ouvrir dans les sacs aériens, en étaient couverts. Les canaux du côté gauche étaient tout tapissés de moisissures déjà anciennes et en pleine maturité, car leurs sporules étaient très développées, fortement colorées en vert sale, et réunies en capitules portés sur des filamens droits. Il n'en était pas ainsi des canaux bronchiques droits, dont les moisissures paraissaient très récentes et sans teinte verdâtre (1). Il ne m'a pas paru que celles des ramifications bronchiques qui se terminent dans la substance des poumons fussent affectées de moisissures; du

pour m'assurer s'il n'y aurait pas quelque disposition particulière dans les organes de la respiration, me fondant sur la faculté qu'auraient les Eiders, au dire des pêcheurs, de rester sous l'eau plus long-temps que les autres canards.

(1) Il est à croire que la respiration, quoique gênée, par la présence des moisissures dans les canaux du côté gauche, se faisait encore suffisamment pour entretenir la vie, tant que ceux du côté droit n'ont pas été affectés; mais, aussitôt qu'ils sont devenus le siège de la moisissure, l'animal est mort asphyxié.

moins les poumons, quoique un peu gorgés de sang, étaient perméables à l'air insufflé, surnageaient étant plongés dans l'eau, et n'offraient ni tubercules, ni ulcérations. D'après l'état de maturité avancée des moisissures des bronches gauches, je serais porté à croire que c'est dans ce point que l'affection a paru d'abord, et que de là elle s'est propagée de proche en proche, vu que les sacs aériens du côté gauche contenaient des plaques plus nombreuses et plus grandes que ceux du côté droit.

La membrane qui sert de séreuse aux parois du thorax et de l'abdomen, ainsi qu'aux organes contenus dans ces cavités, et qui est en même temps un prolongement de la muqueuse, de la trachée-artère et des bronches, était, sous les plaques larges et anciennes de moisissures, épaissie, rouge et assez fortement injectée de sang. Je détachai, par la dissection, un lambeau assez considérable de cette séro-muqueuse, et le plaçant par sa face externe sur un corps arrondi, afin d'étudier plus aisément les moisissures, je reconnus que l'on pouvait facilement enlever les plaques tout entières : une couche jaunâtre, résistante, très mince à la circonférence, et d'autant plus épaisse au centre qu'elle appartenait à des moisissures plus anciennes et plus largement étendues, était interposée entre la surface de la séro-muqueuse et les petites Cryptogames auxquelles elle servait pour ainsi dire de sol. L'adhérence de la couche jaunâtre à la membrane, quoique intime, ne m'a paru ni celluleuse, ni vasculaire, mais résulter de la juxtaposition de deux surfaces finement granuleuses, à configuration réciproque; mode d'adhérence qui a beaucoup de rapport avec celui de la membrane épidermique de l'intérieur du gésier des oiseaux, et qui se détruit de la même manière.

Ces couches jaunâtres m'ont paru n'avoir aucune organisation : mises dans l'eau bouillante et dans l'acide azotique, elles ne s'y sont point dissoutes; elles me semblent de nature albumineuse, enfin de véritables fausses membranes, développées par suite de l'irritation de la membrane vasculaire et vivante à laquelle elles adhèrent, et sécrétées par elles.

Sous les grandes plaques de moisissures, la membrane séro-muqueuse était à-peu-près uniformément rouge et épaissie.

Sous les petites, on voyait, vers le centre, un réseau vasculaire fort développé, entouré d'une zône où les vaisseaux s'apercevaient à peine; en dehors de la zône, les ramifications vasculaires redevenaient visibles, mais moins serrées qu'au centre. La couche albumineuse mytifère ne dépassait point la circonférence extérieure de la zône. (Voyez la figure 2, qui représente grossi un fragment de la *séro-muqueuse*, sur laquelle était une plaque de moisissure d'environ trois millimètres de diamètre. La couche albumineuse de cette plaque est représentée, également grossie, figure 3, par sa surface adhérente.)

Les moisissures étaient d'un blanc mat sur les petites plaques; les grandes étaient, dans leur centre, d'une couleur cendrée verdâtre assez irrégulièrement distribuée; le reste était blanc (voyez figure 1). Étudiées à la loupe et au microscope, elles paraissent consister en des filamens transparens, non articulés, peu ou point ramifiés, formant un feutrage inextricable d'autant plus serré et à filamens d'autant plus fins, qu'on les examine plus près de la couche albumineuse qui leur sert de soutien, et où ils ont à peine $\frac{1}{300}$ de millimètre de diamètre, tandis qu'à la surface externe de la plaque, ils ont presque le double. Partout, dans cette masse feutrée, existent en quantité immense de petites vésicules globuleuses ou ovoïdes, d'un diamètre égal à celui des filamens : ce sont sans doute des sporules. Elles sont blanches sur les parties blanches, et d'un cendré verdâtre sur celles de cette couleur. Dans les portions les plus serrées du feutre, ces sporules en remplissent les interstices; là où les filamens sont moins serrés, les sporules sont rangés à la file les uns des autres, tantôt d'un seul côté, tantôt des deux côtés opposés de chaque filament. Sur un petit nombre de plaques de moisissures les plus anciennes, un certain nombre de filamens, redressés, étaient isolés du feutre, et se terminaient par une agglomération arrondie de sporules verdâtres (fig. 4, *c*, *c*). En soumettant à un fort grossissement ces filamens redressés, j'ai vu, parmi ceux qui soutenaient des sporules capitulés, d'autres terminés par un disque aplati, bordé (fig. 4, *d*, *d*), qui m'a paru être le mode de terminaison des filamens, devenu apparent par la chute des sporules. J'ai vu encore ceux-ci [illegible]

semblés et formant des mailles irrégulières à la surface des plaques de moisissures (fig. 5), ou bien des masses cylindroïdes (fig. 6).

Quelque soin que j'aie mis à chercher si les filamens envoyaient des fibres radiculaires dans l'épaisseur de la couche albumineuse, en coupant celle-ci perpendiculairement ou parallèlement à son épaisseur, je n'ai pu voir rien de précis à cet égard.

N'ayant jamais fait d'étude approfondie des moisissures, je ne sais si l'espèce dont je parle est nouvelle ou déjà décrite. J'eusse perdu un temps considérable à la chercher dans les descriptions des mycographes, et il est fort probable que je serais resté dans l'incertitude sur sa détermination spécifique. J'ai dû me contenter de décrire et de figurer de mon mieux cette petite Cryptogame. Les hommes spéciaux prononceront.

Quelques questions se présentent naturellement à l'esprit touchant le genre de relations que doivent avoir les moisissures avec la fausse membrane qui les supporte. Se sont-elles développées après la sécrétion de celle-ci, trouvant là, comme par hasard, une matière d'origine organique, mais non vivante, et analogue à celles sur lesquelles elles se développent si fréquemment à l'air libre? Les moisissures ont-elles précédé la formation de la fausse membrane, qui ne se serait produite que par suite de l'irritation, plus ou moins longue, excitée à la surface de la membrane normale et vivante par les radicelles des moisissures? ou bien les moisissures et la fausse membrane se sont-elles propagées simultanément?

Ce dernier mode, ou la coïncidence dans le développement, me paraît être l'expression du phénomène. En effet, 1° je n'ai aperçu sur aucun point la moindre trace de fausse membrane qui ne fût déjà toute couverte de moisissures plus ou moins avancées; 2° je n'ai pas vu non plus le moindre vestige de moisissure qui ne fût séparé de la surface vasculaire par une fausse membrane, et l'épaisseur de celle-ci était toujours en rapport avec l'étendue et l'état plus ou moins avancé de la Cryptogame.

De l'exclusion des deux modes précédens, il me paraît résulter

que lorsqu'une sporule de moisissure, ou toute autre cause propagatrice de cette végétation singulière, s'est fixée à la surface de la membrane vivante, le lieu excité est devenu aussitôt le siège du dépôt d'un point albumineux sur lequel la moisissure a commencé à s'accroître; celle-ci, étendant ses fibrilles vers une circonférence indéfinie, a entraîné, de la part de la séro-muqueuse, la formation d'une fausse membrane dont l'extension a été la même que celle de la plante. De nouvelles couches albumineuses s'ajoutant, par-dessous, aux premières formées, et les dépassant successivement, explique la plus grande épaisseur du centre des couches.

Il me paraît certain également que la substance végétale n'a nulle part de connexion immédiate avec le tissu animal vivant; il n'y a pas de soudure, greffe ou prolongement de l'une à l'autre, pas plus qu'implantation de l'une dans l'autre. L'interposition d'une matière animale non vivante, du moins comme une membrane normale vasculaire, paraît donc être nécessaire pour que la matière végétale ait pu prendre naissance et s'accroître. C'est surtout en cela que les moisissures dont je parle me paraissent s'éloigner de la Muscardine, car, si je ne me trompe, il résulterait des recherches de M. Audouin qu'elle se développe sans intermédiaire sur le tissu animal. (1)

La rareté du fait, sujet de mon observation, paraîtrait donc tenir plutôt à la difficile réunion de circonstances propres à favoriser la formation de fausses membranes sur une membrane vivante en contact avec l'air, *sous l'influence de l'excitation déterminée par des sporules de moisissures*, qu'à toute autre raison physiologique ou pathologique. Les grandes cavités aériennes des oiseaux dont les parois sont distantes et presque toujours libres de tout contact, offrent cependant les conditions les plus favorables; mais comment se fait-il que les oiseaux de basse-cour, par exemple, ne soient point atteints de moisis-

(1) La Muscardine ou plutôt la Cryptogame, qui constitue cette maladie se développe par ses radicelles, ou, pour parler plus exactement son thallus, qui croît au-dessus du tissu graisseux, en détruisant ses globules, finit par en occuper toute la place, ce qui amène la mort subite du Ver à soie et la solidité de son cadavre. V. Aud.

sures (1), eux qui séjournent dans des lieux où ces productions végétales sont abondantes, qui avalent souvent des corps qui en sont tout couverts, eux enfin dont les voies aériennes doivent être si fréquemment exposées au contact des sporules suspendus dans l'air?

L'influence de notre climat, méridional relativement aux pays qu'habitent les Eiders, est sans doute entrée comme élément essentiel de l'affection éprouvée par mon oiseau; mais il est impossible, je crois, de bien déterminer la part qui lui revient. Au reste, si l'influence du climat est aussi réelle qu'il le paraît, on pourrait aisément s'en assurer dans les établissemens où l'on élève et conserve des oiseaux étrangers; nul, à coup sûr, n'est plus propice à cette constatation que le Jardin du Roi.

EXPLICATION DES FIGURES.

PLANCHE 11 B.

Fig. 1. Morceau de la séro-muqueuse costale, sur lequel se voient plusieurs plaques de moisissure à divers degrés de développement.

Fig. 2. Fragment de la séro-muqueuse très grossi, sur lequel existait une plaque de moisissure (enlevée) d'environ trois millimètres de diamètre. On voit en son milieu une surface où les vaisseaux sont très injectés, bordés par une zône où les vaisseaux ne sont plus apparens. En dehors de la zône, les vaisseaux de la membrane sont de nouveau visibles, mais moins injectés et moins nombreux qu'au centre. La surface de ce fragment de membrane est couverte de granulations, qui correspondent aux enfoncemens de la couche albumineuse.

Fig. 3. Couche albumineuse détachée du fragment de membrane, représenté fig. 2, vue par sa surface externe ou celle correspondante à la séro-muqueuse, elle est également couverte de granulations.

Fig. 4. Petit buisson de moisissures considérablement grossies. — *a*, *a*. Coupe de la couche albumineuse ou fausse membrane; *b*, *b*. filamens blancs, feutrés, dont les interstices sont remplis de sporules blanches; *c*, *c*. sporules verdâtres, réunies en capitule au sommet des filamens redressés; *d*, *d*. sommet de ceux-ci dépouillé de sporules?

Fig. 5. Sporules agglomérées, formant des mailles irrégulières à la surface des plaques de moisissures.

Fig. 6. Sporules agglomérées en masses cylindroïdes, répandues à la surface des plaques.

(1) Au reste, il me paraît impossible d'admettre que de pareilles épigénies soient aussi rares que le silence des observateurs pourrait le faire croire. On néglige presque toujours de rechercher, par la dissection, la cause de la mort d'animaux sur lesquels la médecine vétérinaire n'a pas de prétentions. Le hasard seul amène des découvertes analogues à la mienne.

PROGRAMME *des prix relatifs à la zoologie, proposés par l'Académie des Sciences de Bruxelles pour le concours de* 1842.

§ 1.

« Faire la description des Coquilles et des Polypiers fossiles des terrains ar-
« doisier, anthraxifère et houiller de la Belgique, et donner l'indication précise
« des localités et des systèmes de roches dans lesquels ils se trouvent. »

§ 2.

« Faire la description des Coquilles et des Polypiers fossiles des terrains ter-
« tiaires de la Belgique, et donner l'indication précise des localités et des sys-
« tèmes de roches dans lesquels ils se trouvent. »

Dans les réponses aux deux questions qui précèdent, la synonymie des espèces déjà connues devra être soigneusement établie, et la description des nouvelles espèces accompagnée de figures.

§ 3.

La théorie de la digestion a acquis un caractère tout positif, après les belles recherches chimiques que la science possède déjà sur le chyme, il serait à desirer que ce dernier fût soumis à une investigation microscopique plus détaillée.

L'Académie propose donc :

« 1° De faire des recherches microscopiques approfondies sur les parties qui
« composent le chyme, en général ;

« 2° D'établir les rapports qui existent entre ces parties et certains alimens,
« tels que l'albumen, la gélatine, le lait et ses produits, l'amidon, etc. »

L'Académie propose dès à présent, pour le concours de 1843, les questions suivantes :

§ 1.

Le gonflement et l'affaissement alternatifs du cerveau et de la moelle épinière, isochrones avec l'inspiration et l'expiration, ne sont pas encore suffisamment expliqués. L'Académie demande :

« 1° Quelle est la cause immediate de ce phénomène ?

« 2° Quelle est, en général, l'influence de la respiration sur la circulation
« veineuse ?

§ 2.

« Faire la description des Coquilles fossiles du terrain crétacé de Belgique, « et donner l'indication précise des localités et des systèmes de roches dans les- « quelles elles se trouvent. »

Le prix de chacune de ces questions sera une médaille d'or de la valeur de six cents francs.

Les Mémoires doivent être écrits lisiblement en latin, français ou flamand, et seront adressés, francs de port, avant le 1er février 1842, à M. QUETELET, secrétaire perpétuel de l'Académie.

PUBLICATIONS NOUVELLES.

OBSERVATIONS *sur les Ascidies composées des côtes de la Manche*, par M. MILNE EDWARDS. 1 vol. in-4° avec 8 planches.

Ce travail, dont un extrait a été inséré dans le treizième volume des Annales, est divisé en deux parties. Dans la première, l'auteur expose ses recherches, 1° sur la circulation chez les Ascidies composées, 2° sur le mécanisme de la respiration, 3° sur les organes de la génération et les zoospermes, 4° sur le développement de l'œuf et des larves de ces animaux, 5° sur leur multiplication par bouture. Dans la seconde partie, M. Milne Edwards fait l'application des faits précédemment exposés à la classification des Ascidies en général, et décrit les principales espèces qui habitent les côtes de la France.

HISTOIRE *naturelle des Infusoires*, par M. F. DUJARDIN, doyen de la Faculté des Sciences de Rennes. 1 vol. in-8° avec atlas de 22 planches.

Dans cet ouvrage, qui fait partie de la collection de traités sur diverses branches de l'histoire naturelle, publié par le libraire Roret, sous le titre de *Suites à Buffon*, M. Dujardin développe les opinions dont il a souvent entretenu les lecteurs des Annales relativement à la structure des Infusoires proprement dits, et il expose l'ensemble de ses recherches sur cette division du règne animal.

HISTOIRE *naturelle des Insectes Aptères*, par M. le baron WALCKENAER, membre de l'Institut. Deuxième volume.

Cet ouvrage, appartenant à la même collection que le précédent, comprendra l'histoire des Myriapodes et des Insectes hexapodes aptères aussi bien que celle des Arachnides. Le second volume, que nous annonçons ici, complète l'histoire de la division des Aranéides.

TABLE DES MATIÈRES

CONTENUES DANS CE VOLUME.

PHYSIOLOGIE.

Observations sur l'origine et le mode de développement des *Zoospermes*, par M. Lallemand. 30

Recherches sur les modifications de proportion de quelques principes du *sang* dans les maladies, par MM. Andral et Gavarret (Suite) . . . 129

Nouvelles recherches concernant l'*action de la Garance sur les os*, par M. Flourens 241

Observations sur les *vaisseaux lymphatiques* de la Salamandre et de la Grenouille, par M. Rusconi 249

Note sur les *globules du sang* du *Cryptobranchus japonicus*, par M. Van der Hoeven 251

Observations sur le développement des *zoospermes de la Raie*, par M. Lallemand. 257

Observations sur le rôle des *zoospermes* dans la génération, par M. Lallemand 262

ANIMAUX VERTÉBRÉS.

Recherches sur divers ossemens fossiles attribués par Cuvier à deux Phoques, au Lamantin et à deux espèces d'Hippopotame, et rapportés au *Métaxythérium*, nouveau genre de Cétacé de la famille des Dugongs, par M. J. de Christol. 307

Notes anatomiques sur divers organes d'une *Baleinoptère*, par M. Ravin. 337

Note sur les mœurs du Canard *Eider*, et sur des moisissures développées, pendant la vie, à la surface externe des poches aériennes d'un de ces animaux, par M. Eudes Deslongchamp 371

ANIMAUX ARTICULÉS.

Note sur quelques espèces de l'ordre des *Acariens*, par M. Gervais . . 5

Sur quelques points de l'organisation des *Limules*, et description plus particulière de leurs branchies, par M. Duvernoy. 10

Sur une nouvelle forme de branchies, découverte dans une espèce de Crustacé Décapode (Genre *Aristée*), par M. Duvernoy. 101

Sur un nouveau genre de l'ordre des Crustacés Isopodes, et sur l'espèce type de ce genre, le *Képône type*, par M. Duvernoy. 110

Essai d'une monographie des *organes de la respiration de l'ordre des Crustacés Isopodes*, par MM. Duvernoy et Lereboullet 177

Remarques sur la *phosphorescence* de quelques animaux articulés, par M. Audouin 253

Observations sur les métamorphoses du *Cerceris Bupresticida* et sur l'industrie et l'instinct entomologique de cet Hyménoptère, par M. L. Dufour. 353

MOLLUSQUES.

Recherches sur le *développement des Aplysies*, par M. Van Beneden. 123

ZOOPHYTES.

Observations sur le développement et les métamorphoses des genres *Campanulaire* et *Syncoryne*, par M. Lowen. 157

MÉLANGES.

Programme des prix relatifs à la Zoologie, proposés par l'Académie des Sciences de Bruxelles 380

Annonces d'ouvrages nouveaux 381

TABLE DES MATIÈRES PAR NOMS D'AUTEURS.

ANDRAL et GAVARRET.—Recherches sur les modifications de proportion de quelques principes du sang. 129

AUDOUIN. — Remarques sur la phosphorescence de quelques animaux articulés..... 256

CHRISTOL. — Recherches sur divers ossemens fossiles attribués par Cuvier à deux Phoques, etc., et rapportés au *Métaxythérium*, nouveau genre de Cétacé de la famille des Dugongs... 307

DESLONGCHAMP.—Note sur les mœurs du *Canard Eider* et sur des moisissures développées pendant la vie, à la surface interne des poches aériennes d'un de ces animaux..... 371

DUFOUR. — Observations sur les métamorphoses et les mœurs du *Cerceris Buprestícida* 353

DUVERNOY. — Sur quelques points de l'organisation des *Limules* et description plus particulière de leurs branchies..... 10

— Sur une nouvelle forme de branchies, découverte dans une espèce de Crustacé Décapode (genre *Aristée*)..... 101

— Sur un nouveau genre de l'ordre des Crustacés Isopodes (genre *Képone*).. 110

DUVERNOY et LEREBOULLET. — Essai d'une Monographie des *organes respiratoires* de l'ordre des *Crustacés Isopodes*..... 277

FLOURENS. — Nouvelles recherches concernant l'*action de la garance* sur les os. 241

GAVARET (voyez ANDRAL).

GERVAIS. — Note sur quelques espèces de l'ordre des *Acariens*..... 5

LALLEMAND. — Observations sur l'origine et le mode de développement des *zoospermes*..... 30

— Observations sur le développement des *zoospermes* de la Raie..... 257

— Observations sur le rôle des *zoospermes* dans la génération..... 262

LOWEN. — Observations sur le développement et les métamorphoses des genres *Campanulaire* et *Syncoryne*..... 157

RAVIN. — Notes anatomiques sur divers organes d'une *Baléinoptère*..... 337

RUSCONI. — Observations sur les *vaisseaux lymphatiques* de la Salamandre et de la Grenouille..... 249

VAN BENEDEN. — Recherches sur le développement des *Aplysies*..... 123

VAN DER HOEVEN. — Sur les globules du sang du *Cryptobranchus japonicus*... 251

TABLE DES PLANCHES

RELATIVES AUX MÉMOIRES CONTENUS DANS CE VOLUME.

PLANCHE 1. Développement des Aplysies.

2. Acariens.

3. Organisation des Limules.

4. [illegible]*iteus antennatus*. — B. *Kepon typus*.

5. Branchies de l'Aristée.

6. Branchies des Isopodes.

7. Nouveau genre de Mammifère fossile (*Metaxytherium*).

8. A. Campanulaire. — B. Syncoryne.

9. Anatomie de la Baléinoptère.

10. Développement des zoospermes de la Raie.

11. A. Métamorphoses des Cerceris. — B. Moisissures de l'Eider.

FIN DE LA TABLE DU QUINZIÈME VOLUME.



Embryogénie des Aplysies.



Delahaye delin. 1840.

Acariens

Organisation des Limules.



A. *Aristeus antennatus*, Dum. —— B. *Kepon typus*, Dum.







Cornuel del.

Branchies de l'Aristée



Branchies des Isopodes.



J. de Christol del. I. Lith. d'Artus Emile Beau Lith.

Nouveau genre de Mammifere Fossile. (*Metarytherium.*)



A. 1-18. Campanulaire B. 1-10. Syncoryne.



Anatomie de la Balenoptère.

A

B

A. Metamorphoses du Cerceris bupresticida.

B. Monstruosités de l'Eider.

ANNALES

DES

SCIENCES NATURELLES

COMPRENANT

LA ZOOLOGIE, LA BOTANIQUE,
L'ANATOMIE ET LA PHYSIOLOGIE COMPARÉES DES DEUX RÈGNES,
ET L'HISTOIRE DES CORPS ORGANISÉS FOSSILES;

RÉDIGÉES

POUR LA ZOOLOGIE

PAR MM. AUDOUIN ET MILNE EDWARDS,

ET POUR LA BOTANIQUE

PAR MM. AD. BRONGNIART ET GUILLEMIN.

Seconde Série.

TOME SEIZIÈME. — ZOOLOGIE.

PARIS.

FORTIN, MASSON & C^ie^, LIBRAIRES-ÉDITEURS,
PLACE DE L'ÉCOLE-DE-MÉDECINE, N. 1.

1841.

ANNALES

DES

SCIENCES NATURELLES.

PARTIE ZOOLOGIQUE.

Études *anatomiques et physiologiques sur une Mouche, dans le but d'éclairer l'histoire des métamorphoses et de la prétendue circulation des insectes,*

Par M. Léon Dufour.

(Extrait lu à l'Académie des Sciences, le 19 avril 1841.)

En attendant que je présente à l'Académie les résultats de mes nombreuses dissections des insectes de l'ordre entier des Diptères, je viens lui soumettre mes recherches sur l'organisation tant extérieure qu'intérieure des trois formes d'une Mouche très connue, la *Mouche carnassière* d'Olivier, ou la *Sarcophage hémorhoïdale.* Je viens aussi, m'élevant à des considérations moins circonscrites, examiner et résoudre, par les faits et le raisonnement, une question litigieuse qui intéresse à un haut degré la physiologie générale, et qui partage les savans de notre époque : c'est la prétendue circulation des insectes.

Que l'Académie me permette de lui donner une esquisse de ce travail : métamorphoses et circulation, en voilà les deux divisions naturelles.

Après avoir décrit et figuré la larve, la nymphe et l'insecte

ailé, après avoir fait ressortir les prodigieuses différences de ces trois états d'un même individu dont la vie collective résume une trinité réelle, après en avoir suivi pas à pas les développemens et les mutations, j'ai déchiré leurs tuniques tégumentaires, et, armé du scalpel et du microscope, j'ai consulté les divers appareils organiques dans leurs métamorphoses respectives; j'ai cherché à m'initier aux mystères de l'organogénie. C'est par ces vivisections cent fois renouvelées, que j'ai vu se dérouler ces trois organismes si dissemblables, destinés pourtant à se fondre l'un dans l'autre pour n'en constituer qu'un seul. J'ai étudié dans leurs inconcevables phases de création les viscères de la *larve*, ver acéphalé, apode, rampant, mandibulaire, carnivore, croissant avec rapidité, mais dépourvu de sexe et de génération; ceux de la *nymphe*, qui, par son inertie et son insensibilité absolues, est la fidèle image d'une momie, mais recélant un principe animé; enfin ceux de l'*insecte parfait*, qui vole, court, s'agite, suce avec sobriété un aliment subtil, ne prend pas de croissance, a deux sexes séparés, et se reproduit par voie de génération. Je me suis attaché à surprendre dans le jeu de leurs élémens matériels les échanges de ces vies partielles pour une vie commune ou définitive, qui est le type de l'organisme parfait. J'ai été parfois assez heureux pour saisir ces momens d'une palpitante curiosité, où un organisme s'improvise avec les débris d'un organisme qui se détruit, ces instans fugaces où des organes en déchéance prêtent encore leur ministère à des organes en création.

Dans l'intérêt de cette triple étude des transformations, j'ai été amené, par les modifications des faits, à établir dans cet organisme intermédiaire à la larve et à la mouche, et formant le chaînon de l'une à l'autre, dans la nymphe, trois âges ou phases, ou stades, qui n'avaient point été saisis par mes devanciers, et qui sont d'une grande importance pour comprendre la marche des métamorphoses. Le premier âge, que j'appelle la *première transition*, est celui qui succède immédiatement au passage de la larve en nymphe; il y a encore adhérence organique de celle-ci avec l'enveloppe délaissée par la larve. Le second, dont le nom emporte la définition, est la *nymphe confirmée* : celle-ci est uni-

formément blanchâtre. Le troisième, qui correspond à la mutation de la nymphe en mouche, est la *seconde transition* : les yeux ont une teinte violacée.

Dans les trois morphoses de la Sarcophage, l'*appareil sensitif* consiste en deux seuls centres nerveux, le *cerveau* et le *ganglion thoracique*, d'où émanent tous les *nerfs* qui distribuent dans les divers tissus le mouvement et la vie. Le cerveau est profondément bilobé ou à deux hémisphères. Dans la larve qui est acéphale, il ne saurait être renfermé dans la tête. Dans la nymphe confirmée, malgré l'existence d'une grosse tête vésiculeuse, il est encore hors de celle-ci ; il n'y rentre qu'à la seconde transition, et dans la mouche. Une ébauche de *rétine* ne commence à s'observer que dans la nymphe confirmée, et ce n'est que dans l'âge suivant, surtout dans la mouche, que l'on voit se développer cette rétine et se former le *pigment* de la choroïde, soit aux yeux, soit aux ocelles. Dans la larve et les deux premiers âges de la nymphe, le cerveau et le ganglion thoracique semblent confondus en une seule et même masse, tandis que dans la seconde transition et dans la mouche, le ganglion thoracique est séparé de l'encéphale par un *cordon rachidien* bien prononcé. Ce dernier est simple dans les Diptères, et c'est une découverte qui m'appartient ; il est double dans tous les autres ordres d'insectes. Le ganglion thoracique de la larve a, de plus que celui des autres formes du Diptère, plusieurs paires de corps particuliers de nature ambiguë, dont la science n'a point encore fait mention, et que j'ai désignés sous le nom de *corps ganglionoïdes*.

La *respiration* est dans les insectes une véritable circulation d'air, et l'appareil vasculaire qui y préside cumule les deux plus importantes fonctions de l'animal. Je reviendrai sur ce point. Dans la larve, les *stigmates*, ou orifices respiratoires, sont au nombre de deux paires. Les antérieurs ont, chacun, la forme d'un éventail mobile à quinze digitations ; les postérieurs, logés dans une caverne que j'ai appelée *stigmatique*, et dont la structure est admirable, sont assez grands, arrondis, un peu réniformes, rapprochés l'un de l'autre et immobiles, ayant chacun trois ostioles linéaires. Dans la transformation en nymphe, les

deux paires de stigmates ont été abandonnées par la larve et collées contre les parois intérieures de la capsule pupale, laquelle n'est que le tégument durci et coloré de cette morphose. Toutefois, la nymphe, malgré son existence embryonnaire et sa mort apparente, n'a pas été déshéritée d'un appareil respiratoire. On lui trouve une seule paire de stigmates, les antérieurs, mais il est très vraisemblable qu'ils n'exercent pas des fonctions actives. Dans l'évolution définitive de la nymphe en mouche, huit paires de stigmates simples se sont improvisées, deux thoraciques bivalvulaires à valves velues, et six abdominaux, petits, ronds, à cerceau.

Les *trachées*, le seul système vasculaire des insectes, sont, dans la larve, toutes de l'ordre des tubulaires ou élastiques, et constituent un appareil parfaitement symétrique. Celui-ci consiste, pour chaque moitié du corps, en un grand canal dorso-latéral, qui mérite le nom de *trachée-artère*, lequel se continue directement du stigmate postérieur à l'antérieur, en émettant à droite et à gauche un nombre déterminé et régulier de branches nutritives. Celles-ci naissent de la trachée-artère à angle aigu dont l'ouverture est antérieure. Cette disposition prouve incontestablement que l'inhalation de l'air ou l'inspiration, se fait par les stigmates postérieurs. Les deux trachées-artères se communiquent en avant par un canal traverse. Le système trachéen de la nymphe ressemble beaucoup à celui de la larve; mais comme il n'existe pas de stigmates postérieurs, la trachée-artère se termine en arrière par un bout fermé ou en cul-de-sac. En cet endroit, il y a un écheveau considérable de trachées entremêlées. Plusieurs branches traversales établissent une communication directe entre les grands canaux. La somme de respiration, toujours proportionnée au degré de l'énergie vitale, entraîne dans la mouche un système trachéen bien plus ramifié que dans les morphoses précédentes. La condition d'insecte ailé a aussi rendu nécessaires des trachées utriculaires, de véritables aérostats placés principalement à la base de la cavité abdominale qui est justement le milieu du corps, et destinés, dans l'intérêt de la progression aérienne, à diminuer la pesanteur spécifique et à équilibrer les mouvemens.

Passons maintenant aux métamorphoses de l'*appareil digestif* dans la larve qui dévore, dans la nymphe qui ne mange pas, et dans la mouche qui lèche, qui suce un aliment léger.

La larve a un canal digestif sept à huit fois plus long que son corps, filiforme, reployé sur lui-même en plusieurs circonvolutions. Il débute par une *panse buccale* très développée, un *gésier* calleux et quatre *bourses ventriculaires*. Ces trois organes ne se rencontrent ni dans la nymphe, ni dans la mouche. Cette prépondérance dans la composition de l'appareil digestif est une cause ou une conséquence de la voracité et de la croissance rapide de la larve. Les *glandes salivaires* consistent en deux boyaux filiformes égalant à peine la moitié de la longueur du corps, et unis par un *épiploon salivaire* que j'ai rencontré pour la première fois dans les insectes. Il y a quatre *vaisseaux hépatiques*, longs, grêles comme un fil, jaunes ou verdâtres, flottant par un bout, s'unissant par paires à un *canal cholédoque* inséré de chaque côté de la terminaison du ventricule chylifique, où ils épanchent la bile.

Dans la transformation de la larve en nymphe, la panse buccale, le gésier et les bourses ventriculaires, ont disparu; le canal alimentaire a perdu les deux tiers de sa longueur. Le ventricule chylifique, droit, oblong, plus ample que dans les deux autres morphoses, offre à son origine et l'ébauche d'un godet, et celle d'une nouvelle panse bien différente de celle de la larve. Il renferme un liquide sirupeux et une *vésicule intra-ventriculaire*, résidu singulier de l'évolution du canal digestif de la larve. Les glandes salivaires sont encore celles de cette dernière, mais leurs élémens tendent à se dissocier pour une création nouvelle. Les vaisseaux hépatiques, organe de première formation, ne diffèrent ni de ceux de la larve, ni de ceux de la mouche.

L'insecte ailé semble avoir repris le canal alimentaire de la larve, mais sans les trois organes de son origine. Des glandes salivaires qui ont totalement abdiqué leur première forme, se sont improvisées; une panse à long col et à réservoir bilobé est venue s'implanter à la terminaison de l'œsophage, et la vésicule

intra-ventriculaire n'a pas laissé le moindre vestige de son existence. Toutes ces modifications successives de créations, toutes ces substitutions, toutes ces improvisations, présentent le plus vif intérêt, et leur parallèle dans les diverses morphoses fournit des considérations profitables à l'organogénie.

L'*appareil génital* eût dû trouver ici sa place; mais comme il est l'attribut exclusif de l'insecte parfait, j'en ai réservé l'exposition pour mon travail général sur les Diptères.

Le *tissu adipeux splanchnique* existe dans les trois formes de la Sarcophage, et il joue un grand rôle dans l'organogénie. Celui de la larve est en larges nappes ou tabliers membraniformes criblés de trous; mais en approchant de l'époque de la métamorphose, il se convertit en un réseau dont les mailles irrégulières sont granuleuses. Dans la nymphe, ce ne sont plus que des granules détachés, flottant dans un liquide abondant. Ces granules sont des matériaux plastiques tout taillés, et prêts à être mis en construction. J'ai souvent surpris ces moellons organogéniques disposés en séries linéaires, fondus en floccons ou étalés en lames pour former des conduits, des articulations, des membranes, en vertu d'une loi d'*affinité organique* non encore formulée et d'une *sensibilité élective* dont la pathologie humaine fournit de nombreux exemples.

J'ai donné provisoirement le nom d'*organe dorsal* à un organe qui se rencontre dans tous les états de la sarcophage, à la ligne médiane du dos, et qui est l'analogue du *vaisseau dorsal* des auteurs. Il est dans notre Diptère beaucoup plus compliqué que dans les autres insectes, et semblerait, par conséquent, avoir une prééminence physiologique. On y distingue son *axe* et ses *ailes*. L'axe est un *cordon* sans cavité ni divisions, fixé par un bout à la partie postérieure du tégument dorsal, par l'autre à l'origine du ventricule chylifique sans pénétrer dans la cavité de celui-ci. Sa portion thoracique est nue, libre, un peu atténuée. Les ailes sont exclusivement propres à la portion abdominale. Elles consistent, pour son tiers postérieur, en une double série de douze *sphérules* roussâtres, sessiles, terminées par autant de ligamens, et pour ses deux tiers antérieurs, en une sorte d'épiploon ou de *fraise mésentériforme* composée de

fort petites granulations, et maintenue de part et d'autre par quatre ligamens. L'étude minutieusement attentive de la forme et de la structure de cet organe dorsal (nouveau pour la science) prouve qu'il n'a aucune analogie ni avec un cœur, ni avec un vaisseau, et que, par conséquent, on ne saurait le considérer comme un appareil circulatoire. Il se pourrait qu'il fût un organe sécréteur, mais d'un genre spécial et n'ayant aucun rapport avec les glandes ordinaires des insectes. J'ai, à ce sujet, établi une classification des organes sécréteurs que l'on rencontre assez fréquemment dans ces derniers animaux, et sa structure particulière l'en excluerait. J'ai hasardé l'idée, sans y tenir beaucoup, que l'organe dorsal de la Sarcophage pourrait bien ne pas être étranger à la création et à l'entretien de l'enveloppe tégumentaire du Diptère.

L'examen de la *circulation dans les insectes* en général termine mon travail. Quoique étranger en apparence à mes études sur la Sarcophage, il en découle néanmoins par les développemens où je suis entré sur l'organe dorsal de ce Diptère. Pour la solution du problème, j'ai mis à contribution, et les documens fournis par les insectes de tous les ordres, et les opinions émises par tous les savans.

Parmi les incrédules de cette circulation, se trouvent Malpighi, Swammerdam, Lyonnet, Cuvier, MM. Marcel de Serres, Duméril, Duvernoy, Audouin, etc., et parmi les partisans, MM. Comparetti, Straus, Wagner, Carus, Behn, Dugès, etc., On voit que dans les deux camps figurent les noms les plus recommandables, le plus haut placés.

Hommage éclatant, hommage éternel à notre grand Cuvier! à une époque déjà si éloignée de nous (il y a plus de quarante ans), il avait, par une inspiration qui n'appartient qu'au génie, établi, à l'occasion des insectes, cette loi fondamentale de physiologie, que l'existence d'un appareil vasculaire aérifère exclut celle d'un appareil vasculaire sanguin, ou en conservant les paroles sacramentelles de ce législateur de la science, *le fluide nourricier ne pouvant aller chercher l'air, c'est l'air qui le vient chercher pour se combiner avec lui.* Depuis cette époque, le progrès des découvertes ne lui fit point modifier l'expression

de cette loi : elle conserve encore, suivant moi, tout son esprit, toute sa force.

Il est bien singulier qu'au lieu de choisir les plus grandes espèces d'insectes pour démontrer l'existence d'un appareil de circulation, les savans qui préconisent celle-ci se soient, au contraire, adressé aux plus petites, aux plus jeunes larves, et que des mouvemens d'un liquide contenu dans les cavités du corps et aperçus à la dérobée à travers la pellucidité des tégumens, aient été jugés suffisans pour admettre et établir une circulation dans ces animaux. Et cependant les expérimentations, les injections faites par Cuvier, largement renouvelées par M. Marcel de Serres, étaient tout-à-fait contraires à cette circulation.

J'ai scrupuleusement analysé et victorieusement combattu, je crois, les assertions spécieuses et parfois contradictoires de M. Carus, qui fonde la circulation, la double circulation des insectes sur des *courans* de liquide, sur des *vaisseaux sans parois* qu'il ne craint pas de qualifier d'*artériels* et de *veineux*. Ces courans, subordonnés, suivant moi, aux lois combinées de la capillarité et des affinités organiques, ne sauraient constituer un système de circulation.

M. Straus a décrit et figuré le prétendu *cœur* du Hanneton comme percé de huit paires latérales d'ouvertures *auriculo-ventriculaires* et d'autant de *ventricules* ou *chambres* séparées par des *valvules*. Le sang des cavités entre directement, suivant lui, dans le cœur par ces ouvertures, passe dans l'*artère* qui traverse le corselet, et va s'épancher dans la tête pour revenir dans les cavités. En admettant avec M. Straus une semblable structure, je prouve qu'on ne saurait rationnellement en tirer parti pour établir une double circulation comme il le veut. Le mouvement se bornerait, suivant moi, à un éternel jeu de siphon qui n'atteindrait nullement le but physiologique d'une circulation. Mes dissections sur ce même Hanneton ne m'ont démontré aucune ouverture dans l'organe dorsal de ce Coléoptère. Cet organe est fermé à ses deux extrémités, et l'une de celles-ci se fixe, comme dans la sarcophage, à l'œsophage de l'insecte sans pénétrer dans l'intérieur de ce conduit digestif.

Ce fait seul ruine complètement le système de M. Straus et des autres partisans de cette circulation. Lyonnet, dans son ouvrage posthume, en a signalé un semblable.

En faisant la revue de l'organe dorsal dans les divers ordres des insectes hexapodes ou à tranchées, on lui trouve, dans tous, les traits suivans : 1° il est situé à la ligne médiane dorsale du corps, immédiatement au-dessous des tégumens ; 2° son axe, qui est plus particulièrement le cœur ou le vaisseau dorsal des auteurs, est un cordon fibro-charnu simple, sans divisions, sans ouvertures, sans cavités ; 3° il est fixe et fermé par ses deux bouts ; 4° sa portion abdominale est garnie latéralement d'ailes tantôt submembraneuses, découpées ou entières, où se fixent des ligamens tantôt (comme dans les Hémiptères) sous la forme d'une bordure étroite, linéaire, dépourvue d'un bout à l'autre de tout moyen de connexion ; 5° la portion thoracique est toujours nue et libre. Les dissections les plus habiles, les injections les plus adroites, n'ont jamais constaté la moindre ramification vasculaire à cet organe, et presque tous les anatomistes ont admis ce fait négatif, qui a une si haute portée dans la question de la circulation.

Les mouvemens de l'organe dorsal que l'on a si imprudemment désignés sous les noms de *systole* et de *diastole*, et les agens qui les déterminent, ont été l'objet de mon étude attentive. Ils sont nuls ou d'une constatation très difficile dans plusieurs insectes. Les mouvemens généraux ou de totalité sont principalement déterminés par les ligamens, les muscles peauciers, les trachées mises en jeu par l'acte respiratoire, et la fluctuation du liquide nourricier. Les mouvemens propres ou les *pulsations* (nom impropre) dépendent surtout de la contractilité fibrillaire. Ils sont irréguliers, et Malpighi a même dit qu'il les avait vus s'opérer dans le même individu tantôt d'avant en arrière, tantôt d'arrière en avant, témoignage bien grave contre le système de la circulation.

Ce qui ajoute encore aux nombreuses preuves de la non-existence dans les insectes d'un cœur et d'une circulation, c'est que la section transversale de ce prétendu cœur n'entraîne pas immédiatement la mort, tandis que la même opération prati-

quée sur le vaisseau dorsal, le véritable cœur d'une Arachnide pulmonaire, tue subitement celle-ci.

Je conclus de mes dissections, de mes expérimentations et de mes raisonnemens, que l'existence d'un système vasculaire aérifère destiné à faire jouir tous les organes, tous les tissus, du bénéfice physiologique de la respiration, est incompatible avec celle d'une circulation humorale. Je conclus que celle-ci n'existe pas dans les insectes à trachées, et que l'organe que l'on a cru présider à cette fonction n'est qu'un rudiment, un simulacre du cœur des Arachnides, un cœur obturé, un organe déchu de toute attribution physiologique bien déterminée, et peut-être un tissu vestigiaire.

NOTE *sur la découverte d'un squelette entier de Metaxytherium*,

Par M. MARCEL DE SERRES.

Le genre *Metaxytherium* a été récemment établi par M. de Christol, sur diverses pièces osseuses se rapportant à un mammifère marin qui paraît intermédiaire entre le lamantin et le Dugong. C'est même sous ce dernier nom, que nous avons décrit les restes nombreux de ce cétacé que nous avons rencontré dans les sables marins tertiaires supérieurs des environs de Montpellier. Ces fragmens se rapportent principalement aux os de la tête, qui offrent une grande partie des maxillaires armés de leurs dents, et en second lieu aux vertèbres et aux os des membres. Depuis lors M. de Christol a trouvé divers ossemens du même animal dans les terrains marins inférieurs des départemens de la Charente et de Maine-et-Loire.

C'est à l'aide de toutes ces pièces qu'il a comparés avec une rare sagacité, qu'il a fondé le genre *Metaxytherium*, dans lequel il a réuni deux espèces d'Hippopotame décrites par Cuvier

sous les noms d'*Hyppopotamus medius* et *dubius*. On ne doit pas trop s'étonner, qu'un aussi habile anatomiste que Cuvier, se soit laissé tromper par les dents de ce mammifère marin, et qu'il l'ait rapporté à un mammifère terrestre. En effet les molaires de ce cétacé prennent par la détrition la disposition en tréfle qui caractérise les mâchelières de l'Hippopotame, à tel point, que lorsqu'on ne les voit pas implantées dans leurs maxillaires, il serait facile de faire la même méprise, si l'on ne portait en même temps son attention sur la forme et la disposition de leurs racines. Mais ce qui est singulier, c'est que cette observation n'avait pas échappé à Cuvier qui prouva que des dents rapportées par Péron à l'Hippopotame appartenait réellement au Dugong (1).

Ce genre *Metaxytherium*, dont nous possédons les principales pièces qui en composaient le squelette, se rapprochaient beaucoup par la forme de sa tête et de ses maxillaires des Lamantins, et par celle de ses membres, des Dugongs. Un squelette à-peu-près entier de ce genre perdu, a été récemment découvert (août 1840) au milieu du massif du calcaire moellon qui compose des bancs pierreux tertiaires, exploités à Beaucaire pour les constructions.

Cet individu dont un certain nombre de fragmens nous ont été montrés, par les soins obligeans de M. le docteur Quet paraît avoir été rencontré à-peu-près complet, ainsi que nous venons de le faire observer. Malheureusement les pièces osseuses qui nous ont été apportées, ne nous ont rien appris de plus que ce que nous savions déjà, d'après celles que nous possédons dans nos collections.

D'après le dire des ouvriers, le *Metaxytherium* rencontré à Beaucaire, paraissait avoir été saisi étendu, lorsqu'il a été enveloppé par le dépôt pierreux dans lequel il a été trouvé. Quant à ceux, qui jusqu'à présent, ont été observés dans les environs de Montpellier, c'est uniquement dans les sables marins tertiaires qu'ils ont été aperçus. On ne les a pas encore remarqués du moins jusqu'à présent aussi bas qu'à Beaucaire; mais ils

(1) Recherches sur les ossemens fossiles de G. Cuvier, tome v, première partie, page 261.

existent dans des couches bien plus anciennes dans les départemens de la Charente et de Maine-et-Loire, c'est-à-dire dans les terrains marins tertiaires inférieurs.

On dirait d'après ces faits et d'après une foule d'autres que nous avons signalés dans nos travaux sur les terrains tertiaires, que les mêmes espèces fossiles ont péri plus tard dans le midi que dans le nord de la France. Il est du moins certain, que leurs débris se trouvent dans des formations plus jeunes dans l'une que dans l'autre de ces régions.

L'individu de Beaucaire avait du reste de plus grandes dimensions que ceux recueillis à Montpellier, circonstance qui paraît avoir dépendu uniquement de leur âge relatif. Celui de la première de ces localités était tout-à-fait adulte, tandis que ceux de Montpellier étaient dans le jeune âge, leurs dents de remplacement n'étant pas encore sorties de leurs alvéoles. Aussi nous sommes en doute, qu'il ait réellement existé plusieurs espèces de ce genre, d'autant que M. de Christol n'en a admis plusieurs, qu'en se fondant sur leurs dimensions. Or, quoique celles du *Metaxytherium* de Beaucaire et de Montpellier soient assez différentes, les individus n'ont pas présenté d'autres caractères, propres à les faire considérer comme ayant réellement constitué deux espèces.

CONSIDÉRATIONS *paléontologiques et géographiques sur la distribution des Céphalopodes acétabulifères,*

Par M. ALCIDE D'ORBIGNY.

(Lues à l'Académie des Sciences, le 19 juillet 1841.)

CONSIDÉRATIONS PALÉONTOLOGIQUES.

Les Céphalopodes ont existé, dans les terrains siluriens et carbonifères, dès la première époque où l'animalisation s'est manifestée sur le globe terrestre; mais, dans la période où déjà les *Orthoceras*, les *Nautilus*, les *Goniatites*, etc., couvraient les mers de leurs innombrables essaims, il ne paraît pas y avoir eu de Céphalopodes acétabulifères, à moins que leurs traces n'en soient postérieurement disparues. On peut croire qu'il en est ainsi dans le Muschelkalk, où les genres que nous venons de citer ne sont représentés que par les Nautiles, auxquels déjà viennent se joindre quelques Ammonites, mais encore aucune des espèces qui nous occupent.

La première apparition des Céphalopodes acétabulifères a donc eu lieu dans les terrains jurassiques ou oolitiques. A l'époque où vivaient ces myriades d'Ammonites si variées dans leurs formes, se montrent en grand nombre, pour la première fois, dans les étages les plus inférieurs du lias, les Bélemnites coniques et sans sillons, avec quelques Sépiothentes. Les premiers, si l'on en juge par leurs formes allongées, devaient être des animaux pélagiens, tandis que les autres pouvaient fort bien être plus côtiers, au moins d'après l'analogie. Aux étages moyens de l'oolite, dans l'oolite inférieure, on retrouve les deux mêmes genres dans les mêmes proportions numériques, c'est-à-dire quel-

ques Teudopsis et un grand nombre de Bélemnites, alors le plus souvent sillonnées en dessous. Si nous remontons vers les couches plus supérieures (l'oxford clay), nous voyons le nombre des Bélemnites diminuer et même leurs formes changer : de coniques qu'elles étaient dans le bas, elles deviennent généralement lancéolées ou fusiformes; les espèces des couches inférieures sont remplacées par d'autres tout-à-fait distinctes. Avec elles, dans les couches supérieures des terrains oolitiques, paraissent pour la première fois quatre ou cinq espèces de Seiches, trois Ommastrèphes, deux Enoploteuthes, et un Kelaeno dans les carrières de Solenhofen, si riches en fossiles; tous animaux différens de ceux des couches inférieures, dont les premiers seulement devaient être côtiers, tandis que tous les autres ont dû être des hautes mers. En résumé, dans les terrains oolitiques, les Bélemnites atteignent leur plus grand développement numérique et spécifique, surtout au milieu des couches inférieures; les Sépioteuthes se voient seulement dans les couches inférieures, les Teudopsis et les Bélemnites dans les couches moyennes, tandis qu'on ne rencontre que dans les couches supérieures les genres *Sepia*, *Ommastrephes*, *Enoploteuthis* et *Kelaeno*, que nous devons retrouver plus tard.

Remontons-nous dans les terrains crétacés, les Céphalopodes acétabulifères ne changent pas entièrement de forme, comme nous l'avons vu dans le passage des terrains de transition aux terrains oolitiques, puisque, dans les couches néocomiennes et dans le gault, on trouve encore des Bélemnites; mais ces Bélemnites prennent pour la plupart une forme comprimée, propre aux terrains néocomiens. Dans la dernière époque des terrains crétacés, la craie blanche, les Bélemnites comprimées ou lancéolées sont remplacées par les Bélemnitelles, espèces pourvues d'une gouttière et tout-à-fait distinctes de forme de celle des terrains inférieurs. Soit que les terrains ne fussent pas propres à en conserver les traces, soit qu'il n'y en ait pas existé, aucun des autres genres que nous avons signalés dans les époques antérieures ne se montrent dans les terrains crétacés, où les Bélemnites même s'effacent pour toujours dans les couches supérieures de cette formation.

Si nous passons aux terrains tertiaires, les plus rapprochés de notre époque, si nous scrutons les faunes spéciales aux différens bassins très riches en fossiles, nous serons étonnés du peu de Céphalopodes qui s'y rencontrent. Plus de représentans de ces myriades de Bélemnites des terrains inférieurs, plus de traces de Céphalopodes à coquille cornée; de tout ce que nous connaissons déjà, le seul genre *Sepia* se retrouve encore, accompagné des Béloptères jusqu'alors inconnus; et ces espèces, propres aux couches les plus inférieures de l'époque tertiaire, se rencontrent uniquement dans le bassin de Paris, tandis que les autres couches supérieures, celles d'Italie, par exemple, si riches en Poissons, n'ont montré jusqu'ici aucune trace de fossiles de l'ordre d'animaux que nous recherchons.

Pour mieux faire concevoir cette succession des genres et des espèces dans les couches, nous les donnerons comparativement dans le tableau suivant.

TERRAINS.	LOCALITÉS.	GENRES.	ESPÈCES.
Terrains de transition.	»	»	»
Terrains du Muschelkalk.	»	»	»
Terrains oolitiques.			
Inférieurs. Lias.	Allemagne.	Sepioteuthis.	
id. id.	Partout.	Bélemnites.	digitalis, Faure, Biguet.
id. id.	id.	id.	elongatus, Blainville.
id. id.	id.	id.	niger, Lister, etc., etc.
Moyens Oolite infér.	id.	id.	acutus, Blainville.
id.	id.	id.	apiciconus, Blainv., etc.
id.	Vendée.	id.	Fleuriausianus, d'Orb.
Grande oolite.	Caen.	Teudopsis.	Caumontii, Deslongch.
Oxford-Clay et couches supérieures.	Vendée.	Bélemnites.	hastatus, Blainville.
id.	Partout.	id.	semihastatus, Blainv.

(1) Nous devons la connaissance de ces espèces aux savantes communications de M. le comte Münster, de Bayreuth.

TERRAINS.	LOCALITÉS.	GENRES.	ESPÈCES.
Terrains oolitiques.			
Oxford-Clay et couches supérieures.			
id.	Solenhofen.	Ommastrephes.	cochlearis.
id.	id.	id.	intermediis.
id.	Eschstadt.	Enoploteuthis.	subhasta.
id.	Solenhofen.	Kelaeno.	speciosa, Münster. (1)
id.	Eschstadt.	id.	prisca, Münster.
id.	Solenhofen.	Sepia.	antiqua, Münster.
id.	id.	id.	hasteformis, Rüppel.
id.	id.	id.	caudata, Münster.
id.	id. Eschstadt.	id.	linguata, Münster.
id.	id.	id.	venusta, Münster.
Terrains crétacés.			
Néocomiens.	Provence, B-Alp.	Bélemnites.	dilatatus, Blainville.
id.	id. id.	id.	bipartitus, Blainville.
id.	id. id.	id.	bicanaliculatus, Blainv.
id.	id. id.	id.	subfusiformis, Blainv.
id.	id. id.	id.	pistiliformis, Blainv.
id.	id. id.	id.	Baudouini, d'Orb.
id.	id. id.	id.	Emerici, Raspail.
id.			
Gault.	Boulogne.	id.	minimus, Lister.
Craie blanche.	Paris.	Belemnitella.	mucronata, d'Orb.
id.	id.	id.	quadrata, d'Orb.
Terrains tertiaires.			
Inférieurs.	id.	Beloptera.	belemnitoidea, Blainv.
id.	id.	id.	Levesquei, d'Orb.
id.	Angleterre.	id.	anomala, Sowerby.
id.	Paris.	Sepia.	sepioidea, d'Orb.
id.	id.	id.	compressa, d'Orb.
Supérieurs.	id.	"	"

Maintenant si, commençant par les terrains les plus inférieurs, nous cherchons, dans chaque genre, les couches qui les ont successivement renfermés, et l'époque où ils ont cessé de se montrer, nous arriverons aux résultats suivans :

1° Les *Sepioteuthis* apparaissent et disparaissent aussitôt dans les couches inférieures du terrain oolitique.

2° Les Bélemnites coniques et sans sillon ventral commencent à se montrer dans le lias, où elles dominent sur les autres fos-

siles et sont au maximum de leur existence numérique. Elles sont remplacées par une série presque aussi nombreuse de Bélemnites pourvues d'un sillon ventral dans l'oolite inférieure; puis elles diminuent, deviennent le plus souvent lancéolées, et changent encore d'espèces dans l'oolite supérieure. Dans la première période des terrains crétacés (les terrains néocomiens), apparaissent pour la première fois les Bélemnites comprimées, pourvues d'un sillon ventral et de sillons latéraux; elles sont assez nombreuses encore sous cet horizon géologique, mais c'est pour être réduites ensuite à une seule espèce distincte des premières dans le gault. Puis les Bélemnites proprement dites s'effacent entièrement de la surface du globe pour être remplacées, dans la craie blanche, par les Bélemnitelles, dernières traces que l'on connaisse de la famille des Bélemnitidées.

3° Les *Teudopsis*, contemporains de la seconde série des Bélemnites, ne font que se montrer, puisqu'ils cessent d'exister dans les étages inférieurs de l'oolite moyenne.

4° Les Ommastrèphes, les Enoploteuthes et les Kelaeno, se présentent avec l'étage supérieur des terrains oolitiques, et ne semblent pas, dans les couches terrestres, avoir survécu à cette époque.

5° Les Seiches se montrent en assez grand nombre avec les trois genres que nous venons de citer; puis disparaissen dans toute la formation crétacée pour revenir, sous d'autres formes, dans les terrains tertiaires inférieurs, où elles cessent d'exister.

6° Enfin les Béloptères naissent au sein des mêmes couches tertiaires que les Seiches, auxquelles ils ne survivent pas.

Quelques-uns de ces genres, comme les Bélemnites, les Bélemnitelles, les *Teudopsis*, les *Kelaeno* et les Béloptères sont ensevelis pour toujours dans les couches terrestres, tandis que d'autres, les Sépioteuthes, les Ommastrèphes, les Enoploteuthes et les Seiches montrent encore aujourd'hui un grand nombre d'espèces vivant au sein des mers. Si les genres survivent aux révolutions du globe, il n'en est pas ainsi des espèces; celles-ci, non-seulement ne passent pas d'une couche à l'autre, mais moins

encore ont survécu jusqu'à nos jours, ou elles sont tout-à-fait remplacées par des formes spécifiques distinctes.

Il nous reste à envisager, sous un autre point de vue, l'ensemble des espèces fossiles et leur succession jusqu'à nos jours. On a souvent agité la question philosophique du plus ou moins de perfection, de complication des corps, organisés dans leur ordre de succession au sein des couches terrestres du globe. Nous avons étudié les faits dans plusieurs séries animales, et nous nous sommes convaincu du peu d'uniformité des lois de cette nature, suivant les grandes sections zoologiques. Si d'un côté l'on aperçoit dans l'ensemble des êtres une progression évidente vers la perfection, ou une succession du simple au composé, il n'en est pas toujours ainsi lorsqu'on veut étudier un groupe naturel quelconque d'animaux, puisque quelquefois on trouve un état stationnaire ou même rétrograde dans la complication des formes. Relativement aux Céphalopodes acétabulifères, cette loi nous montre peu de variation. Il est vrai qu'avec des formes analogues à celles qui existent maintenant (les Sépioteuthes et les Enoploteuthes), nous trouvons les Bélemnites dont les caractères se compliquent de la réunion des parties crétacées et cornées, et qui joignent à un osselet voisin de celui des Ommastrèphes, des loges empilées comme les Orthocères, ce qui pourrait faire croire que la nature était alors, chez les Céphalopodes, plus complète qu'aujourd'hui, mais nous leur opposerons, pour établir la balance, l'exemple de la Spirule et de l'Argonaute, formes inconnues à l'état fossile, et qui peuvent prouver que la nature regagne d'un côté ce qu'elle perd de l'autre.

CONSIDÉRATIONS GÉOGRAPHIQUES.

Malgré le peu de renseignemens que la science possède encore sur les restes fossiles des Céphalopodes acétabulifères, ce qui tient sans doute à ce que ces corps se conservent difficilement, on peut se rendre compte des modifications qu'ils ont subies aux diverses périodes géologiques, et reconnaître les genres qui se retrouvent de nos jours. Ces genres, fussent-ils seuls, seraient

déjà d'une haute importance, en nous éclairant, par la comparaison, sur les formes zoologiques des espèces éteintes; mais ils ne le sont pas aujourd'hui, et un bien plus grand nombre de moyens d'étude nous a été conservé. Nous avons dit que trois genres ont des espèces vivantes; mais nous en possédons en même temps douze autres (1), dont les formes variées, par leur analogie avec les genres perdus, peuvent nous donner une idée des formes zoologiques de ceux-ci, tandis que la répartition actuelle des espèces vivantes, suivant les mers et les zônes de température, pourra peut-être aussi nous amener à quelques résultats satisfaisans sur l'état des mers aux époques où vivaient les espèces fossiles. C'est dans ce but que nous allons étudier les lois qui président à la distribution géographique des espèces vivantes.

Nous pouvons envisager la question sous deux points de vue distincts : l'un relatif à la répartition, suivant les formes, au sein des différentes mers, et dans les diverses régions de ces mers; l'autre purement numérique, sans avoir égard à ces formes. Nous commencerons par le premier.

Comme nous donnons ailleurs la distribution partielle des espèces dans chaque groupe (2), nous ne nous occuperons ici que de la répartition des genres, au sein des différentes mers :

Les Poulpes, les Seiches, les Ommastrèphes, habitent en même temps l'Océan Atlantique, le grand Océan, la Méditerranée et la Mer Rouge.

Les Argonautes, les Sépioles, les Rossies et les Calmars, un peu moins largement répartis, manquent dans la Mer Rouge, tout en se trouvant dans les mêmes mers.

Les Sépioteuthes sont de l'Océan Atlantique, du grand Océan et de la Mer Rouge; les Philonexes de l'Océan Atlantique et de la Méditerranée; les Enoploteuthes du grand Océan et de l'Océan Atlantique.

Après ces séries de genres, qu'on voit habiter simultanément

(1) Les genres *Octopus*, *Philonexis*, *Argonauta*, *Cranchia*, *Sepiola*, *Rossia*, *Loligo*, *Loligopsis*, *Chiroteuthis*, *Histioteuthis*, *Onychoteuthis* et *Spirula*.

(2) Monographie des Céphalopodes acétabulifères.

plusieurs mers à-la-fois, il ne nous restera plus de spéciaux à des mers distinctes, que les Sépioloïdes du grand Océan; les Histioteuthes et les Chiroteuthes de la Méditerranée, les Cranchies, les Loligopsis et les Spirules propres à l'Océan Atlantique. Il résulterait de ce qui précède, résumé exact de l'étude des espèces, que les genres sont à-peu-près également répartis dans les mers, et que, s'ils manquent dans telle ou telle mer, cela peut provenir pour quelques-uns du défaut d'observations plutôt que de l'absence réelle des espèces. Néanmoins, pour contre-partie des faits cités, nous dirons que jusqu'à présent on n'a pas encore trouvé dans la Mer Rouge les genres *Philonexis*, *Loligopsis*, *Histioteuthis*, *Enoploteuthis*, *Spirula*, *Cranchia*, *Sepiola*, *Rossia* et *Loligo*, que la Méditerranée ne possède pas de *Sepioteuthis*, d'*Enoploteuthis*, de *Spirula* et de *Cranchia*; que trois genres seulement sont inconnus dans le grand Océan, les *Histioteuthis*, les *Spirula* et les *Cranchia*, tandis que, dans l'Océan Atlantique, où l'on a beaucoup mieux cherché, par suite de la proximité des centres d'observation, il ne manque que les *Histioteuthis*, ce qui confirmerait dans l'idée que, par la suite, beaucoup de ces lacunes pourront se combler et rendre dès-lors la répartition uniforme.

Après avoir parlé de la répartition des genres au sein des mers, voulons-nous chercher si ces genres appartiennent à toutes les régions, ou bien s'ils sont, au contraire, répartis suivant des zônes de température spéciales qui leur soient propres, nous trouverons: 1° que les *Octopus*, les *Rossia*, les *Sepia*, les *Loligo*, les *Onychoteuthis* et les *Ommastrephes*, habitent simultanément les régions chaudes, les régions tempérées et les régions froides, beaucoup plus nombreux en espèces dans les zônes chaudes que partout ailleurs; 2° que les Argonautes, les Philonexis et les Sépioles, vivent en même temps dans les régions chaudes et tempérées, bien plus multipliés encore en espèces sous la zône torride que dans les autres parties des mers. Voilà pour ce qui a rapport aux genres vivant simultanément dans plusieurs zônes à-la-fois. Quant à ceux qui sont propres à des régions spéciales, nous trouverons: 3° les Cranchies, les Sépioloïdes, les Sépioteuthes, les Loligopsis, les Enoploteuthis et les

Spirules, seulement sous la zône équatoriale; 4° le seul genre Histioteuthe dans les régions tempérées, et 5° aucun dans les régions froides. En résumé, sur seize genres, quinze se rencontrent dans les régions chaudes, dix ou seulement les deux tiers dans les régions tempérées, et six ou beaucoup moins de la moitié dans les régions froides. Ainsi, n'ayant égard qu'aux formes, nous les trouvons presque toutes dans les régions chaudes. Moins de modifications passent en même temps dans les régions tempérées, tandis que beaucoup moins encore s'avancent vers les régions froides. De là il résulte à n'en pas douter: 1° que les Céphalopodes acétabulifères sont d'autant plus compliqués dans leurs formes, dans leurs caractères, qu'ils habitent des régions plus chaudes; 2° que leur centre d'animalisation, leurs régions favorites sont, sous une température très élevée.

Ces conséquences, auxquelles nous sommes arrivé par la seule étude des formes, sans avoir égard aux nombres spécifiques, sont des plus importantes, relativement à l'ensemble des genres que nous avons signalés à l'état fossile; car elles nous donnent la presque certitude que tous ces genres ont vécu au sein de mers chaudes, ou, du moins, sous une température bien plus élevée que celle des lieux où l'on rencontre aujourd'hui ces restes, ce qui serait en rapport avec l'action lente du refroidissement de la terre.

Avant de passer à l'examen numérique des espèces de Céphalopodes acétabulifères, nous croyons devoir donner dans le tableau suivant de la répartition des espèces par genre, non-seulement la preuve de ce que nous venons de dire, mais encore les bases des considérations qui vont suivre. Ce tableau démontrera, de plus, le nombre des espèces par genre, et dès-lors fera juger de leur importance relative.

TABLEAU COMPARATIF *de la distribution géographique actuelle des espèces de Céphalopodes acétabulifères au sein des différentes mers.*

NOMS DES FAMILLES et des Genres.	ESPÈCES DE L'OCÉAN ATLANT.	ESPÈCES DU GRAND OCÉAN.	ESPÈCES DE LA MÉDITERRANÉE.	ESPÈCES DE LA MER-ROUGE.
	Cuverii.	Cuvierii.	Cuvierii.	Cuvierii.
	Vulgaris.	Vulgaris.	Vulgaris.	Vulgaris.
	Brevipes.	»	»	»
	Tuberculatus.	»	Tuberculatus.	»
	Tehuelchus.	»	»	»
	Rugosus.	Rugosus.	»	»
OCTOPIDÆ.	»	Membranaceus.	»	»
	»	Fontanianus.	»	»
Genre OCTOPUS.	»	Indicus.	»	»
	»	Aculeatus.	Aculeatus.	»
	»	Superciliosus.	»	»
	»	Aranea.	»	»
	»	Lunulatus.	»	»
	»	Cordiformis.	»	»
	»	»	Tetracirrhus.	»
	»	»	Granosus.	»
	»	»	»	Horridus.
ELEDONE.....	Cirrhosus.	»	»	»
	»	»	Moschatus.	»
	Quoyanus.	»	»	»
	Venustus.	»	»	»
PHILONEXIS.....	Atlanticus.	»	»	»
	Microstomus.	»	»	»
	»	»	Velifer.	»
	»	»	Tuberculatus.	»
	Argo.	Argo.	Argo.	»
ARGONAUTA.....	Hians.	Hians.	»	»
	»	Tuberculatus.	»	»
SEPIDÆ.	Scabra.	»	»	»
CRANCHIA.....	Maculata.	»	»	»
	Oweniana.	»	»	»
	Atlantica.	»	»	»
SEPIOLA.....	»	Japonica.	»	»
	»	Stenodactyla.	»	»
	»	»	Rondeleti.	»
SEPIOLOIDEA....	»	Lineolata.	»	»
	Palpebrosa.	»	»	»
ROSSIA.....	»	Subalata.	»	»
	»	»	Macrosoma.	»

NOMS DES FAMILLES et des Genres.	ESPÈCES. DE L'OCÉAN ATLANT.	DU GRAND OCÉAN.	DE LA MÉDITERRANÉE.	DE LA MER-ROUGE.
	Officinalis.	»	Officinalis.	»
	Hierredda.	»	»	»
	Bertheloti.	»	»	»
	Tuberculata.	»	»	»
	Vermiculata.	»	»	»
	Ornata.	»	»	»
	Orbigniana.	»	Orbigniana.	»
	Capensis.	»	»	»
	Rupellaria.	»	»	»
	Antillarum.	»	»	»
Sepia.....	»	Aculeata.	»	»
	»	Blainvillii.	»	»
	»	Rostrata.	»	»
	»	Rouxii.	»	Rouxii.
	»	Latimanus.	»	»
	»	Sinensis.	»	»
	»	Inermis.	»	»
	»	»	Elegans.	»
	»	»	»	Savignyi.
	»	»	»	Lefebrei.
	»	»	»	Elongata.
	»	»	»	Gibbosa.
	Vulgaris.	»	Vulgaris.	»
	Brasiliensis.	»	»	»
	Plei.	»	»	»
Loligidæ.	Perlucida.	»	»	»
	Pealei.	»	»	»
Loligo.....	Subulata.	»	Subulata.	»
	Brevis.	»	»	»
	Reynaudi.	»	»	»
	»	Gahi.	»	»
	»	Sumatrensis.	»	»
	»	Duvancelii.	»	»
	Sepioidea.	»	»	»
	»	Lunulata.	»	»
	»	Lessoniana.	»	»
	»	Mauritiana.	»	»
Sepioteuthis...	»	Australis.	»	»
	»	Blainvilleana.	»	»
	»	Bilineata.	»	»
	»	Sinensis.	»	»
	»	»	»	Hemprichii.
	»	»	»	Loliginiformis.
	Pavo.	»	»	»
Loligopsidæ.	»	Guttata.	»	»
Loligopsis.....	»	Peronii.	»	»
	»	Chrysoptalma.	»	»
	Bomplandi.	»	»	»

NOMS DES FAMILLES et des Genres.	ESPÈCES DE L'OCÉAN ATLANT.	ESPÈCES DU GRAND OCÉAN.	ESPÈCES DE LA MÉDITERRANÉE.	ESPÈCES DE LA MER-ROUGE.
CHIROTEUTHIS . .	»	»	Veranyi.	»
HISTIOTEUTHIS. .	»	»	Bonnelliana.	»
TEUTHIDÆ.	Bergii.	Bergii.	»	»
	Cardioptera.	»	»	»
	Caribœa.	»	»	»
ONYCHOTEUTHIS.	Banckxii.	»	»	»
	»	Dussumieri.	»	»
	»	Platyptera.	»	»
	»	»	Lichtenstenii.	»
	Morisii.	»	»	»
ENOPLOTEUTHIS.	»	Lesueurii.	»	»
	»	Molinæ.	»	»
	»	Armata.	»	»
	Bartramii.	»	Bartramii.	»
	Sagittata.	»	Sagittata.	»
	Cylindricus.	»	»	»
OMMASTREPHES. .	Pelagicus.	»	»	»
	»	Giganteus.	»	»
	»	Oceanicus.	»	»
	»	»	Todarus.	»
	»	»	»	Arabicus.
SPIRULIDÆ.				
SPIRULA.	Fragilis.	»	»	»

Le second point de vue, sous lequel nous envisagerons la répartition géographique des Céphalopodes acétabulifères, sera relatif au nombre d'espèces, sans avoir égard aux formes. Ainsi, ne faisant qu'une somme totale de toutes les espèces bien caractérisées et réduites à leur simple valeur, élaguant toutes celles qui sont peu certaines, et celles sur lesquelles nous n'avons pas de données positives d'habitation, nous allons chercher si les résultats sont les mêmes que pour les formes génériques, relativement à leur répartition sur le globe.

Nous connaissons *cent huit* espèces de Céphalopodes acétabulifères, dont *quarante-neuf* se rencontrent dans l'Océan Atlantique, *quarante-sept* dans le grand Océan, *vingt-trois* dans la

Méditerranée et *onze* dans la Mer Rouge (1). Il est bien entendu que ces nombres renferment les espèces qui se trouvent dans plusieurs mers à-la-fois; néanmoins ils démontrent que les mers en nourrissent une quantité, pour ainsi dire, proportionnée à leur étendue, et nous croyons que si le grand Océan ne nous en a pas montré, comparativement à sa vaste superficie, plus que l'Océan Atlantique et que la Méditerranée, cela peut provenir de son éloignement, qui a empêché d'y faire des recherches aussi complètes que dans l'Océan Atlantique.

Nous allons prendre maintenant chaque bassin maritime en particulier pour reconnaître le nombre d'espèces qui lui est spécial ou qui se trouve en même temps dans plusieurs autres mers, examinant ainsi quelles parties de ces mers fréquentent les espèces.

Parmi les 49 espèces de l'Océan Atlantique, nous en rencontrons 2 habitant simultanément le grand Océan, la Méditerranée et la Mer Rouge, 1 le grand Océan et la Méditerranée, 4 le grand Océan et 7 la Méditerranée (2). Il resterait encore *trente-cinq* espèces propres à l'Océan Atlantique. Sur ce nombre si nous cherchons à quelles parties appartiennent les espèces qui le composent, nous trouverons que 16, ou près de la moitié, sont des zones chaudes de l'Océan, sans dépendre des continens; que 6 sont spéciales aux côtes africaines, 4 à l'Amérique Septentrionale, 3 à l'Amérique Méridionale, 3 aux côtes d'Europe, 2 au cap de Bonne-Espérance et une au pôle : ainsi, le plus grand nombre serait des mers chaudes ou des côtes qui en sont baignées.

Parmi les 47 espèces du grand Océan, nous en trouvons 2 vivant, en même temps, dans l'Océan Atlantique, la Méditerranée et la Mer Rouge; 1 dans la Méditerranée et l'Océan Atlantique, 1 dans la Mer Rouge, 1 dans l'Océan Atlantique et dans la Médi-

(1) On ne connaît jusqu'à présent aucun Céphalopode de la Mer Noire, fait reconnu par Aristote (lib. IX, cap. XXXVII).

(2) Il est à remarquer que presque toutes ces espèces voyageuses appartiennent au genre *Octopus*.

terranée. Il reste donc encore, après ces soustractions, 38 espèces propres au grand Océan, sur lesquelles 21 sont de l'Inde ou des mers voisines, 13 de l'Australie ou des mers océaniennes et 4 de l'Amérique Méridionale.

Parmi les 23 espèces de la Méditerranée, nous en trouvons 2 habitant simultanément l'Océan Atlantique, le grand Océan et la Mer Rouge, 1 le grand Océan et 7 l'Océan Atlantique. Il reste encore, après ces distinctions, 12 espèces propres à la Méditerranée, chiffre énorme quand on le compare à l'étendue restreinte de son bassin. Les espèces méditerranéennes paraissent, du reste, se trouver dans toutes les parties.

Parmi les 11 espèces de la Mer Rouge, 2 habitent encore les deux grands Océans et la Méditerranée, et 1 le grand Océan : dès-lors il reste 8 espèces propres à la Mer Rouge.

Il résulterait des chiffres qui précèdent, que, malgré le nombre des espèces passant indifféremment d'un Océan à l'autre, il y a, en somme, plus de deux tiers des espèces de chaque mer qui leur sont spéciales ; ce nombre prouve évidemment que des limites d'habitation fixes existent encore pour des animaux que leur puissance de locomotion, leurs mœurs pélagiennes, devraient répartir à-la-fois au sein de toutes les mers, si, le cap Hornn d'un côté, le cap de Bonne-Espérance de l'autre, n'étaient pas dans une position méridionale tout-à-fait en dehors de la zone torride, où habitent presque toutes les espèces, servant dès-lors comme de barrière, que ne peuvent franchir les Céphalopodes des régions chaudes, tandis que les espèces indifférentes à la température se trouvent presque toutes dans plusieurs mers à-la-fois. Il est évident pour nous que si le motif que nous venons d'énoncer n'était pas la véritable cause de limites restreintes parmi les Céphalopodes acétabulifères, il en serait de leurs espèces comme des Ptéropodes (1) que nous avons trouvés également dans les deux grands Océans; car les lois de dis-

(1) Voyez à cet égard nos généralités, *Voyage dans l'Amérique méridionale*, Mollusques, page 71.

tribution géographique, si tranchées par bassins maritimes parmi les Mollusques, comme nous l'avons reconnu pour les espèces côtières, que leurs habitudes empêchent de voyager, se modifient, dès que ces animaux habitant librement des mers, peuvent y voyager, ou sont transportés par les courans généraux; mais, comme nous le prouvent les Céphalopodes, ces modifications n'ont lieu que lorsque leur zone de température propre leur permet de supporter les passages par les régions froides. Nous avons donc la certitude que l'unité de température, plus que tous les autres agens, est la véritable base de la distribution géographique des êtres; fait prouvé par l'étude même de la géologie, puisque les espèces sont d'autant moins divisées par fausses locales, que les terrains sont plus anciens, s'étant dès-lors formées à une époque ou la température du globe terrestre était plus uniforme, par suite de la chaleur centrale.

Nous allons voir, du reste, si les chiffres des espèces de Céphalopodes acétabulifères, considérés, non plus par bassins, mais bien par zones, sans avoir égard aux circonscriptions des mers, confirment ou infirment les résultats auxquels nous sommes arrivés. L'ensemble des espèces que nous connaissons, divisées en trois séries, sans tenir compte des espèces qu'on trouve simultanément dans plusieurs zones, ou du moins les comptant dans chacune, nous donnent les résultats suivans :

Zone chaude.	78 espèces.
Zone tempérée.	35
Zone froide.	7

Sous ce rapport, les résultats étant encore les mêmes, nous croyons, en dernière analyse, pouvoir en conclure avec certitude que les Céphalopodes acétabulifères sont plus compliqués et plus nombreux sous la zone torride que partout ailleurs; que cette zone est plus propre à leur habitation, que la diversité des caractères, que le nombre, vont en diminuant d'une manière progressive très rapide, en s'avançant des régions chaudes aux régions tempérées, où ils sont déjà réduits à moins de la moitié,

et plus encore en arrivant dans les zones froides, où l'on trouve à peine des représentans de quelques séries, comme égarés, de leur zone plus spéciale.

Un dernier fait des plus curieux, appartenant encore à la distribution géographique des espèces, vient, comme une exception singulière, s'interposer au milieu des lois générales. Nous avons dit que les formes étaient d'autant plus variées, qu'on s'avance davantage vers des régions plus chaudes, et que le nombre des espèces va également en augmentant dans la même proportion; mais nous n'avons rien ajouté relativement à la multiplicité des individus, suivant ces espèces, au nombre comparatif individuel dans les diverses régions, et c'est précisément là que se place l'exception dont nous voulons parler. Dans les régions chaudes, les Céphalopodes acétabulifères sont des plus variés en espèces; dans les régions froides, ils le sont beaucoup moins; néanmoins, dans les zones chaudes, nous avons trouvé les individus peu multipliés, tandis que, des deux côtés du monde, aux régions voisines des pôles, nous voyons au pôle sud une seule espèce, l'*Ommastrephes giganteus*; au pôle nord, l'*Ommastrephes sagittatus*, si multipliés l'un et l'autre, que leurs bancs voyageurs, à l'instant des migrations annuelles, viennent encombrer les côtes du Chili et celles de Terre-Neuve, et que la mer, sur une surface immense, en montre partout les restes épars. L'exception que nous venons de signaler, quelque importante qu'elle puisse être, ne changera rien aux résultats généraux. Il nous paraît évident qu'elle tient plutôt aux habitudes sociales des individus de ces deux espèces, qui, dans une saison déterminée, les portent à suivre une direction fixe, qu'à la loi générale, que nous voyons présider à l'ensemble de la répartition des espèces au sein des mers.

Leçon *sur la Statique chimique des êtres organisés*,

Professée par M. Dumas,

Pour la clôture de son Cours à l'Ecole de Médecine.

Parmi les phénomènes de la vie dont vous êtes appelés à sonder les douloureux mystères, il en est qui se rattachent manifestement aux forces que la nature brute met elle-même en jeu, d'autres qui émanent d'une source plus élevée, moins accessible aux hardiesses de la pensée.

Il ne m'appartenait pas de jeter avec vous un regard curieux sur toute cette partie de vos études où viennent se ranger les faits qui se rapportent à l'exercice normal ou irrégulier des instincts de la vie. A plus forte raison, n'avons-nous jamais eu à nous entretenir de ces nobles facultés, par lesquelles l'intelligence humaine, maîtrisant tout ce qui l'entoure, brisant tous les obstacles, pliant toutes les forces naturelles à ses besoins, s'est emparée peu-à-peu de la terre, des mers, du globe tout entier; vaste domaine, que nos souvenirs, que nos pressentimens peut-être nous font si souvent considérer pourtant comme une prison trop étroite. A d'autres plus heureux, le soin de vous initier à ces graves études, le privilège de développer devant vous ces nobles pensées; notre tâche plus humble doit se renfermer dans le champ des phénomènes physiques de la vie, et encore en est-il qui n'ont pas dû trouver place dans nos leçons.

C'est surtout, en effet, le rôle de la matière dans la production et l'accroissement des êtres organisés, la part qu'elle prend à l'accomplissement des phénomènes de leur existence journalière, les altérations qu'elle éprouve après leur mort, que nous avions à étudier ensemble, et cette étude a bien suffi à elle seule à nos préoccupations de cette année.

I.

Les plantes, les animaux, l'homme, renferment de la matière. D'où vient-elle? Que fait-elle dans leurs tissus et dans les li-

quides qui les baignent ? Où va-t-elle quand la mort brise les liens par lesquels ses diverses parties étaient si étroitement unies ?

Voilà les questions que nous avons abordées ensemble avec hésitation d'abord ; car le problème pouvait être bien au-dessus des forces de la chimie moderne ; puis avec un peu plus de confiance, quand nous avons senti à cet accord tacite et secret de nos intelligences que la route était sûre et que nous pouvions voir le but se dégageant peu-à-peu de tous les obstacles. Si de ce travail, auquel vous avez assisté, auquel vous avez pris part, dois-je dire plutôt, si de cet effort scientifique sont sorties quelques vues générales, quelques formules simples, je devais m'en faire l'historien ; mais laissez-moi le plaisir d'ajouter qu'elles vous appartiennent ; qu'elles appartiennent à notre école, dont l'esprit est venu s'exercer sur ce terrain nouveau. C'est l'ardeur avec laquelle vous m'avez suivi dans cette carrière qui m'a donné la force de la parcourir ; c'est votre intérêt qui m'a soutenu, votre curiosité qui a éveillé la mienne, votre confiance qui m'a fait voir, qui me prouve en ce moment encore que nous sommes dans la route de la vérité.

Ces mots vous rappellent avec quel étonnement nous avons reconnu ensemble qu'à ces nombreux élémens de la chimie moderne, la nature organique n'en emprunte qu'un très petit nombre ; qu'à ces matières végétales ou animales maintenant multipliées à l'infini, la physiologie générale n'emprunte pas plus de dix à douze espèces, et que tous ces phénomènes de la vie si compliqués en apparence se rattachent, en ce qu'ils ont d'essentiel, à une formule générale si simple, qu'en quelques mots on a pour ainsi dire tout énoncé, tout rappelé, tout prévu.

N'avons-nous pas constaté, en effet, par une foule de résultats que les animaux constituent, au point de vue chimique, de véritables appareils de combustion, au moyen desquels, du carbone brûlé sans cesse retourne à l'atmosphère sous forme d'acide carbonique ; dans lesquels de l'hydrogène brûlé sans cesse, de son côté, engendre continuellement de l'eau ; d'où enfin s'exhale sans cesse par la respiration de l'azote libre, de l'azote à l'état d'oxide d'ammonium par les urines ?

Ainsi, du règne animal considéré dans son ensemble, s'échappent constamment de l'acide carbonique, de la vapeur d'eau, de l'azote et de l'oxide d'ammonium, matières simples et peu nombreuses dont la formation se rattache étroitement à l'histoire de l'air lui-même.

N'avons-nous pas constaté d'autre part que les plantes, dans leur vie normale, décomposent l'acide carbonique pour en fixer le carbone et en dégager l'oxigène; qu'elles décomposent l'eau pour s'emparer de son hydrogène et pour en dégager aussi l'oxigène; qu'enfin elles empruntent tantôt directement de l'azote à l'air, tantôt indirectement de l'azote à l'oxide d'ammonium, ou à l'acide nitrique, fonctionnant de tout point ainsi d'une manière inverse de celle qui appartient aux animaux? Si le règne animal constitue un immense appareil de combustion, le règne végétal, à son tour, constitue donc un immense appareil de réduction où l'acide carbonique réduit laisse son charbon; où l'eau réduite laisse son hydrogène; où l'oxide d'ammonium et l'acide azotique réduits laissent leur ammonium ou leur azote.

Si les animaux produisent sans cesse de l'acide carbonique, de l'eau, de l'azote, de l'oxide d'ammonium, les plantes consomment donc sans cesse de l'oxide d'ammonium, de l'azote, de l'eau, de l'acide carbonique. Ce que les uns donnent à l'air, les autres le reprennent à l'air, de sorte qu'à prendre ces faits au point de vue le plus élevé de la physique du globe, il faudrait dire qu'en ce qui touche leurs élémens vraiment organiques, les plantes, les animaux dérivent de l'air, ne sont que de l'air condensé; et que, pour se faire une idée juste et vraie de la constitution de l'atmosphère aux époques qui ont précédé la naissance des premiers êtres organisés à la surface du globe, il faudrait rendre à l'air, par le calcul, l'acide carbonique et l'azote dont les plantes et les animaux se sont approprié les élémens.

Les plantes et les animaux viennent donc de l'air et y retournent donc: ce sont de véritables dépendances de l'atmosphère.

Les plantes reprennent donc sans cesse à l'air ce que les animaux lui fournissent, c'est-à-dire du charbon, de l'hydro-

gène et de l'azote, ou plutôt de l'acide carbonique, de l'eau et de l'ammoniaque.

Reste à préciser maintenant comment, à leur tour, les animaux se procurent ces élémens qu'ils restituent à l'atmosphère, et l'on ne peut voir sans admiration pour la simplicité sublime de toutes ces lois de la nature, que les animaux empruntent toujours ces élémens aux plantes elles-mêmes.

Nous avons reconnu, en effet, par des résultats de toute évidence, que les animaux ne créent pas de véritables matières organiques, mais qu'ils les détruisent; que les plantes, au contraire, créent habituellement ces mêmes matières, et qu'elles n'en détruisent que peu et pour des conditions particulières et déterminées.

Ainsi, c'est dans le règne végétal que réside le grand laboratoire de la vie organique; c'est là que les matières végétales et animales se forment, et elles s'y forment aux dépens de l'air;

Des végétaux, ces matières passent toutes formées dans les animaux herbivores, qui en détruisent une partie et qui accumulent le reste dans leurs tissus;

Des animaux herbivores, elles passent toutes formées dans les animaux carnivores, qui en détruisent ou en conservent selon leurs besoins;

Enfin, pendant la vie de ces animaux ou après leur mort, ces matières organiques, à mesure qu'elles se détruisent, retournent à l'atmosphère d'où elles proviennent.

Ainsi se ferme ce cercle mystérieux de la vie organique à la surface du globe. L'air contient ou engendre des produits oxidés, acide carbonique, eau, acide azotique, oxide d'ammonium. Les plantes, véritables appareils réducteurs, s'emparent de leurs radicaux, carbone, hydrogène, azote, ammonium. Avec ces radicaux, elles façonnent toutes les matières organiques ou organisables qu'elles cèdent aux animaux. Ceux-ci, à leur tour, véritables appareils de combustion, reproduisent à leur aide l'acide carbonique, l'eau, l'oxide d'ammonium et l'acide azotique, qui retournent à l'air pour reproduire de nouveau et dans l'immensité des siècles les mêmes phénomènes.

Et si l'on ajoute à ce tableau, déjà si frappant par sa simpli-

cité et sa grandeur, le rôle incontesté de la lumière solaire, qui seule a le pouvoir de mettre en mouvement cet immense appareil, cet appareil inimité jusqu'ici, que le règne végétal constitue et où vient s'accomplir la réduction des produits oxidés de l'air, on sera frappé du sens de ces paroles de Lavoisier :

« L'organisation, le sentiment, le mouvement spontané, la « vie n'existent qu'à la surface de la terre et dans les lieux ex« posés à la lumière. On dirait que la fable du flambeau de Pro« méthée était l'expression d'une vérité philosophique qui n'a« vait point échappé aux anciens. Sans la lumière, la nature « était sans vie, elle était morte et inanimée : un Dieu bienfai« sant, en apportant la lumière, a répandu sur la surface de la « terre l'organisation, le sentiment et la pensée. »

Ces paroles sont aussi vraies qu'elles sont belles. Si le sentiment et la pensée, si les plus nobles facultés de l'âme et de l'intelligence ont besoin, pour se manifester, d'une enveloppe matérielle, ce sont les plantes qui sont chargées d'en ourdir la trame avec des élémens qu'elles empruntent à l'air, et sous l'influence de la lumière que le soleil, où en est la source inépuisable, verse constamment et par torrens à la surface du globe.

Et comme si, dans ces grands phénomènes, tout devait se rattacher aux causes qui en paraissent le moins proches, il faut remarquer encore comment l'oxide d'ammonium, l'acide azotique, auxquels les plantes empruntent une partie de leur azote, dérivent eux-mêmes presque toujours de l'action des grandes étincelles électriques qui éclatent dans les nuées orageuses, et qui, sillonnant l'air sur une grande étendue, y produisent l'azotate d'ammoniaque que l'analyse y décèle.

Ainsi, des bouches de ces volcans dont les convulsions agitent si souvent la croûte du globe, s'échappe sans cesse la principale nourriture des plantes, l'acide carbonique; de l'atmosphère enflammée par les éclairs et du sein même de la tempête descend sur la terre cette autre nourriture non moins indispensable des plantes, celle d'où vient presque tout leur azote, le nitrate d'ammoniaque, que renferment les pluies d'orage.

Ne dirait-on pas comme un souvenir de ce chaos dont parle

la Bible, de ces temps de désordre et de tumulte des élémens qui ont précédé l'apparition des êtres organisés sur la terre?

Mais à peine l'acide carbonique et l'azotate d'ammoniaque sont-ils formés qu'une force plus calme, quoique non moins énergique, vient les mettre en jeu : c'est la lumière. Par elle, l'acide carbonique cède son carbone, l'eau son hydrogène, l'azotate d'ammoniaque son azote. Ces élémens s'associent, les matières organisées se forment et la terre revêt son riche tapis de verdure.

C'est donc en absorbant sans cesse une véritable force, la lumière et la chaleur émanées du soleil, que les plantes fonctionnent et qu'elles produisent cette immense quantité de matière organisée ou organique, pâture destinée à la consommation du règne animal.

Et si nous ajoutons que les animaux produisent, de leur côté, de la chaleur et de la force en consommant ce que le règne animal a produit et a lentement accumulé, ne semble-t-il pas que la fin dernière de tous ces phénomènes, que leur formule la plus générale se révèle à nos yeux?

L'atmosphère nous apparaît comme renfermant les matières premières de toute l'organisation; les volcans et les orages comme les laboratoires où se sont façonnés d'abord l'acide carbonique et l'azotate d'ammoniaque dont la vie avait besoin pour se manifester ou se multiplier.

A leur aide, la lumière vient développer le règne végétal, producteur immense de matière organique; les plantes absorbent la force chimique qui leur vient du soleil pour décomposer l'acide carbonique, l'eau et l'azotate d'ammoniaque, comme si les plantes réalisaient un appareil réductif supérieur à tous ceux que nous connaissons; car aucun d'eux ne décomposerait l'acide carbonique à froid.

Viennent ensuite les animaux, consommateurs de matière et producteurs de chaleur et de force, véritables appareils de combustion. C'est en eux que la matière organisée revêt sa plus haute expression sans doute; mais ce n'est pas sans en souffrir qu'elle devient l'instrument du sentiment et de la pensée; sous cette influence, la matière organisée se brûle, et en produisant

cette chaleur, cette électricité qui font notre force et qui en mesurent le pouvoir, ces matières organisées ou organiques s'anéantissent pour retourner à l'atmosphère d'où elles sortent.

L'atmosphère constitue donc le chaînon mystérieux qui lie le règne végétal au règne animal.

Les végétaux absorbent donc de la chaleur et accumulent donc de la matière qu'ils savent organiser.

Les animaux par lesquels cette matière organisée ne fait que passer, la brûlent ou la consomment pour produire à son aide la chaleur et les diverses forces que leurs mouvemens mettent à profit.

Permettez donc, qu'empruntant aux sciences modernes une image assez grande pour supporter la comparasion avec ces grands phénomènes, nous assimilions la végétation actuelle, véritable magasin où s'alimente la vie animale, à cet autre magasin de charbon que constituent les anciens dépôts de houille, et qui brûlé par le génie de Papin et de Watt, vient produire aussi de l'acide carbonique, de l'eau, de la chaleur, du mouvement, on dirait presque de la vie et de l'intelligence.

Pour nous le règne végétal constituera donc un immense dépôt de combustible destiné à être consommé par le règne animal, et où ce dernier trouve la source de la chaleur et des forces locomotives qu'il met à profit.

Ainsi un lien commun entre les deux règnes, l'atmosphère; quatre élémens dans les plantes et dans les animaux, le carbone, l'hydrogène, l'azote et l'oxigène; un très petit nombre de formes sous lesquelles les végétaux les accumulent, sous lesquelles les animaux les consomment, quelques lois très simples que leur enchaînement simplifie encore; tel serait le tableau de l'état de la chimie organique la plus élevée, qui résulterait de nos conférences de cette année.

Vous avez compris comme moi qu'avant de nous séparer nous avions besoin de nous recueillir en nous-mêmes, de préciser tous les faits, de rapprocher et de résumer les opinions qui expliquent et développent ces grands principes; enfin qu'il était utile à vos études futures de vous donner par écrit et sous une forme plus nette l'expression de ces vues nées en partie sous l'excita-

tion de vos regards, et par conséquent formulées avec l'hésitation qui accompagne si souvent le premier jet de toutes nos pensées.

II.

Puisque tous les phénomènes de la vie s'exercent sur des matières qui ont pour base le carbone, l'hydrogène, l'azote, l'oxigène; puisque ces matières passent du règne animal au règne vegetal par des formes intermédiaires, l'acide carbonique, l'eau et l'oxide d'ammonium; puisqu'enfin l'air est la source où le règne végétal s'alimente, qu'il est le réservoir dans lequel le règne animal vient s'anéantir, nous sommes conduits à étudier rapidement ces divers corps au point de vue particulier de la physiologie générale.

Composition de l'eau. — L'eau se forme et se décompose sans cesse dans les animaux et les plantes; pour apprécier ce qui en résulte, voyons d'abord quelle est sa composition. Des expériences fondées sur la combustion directe de l'hydrogène, et où j'ai produit plus d'un kilogramme d'eau artificielle; expériences très difficiles, très délicates, il est vrai, mais dont les erreurs seraient, du reste, sans importance pour les circonstances qui nous occupent, rendent très probable que l'eau est formée, en poids,

De 1 partie d'hydrogène
Et 8 parties oxigène,

et que ces nombres entiers et simples expriment le véritable rapport suivant lequel se combinent ces deux élémens pour constituer l'eau.

Comme les matières se représentent toujours aux yeux du chimiste par des molécules, comme il cherche toujours à rattacher dans sa pensée, au nom même de chaque matière, le poids de la molécule, la simplicité de ce rapport n'est pas sans quelque importance.

En effet, chaque molécule d'eau se trouvant formée d'une molécule d'hydrogène et d'une molécule d'oxigène, on arrive à ces nombres simples qui ne s'oublient plus.

Une molécule d'hydrogène pèse 1; une molécule d'oxigène pèse 8, et une molécule d'eau pèse 9.

Composition de l'acide carbonique. — L'acide carbonique se produit sans cesse dans les animaux, et se décompose sans cesse dans les plantes; sa composition méritait donc un attention spéciale à son tour.

Or l'acide carbonique comme l'eau se représente par les nombres les plus simples.

Des expériences fondées sur la combustion directe du diamant et sur sa conversion en acide carbonique m'ont prouvé que cet acide se forme de la combinaison de 6 parties en poids de carbone pour 16 parties en poids d'oxigène.

On est donc conduit à se représenter l'acide carbonique comme étant formé d'une molécule de carbone pesant 6 pour deux molécules d'oxigène pesant 16, ce qui constituerait une molécule d'acide carbonique pesant 22.

Composition de l'ammoniaque. — Enfin l'ammoniaque à son tour semble formé en nombres entiers de 3 parties d'hydrogène pour 14 d'azote, ce qui peut se représenter par 3 molécules d'hydrogène pesant 3 et par une molécule d'azote pesant 14.

Ainsi, comme pour montrer mieux toute sa puissance, la nature n'opère, quand il s'agit de l'organisation, que sur un très petit nombre d'élémens combinés dans les rapports les plus simples.

Tout le système atomique du physiologiste roule sur ces quatre nombres : 1, 6, 7, 8.

1, c'est la molécule d'hydrogène;

6, celle du carbone;

7, ou deux fois 7, c'est-à-dire 14, celle de l'azote;

8, celle de l'oxigène.

Qu'il rattache toujours ces nombres à ces noms, car pour le chimiste, il ne saurait exister ni hydrogène, ni carbone, ni azote, ni oxigène abstraits. Ce sont ces êtres dans leur réalité qu'il a toujours en vue; c'est de leurs molécules qu'il parle toujours, et pour lui le mot hydrogène peint une molécule qui pèse 1, le mot carbone une molécule qui pèse 6, et le mot oxigène une molécule qui pèse 8.

Composition de l'air. — L'air atmosphérique, qui joue un si grand rôle dans la nature organique, possède-t-il aussi une com-

position simple comme l'eau, l'acide carbonique et l'ammoniaque? Telle est la question que nous avons récemment étudiée, M. Boussingault et moi. Or, nous avons trouvé, comme le pensaient le plus grand nombre des chimistes, et contrairement à l'opinion du docteur Prout, à qui la chimie doit tant de vues ingénieuses, que l'air est un mélange, un véritable mélange.

En poids, l'air renferme 2,300 d'oxigène pour 7,700 d'azote; en volume, 208 du premier pour 792 du second.

L'air renferme en outre de 4 à 6/10,000^e d'acide carbonique en volume, soit qu'on le prenne à Paris, soit qu'on le prenne à la campagne. Ordinairement, il en renferme 4/10,000^e.

De plus, il contient une quantité presque égale de ce gaz hydrogène carboné, qu'on nomme gaz des marais, et que les eaux stagnantes laissent dégager à chaque instant.

Nous ne parlons pas de la vapeur aqueuse si variable; de l'oxide d'ammonium et de l'acide azotique, qui ne peuvent avoir dans l'air qu'une existence momentanée à raison de leur solubilité dans l'eau.

L'air constitue donc un mélange d'oxigène, d'azote, d'acide carbonique et de gaz des marais.

L'acide carbonique y varie, et même beaucoup, puisque les différences y vont presque du simple au double, de 4 à 6/10,000^e. Ne serait-ce pas la preuve que les plantes lui enlèvent cet acide carbonique et que les animaux lui en reprennent, ne serait-ce pas, en un mot, la preuve de cet équilibre des élémens de l'air attribué aux actions inverses que les animaux et les plantes produisent sur lui?

Il y a long-temps, en effet, qu'on l'a remarqué; les animaux empruntent à l'air son oxigène et lui rendent de l'acide carbonique; les plantes à leur tour décomposent cet acide carbonique pour en fixer le carbone et restituent son oxigène à l'air.

Comme les animaux respirent toujours, comme les plantes ne respirent que sous l'influence solaire; comme en hiver la terre est dépouillée, tandis qu'en été elle est couverte de verdure, on a cru que l'air devait traduire toutes ces influences dans sa constitution.

L'acide carbonique devait augmenter la nuit et diminuer le jour. L'oxigène à son tour devait suivre une marche inverse.

L'acide carbonique devait aussi suivre le cours des saisons et l'oxigène subir le même sort.

Tout cela est vrai, sans doute, et très sensible pour une portion d'air limitée et confinée sous une cloche, mais dans la masse de l'atmosphère toutes ces variations locales se confondent et disparaissent. Il faut des siècles accumulés pour que cette balance des deux règnes au sujet de la composition de l'air puisse être mise en jeu d'une manière efficace et nécessaire; nous sommes donc bien loin de ces variations journalières ou annuelles qu'on était disposé à regarder comme aussi faciles à observer qu'à prévoir.

Relativement à l'oxigène, le calcul montre qu'en exagérant toutes les données, il ne faudrait pas moins de 800,000 années aux animaux vivans à la surface de la terre, pour le faire disparaître en entier.

Par conséquent, si l'on supposait que l'analyse de l'air eût été faite en 1800, et que pendant tout le siècle les plantes eussent cessé de fonctionner à la surface du globe entier, tous les animaux continuant d'ailleurs à vivre, les analystes en 1900 trouveraient l'oxigène de l'air diminué de 1/8000 de son poids, quantité qui est inaccessible à nos méthodes d'observations les plus délicates, et qui à coup sûr n'influerait en rien sur la vie des animaux ou des plantes.

Ainsi, nous ne nous y tromperons pas, l'oxigène de l'air est consommé par les animaux, qui le convertissent en eau et en acide carbonique; il est restitué par les plantes qui décomposent ces deux corps.

Mais la nature a tout disposé pour que le magasin d'air fût tel relativement à la dépense des animaux, que la nécessité de l'intervention des plantes pour la purification de l'air ne se fît sentir qu'au bout de quelques siècles.

L'air qui nous entoure pèse autant que 581,000 cubes de cuivre d'un kilomètre de côté; son oxigène pèse autant que 134,000 de ces mêmes cubes. En supposant la terre peuplée de mille millions d'hommes, et en portant la population animale

à une quantité équivalente à trois mille millions d'hommes, on trouverait que ces quantités réunies ne consomment en un siècle qu'un poids d'oxigène égal à 15 ou 16 kilomètres cubes de cuivre, tandis que l'air en renferme 134,000.

Il faudrait 10,000 années pour que tous ces hommes pussent produire sur l'air un effet sensible à l'eudiomètre de Volta; même en supposant la vie végétale anéantie pendant tout ce temps.

En ce qui concerne la permanence de la composition de l'air, nous pouvons dire en toute assurance que la proportion d'oxigène qu'il renferme est garantie pour bien des siècles, même en supposant nulle l'influence des végétaux, et que néanmoins ceux-ci lui restituent sans cesse de l'oxigène en quantité au moins égale à celle qu'il perd, et peut-être supérieure; car les végétaux vivent tout aussi bien aux dépens de l'acide carbonique fourni par les volcans, qu'aux dépens de l'acide carbonique fourni par les animaux eux-mêmes.

Ce n'est donc pas pour purifier l'air que ceux-ci respirent que les végétaux sont surtout nécessaires aux animaux; c'est pour leur fournir surtout, et incessamment, de la matière organique toute prête à l'assimilation; de la matière organique, qu'ils puissent brûler à leur profit.

Il y a donc un service nécessaire sans doute, mais si éloigné que notre reconnaissance en est bien petite, que les végétaux nous rendent, en purifiant l'air que nous consommons. Il en est un autre tellement prochain que si, pendant une seule année, il nous faisait défaut, la terre en serait dépeuplée, c'est celui que ces mêmes végétaux nous rendent en préparant notre nourriture et celle de tout le règne animal. C'est en cela surtout que réside cet enchaînement des deux règnes. Supprimez les plantes et les animaux périssent tous d'une affreuse disette; la nature organique elle-même disparaît tout entière avec eux, en quelques saisons.

Cependant, avons-nous dit, l'acide carbonique de l'air varie de 4 à 6/10,000. Ces variations sont très faciles à observer et très fréquentes. N'est-ce pas là un phénomène qui accuse l'in-

fluence des animaux qui introduisent cet acide dans l'air et celle des végétaux qui le lui enlèvent?

Non, vous le savez, ce phénomène est un simple phénomène météorologique. Il en est de l'acide carbonique comme de la vapeur aqueuse, qui se forme à la surface des mers, pour se condenser ailleurs, retomber en pluie et se reproduire encore sous forme de vapeur.

Cette eau qui se condense et tombe, dissout et entraîne l'acide carbonique; cette eau qui s'évapore abandonne ce même gaz à l'air.

Il y aurait donc un grand intérêt météorologique à mettre en regard les variations de l'hygromètre et celles des saisons ou de l'état du ciel, avec les variations de l'acide carbonique de l'air; mais jusqu'ici tout tend à montrer que ces variations rapides constituent un simple évènement météorologique, et non pas comme on l'avait pensé un évènement physiologique qui, considéré isolément, produirait à coup sûr des variations infiniment plus lentes que celles qu'on observe en réalité tant dans les villes qu'à la campagne elle-même.

Ainsi l'air est un immense réservoir où les plantes peuvent long-temps puiser tout l'acide carbonique nécessaire à leurs besoins, où les animaux, pendant bien plus long-temps encore, trouveront tout l'oxigène qu'ils peuvent consommer.

C'est aussi dans l'atmosphère que les plantes puisent leur azote, soit directement, soit indirectement; c'est là que les animaux le restituent en définitive.

L'atmosphère est donc un mélange qui reçoit et fournit sans cesse de l'oxigène, de l'azote ou de l'acide carbonique, par mille échanges dont il est maintenant facile de se former une juste idée, et dont une analyse rapide va nous permettre d'apprécier les détails.

III.

Que l'on jette une semence en terre, et qu'on la laisse germer et se développer, qu'on suive la nouvelle plante jusqu'à ce qu'elle ait porté fleurs et graines à son tour, et l'on verra par des

analyses convenables que la semence primitive, en produisant le nouvel être, a fixé du carbone, de l'hydrogène, de l'oxigène, de l'azote et des cendres.

Carbone. — Le carbone provient essentiellement de l'acide carbonique, soit qu'il ait été emprunté à l'acide carbonique de l'air, soit qu'il provienne de cette autre partie d'acide carbonique que la décomposition spontanée des engrais développe sans cesse au contact de racines.

Mais c'est dans l'air surtout que le plus souvent les plantes puisent leur carbone. Comment en serait-il autrement quand on voit l'énorme quantité de carbone qu'ont su s'approprier des arbres séculaires par exemple, et l'espace si limité pourtant dans lequel leurs racines peuvent s'étendre? A coup sûr, quand a germé le gland qui a produit, il y a cent ans, le chêne qui fait notre admiration maintenant, le terrain sur lequel il était tombé ne renfermait pas la millionième partie du charbon que le chêne lui-même renferme aujourd'hui. C'est l'acide carbonique de l'air qui a fourni le reste, c'est-à-dire la masse à-peu-près entière.

Mais quoi de plus clair et de plus concluant d'ailleurs, que cette expérience de M. Boussingault où des pois semés dans du sable, arrosés d'eau distillée et alimentés d'air seulement, ont trouvé dans cet air tout le carbone nécessaire pour se développer, fleurir et fructifier.

Toutes les plantes fixent du carbone, toutes l'empruntent à l'acide carbonique, soit que celui-ci soit pris directement à l'air par les feuilles, soit que les racines puisent dans la terre les eaux pluviales imprégnées d'acide carbonique, soit que les engrais, en se décomposant dans le sol, fournissent de l'acide carbonique dont les racines s'emparent aussi pour les transporter aux feuilles.

Tous ces résultats se constatent sans peine. M. Boussingault a vu des feuilles de vigne enfermées dans un ballon prendre tout l'acide carbonique de l'air qu'on dirigeait au travers de ce vase, quelque rapide que fût le courant. M. Boucherie a vu à son tour s'échapper, du tronc coupé des arbres en pleine sève, des quan-

tités énormes d'acide carbonique évidemment aspiré du sol par les racines.

Mais si les racines puisent dans le sol cet acide carbonique, si celui-ci passe dans la tige et de là dans les feuilles, il finit par s'exhaler dans l'atmosphère, sans altération quand aucune force nouvelle n'intervient.

Tel est le cas des plantes végétant à l'ombre ou dans la nuit. L'acide carbonique du sol filtre au travers de leurs tissus et se répand dans l'air. On dit que les plantes produisent de l'acide carbonique pendant la nuit; il faut dire que les plantes, en pareil cas, laissent passer de l'acide carbonique emprunté au sol.

Mais que cet acide carbonique venant du sol ou pris à l'atmosphère se trouve en contact avec les feuilles ou les parties vertes, que la lumière solaire intervienne d'ailleurs, et alors la scène change tout-à coup.

L'acide carbonique disparaît. Des bulles déliées d'oxigène se développent sur tous les points de la feuille et le carbone se fixe dans les tissus de la plante.

Chose bien digne d'intérêt, ces parties vertes des plantes, les seules qui jusqu'ici puissent manifester cet admirable phénomène de la décomposition de l'acide carbonique sont aussi douées d'une autre propriété non moins spéciale, non moins mystérieuse.

En effet, vient-on à transporter leur image dans l'appareil de M. Daguerre, ces parties vertes ne s'y trouvent pas reproduites, comme si tous les rayons chimiques, essentiels aux phénomènes daguerriens, avaient disparu dans la feuille, absorbés et retenus par elle.

Les rayons chimiques de la lumière disparaissent donc en entier dans les parties vertes des plantes, absorption extraordinaire sans doute, mais qu'explique sans peine la dépense énorme de force chimique nécessaire à la décomposition d'un corps aussi stable que l'acide carbonique.

Quel est d'ailleurs le rôle de ce carbone fixé dans la plante? A quoi est-il destiné? Pour la majeure partie sans doute, il se combine à l'eau ou à ses élémens, donnant ainsi naissance à des matières de la plus haute importance pour le végétal.

Que 12 molécules d'acide carbonique se décomposent et abandonnent leur oxigène, et il en résultera 12 molécules de carbone qui, avec 10 molécules d'eau, pourront constituer soit le tissu cellulaire des plantes, soit leur tissu ligneux, soit l'amidon et la dextrine qui en dérive.

Ainsi dans une plante quelconque, la masse presque entière de la charpente formée comme elle l'est par du tissu cellulaire, du tissu ligneux, de l'amidon ou des matières gommeuses se représentera par 12 molécules de charbon unies à 10 molécules d'eau.

Le ligneux, insoluble dans l'eau; l'amidon, qui fait empois dans l'eau bouillante et la dextrine, qui se dissout si bien dans l'eau à froid ou à chaud, constituent donc, comme l'a si bien prouvé M. Payen, trois corps doués exactement de la même composition, mais diversifiés par un arrangement moléculaire différent.

Ainsi, avec les mêmes élémens, dans les mêmes proportions, la nature végétale produit ou bien les parois insolubles des cellules du tissu cellulaire et des vaisseaux, ou bien l'amidon qu'elle accumule comme aliment autour des bourgeons et des embryons, ou bien la dextrine soluble que la sève peut transporter d'une place à l'autre pour les besoins de la plante.

Admirable fécondité, qui sait du même corps en faire trois différens et qui permet de les transmuter l'un en l'autre avec la plus faible dépense de force toutes les fois que l'occasion l'exige.

C'est encore au moyen du charbon uni à l'eau que se produisent les matières sucrées si fréquemment déposées dans les organes des plantes pour des besoins spéciaux que nous rappellerons bientôt. 12 molécules de carbone et 11 molécules d'eau forment le sucre de canne. 12 molécules de carbone et 15 molécules d'eau font le sucre de raisin.

Ces matières ligneuses, amylacées, gommeuses et sucrées, que le charbon, pris à l'état naissant, peut produire en s'unissant à l'eau, jouent un rôle si large dans la vie des plantes, qu'il n'est plus difficile de s'expliquer, quand on les prend en consi-

dération, le rôle important que joue dans les plantes la décomposition de l'acide carbonique.

Hydrogène. — De même que les plantes décomposent l'acide carbonique pour s'approprier son carbone et pour former avec celui-ci tous les corps neutres qui composent leur masse presque entière, de même, et pour certains produits qu'elles forment en moindre abondance, les plantes décomposent l'eau et en fixent l'hydrogène. C'est ce qui ressort clairement des expériences de M. Boussingault sur la végétation des pois en vaisseaux clos. C'est ce qui ressort plus clairement encore de la production des huiles grasses ou volatiles si fréquentes dans certaines parties des plantes et toujours si riches en hydrogène. Celui-ci ne peut venir que de l'eau, car la plante ne reçoit pas d'autre produit hydrogéné que l'eau elle-même.

Ces corps hydrogénés, auxquels donne naissance la fixation de l'hydrogène emprunté à l'eau, sont employés par les plantes à des usages accessoires. Ils constituent en effet les huiles volatiles qui servent de défense contre les ravages des insectes; des huiles grasses ou des graisses, dont la graine s'entoure, et qui servent à développer de la chaleur en se brûlant au moment de la germination; des cires dont les feuilles ou les fruits se revêtent pour devenir imperméables à l'eau.

Mais tous ces usages ne constituent que des accidens de la vie des plantes; aussi les produits hydrogénés sont-ils bien moins nécessaires, bien moins communs dans le règne végétal que les produits neutres formés de charbon et d'eau.

Azote. — Pendant sa vie, toute plante fixe de l'azote, soit qu'elle emprunte cet azote à l'atmosphère, soit qu'elle le prenne aux engrais. Dans les deux cas il est probable que l'azote n'arrive dans la plante et ne s'y utilise que sous forme d'ammoniaque ou d'azide azotique.

Les expériences de M. Boussingault ont prouvé que certaines plantes, comme les topinambours, empruntent à l'air une grande quantité d'azote; que d'autres, comme le froment, ont au contraire besoin de tirer tout leur azote des engrais; distinction précieuse pour l'agriculture, car il faut évidemment, dans toute culture, commencer par produire les végétaux qui s'assimilent

l'azote et l'air, élever à leur aide les bestiaux qui fourniront des engrais et tirer parti de ces derniers pour la culture de certaines plantes qui ne savent prendre l'azote que dans les engrais eux-mêmes.

L'un des plus beaux problèmes de l'agriculture réside donc dans l'art de se procurer de l'azote à bon marché. Pour le carbone, il n'y a pas à s'en inquiéter; la nature y a pourvu; l'air et l'eau pluviale y suffisent. Mais l'azote de l'air, celui que l'eau dissout et entraîne, les sels ammoniacaux que l'eau pluviale recèle elle-même ne sont pas toujours suffisans. Pour la plupart des plantes de culture importante il faut encore entourer leurs racines d'un engrais azoté, source permanente d'ammoniaque ou d'acide azotique, dont la plante s'empare à mesure de leur production. C'est là, comme on sait, une des grandes dépenses de l'agriculture, un de ses grands obstacles, car elle ne retrouve que l'engrais qu'elle produit elle-même. Mais la chimie est assez avancée sur ce point pour que le problème de la production d'un engais azoté purement chimique ne puisse tarder à être résolu.

M. Schattenman, l'habile directeur des usines de Bouxvillers, en Alsace, M. Boussingault, M. Liebig, ont fixé l'attention sur le rôle de l'ammoniaque dans les engrais azotés. Des essais récens montrent que l'acide azotique des azotates mérite aussi une attention particulière.

Mais à quoi sert donc cet azote dont les plantes semblent avoir un besoin si impérieux? Les recherches de M. Payen nous l'apprennent en partie, car elles ont prouvé que tous les organes de la plante, sans exception, commencent par être formés d'une matière azotée analogue à la fibrine à laquelle viennent s'associer plus tard le tissu cellulaire, le tissu ligneux, le tissu amylacé lui-même. Cette matière azotée, véritable origine de toutes les parties de la plante, ne se détruit jamais; on la retrouve toujours, quelque abondante que soit la matière non azotée qui est venue s'interposer entre ses propres particules.

Cet azote, fixé par les plantes, sert donc à produire une substance fibrineuse concrète qui fait le rudiment de tous les organes du végétal.

Il sert à produire en outre l'albumine liquide que les sucs coagulables de toutes les plantes recèlent, et le caséum, si souvent confondu avec l'albumine, mais si facile à reconnaître dans beaucoup de plantes.

La fibrine, l'albumine, le caséum existent donc dans les plantes. Ces trois produits, identiques d'ailleurs dans leur composition, ainsi que M. Vogel l'a prouvé depuis long-temps, présentent une analogie singulière avec le ligneux, l'amidon et la dextrine.

En effet, la fibrine est insoluble comme la matière ligneuse; l'albumine se coagule à chaud comme l'amidon; le caséum est soluble comme la dextrine.

Ces matières azotées sont neutres d'ailleurs aussi bien que les trois matières non azotées parallèles, et nous verrons qu'elles jouent, par leur abondance dans le règne animal, le même rôle que ces dernières nous ont offert dans le règne végétal.

En outre, de même qu'il suffit, pour former les matières non azotées neutres, d'unir du carbone à l'eau ou à ses élémens, de même, pour former ces matières azotées neutres, il suffit d'unir le carbone et l'ammonium aux élémens de l'eau. 48 molécules de carbone, 6 d'ammonium et 17 d'eau constituent ou peuvent constituer la fibrine, l'albumine et le caséum.

Ainsi, dans les deux cas, des corps réduits, carbone ou ammonium, et de l'eau suffisent à former les matières qui nous occupent, et leur production rentre tout naturellement dans le cercle des réactions que la nature végétale semble surtout propre à produire.

Le rôle de l'azote dans les plantes est donc digne de la plus sérieuse attention, puisque c'est lui qui sert à former la fibrine qu'on retrouve comme rudiment dans tous les organes, puisque c'est lui qui sert à produire l'albumine et le caséum, si largement répandus dans tant de plantes, et que les animaux s'assimilent ou modifient pour leurs propres besoins.

C'est donc dans les plantes que réside le véritable laboratoire de la chimie organique; le carbone, l'hydrogène, l'ammonium et l'eau sont donc les principes que les plantes élaborent; la matière ligneuse, l'amidon, les gommes et les sucres d'une part,

la fibrine, l'albumine, le caséum et le gluten de l'autre sont donc les produits fondamentaux des deux règnes; produits, formés dans les plantes et dans les plantes seules, et transportés par la digestion dans les animaux.

Cendres. — Une immense quantité d'eau traverse le végétal pendant la durée de son existence. Cette eau s'évapore à la surface des feuilles et laisse nécessairement pour résidu, dans la plante, les sels qu'elle contenait en dissolution. Ces sels constituent les cendres, produits évidemment empruntés au sol, et qu'après leur mort les végétaux lui restituent.

Quant à la forme sous laquelle se déposent ces produits minéraux dans le tissu végétal, rien de plus variable. Remarquons toutefois que parmi les produits de cette nature, l'un des plus fréquens et des plus abondans consiste en ce pectinate de chaux, reconnu par M. Jacquelain dans le tissu ligneux de la plupart des plantes.

IV.

Si, dans l'obscurité, les plantes fonctionnent comme de simples filtres que traversent l'eau et les gaz; si, sous l'influence de la lumière solaire, elles fonctionnent comme des appareils réducteurs qui décomposent l'eau, l'acide carbonique et l'oxide d'ammonium, il est certaines époques et certains organes où la plante revêt un autre rôle, un rôle tout opposé.

En effet, s'agit-il de faire germer un embryon, de développer un bourgeon, de féconder une fleur, la plante qui absorbait la chaleur solaire, qui décomposait l'acide carbonique et l'eau, change tout-à-coup d'allure. Elle brûle du carbone et de l'hydrogène; elle produit de la chaleur, c'est-à-dire qu'elle s'approprie les principaux caractères de l'animalité.

Mais ici une circonstance remarquable se révèle. Si l'on fait germer de l'orge, du blé, il se produit beaucoup de chaleur d'acide carbonique et d'eau. L'amidon de ces graines se change d'abord en gomme, puis en sucre, puis il disparaît en produisant l'acide carbonique recueilli. Une pomme de terre germe-t-elle, c'est encore son amidon qui se change en dextrine, puis en sucre, et qui produit enfin de l'acide carbonique et de la cha

leur. Le sucre semble donc l'agent au moyen duquel les plantes développent de la chaleur au besoin.

Comment n'être pas frappé dès-lors de la coïncidence des faits suivans : La fécondation est toujours accompagnée de chaleur; les fleurs respirent en produisant de l'acide carbonique. Elles consomment donc du charbon et si l'on se demande d'où vient ce charbon, on voit que dans la canne à sucre, par exemple, le sucre accumulé dans la tige a disparu en entier quand la floraison et la fructification sont accomplies. Dans la betterave, le sucre va toujours en augmentant dans la racine jusqu'à la floraison; la betterave porte-graine ne contient plus trace de sucre dans sa racine. Dans le panais, le navet, la carotte, les mêmes phénomènes se reproduisent.

Ainsi donc à certaines époques, dans certains organes, la plante se fait animal, elle devient comme lui appareil de combustion; elle brûle du carbone et de l'hydrogène; elle développe de la chaleur.

Mais à ces mêmes époques elle détruit en abondance des matières sucrées qu'elle avait lentement accumulées et emmagasinées. Le sucre, ou l'amidon converti en sucre sont donc les matières premières, au moyen desquelles les plantes développent au besoin la chaleur nécessaire à l'accomplissement de quelques-unes de leurs fonctions.

Et si nous remarquons avec quel instinct les animaux, les hommes eux-mêmes, vont précisément choisir pour leur nourriture ces parties du végétal où celui-ci avait accumulé le sucre et l'amidon qui lui servent à développer de la chaleur, ne devient-il pas probable que, dans l'économie animale, le sucre et l'amidon sont aussi destinés à jouer le même rôle, c'est-à-dire à se brûler pour développer la chaleur qui accompagne le phénomène de la respiration?

En résumé, tant que le végétal conserve son caractère le plus habituel, il emprunte au soleil de la chaleur, de la lumière et des rayons chimiques. Il reçoit de l'air du carbone; il prend de l'hydrogène à l'eau, de l'azote à l'oxide d'ammonium, au sol divers sels. Avec ces matières minérales ou élémentaires, il façonne des matières organisées qui s'accumulent dans ses tissus.

Ce sont des matières ternaires, ligneux, amidon, gommes, sucres.

Ce sont des matières quaternaires, fibrine, albumine, caséum, gluten.

Jusque-là, le végétal est donc un producteur incessant; mais si par momens, si pour satisfaire à certains besoins, le végétal se fait consommateur, il réalise exactement les mêmes phénomènes que l'animal va nous offrir.

V.

Un animal, en effet, constitue un appareil de combustion, où se dégage sans cesse de l'acide carbonique, où sans cesse se brûle par conséquent du carbone.

Vous savez que nous n'avons pas été arrêtés par cette expression d'*animaux à sang froid*, qui semblerait désigner des animaux dépourvus de la propriété de produire de la chaleur. Le fer qui brûle avec éclat dans l'oxigène produit une chaleur que personne ne voudrait nier; mais il faut de la réflexion et quelque science pour s'apercevoir que le fer qui se rouille lentement à l'air en dégage tout autant, quoique sa température ne varie pas sensiblement. Le phosphore enflammé brûle en produisant une grande quantité de chaleur, personne n'en doute. Le phosphore à froid brûle encore dans l'air, et pourtant la chaleur qu'il développe en pareil cas a été long-temps contestée.

Ainsi des animaux; ceux qu'on appelle à sang chaud brûlent beaucoup de charbon dans un temps donné, et conservent un excès sensible de chaleur sur les corps environnans; ceux qu'on nomme à sang froid brûlent beaucoup moins de charbon et conservent conséquemment un excès de chaleur si faible, qu'il devient difficile ou impossible à observer.

Mais néanmoins, le raisonnement nous fait voir que le caractère le plus constant de l'animalité réside dans cette combustion de charbon et dans le développement d'acide carbonique qui en est la conséquence, partant aussi dans la production de chaleur que toute combustion de charbon détermine.

Qu'il s'agisse d'animaux supérieurs ou inférieurs; que cet acide

carbonique s'exhale du poumon ou de la peau, il n'importe, c'est toujours le même phénomène, la même fonction.

En même temps que les animaux brûlent du carbone, ils brûlent aussi de l'hydrogène; c'est un point prouvé par la disparition constante d'oxigène qui a lieu dans leur respiration.

En outre, ils exhalent constamment de l'azote. J'insiste sur ce point, et c'est surtout pour faire disparaître une des illusions que je croirais parmi les plus fâcheuses à vos études. Quelques observateurs ont admis dans la respiration, une absorption d'azote qui ne se présente jamais qu'avec des circonstances qui la rendent plus que douteuse. Le phénomène constant, c'est l'exhalation de gaz.

Il faut donc en conclure avec certitude que nous n'empruntons jamais de l'azote à l'air; que l'air n'est jamais un aliment pour nous; que nous nous bornons à lui prendre l'oxigène nécessaire pour former avec notre carbone de l'acide carbonique, avec notre hydrogène de l'eau.

L'azote exhalé provient donc des alimens, et il en provient tout entier. Celui-là, dans l'économie générale de la nature, pourra dans des milliers de siècles, être absorbé par les plantes qui, comme les topinambours, empruntent directement leur azote à l'air.

Mais ce n'est pas là tout l'azote que les animaux exhalent. Chacun de nous rend par ses urines, terme moyen, comme l'a constaté M. Lecanu, quinze grammes d'azote par jour, d'azote évidemment emprunté à nos alimens, comme le carbone et l'hydrogène que nous brûlons.

Sous quelle forme cet azote s'échappe-t-il? Sous forme d'ammoniaque. Ici se présente même une de ces observations qui ne manquent jamais de nous pénétrer d'admiration pour la simplicité des moyens que la nature met en œuvre.

Si dans l'ordre général des choses, nous rendons à l'air l'azote que certains végétaux pourront utiliser directement un jour, il devait arriver que nous étions tenus de lui rendre aussi de l'ammoniaque, produit si nécessaire à l'existence, au développement de la plupart des végétaux.

Tel est le principal résultat de la sécrétion urinaire. C'est une émission d'ammoniaque, qui retourne au sol ou à l'air.

Mais est-il besoin d'en faire ici la remarque, les organes urinaires seraient altérés dans leurs fonctions et leur vitalité, par le contact de l'ammoniaque; ils le seraient même par le contact du carbonate d'ammoniaque. Aussi la nature nous fait-elle excréter de l'urée.

L'urée, c'est du carbonate d'ammoniaque; c'est-à-dire de l'acide carbonique comme celui que nous expirons, et de l'ammoniaque tel que le veulent les plantes. Mais ce carbonate d'ammoniaque a perdu de l'hydrogène et de l'oxigène, ce qu'il en faut, pour constituer deux molécules d'eau.

Privé de cette eau le carbonate d'ammoniaque devient de l'urée; alors il est neutre, inactif sur les membranes animales; alors il peut traverser les reins, les uretères, la vessie, sans les enflammer. Mais parvenu à l'air, il éprouve une fermentation véritable, qui lui restitue ces deux molécules d'eau et qui fait de cette même urée de véritable carbonate d'ammoniaque; volatil pouvant s'exhaler dans l'air; soluble, pouvant être repris par les pluies; destiné en conséquence à voyager ainsi de la terre à l'air et de l'air à la terre, jusqu'à ce que, pompé par les racines d'une plante et élaboré par elle, il se convertisse de nouveau en matière organique.

Ajoutons un trait à ce tableau. Dans l'urine, à côté de l'urée, la nature a placé quelques traces de matière animale albumineuse ou muqueuse, traces presque insensibles à l'analyse. Celle-ci pourtant, parvenue à l'air, s'y modifie, et devient un de ces fermens comme nous en trouvons tant dans la nature organique; c'est lui qui détermine la conversion de l'urée en carbonate d'ammoniaque.

Ces fermens qui ont si vivement attiré notre attention et qui président aux métamorphoses les plus remarquables de la chimie organique, je me réserve de vous en faire l'année prochaine une histoire plus spéciale encore et plus développée.

Ainsi nous émettons de l'urée accompagnée de ce ferment, de cet artifice qui, jouant à un moment donné, va transformer cette urée en carbonate d'ammoniaque.

Si nous rendons au phénomène général de la combustion animale cet acide carbonique du carbonate d'ammoniaque qui lui appartient de droit, il reste de l'ammoniaque comme produit caractéristique des urines.

Ainsi, par le poumon et la peau, acide carbonique, eau, azote;

Par les urines, ammoniaque.

Tels sont les produits constans et nécessaires qui s'exhalent de l'animal.

Ce sont précisément ceux que la végétation réclame et utilise; tout comme le végétal rend à son tour à l'air oxigène que l'animal a consommé.

D'où viennent ce carbone, cet hydrogène brûlés par l'animal, cet azote qu'il a exhalé libre ou converti en ammoniaque? Ils viennent évidemment des alimens.

En étudiant la digestion à ce point de vue, nous avons été conduits à la considérer d'une manière bien plus simple qu'on n'a coutume de le faire et qui va se résumer en quelques mots.

En effet, dès qu'il a été prouvé pour nous que l'animal ne crée point de matière organique; qu'il se borne à se l'assimiler ou à la dépenser en la brûlant, il ne fallait plus chercher dans la digestion tous ces mystères qu'on n'était bien sûr de n'y point trouver.

C'est qu'en effet, la digestion est une simple fonction d'absorption. Les matières solubles passent dans le sang, inaltérées pour la plupart; les matières insolubles arrivent dans le chyle, assez divisées pour être aspirées par les orifices des vaisseaux chylifères.

D'ailleurs, la digestion a évidemment pour objet de restituer au sang une matière propre à fournir à notre respiration ces dix ou quinze grammes de charbon ou l'équivalent d'hydrogène que chacun de nous brûle à l'heure, et de lui rendre ce gramme d'azote qui s'exhale par heure aussi, tant par le poumon ou la peau que par les urines.

Ainsi, les matières amylacées se changent en gomme et sucre; les matières sucrées s'absorbent;

Les matières grasses se divisent, s'émulsionnent, et passent

ainsi dans les vaisseaux, pour former ensuite des dépôts que le sang reprend et brûle au besoin.

Les matières azotées neutres, la fibrine, l'albumine et le caséum, dissoutes d'abord, puis précipitées, passent dans le chyle très divisées ou dissoutes de nouveau.

Ainsi, l'animal reçoit et s'assimile presque intactes des matières azotées neutres qu'il trouve toute formées dans les animaux ou les plantes dont il se nourrit; il reçoit des matières grasses qui proviennent des mêmes sources; il reçoit des matières amylacées ou sucrées qui sont dans le même cas.

Ces trois grands ordres de matières, dont l'origine remonte toujours à la plante, se partagent en produits assimilables, fibrine, albumine, caséum, corps gras, qui servent à accroître ou à renouveler les organes; en produits combustibles, sucre et corps gras que la respiration consomme.

L'animal s'assimile donc ou détruit des matières organiques toutes faites; il n'en crée donc pas.

La digestion introduit donc dans le sang des matières organiques toutes faites; l'assimilation utilise celles qui sont azotées; la respiration brûle les autres.

Si les animaux ne possèdent aucun pouvoir particulier pour produire des matières organiques, ont-ils du moins ce pouvoir spécial et singulier de produire de la chaleur sans dépense de matière qu'on leur a attribué?

Vous avez vu, en discutant les expériences de MM. Dulong et Despretz, vous avez positivement vu le contraire en ressortir Ces habiles physiciens ont supposé qu'un animal placé dans un calorimètre à eau froide, en sort exactement avec la température qu'il possédait à l'entrée; chose absolument impossible, on le sait aujourd'hui. C'est ce refroidissement de l'animal, dont ils n'ont pas tenu compte, qui exprime dans leurs tableaux les excès de chaleur attribués par eux et par tous les physiologistes à un pouvoir calorifique particulier à l'animal et indépendant de la respiration.

Il m'est démontré que toute la chaleur animale vient de la respiration; qu'elle se mesure par le charbon et l'hydrogène brûlés. Il m'est démontré, en un mot, que cette assimilation

poétique de la locomotive du chemin de fer à un animal, repose sur des bases plus sérieuses qu'on ne l'a cru peut-être. Dans l'une et l'autre, combustion, chaleur, mouvemens, trois phénomènes liés et proportionnels.

Vous voyez qu'à la considérer ainsi, la machine animale devient bien plus facile à comprendre; c'est l'intermédiaire entre le règne végétal et l'air; elle emprunte tous ses alimens au premier, pour rendre au second toutes ses excrétions.

Vous rappellerai-je comment nous avons envisagé la respiration, phénomène plus complexe que ne l'avaient cru Laplace et Lavoisier, que ne l'avait pensé Lagrange, mais qui précisément, en se compliquant, tend de plus en plus à rentrer dans les lois générales de la nature morte?

Vous avez vu que le sang veineux dissout de l'oxigène et dégage de l'acide carbonique; qu'il devient artériel sans produire trace de chaleur. Ce n'est donc pas en s'artérialisant que le sang produit de la chaleur.

Mais sous l'influence de l'oxigène absorbé, les matières solubles du sang se convertissent en acide lactique, comme l'ont vu MM. Mitscherlich, Boutron-Charlard et Frémy; l'acide lactique se convertit lui-même en lactate de soude, ce dernier par une véritable combustion en carbonate de soude, qu'une nouvelle portion d'acide lactique vient décomposer à son tour.

Cette succession lente et continue de phénomènes qui constitue une combustion réelle, mais décomposée en plusieurs temps, où il faut voir une de ces combustions lentes sur lesquelles M. Chevreul a depuis long-temps fixé l'attention, c'est là le véritable phénomène de la respiration. Le sang s'oxigène donc dans le poumon; il respire réellement dans les capillaires de tous les autres organes, là où la combustion du carbone, la production de chaleur se réalisent surtout.

Une dernière réflexion. Pour monter au sommet du Mont-Blanc, un homme emploie deux journées de douze heures. Pendant ce temps, il brûle en moyenne 300 grammes de carbone ou l'équivalent d'hydrogène. Si une machine à vapeur s'était chargée de l'y porter, elle en aurait brûlé 1,000 à 1,200 pour faire le même service.

Ainsi, comme machine empruntant toute la force au charbon qu'il brûle, l'homme est une machine trois ou quatre fois plus parfaite que la plus parfaite machine à vapeur.

Nos ingénieurs ont donc encore beaucoup à faire, et pourtant ces nombres sont bien de nature à prouver qu'il y a communauté de principes entre la machine vivante et l'autre; car si l'on tient compte de toutes les pertes inévitables dans les machines à feu et si soigneusement évitées dans la machine humaine, l'identité du principe de leurs forces respectives ressort manifeste et évidente aux yeux.

Mais c'est assez poursuivre des considérations où vos propres réflexions me devancent maintenant, où vos souvenirs ne me laissent plus rien à faire.

Si nous nous résumons, nous voyons que de l'atmosphère primitif de la terre il s'est fait trois grandes parts :

L'une qui constitue l'air atmosphérique actuel; la seconde qui est représentée par les végétaux, la troisième par les animaux.

Entre ces trois masses, des échanges continuels se passent : la matière descend de l'air dans les plantes, pénètre par cette voie dans les animaux, et retourne à l'air à mesure que ceux-ci la mettent à profit.

Les végétaux verts constituent le grand laboratoire de la chimie organique. Ce sont eux qui, avec du carbone, de l'hydrogène, de l'azote, de l'eau et de l'oxide d'ammonium, construisent lentement toutes les matières organiques les plus complexes.

Ils reçoivent des rayons solaires, sous forme de chaleur ou de rayons chimiques, les forces nécessaires à ce travail.

Les animaux s'assimilent ou absorbent les matières organiques formées par les plantes. Ils les altèrent peu-à-peu, ils les détruisent. Dans leurs organes, des matières organiques nouvelles peuvent naître, mais ce sont toujours des matières plus simples, plus rapprochées de l'état élémentaire que celles qu'ils ont reçues.

Ils défont peu-à-peu ces matières organiques créées lentement par les plantes; ils les ramenent peu-à-peu vers l'état d'acide carbonique, d'eau, d'azote, d'ammoniaque, état qui leur permet de les restituer à l'air.

En brûlant ou en détruisant ces matières organiques, les animaux produisent toujours de la chaleur qui, rayonnant de leur corps dans l'espace, va remplacer celle que les végétaux avaient absorbée.

Ainsi, tout ce que l'air donne aux plantes, les plantes le cèdent aux animaux, les animaux le rendent à l'air; cercle éternel dans lequel la vie s'agite et se manifeste, mais où la matière ne fait que changer de place.

La matière brute de l'air, organisée peu-à-peu dans les plantes, vient donc fonctionner sans changement dans les animaux et servir d'instrument à la pensée; puis vaincue par cet effort et comme brisée, elle retourne matière brute au grand réservoir d'où elle était sortie.

Permettez-moi d'ajouter, en terminant ce tableau qui résume des opinions qui à mon sens ne sont que les conséquences et les développemens nécessaires de la grande voie que Lavoisier a tracée à la chimie moderne; permettez-moi, dis-je, de m'exprimer comme il le faisait lui-même au sujet de ses collaborateurs, de ses amis.

Si dans mes leçons, si dans ce résumé, il m'est échappé d'adopter, sans les citer, les expériences ou les opinions de M. Boussingault, c'est que l'habitude de nous communiquer nos idées, nos observations, notre manière de voir, a établi entre nous une communauté d'opinions, dans laquelle il nous est difficile à nous-mêmes de distinguer ensuite ce qui nous appartient.

En appuyant de son nom et de son autorité ces opinions et leurs conséquences, en vous disant que nous travaillons activement, tantôt réunis, tantôt séparés, à préciser et à développer par l'expérience tous ces faits, tous ces résultats, c'est vous montrer le prix que je mets à justifier l'intérêt que vous m'avez témoigné cette année.

Je vous en remercie. Il m'a donné la confiance d'entreprendre une longue suite de recherches; s'il en sort quelque chose d'utile aux progrès de l'humanité, que tout l'honneur en revienne à cette bienveillance intelligente dont vous m'avez si constamment entouré, et dont je serai toujours reconnaissant du plus profond de l'âme et du cœur.

DESCRIPTION *de quelques Mollusques, provenant de la campagne de l'Astrolabe et de la Zélée,*

Adressée à l'Académie des Sciences, le 19 juillet 1841,

Par MM. HOMBRON et JACQUINOT.

Genre HÉLICE, *Helix.*

HÉLICE-BOUCHE-ÉPAISSE. *Helyx Pachystoma.*

Testâ orbiculatâ, depresso-convexâ, spirâ obtusâ, subtùs planiusculâ, rufo castaneâ, exiguè perforatâ; ultimo anfractu maximo; aperturâ amplâ, obliquissimâ; labro albo, incrassato, calloso, inæquale, intùs reflexo.

Diamètre : 55 mill. — Habite les îles Hogoleu (Carolines Occidentales).

HELICE D'URVILLE. *Helyx Durvillii.*

Testâ orbiculato-globulosâ, ventricosâ, solidâ, spirâ, fusco-flavicante, basi pallidiore, umbilico columellâ semi-obtecto; labro albo, complanato, intùs incrassato, extùs reflexo.

Diamètre: 40 mill. — Habite la baie Rafles (Nouvelle-Hollande).

HÉLICE MOMIE. *Helyx Mumia.*

Testâ orbiculari, depresso-convexâ, lævi, subpellucidâ, rufo-fuscâ, perforatâ; striis tenue granulatis, anfractibus zonâ pallide rufâ cinctis; labro interiore fusco, acuto.

Diamètre : 45 mill. Habite la baie Triton (Nouvelle-Guinée).

HÉLICE DE KÉRAUDREN. *Helyx Keraudrenii.*

Testâ orbiculatâ, subglobosâ, lævi, perforatâ, rufo-flavescente, ultimo anfractu, zonâ intensè rufâ cincto; labro interiore albo, acuto.

Diamètre. 50 mill. — Habite Singhapore.

H. CARÉNÉE. — *H. carinata.*

Testâ orbiculatâ, subtrochiformi, spirâ brevissimâ, apice acuto, umbilico columellâ obtecto; ultimo anfractu valdè carinato, infrà subconvexo; aperturâ obliquâ, angulatâ; labro maximè reflexo.

Diamètre, 40 mill. — Habite la baie Triton (Nouvelle-Guinée).

H. OMBREUSE. *H. umbrosa.*

Testâ orbiculatâ, depresso-convexâ, tenui, translucidâ, perforatâ, pallidè fuscâ; ultimo anfractu subcarinato, zonâ intensè rufâ cincto; aperturâ subangulatâ, labro acuto.

Diamètre : 40 mill. — Habite la baie Triton (Nouvelle-Guinée).

H. ISABELLE. *H. Isabella.*

Testâ orbiculatâ, subglobosâ, colore melino subalbido, infrà pallente, perforatâ, transversim tenuè et regulariter striatâ; labro albo, incrassato, non reflexo.

Diamètre : 23 mill. — Habite Singhapore.

H. SAMOA. *H. Samoa.*

Testâ orbiculato-convexâ, fusco flavescente, perforatâ, anfractibus lineâ fuscâ, ultimo binâ, cinctis; labro semi-lunari, acuto.

Diamètre: 20 mill. — Habite l'île Opoulou (archipel Samoa).

H. BOUCHE ÉCHANCRÉE. *H. entomostoma.*

Testâ orbiculato-depressâ, subtùs convexâ, carinatâ, latè umbilicatâ, fulvo-lutescente, aperturâ transversâ, subangulatâ; labro incrassato; inæquale, ad sinistram emarginato; dente obtusâ columellari, instructo.

Diamètre : 23 mill. — Habite les îles Hogoleu (Carolines Occidentales).

H. DE TORRÈS. *H. Torresiana.*

Testâ orbiculatâ, subglobulosâ, tenui, lævi, albo-lutescente, perforatâ, transversim et tenuiter striatâ; margine reflexo.

Diamètre : 20 mill. — Habite l'île Toud (détroit de Torrès).

H. DE SANZ. — *H. Sanziana.*

Testâ orbiculatâ, subglobosâ, pallidè fusco-rufescente; spirâ intensè rufo-zonatâ; labro interiore albo, lineâ fuscâ circumdato, ad sinistram lævitèr depresso.

Diamètre : 25 mill. — Habite Sanboanga (Mindanao).

H. AMBRÉE. *H. succinea.*

Testâ orbiculatâ, subglobosâ, lævi, nitidulâ; pellucidâ, flavo-succineâ, vix perforatâ; labro acuto.

Diamètre : 30 mill. — Habite la Nouvelle-Guinée.

H. SOUFRÉE. *H. sulfurea.*

Testâ orbiculato-depressâ, subtùs convexâ, lævi, nitidâ, pellucidâ, flavo-sulfureâ, vix perforatâ; anfractibus lineâ rufâ cinctis; labro acuto.

Diamètre : 28 mill. — Habite les îles Arrow.

H. CREUSÉE. — *H. excavata.*

Testâ orbiculato-depressâ, subtùs convexâ, pallidè fuscâ; fasciis rufis undulatâ, umbilico latè excavato; aperturâ transversâ, subangulatâ; labro acuto.

Diamètre: 5 mill. — Habite Taïti.

H. ANTIPODE. *H. antipoda.*

Testâ orbiculatâ, subconoideâ, subtùs convexâ, pallidè rufâ, fasciis fuscis alveolatâ, perforatâ; aperturâ transversâ, subangulatâ; labro ocuto.

Diamètre: 6 mill. — Habite les îles Auchland.

H. ENTONNOIR. *H. infundibulum.*

Testâ orbiculatâ, subglobosâ, lineis fuscis transversim striatâ, umbilico lato et spiriali; aparturâ amplâ: rotundatâ; labro acuto.

Diamètre: 5 mill. — Habite Vavao.

H. VOILÉE. *H. velata.*

Testâ orbiculato-depressâ, subtùs convexâ, subcarinatâ, pallidè fulvâ, perforatâ; aperturâ semi-obturata amplo dente columellari; labro incrassato, introrsùm emarginato.

Diamètre: 7 mill. — Habite les îles Hogoleu (Carolines Occidentales).

H. CENDRÉE. *H. cineracea.*

Testâ orbiculatâ, subconoideâ, subtùs subplanatâ, lævitèr carinatâ, supernè lutescente subtùs albo cineraceo, vix perforatâ; aperturâ obliquâ; labro margine reflexo.

Diamètre: 15 mill. — Habite la Nouvelle-Guinée.

H. TIMIDE. *H. timida.*

Testâ orbiculatâ, subglobulosâ, glabriusculâ, albo-lutescente, vix perforatâ; labro acuto; anfractibus sex.

Diamètre: 10 mill. — Habite la Nouvelle-Guinée.

H. ÉTRANGLÉE. *H. strangulata.*

Testâ orbiculatâ, subglobosâ, tenuè striatâ, perforatâ, albo-lutescente; aperturâ subrotundâ, labro circulatim depresso, margine reflexo.

Diamètre: 6 mill. — Habite l'île Toud (détroit de Torrès).

Genre PUPINA.

PUPINA HUMBLE. *Pupina humilis.*

Testâ cylindraceo-mammeatâ, oblongâ, obtusâ, subcrassâ, pallidâ; aperturâ albido-rufâ; rotundâ basi et columellâ latè canaliculatis; labro extùs reflexo, incrassato.

Long. 15 mill.; larg. 8 mill. — Habite la Nouvelle-Guinée.

OBSERVATIONS *faites pendant l'incubation d'une femelle du Python à deux raies* (Python bivittatus, Kuhl.) *pendant les mois de mai et de juin* 1841,

Par M. VALENCIENNES.

(Lues à l'Académie des Sciences, dans sa séance du 19 juillet 1841.)

On sait que chez les oiseaux qui couvent, l'élévation de température est très variable, qu'elle est plus forte au commencement de l'incubation que vers la fin. En faisant quelques expériences sur différentes couveuses, j'ai vu la température prise par mes thermomètres placés sous le ventre de la poule et entre les œufs, varier de 42° à 56°, selon que l'oiseau était plus ou moins avancé dans son incubation.

Les reptiles, animaux ovipares, dont la température est variable à cause de la disposition particulière de leur appareil respiratoire et circulatoire, n'offrent-ils pas quelquefois des phénomènes semblables à ceux des oiseaux? ne couvent-ils jamais leurs œufs?

Ce que nous savons de l'histoire naturelle des reptiles de nos climats répond négativement à ces questions. Cependant une observation faite dans l'Inde, pendant la traversée de Chandernagor à l'île Bourbon, et communiquée à l'Académie des Sciences par M. Lamarrepiquot, semblait montrer qu'une espèce de grand serpent de l'Inde, au contraire des reptiles de nos contrées, et d'un grand nombre d'autres espèces, se plaçait sur ses œufs, et les échauffait en développant pendant ce temps une chaleur notable. Ce fait isolé laissait beaucoup de doutes dans l'esprit de plusieurs naturalistes les plus éminens, mais il vient d'être confirmé récemment par une femelle de serpent, du genre des Pythons. (1)

(1) Il paraît que l'incubation des Serpens est un fait si connu dans l'Inde, qu'il entre

L'exemple d'une incubation suivie et prolongée sans aucune interruption pendant près de deux mois, que vient de donner, dans la ménagerie du Muséum d'Histoire naturelle, la femelle du Python à deux raies (*Python bivittatus*, Kuhl.) a fourni à mes observations les faits que je vais avoir l'honneur de vous communiquer.

M. Duméril, professeur d'Erpétologie au Muséum, et chargé plus spécialement de la direction de cette partie de la ménagerie qui renferme les reptiles, voulut bien me permettre de suivre et d'observer l'animal, après que je lui eus fait connaître les premiers résultats de mes observations.

Ces serpens sont enfermés dans des coffres en bois; ils sont cachés sous des couvertures de laine, et réchauffés par de l'eau chaude mise dans des bouilloires placées dans un double fond de la caisse. La température de l'eau renouvelée tous les matins est, au moment de sa plus grande chaleur, de 60° à 70°. Elle se refroidit pendant le jour, et elle transmet dans l'intérieur du coffre une quantité variable de calorique qui entretient la température intérieure de la boîte à 20 ou 25°.

Un mâle de ce Python à deux raies, long de 2^{m},20, s'accoupla avec une femelle de la même espèce, longue de 3 mètres et quelques centimètres. Le premier accouplement eut lieu le 22 janvier 1841. Ces animaux s'accouplèrent ensuite plusieurs fois jusqu'à la fin de février. On les sépara, et on laissa la femelle seule et tranquille dans sa boîte. Elle mangea le 2 février environ six à sept livres de viande de bœuf crue, attachée à la suite d'un lapin vivant de moyenne grosseur. On la vit changer d'épiderme le 4 avril; alors, selon l'habitude, on lui présenta à manger quelques jours après, le 9 du mois; elle refusa la nourriture, et elle fit de même quand on lui en présenta de nouveau le 16 et le 25 du même mois.

Pendant ce temps son ventre grossissait sensiblement, on s'attendait donc à voir bientôt le produit de son accouplement. Le

même dans leurs contes populaires. M. Roulin m'a fait remarquer, dans le second voyage de Sindbad le marin (nouvelle traduction anglaise des *Mille et une Nuits*, par W. Lane, tom. III, page 20), le passage suivant : « Alors je regardai dans la caverne, et vis, au fond, un énorme Serpent endormi sur ses œufs... »

5 mai, l'animal ordinairement doux et tranquille, devint plus excité, et cherchait à mordre; le lendemain cette femelle pondit *quinze œufs*. La ponte, commencée à six heures du matin, fut achevée à neuf heures et demie. Les œufs étaient tous séparés, de forme ovale et un peu allongés au moment de leur sortie; la coque était molle, d'une couleur grise ou cendrée. Ils se renflèrent à l'air, devinrent également gros aux deux bouts; leur enveloppe, desséchée sans être dure, resta d'un beau blanc; alors la longueur du plus grand diamètre de l'œuf était de 0^m, 12, et celle du plus petit de 0^m,07. La femelle, livrée à elle-même dans sa boîte, sous sa couverture, rassembla tous les œufs en un tas, autour duquel elle enroula la partie postérieure de son corps; elle se replia ensuite sur ce premier pli, et finit par s'enrouler en une sorte de spirale, dont tous les tours contigus formaient un cône au sommet duquel était sa tête; elle cacha ainsi tous les œufs, si bien qu'on n'en apercevait plus un seul; par les contractions violentes des muscles du tronc, elle repoussait la main qui la touchait, et en se serrant, empêchait qu'on ne pût atteindre aux œufs; elle témoignait vivement de son impatience, tellement qu'elle eût peut-être fini par mordre, si l'on n'eût pas agi près d'elle avec prudence.

La chaleur de ce reptile était tellement sensible à la main, que j'eus la curiosité d'examiner, par des observations thermométriques, la température de l'animal. M'étant procuré de très bons thermomètres de Colardeau, dont l'excellence de la marche est bien connue de M. Gauthier de Claubry, et ayant demandé quelques conseils à mon collègue M. Gay-Lussac, sur la meilleure manière de faire les observations, j'ai réuni une suite de vingt-quatre observations thermométriques, que je présente dans le tableau joint à ce Mémoire. J'ai placé un thermomètre dans la chambre, pour avoir la température du milieu où sont tenus les animaux; j'en ai mis un second sous la couverture, à distance de l'animal sans le toucher, de manière à prendre la température de l'air chauffé artificiellement, et j'en mettais un troisième entre les plis de l'animal. Faisant ces trois observations simultanément, je me suis assuré que pendant les premiers jours de l'incubation, le thermomètre placé sur le corps de l'animal,

et au centre du cône contenant les œufs, marquait 41°, la température sous la couverture étant seulement de 22°,5, et celle de la chambre de 20°; la température de l'animal était donc de 21° au-dessus de l'air extérieur, ou de 19° au-dessus de l'air retenu autour de lui entre les plis de la couverture. On peut voir, dans le tableau ci-joint, que la température qui a suivi à l'extérieur les variations des nuits assez fraîches du mois de mai, est toujours restée, entre les plis du serpent, même vers la fin de l'incubation, constamment supérieure de 12 à 14° à celle de l'air de la chambre, ou de 10 à 12° au-dessus de celle renfermée sous la couverture. Enfin après cinquante-six jours d'incubation suivis, sans que la femelle se soit un seul instant dérangée, sans avoir par conséquent jamais quitté ses œufs, la coque s'est fendillée; et l'on a vu sortir la tête d'un petit Python. Le petit animal est resté encore un jour dans l'œuf, sortant ou rentrant sa tête ou sa queue, mais la partie moyenne du corps y était toujours enfermée. Le 3 juillet au soir, le petit est sorti tout-à-fait, s'est mis à ramper, à avancer de tous côtés sous la couverture. Il avait, au moment de sa naissance, $0^m,52$ de longueur, on voyait sous le ventre, un peu au-delà des deux tiers antérieurs du corps, les restes du cordon ombilical flétri et mou. Des quinze œufs, huit seulement sont éclos, le dernier Python est sorti de l'œuf le 7 juillet. Les autres œufs qui étaient fécondés ne sont pas venus à bonne fin, parce que, pressés par la mère, les petits ont été écrasés plus ou moins tôt, ainsi que le prouve le développement inégal du fœtus.

Par la manière dont j'ai procédé, il pouvait rester encore quelques doutes sur la cause de l'élévation de température de l'animal. La chaleur que nous accusait le thermomètre était-elle bien réellement produite par l'action vitale du serpent? ou bien n'était-elle pas due à ce que cette femelle, repliée sur elle-même, recevait pendant le jour et durant la période croissante de la température dans la boîte, une quantité de calorique égale ou peut-être supérieure à celle dont je trouvais l'expression sur le thermomètre, même après le refroidissement de l'eau de la bouilloire et des couvertures de laine? L'enroulement du corps sur ces œufs réunis ne laissait-il pas perdre la chaleur en moins

grande abondance, et plus lentement entre les plis, que ne perdait ou l'air retenu autour du serpent par les couvertures, ou le coussin tout entier?

Pour répondre à ces objections, j'ai fait les expériences suivantes :

J'ai placé un thermomètre à maximum, pendant vingt-quatre heures, sous l'enveloppe de laine, de manière à connaître la plus haute température à laquelle ait pu atteindre le coussin sur lequel la couveuse resta placée. J'ai eu soin de soulever le premier pli de la couverture par un linge plié de manière à avoir sous ce premier pli la même quantité d'air interposée entre les deux plis, et que le supérieur fût aussi éloigné du réservoir d'eau chaude, qu'il l'était pendant l'incubation de l'animal.

En mettant dans le réservoir l'eau à 73°, le maximum de chaleur a été de 30°,5. Le lendemain, en augmentant la chaleur de l'eau et la portant à 76°, je n'ai eu pour maximum que 31°, et enfin, pour faire l'expérience la plus concluante, en me plaçant dans les conditions les plus défavorables aux conclusions de cette observation, j'ai rempli la boîte de cuivre d'eau bouillante; portée sous le coussin, l'eau n'avait plus que 92°,5. A cette forte chaleur, le maximum de température du coussin n'a été que 35°,5. La femelle n'a donc jamais pu recevoir par transmission que 35° de température. Et cependant, durant les quinze premiers jours de l'incubation, du 8 mai au 23 du même mois, le thermomètre s'est élevé au-dessus de ce degré, et nous l'avons vu monter jusqu'à 41°5.

L'observateur que j'ai cité plus haut avait vu également la femelle du Python s'enrouler autour de ses œufs. Cette concordance me semble prouver qu'il est dans la nature des Pythons de se tenir ainsi sur leurs œufs. Il y a donc en eux un instinct naturel qui n'aurait aucun but, si, comme les oiseaux, ces reptiles ne couvaient pas leurs œufs.

Que l'on ne croie pas que je veuille inférer de là que les reptiles en général, que les couleuvres couvent leurs œufs : le contraire a lieu. Mais dans ces exceptions fréquentes soit dans les formes, soit dans les habitudes, la nature, si l'on ose s'exprimer ainsi, nous donne preuve de souvenir de ce qu'elle a fait et dé-

veloppé avec luxe dans d'autres familles, et ce sont ces faits appréciés qui établissent ce que nous nommons les passages ou les liaisons entre les divers êtres.

N'est-il pas, en outre, bien digne de remarque de voir que ces incubations n'ont été encore reconnues que sur quelques espèces de reptiles qui habitent les régions les plus chaudes du globe, comme les plaines des bords du Gange, les îles de Java ou de Sumatra, lorsque nous n'en trouvons aucun exemple dans les espèces de nos climats, où le peu d'élévation de température semblerait appeler ces sortes de soins préliminaires de la part de la mère. Mais on sait que dans nos climats la nature y supplée par d'autres moyens.

Pendant tout le temps de l'incubation, la femelle n'a pas voulu manger; mais le 25 mai, après vingt jours de couvaison, son gardien, Vallée, homme très soigneux et très intelligent, la voyant plus inquiète que de coutume, remuer sa tête, lui présenta de l'eau dans un petit bassin; elle y plongea le bout de son museau, et l'animal en but avec avidité environ deux verres. Elle a ensuite bu cinq fois pendant le reste du temps de sa couvaison : le 4 juin, le 13, le 19 et le 26. Cette observation mérite aussi de fixer l'attention des physiologistes, car elle prouve qu'une sorte d'état fébrile a suivi l'incubation, que l'animal a pu se passer de nourriture solide, mais que le besoin de la soif est devenu assez impérieux chez lui pour le manifester à son gardien.

Le 3 juillet au matin, on a vu qu'elle témoignait le désir de manger; et elle a avalé, en tenant encore les œufs dans ses derniers replis, cinq à six livres de bœuf. Elle a quitté alors ses œufs, dont plusieurs commençaient à éclore; elle a passé sur la couverture, et n'a plus montré aucune affection pour ses petits, après cependant les avoir couvés avec tant de soin, d'assiduité, et montré même qu'elle les défendrait au besoin.

Le petit Python n'a pas sur le bout du museau ce tubercule dur, trièdre, et taillé en pointe de diamant, que la nature fait croître sur le bec de l'oiseau pour bêcher son œuf. Aussi, quand le petit est développé, la coque de l'œuf se fendille naturellement. En examinant l'intérieur de la coque abandonnée par le Python, j'y ai trouvé une petite pelotte qui, examinée sous l'eau

s'est étendue en une membrane, que j'ai reconnue facilement pour être la membrane du vitellus sur laquelle se dessine la figure veineuse du fœtus de l'ovipare. Cette membrane n'accompagne donc pas l'intestin pour rentrer dans l'abdomen du petit, comme cela a lieu dans le fœtus de l'oiseau : le jaune seul est absorbé pour la nourriture du petit, pendant qu'il est dans l'œuf. Il me semble que ce fait est aussi intéressant à noter, parce qu'il semble montrer un état intermédiaire entre l'oiseau, qui fait rentrer dans son abdomen le vitellus et la figure veineuse qui l'enveloppe, et le poisson dont le petit sort de l'œuf et nage pendant les premiers jours qui suivent sa naissance, ayant encore le vitellus et la membrane qui le contient suspendus sous le ventre aux vaisseaux omphalo-mésentériques, lesquels ne se flétrissent ni ne se résorbent pas avant la naissance du petit.

Je sais qu'il y aurait eu beaucoup d'autres expériences à noter sur le poids de l'animal, sur celui des œufs, sur leur développement; mais on conçoit que cette ponte étant la première de ce genre qui s'est faite dans la ménagerie, on n'a pas pu essayer toutes ces observations, qui seront faites, sans aucun doute, lorsque l'animal nous fera une seconde ponte.

Ces huit petits Pythons ont changé de peau de dix à quatorze jours après leur sortie de l'œuf; pendant ce temps, ils n'ont pris aucune nourriture, mais ils ont bu plusieurs fois et se sont baignés.

Pendant ce temps, ils ont grandi; et après avoir changé de peau, ils ont mangé : l'un d'eux, trois petits moineaux (*Fringilla domestica* L.) encore dans le nid; un second en prit deux; un troisième a avalé de jeunes moineaux couverts de leurs plumes. Ces petits serpens se sont jetés sur leur proie et l'ont étouffée dans leurs replis comme le font les adultes.

Leur couleur, avant la première mue, était une marbrure à grandes et larges taches brunes sur un fond gris cendré; après la mue, le fond a pris une teinte jaune, ce qui les rend déjà très près d'être entièrement semblable à leur mère.

Ils se sont notablement allongés pendant les seize premiers jours qui ont suivi leur naissance, car ils ont atteint $0^{m},80$.

J'ai pensé qu'il était toujours utile de noter ces premiers ré-

sultats; car il faut conclure de cette observation, que la femelle du *Python bivittatus* couve ses œufs, qu'ils sont cinquante-six jours au moins à éclore, et que pendant ce temps l'animal développe une chaleur propre qui diminue cependant graduellement à mesure que l'on approche du moment de l'éclosion des œufs.

TABLEAU *des observations de température faites sur une femelle de Python, pendant l'incubation.*

JOURS DU MOIS.	CHAMBRE.	Sous la couverture.	Entre les plis de l'animal et sur les œufs.	OBSERVATIONS.
8 mai à 11 h.	23°	28°,5	41°,5	Ce jour-là, l'eau de la chaudière était chauffée environ à 56 ou 60°; je n'y ai pas mis les thermomètres.
à 6 h.	20	23,5	41	
9 mai à 7 h. 1/2.	20	22	39,5	Observation faite avant qu'on eût chauffé, et j'ai toujours pris ainsi les températures.
11.....	18	22,5	39,5	
13.....	18,5	21	39	
17.....	20	22,5	37	
23.....	21	23,7	35,8	
24.....	20	22,3	34	
25.....	21	24	35	
27.....	17	21	32,5	
29.....	21,5	24	35,7	
31.....	19	23	34	Elle a bu beaucoup d'eau à 35°.
1er juin.	19	22	33,5	
4.....	19	22,5	34	Elle a bu.
8.....	17,5	21	32,5	
9.....	19	23,5	34,7	
11.....	18	21	33	
13 juin à 7 h. 1/2.	17,3	20,5	34	Elle a bu.
16.....	18,5	21	33	
19.....	19,3	23,5	33,5	
23.....	18,5	22	32,5	
26.....	18	21	32	Elle a bu.
28.....	17,5	21,7	32	
1er juillet	22	26	29	On avait fait du feu le soir dans la pièce.
2..	20	24	28	Deux œufs sont béchés; elle a mangé 5 à 6 livres de viande; elle a après abandonné ses œufs : 8 sont béchés; les 7 autres sont mauvais, n'éclôront pas; la femelle n'a plus que 24'.

RECHERCHES EXPÉRIMENTALES *sur l'alimentation ; extraites d'un rapport fait à l'Académie des Sciences, au nom d'une commission, par M.* MAGENDIE.

[La gélatine, extraite des os à l'aide de divers procédés proposés par M. Darcet, était généralement considérée comme une substance susceptible d'un emploi utile dans l'alimentation de l'homme, lorsqu'en 1831, M. Donné soumit au jugement de l'Académie des Sciences un Mémoire tendant à prouver que cette opinion était erronée. Vers la même époque, M. Ganal publia des recherches entreprises sur le même sujet, et assura que la gélatine, loin d'être alimentaire, était nuisible à la santé dès qu'on l'introduisait dans le régime en proportion un peu considérable. MM. William Edwards et Balzac entreprirent aussi un travail sur l'emploi de cette substance, et, tout en reconnaissant qu'elle était insuffisante pour nourrir les chiens, ils conclurent de leurs expériences qu'elle pouvait entrer pour une part considérable dans l'alimentation de ces animaux.

La question soulevée par M. Donné intéressait à un haut degré la Société, aussi bien que la science, et, pour la résoudre plus complètement qu'elle ne l'avait été par les physiologistes dont nous venons de citer les noms, l'Académie des Sciences en renvoya l'examen à une commission spéciale chargée de faire toutes les expériences qu'elle jugerait nécessaires pour arriver au résultat demandé, et c'est au nom de cette commission, composée actuellement de MM. Thenard, Darcet, Dumas, Flourens, Breschet, Serres et Magendie, que ce dernier a fait dans les séances des 26 juillet et 2 août le rapport dont nous allons donner ici un extrait.

Ce rapport se compose de deux parties parfaitement distinctes; l'une tout historique, l'autre expérimentale. Il ne nous a pas semblé nécessaire de reproduire ici la première, mais la seconde fournit à la physiologie trop de faits intéressans pour ne pas trouver place dans nos annales. Nous la donnerons, par consé-

quent, textuellement, et nous nous bornerons à ajouter que les personnes qui désireraient prendre connaissance de l'historique des opinions divergentes touchant l'utilité de la gélatine, telle que M. Magendie l'a donnée, la trouveront dans les Comptes-rendus des séances de l'Académie, sous la date du 2 août 1841.

H. M. E.]

—

Nos expériences ont été faites dans les vastes caves du Collège de France, à une température et à une hygrométrie à-peu-près constantes; elles ont eu pour sujets des chiens, animaux d'autant plus convenables pour ce genre de recherches, que leur régime habituel participe plus ou moins de celui de l'homme, et qu'ils ont un goût prononcé pour les os; ils les broient, les digèrent, séparant ainsi à leur profit le tissu organique.

Avant tout, il était nécessaire de déterminer quelle était la matière qui devait servir à nos expériences.

Ce parenchyme, que les chiens extraient des os par l'acte de la digestion, était-ce la gélatine?

Ces tendons, ces cartilages, cette peau, etc., avec lesquels se fabrique la gélatine, contiennent-ils cette substance toute faite? Évidemment non : c'est en modifiant, en altérant ces divers tissus à l'aide de l'eau et de la chaleur, que la chimie crée réellement cette substance. La gélatine, on le sait depuis long-temps, est donc une production de l'art, et non un élément organique.

Cette distinction était pour nous des plus importantes, car, s'il en est ainsi, un animal pourrait se nourrir avec des os et ne pas se nourrir avec la gélatine; en effet, à mesure que les tissus animaux sont modifiés par les agens chimiques, qu'ils perdent leur texture, qu'ils deviennent solubles, on les voit aussi devenir moins putrescibles et moins assimilables.

L'un de nous a développé ailleurs ces idées qui devaient fixer ici notre attention. Elles étaient de nature à ranger parmi les possibilités que la gélatine manque de propriétés nutritives, tandis que celles-ci existeraient à un degré incontestable dans les parenchymes animaux d'où on la retire.

Ajoutons que les tissus qui fournissent la gélatine ne donnent pas tous le même produit.

Tantôt la gélatine se mêle sans trouble avec les dissolutions de fer ou d'alumine, et tantôt elle les précipite. Dans le premier cas, la liqueur recèle la véritable gélatine; dans le second, elle contient une matière différente, désignée par le nom de *chondrine.*

Enfin, la gélatine s'altère par une ébullition prolongée ou par une température qui dépasse 105 degrés; des sels ammoniacaux s'y développent; elle devient sirupeuse; elle perd sa propriété caractéristique de former gelée avec l'eau.

Il résulte de ces considérations préliminaires, que par le mot *gélatine*, on désigne plusieurs substances fort différentes :

1° Le parenchyme organique des os, des cartilages, des ligamens, etc., qui se transforment en gélatine par certains procédés;

2° La chondrine;

3° La gélatine, proprement dite;

4° Cette même substance, altérée par la chaleur.

Entre ces quatre substances, une seule, la *gélatine*, devait d'abord servir à nos expériences. C'est là, en effet, la matière qu'on extrait des os, par des procédés assez économiques pour qu'elle puisse entrer avec avantage, sous le rapport de son prix, dans une alimentation à très bon marché.

EXPÉRIENCES SUR LA GÉLATINE.

Cette première série d'expériences eut pour objet de savoir si des chiens se nourriraient en mangeant de la gélatine.

Dans ce but, on donna à un certain nombre de chiens, privés de toute autre nourriture, de la gélatine pure dite alimentaire. La forme en fut diversement variée : on la donna tantôt sèche, tantôt humide, et tantôt enfin en gelée tremblante.

Le résultat de ces premiers essais fut que la gélatine pure n'était pas un aliment du goût des chiens; plusieurs de ces animaux souffrirent les angoisses de la faim, ayant à leur portée de la gélatine, et n'y touchèrent point; d'autres y goûtèrent,

mais ne voulurent point en manger ; d'autres en prirent une première et une seconde fois en certaine quantité, puis refusèrent obstinément d'en faire usage.

Nous acquîmes ainsi la preuve que la gélatine, bien différente des os que les chiens appètent avec avidité, épurée et devenue insipide et sans odeur, n'avait aucun attrait pour ces animaux, même quand ils ressentaient une faim des plus vives.

Le premier résultat, bien que négatif, n'était pas sans importance; car les animaux affamés, et particulièrement les chiens, ne sont pas délicats sur le choix des moyens de satisfaire le besoin qui les presse. Renfermés en certain nombre, par exemple, privés de tout aliment et pendant plusieurs jours, ils ne tardent point à s'entre-dévorer. Sous ce point de vue (*cela est triste à dire*), ils se rapprochent beaucoup de l'homme, comme ne le prouve que trop, avec tant d'autres exemples analogues, le fameux naufrage de *la Méduse*.

EXPÉRIENCES SUR LA GÉLATINE ASSAISONNÉE.

Après avoir éclairci ce point, nous entreprîmes une autre série d'expériences sur la gélatine rendue sapide et agréable au goût par divers genres d'assaisonnemens.

Nous commençâmes par la gelée véritablement alimentaire que préparent les charcutiers pour la consommation journalière de l'homme. Cette gelée, qui s'ajoute au jambon, à la galantine, est faite par la décoction de diverses parties du porc, réunies souvent aux abatis de volailles ; elle est d'un goût très agréable, et est fort recherchée des consommateurs.

Le premier chien auquel cette gelée fut donnée, la prit pendant quelques jours avec une véritable avidité ; mais cette appétence se calma bientôt : il mettait plus de temps à prendre la gelée ; quelques jours encore, et il ne la prenait qu'en partie et avec des signes de dégoût ; enfin il n'y toucha plus du tout, et se contentait de la flairer, sans doute pour s'assurer si ce qu'on lui donnait n'aurait pas subi quelques changemens. En somme, l'animal, au 20ᵉ jour de l'expérience, était mort de faim, ayant

à sa disposition un aliment que, d'abord, il avait accepté avec empressement.

Cette expérience fut répétée sur plusieurs autres chiens ; elle eut exactement le même résultat, c'est-à-dire la mort avec tous les signes de l'inanition complète, le 20e jour au plus tard.

Bien que le doute ne fût plus possible, nous voulûmes cependant multiplier ces essais, afin de nous assurer s'il n'y avait rien d'individuel dans nos résultats. A cet effet, nous soumîmes d'autres chiens au régime de la gelée de charcutier, mais nous ne poursuivîmes pas l'expérience au-delà de la manifestation du dégoût, qui se montrait rarement plus tard que le 6e ou 8e jour; après quoi nous remettions l'animal à un régime ordinaire, et sa santé ne souffrait aucune atteinte.

D'après ces expériences, un chien pouvait vivre 20 jours en se nourrissant exclusivement de gélatine aromatisée par les principes odorans et sapides de la viande. Mais dans cette durée de l'existence, quelle était la part de la gélatine digérée? L'animal succomberait-il plus tôt, s'il ne prenait aucune nourriture?

Le désir d'éclaircir ce doute fut l'occasion d'une nouvelle série d'expériences qui fut exécutée sur 22 animaux.

En voici le résumé :

EXPÉRIENCES SUR L'ABSTINENCE.

De ces animaux, les uns furent soumis à une abstinence complète ; les autres furent également privés de tout aliment, mais ils eurent de l'eau à discrétion.

Nous reconnûmes d'abord un fait depuis long-temps connu en physiologie, et qui vient d'être récemment constaté de nouveau dans le beau travail de M. Chaussat sur l'abstinence, savoir, que la mort de faim est d'autant plus prompte que l'on est plus jeune. En effet, des chiens âgés de 4 jours, sont morts après 48 heures d'abstinence ; des chiens âgés de plus de 6 ans, vivaient encore au 30e de diète absolue ; d'autres, plus jeunes, ont vécu de 7, 10, 11, 15 et 20 jours.

Pour atteindre l'objet que nous nous proposions, nous n'a-

vions donc qu'à comparer les âges des animaux mis au régime de la gélatine alimentaire, et ceux qui avaient été soumis à l'abstinence complète.

En comparant l'âge des chiens morts en mangeant de la gélatine, et l'âge de ceux qui étaient morts de faim, nous trouvâmes que la différence était fort peu de chose. En prenant des animaux du même âge, l'époque de la mort était, à quelques heures près, la même. Il faut dire toutefois, pour l'intelligence de ce résultat, que les animaux soumis au régime de la gelée de charcutier, se condamnaient eux-mêmes à une abstinence volontaire, après avoir pris cette gelée pendant 8 à 10 jours, et qu'il y avait eu réellement abstinence de part et d'autre dans les 10 ou 15 derniers jours de l'expérience.

Nous venons de dire que, dans la série d'expériences dont nous rapportons les résultats, plusieurs animaux avaient été privés d'alimens, mais non d'eau. Il était curieux, en effet, de savoir si l'eau aurait quelque influence sur la prolongation de l'existence des animaux soumis à l'abstinence. Cette influence a été manifeste : tous les chiens qui ont bu de l'eau, ont vécu 6, 8 et même 10 jours au-delà du terme fatal à ceux qui en étaient privés.

Un tel résultat n'a rien qui doive surprendre : le corps des animaux, le nôtre, sont composés, en très grande partie, d'eau qui se perd incessamment par diverses issues, telles que les poumons, la peau, les reins, etc. Il faut que de nouvelle eau vienne remplacer celle qui s'échappe, sans quoi, les rouages de la machine vivante cesseraient bientôt de fonctionner. Sous ce rapport et sous plusieurs autres, l'eau est donc un véritable aliment, et des plus indispensables.

On pourrait conclure de ces faits, que l'eau pure est plus nutritive que la gelée alimentaire. Sans rejeter entièrement cette conséquence, nous vîmes qu'elle ne ressortait pas rigoureusement des expériences précédentes; car, d'une part, les animaux mis au régime de la gélatine, cessent assez promptement d'en manger, et tombent alors dans le cas de l'abstinence complète; et de l'autre, les animaux mis à l'usage exclusif de l'eau, en boivent jusqu'aux derniers instans de leur vie. Nous avions donc

besoin de nous livrer à de nouvelles tentatives propres à éclaircir si la gélatine est ou n'est pas nutritive.

EXPÉRIENCES SUR LA GÉLATINE ASSOCIÉE A DIVERSES MATIÈRES ALIMENTAIRES.

Pour cela, nous résolûmes de mêler la gélatine à diverses matières alimentaires, et de nous assurer par là si nous ne pourrions pas en prolonger l'usage assez long-temps pour en apprécier les effets nutritifs.

Dans ces nouvelles expériences qui nous ont pris beaucoup de temps, car plusieurs se sont prolongées quatre-vingts et quatre-vingt-dix jours, la gélatine, généralement à forte dose, a été donnée, soit cuite dans du bouillon de viande, soit mêlée au pain et à la viande, tantôt isolément et tantôt réunis.

La quantité de gélatine sèche, associée avec ces matières, a pu être portée jusqu'à 500 grammes par jour pour des animaux du poids total de 10 ou 12 kilogrammes; elle était prise sans trop de répugnance, et a pu donner ainsi tous ses effets nutritifs; et cependant, dans tous ces essais qui ont été variés de beaucoup de manières, où la dose de la gélatine a été tantôt croissante et tantôt décroissante, ainsi que celle des alimens auxquels elle était associée, nous ne sommes jamais arrivés à une alimentation complète; loin de là : nos animaux sont morts avec tous les signes de l'inanition; tous ont perdu rapidement de leur poids; tous ont éprouvé des diarrhées abondantes, et sont tombés dans cet affaiblissement extrême, précurseur presque inévitable de la mort par défaut de nutrition.

On trouvera à la suite de ce rapport le détail de ces expériences; nous en citerons cependant ici quelques-unes, afin de donner une idée de la manière dont elles ont été conduites.

Expérience. — Un jeune chien, de grande taille, âgé de près d'un an, poids $11^{k},25$, est mis au régime d'une soupe composée de pain 250^{gr}, et égale quantité de colle de Flandre. Il y reste pendant 44 jours en maigrissant beaucoup; le 45^{e} jour, le régime se compose de pain 120^{gr}, colle de Flandre 370, c'est-à-

dire, qu'on ajoute en gélatine ce qu'on diminue en pain. L'animal laisse bientôt la soupe avec dégoût, et tombe dans une débilité excessive; on reprend alors le précédent régime de pain et de colle de Flandre à parties égales 25o^{gr}, en y ajoutant un demi-litre de bon bouillon gras : l'animal reprend sa soupe avec avidité; l'état des forces s'améliora. Mais ce mieux ne fut que de courte durée : l'animal, en 63 jours, était redevenu très faible, il ne pesait plus que 8^{k},5o, au lieu de 11^{k},25, poids initial.

La diarrhée la plus abondante n'a pas cessé pendant ces 63 jours. Le voyant dans cet état, et sa mort étant inévitable si on persistait dans le même régime, on mit l'animal au régime de la viande pendant quatre jours, ce qui rétablit ses forces et fit cesser la diarrhée. Au 76^{e} jour, le chien étant bien remis, on reprit le régime de la soupe de pain, de colle et de bouillon ; mais l'animal ne le prend qu'avec dégoût, et meurt le 83^{e} jour avec une maigreur excessive.

Autre expérience. — Une grosse chienne adulte, pleine, bien portante, fut mise à l'usage d'un mélange composé, pour 24 heures, de :

Gélatine sèche alimentaire	200 grammes.
Pain.	25o *id.*
Viande de cœur de bœuf.	13o *id.*
Deux œufs.	
Sel, quantité suffisante.	

Elle prend cette nourriture pendant 18 jours, durant lesquels elle maigrit très sensiblement.

Du 12^{e} au 22^{e} jour de l'expérience, la dose de gélatine est portée jusqu'à 5oo grammes pour 24 heures; mais le dégoût se manifeste : on est forcé de réduire la dose de gélatine.

Le 23^{e} jour, la chienne met bas cinq petits. Nous remarquons qu'elle a seulement quatre mamelles développées et contenant du lait. L'un des petits ne tarda pas à périr, probablement parce qu'il ne trouva pas de mamelles pour s'y attacher.

On continue la même alimentation, mais avec 25o grammes de gélatine seulement.

Le 24ᵉ jour, l'amaigrissement, après la délivrance, paraît très notable.

Du 24ᵉ au 29ᵉ jour, l'animal prend avec ses alimens, suivant la dose indiquée ci-dessus, 970 grammes de gélatine sèche. Il manifeste de la répugnance pour sa nourriture, quoiqu'il présente cependant tous les signes d'une faim excessive. Une des quatre mamelles cesse de fournir du lait, et un des petits est trouvé mort.

Du 29ᵉ au 43ᵉ jour, on cesse la gélatine pour nourrir l'animal avec la tripe. Dès le 3ᵉ jour de ce régime, toutes les mamelles sont pleines et donnent abondamment du lait.

Le 43ᵉ jour, on reprend la gélatine. Bientôt les mamelles supérieures s'affaissent; les trois inférieures sont encore remplies de lait.

Le 55ᵉ jour, toutes les mamelles flétries ne contiennent plus de lait. La mère, devenue très maigre, repousse d'abord ses petits. Au 58ᵉ jour, elle ne les laisse plus s'approcher d'elle; aussi ne tardent-ils pas à périr d'inanition.

Dans l'espace de 20 jours, l'animal a mangé, indépendamment du pain et de la viande, 3210 grammes de gélatine sèche. Cette alimentation a eu pour résultat évident de suspendre la sécrétion du lait, qui revenait aussitôt qu'on changeait de nourriture. Ce régime n'était donc pas suffisamment nutritif.

On peut conclure sans crainte des faits qui précèdent, que la gélatine, même aromatisée par les principes sapides et odorans de la viande, ne peut seule servir d'aliment et entretenir la vie, et qu'elle excite promptement un dégoût insurmontable;

Que son introduction, en certaine proportion, dans le régime, même pour moitié, n'améliore pas celui-ci, et qu'au contraire elle le rend incomplet et insuffisant.

Restait à examiner une préparation alimentaire, où l'on fait entrer quelquefois la gélatine pour une faible proportion, et qu'on distribue ensuite aux indigens. Je veux parler du bouillon de viande, fait en partie avec la solution gélatineuse obtenue par le procédé de M. d'Arcet.

EXPÉRIENCES SUR LE BOUILLON GÉLATINEUX ET LE BOUILLON DE VIANDE.

Dans la vue d'éclairer ce point particulier, qui cependant est d'une haute importance, puisqu'il touche à l'alimentation des pauvres valides ou malades, nous avons cru bien faire en comparant le bouillon qui se fabrique à l'hôpital Saint-Louis par les procédés de M. d'Arcet, et le bouillon que distribue et vend dans Paris, en très grande quantité, la compagnie hollandaise.

Pour rendre cette comparaison plus fructueuse, l'un de nous, d'après le désir de la commission, s'est consacré pendant trois mois (septembre, octobre, novembre de 1835) à l'examen attentif de la dissolution gélatineuse et du bouillon qu'on prépare à l'hôpital Saint-Louis.

Tous les jours il faisait prendre à l'hôpital le bouillon et la dissolution gélatineuse du jour même. A leur arrivée au laboratoire de l'École polytechnique, où toutes ces expériences ont été exécutées, on constatait leurs caractères physiques, leur saveur et leur action sur le papier, etc.

On évaporait ensuite un litre de chaque liqueur au bain de vapeur, jusqu'à ce que le résidu ne perdît plus rien. Après avoir examiné ce résidu lui-même, on le brûlait avec ménagement pour en détruire la matière organique et en doser les sels.

On verra dans le tableau qui suit, et où se trouvent renfermés les résultats de cette longue suite d'essais, que le bouillon de l'hôpital Saint-Louis est souvent neutre ou faiblement acide; qu'on le rencontre fréquemment louche, et que son goût, assez inégal, laisse quelquefois à desirer. Ce bouillon paraît contenir moyennement 14 grammes de matière sèche par litre, dont 8 grammes en matière organique et 6 grammes de sels où domine le sel marin. Quant à la matière organique, elle se compose essentiellement de graisse, de gélatine et d'extrait provenant de la viande ou des légumes. Ce bouillon renferme un peu de sel ammoniac qu'on n'a pas cherché à doser exactement.

La dissolution gélatineuse renfermait généralement 10 gram-

mes de gélatine par litre ; mais comme cette quantité est un produit moyen, on a étudié des dissolutions plus pauvres obtenues des os déjà épuisés. Toutes ces liqueurs se sont montrées plus ou moins alcalines, quelquefois louches et de mauvais goût, mais souvent sans saveur. On n'y trouve, en général, que des traces de substances salines. La liqueur ne renferme guère en réalité que de l'eau, de la gélatine, et un peu de graisse en quelque sorte émulsionnée par la présence de quelques traces des composés ammoniacaux.

C'est l'alcalinité de la dissolution gélatineuse qui explique le peu d'acidité du bouillon qui en provient, les acides fournis par la viande ou les légumes étant neutralisés par l'alcali de la dissolution.

C'est aussi son aspect louche et la saveur assez désagréable qu'elle présente quelquefois, qui rendent compte de l'état trouble du bouillon et de la saveur peu satisfaisante qu'on lui a reconnue dans quelques-unes des épreuves.

Une surveillance active et éclairée est donc plus nécessaire, plus indispensable, quand il s'agit de fabriquer du bouillon avec une dissolution gélatineuse sujette à varier selon les soins qu'on porte au choix des os, à leur manutention et à la bonne direction de l'appareil. Nul doute qu'on ne puisse obtenir, avec l'appareil de M. d'Arcet, une dissolution gélatineuse sans saveur et sans odeur, et par suite, un bouillon agréable ; mais on n'observe pas toujours, sans doute, les précautions qui seraient nécessaires pour y parvenir.

EXAMEN CHIMIQUE COMPARATIF *du bouillon gras et de la dissolution gélatineuse confectionnés à l'hôpital Saint-Louis.*

DATES. — 1835.	BOUILLON PAR LITRE.				DISSOLUTION GÉLATINEUSE PAR LITRE.			
	RÉSIDU sec.	MATIÈRE organ.	SELS.	OBSERVATIONS.	RÉSIDU sec.	MATIÈRE organ.	SELS.	OBSERVATIONS.
	gr.	gr.	gr.		gr.	gr.	gr.	
24 sept.	15,54	8,24	7,30	Neutre, louche, goût ordin., mais pas très bon.	10,60	10,52	0,08	Faiblement alcaline, un peu louche, fade.
25 —	12,34	6,97	5,37	Neutre, louche, goût ordinaire.	12,78	»	»	Faiblement alcaline, un peu louche, goût cru.
26 —	13,24	5,55	7,69	Neutre, louche, goût ordinaire.	10,30	10,17	0,13	Faiblement alcaline, louche, goût mauvais.
28 —	12,34	6,82	5,52	Acide, louche, goût sur.	11,88	11,74	0,14	Faiblement alcaline, louche, goût cru.
29 —	13,42	8,32	5,10	Faiblement acide, louche, mauvais goût.	11,80	11,66	0,14	Faiblement alcaline, louche, mauvais goût.
30 —	17,10	10,34	6,76	Faiblement acide, très louche, goût ordinaire.	12,12	11,97	0,15	Alcaline, sans saveur, louche.
1er oct.	13,10	8,34	4,76	Faiblement acide, louche, goût sur.	8,40	»	»	Neutre, louche, fade.
2	12,86	5,50	7,36	Neutre, presque clair, goût bon.	15,12	»	»	Alcaline, presque claire, fade.
3 —	13,60	6,20	7,40	Neutre, louche, bon goût.	10,62	10,50	0,12	Faiblem. alcaline, goût ordin., un peu louche.
5 —	13,76	6,54	7,22	Neutre, louche, goût ordinaire.	11,22	»	»	Alcaline, un peu louche, goût ordinaire.
6 —	14,38	6,20	8,18	Faiblement acide, louche, goût ordinaire.	10,20	»	»	Un peu alcaline, un peu louche, fade.
7 —	11,92	6,43	5,49	Un peu acide, louche, mauvais goût.	10,38	10,20	0,18	Faiblem. alcaline, presque claire, goût ordin.
8 —	14,36	7,44	6,92	Faiblement acide, louche, goût ordinaire.	10,52	10.39	0.13	Faiblement alcaline, louche, goût ordinaire.
9 —	17,02	8,06	8,96	Faiblement acide, louche, goût sur.	11,86	»	»	Faiblement alcaline, louche, goût ordinaire.
16 —	12,60	6,80	5,80	Un peu acide, louche, bon goût.	6,90	6,78	0,12	Sans saveur, faiblement alcaline, assez claire.
19 —	13,77	6,23	7,54	Neutre, louche, goût gélatineux.	7,66	7,52	0,14	Faiblem. alcaline, un peu louche, goût ordin.
20 —	13,52	7,78	5,74	Un peu acide, louche, goût ordinaire.	14,30	»	»	Faiblem. alcaline, un peu louche, goût ordin.
21 —	15,60	8,33	7.27	Neutre, rouge et coloré; un peu amer.	8,10	7,98	0,12	Faiblem. alcaline, un peu louche, goût ordin.
22 —	13,88	6,68	7,20	Acide, louche, goût un peu sur.	8,88	»	»	Faiblement alcaline, assez claire, fade.
23 —	13,78	6,86	6 92	Neutre, louche, pas très bon.	8,28	8,18	0,10	Faiblem. alcaline, un peu louche, sans saveur.
24 —	15,14	8,71	6,43	Faiblement acide, louche, mauvais goût.	10,88	10,72	0,16	Faiblement alcaline, sans saveur, louche.
26 —	14,40	7,34	7,06	Un peu acide, louche, goût faible et pas bon.	13,40	13,17	0,23	Faiblement alcaline, louche, fade.
27 —	13,96	8,13	5,83	Un peu acide, louche, goût mauvais et sur.	5,38	4,42	0,96	Faiblement alcaline, assez claire, insipide.
28 —	13,50	6,59	6,91	Neutre, trouble, bon goût.	7,74	7,60	0,14	Faiblement alcaline, assez claire, goût ordin.
29 —	15,96	10,21	5,75	Faiblement acide, louche, goût assez bon.	4,42	»	»	Faiblement alcaline, claire, insipide.
30 —	13,68	6,01	7,67	Neutre, louche, goût assez bon.	9,80	9,64	0,16	Un peu alcaline, louche, sans saveur.
31 —	13,20	7,31	5,89	Neutre, un peu louche, goût assez bon.	9,86	9,66	0,20	Alcaline, un peu louche, sans saveur.
2 nov.	13,90	7,02	6,88	Neutre, louche, bon goût.	6,44	6,36	0,09	Faiblement alcaline, claire, insipide.
3 —	13,60	6,93	5,67	Neutre, peu louche, très bon goût.	6,00	5,92	0,08	Neutre, claire, insipide.
4 —	11,80	6,22	5,58	Neutre, un peu louche, bon goût.	6,20	6,11	0,09	Faiblem. alcaline, assez claire, sans saveur.
5 —	15,20	8,13	7,07	Neutre, assez clair, bon goût.	7,74	7,61	0,13	Faiblement alcaline, un peu louche, insipide.
6 —	15,66	7,74	7,92	Faiblement acide, clair, très bon goût.	3,74	3,71	0,03	Alcaline, claire, insipide.
7 —	13,92	6,06	7,86	Faiblement acide, louche, bon goût.	11,40	11,26	0,14	Faiblement alcaline, louche, goût ordinaire.
9 —	15,64	5,78	9,86	Neutre, louche, bon goût.	9,20	9,06	0,14	Alcaline, louche, goût ordinaire.
10 —	12,18	6,38	5,80	Acide, louche, goût ordinaire.	14,48	14,30	0,18	Alcaline, louche, goût ordinaire.

Comme on se proposait de comparer, dans les expériences physiologiques, le bouillon de l'hôpital Saint-Louis à celui de la Compagnie hollandaise, on a exécuté quelques nouvelles expériences chimiques sur ce dernier, qui n'ont fait que confirmer l'analyse faite avec tant de soin par M. Chevreul.

En général, le bouillon de la Compagnie hollandaise est d'une acidité très marquée, d'une saveur agréable et appétissante, souvent un peu louche. Il renferme très régulièrement par litre 24 à 25 grammes de matière sèche, dans lesquels il faut compter 8 à 10 grammes pour les sels, et en particulier pour le sel marin, et 15 grammes pour les matières organiques, c'est-à-dire la graisse, la gélatine, l'extrait de viande et les parties solubles fournies par les légumes.

Quand on compare le résidu sec laissé par le bouillon de l'hôpital Saint-Louis, à celui que laisse le bouillon de la Compagnie hollandaise, leur odeur et leur saveur présentent des caractères si tranchés, que c'est bien certainement l'un des meilleurs moyens de les juger; cependant on n'a pas voulu tenir compte de cette comparaison dans les tableaux.

Examen chimique du bouillon de la Compagnie hollandaise.

DATES. — 1835.	PAR LITRE.			
	RÉSIDU sec.	MATIÈRE organ.	SELS.	OBSERVATIONS.
	gr.	gr.	gr.	
11 novembre.	25,50	15,98	9,52	Acidité faible, bon goût, un peu louche.
12 —	22,96	12.98	9,98	Acide, bon goût, assez clair.
13 —	23,80	14,77	9.08	Acide, bon goût, un peu louche.
16 —	23,96	15,21	8,75	Acide, bon goût, un peu louche.
17 —	23,92	15,17	8,75	Acide, bon goût, un peu louche.
18 —	21,56	14,28	7,28	Acide, bon goût, un peu louche.
19 —	24,58	15,41	9,17	Acide, bon goût, un peu louche.
20 —	24,40	15,04	9,36	Acide, bon goût, assez clair.

Dans le même temps que l'un de nous se livrait à ces études chimiques comparatives, un autre comparait ces mêmes produits sous le rapport nutritif.

A cette fin, dans un certain nombre d'expériences, il mit en

regard deux chiens aussi semblables que possible sous le triple rapport de l'âge, du poids et de la bonne santé. On nourrissait l'un avec une soupe composée d'une quantité déterminée de pain blanc et de bouillon hollandais ; l'autre était nourri avec la même dose de pain, mais mêlée au bouillon de l'hôpital Saint-Louis. On constatait chaque jour sur l'un et sur l'autre l'influence du régime sur le poids du corps et sur l'exercice des fonctions.

Voici quelques-unes de ces expériences, ainsi que leurs résultats :

Un chien, que nous désignerons sous le n° 1, pesant $8^{kil},250$, est mis pour nourriture à l'usage d'une soupe composée de pain blanc 250^{gr} et bouillon gélatineux de l'hôpital Saint-Louis, 1 litre.

La santé s'entretient bonne pendant 56 jours, mais l'animal ne pèse plus que $7^{kil},15$; il a donc perdu dans cet intervalle, et sous l'influence de ce régime, $1^{kil},235$.

On remplace alors le litre de bouillon de l'hôpital Saint-Louis par un litre de bouillon de la Compagnie hollandaise, le pain étant toujours 250^{gr} pour chaque jour. Au 111e de l'expérience et au 55e de ce nouveau régime, l'animal se porte bien, il pèse $7^{kil},90$: il a donc récupéré 90^{gr} sur le poids primitif.

Un chien n° 2, du poids de $6^{kil},50$, fut mis au régime d'une soupe composée de bouillon hollandais 1 litre et pain 250^{gr}. Au 56e jour, son poids était augmenté de 15^{gr}. On le met à l'usage de la soupe faite avec le bouillon de l'hôpital Saint-Louis 1 litre et 250^{gr} de pain. Au 111e jour de l'expérience, au 55e du nouveau régime, l'animal ne pèse plus que $6^{kil},15$; il a donc perdu 40^{gr}.

Voici d'autres expériences dans lesquelles la quantité de pain a été diminuée afin de mieux mettre en évidence les effets du bouillon.

Chien n° 3, pesant $3^{kil},75$; régime par jour :

Bouillon hollandais	1 litre.
Pain.	120 grammes.

Au 17e jour, l'animal pèse $3^{kil},60$: il a donc perdu 15 grammes.

On change le régime.

Bouillon Saint-Louis	1 litre.
Pain.	120 grammes.

Le chien pèse 3^{kil},75 au 41^{e} jour : il a donc récupéré son poids primitif.

Chien n° 4, pesant 4 kilogrammes :

Bouillon Saint-Louis, par jour	1 litre.
Pain	120 grammes.

Au 17^{e} jour, l'animal pèse 3^{kil},80 : il a donc perdu 20 grammes.

On change le régime.

Bouillon hollandais.	1 litre.
Pain.	120 grammes.

Au 41^{e} jour, le chien pèse 4^{kil},50 : il a donc gagné 50 grammes sur son poids primitif, et 70 sur celui qu'il avait acquis en prenant le bouillon gélatineux.

D'après ces exemples, que nous avons pris comme les plus simples, on voit que l'avantage, bien que faible, est toujours resté au bouillon de viande que fait avec tant de soin la Compagnie hollandaise. Au contraire, le bouillon de l'hôpital Saint-Louis, qui est aussi un bon bouillon de viande, mais étendu pour moitié de la solution gélatineuse, n'a que médiocrement soutenu l'épreuve de la concurrence.

Nous devons ajouter, comme un fait important, que dans plusieurs cas, des chiens nourris avec la soupe au bouillon, soit hollandais, soit de Saint-Louis, et bien que la quantité de pain ait été portée jusqu'à 380 grammes par jour, n'étaient pas suffisamment alimentés, et qu'ils sont morts avec tous les signes de l'inanition, bien que l'on ait changé leur régime avant la fin de l'expérience, et qu'on les ait mis à l'usage de la viande.

Tel est, messieurs, le récit aussi abrégé que possible des nombreuses expériences auxquelles votre commission s'est livrée dans le but spécial d'apprécier les propriétés nutritives de la gélatine. Nous pouvons, ou plutôt nous devons en tirer cette conséquence, que si la gélatine peut entrer sans désavantage

pour une part dans les alimens, il ne faut pas que sa proportion dépasse certaines limites, car elle donne alors lieu à des inconvéniens graves, et particulièrement à un dégoût insurmontable, au point que les animaux se laissent mourir d'inanition plutôt que de toucher à cette substance, quel que soit son mode de préparation.

La concordance frappante qui se remarque entre nos résultats et ceux des expérimentateurs qui nous ont précédés, ne permet donc pas de partager les espérances flatteuses que certains philanthropes avaient conçues à différentes époques du parti qu'on pouvait tirer des os.

EXPÉRIENCES SUR LE PARENCHYME DES OS.

Dans toutes les recherches dont il vient d'être question, il s'est toujours agi de la gélatine proprement dite, produit de la réaction de l'eau et de la chaleur sur certaines parties des animaux. Il aurait été curieux, sans doute, d'expérimenter comparativement sur la *chondrine*, mais, outre qu'il n'est pas facile de se procurer cette matière, elle aurait peut-être encore besoin d'être étudiée par les chimistes, avant de servir de base à des expériences sur l'alimentation. Nous aurions pu aussi diriger nos investigations sur la gélatine qui, par une trop forte chaleur ou par quelque influence atmosphérique, a perdu la propriété de faire gelée avec l'eau; mais l'odeur et la saveur repoussante de cette gélatine sirupeuse s'opposent à ce qu'elle puisse jamais être employée comme aliment. Nous n'avons donc pas jugé à propos de la soumettre, non plus que la *chondrine*, à des expériences spéciales dont l'utilité eût été fort contestable.

Il n'en était pas de même des os et de la matière organique qui forme leur parenchyme; il était intéressant de chercher si ces substances étaient de bons ou de mauvais alimens.

Dans cette intention, nous nous sommes procuré à l'établissement de l'île des Cygnes, des os déphosphatés et décarbonatés par l'acide chlorhydrique. Réduits ainsi à leur parenchyme organique, les os sont demi transparens, flexibles, élastiques,

ont une odeur de graisse et une saveur acide qu'ils doivent à l'opération chimique par laquelle une grande partie de leurs sels calcaires a été enlevée.

Ces produits, qui portent le nom collectif de *gélatine alimentaire*, sont cependant de deux espèces. Les uns proviennent de la tête du bœuf et de celle du mouton. Ils se transforment presque entièrement en gélatine par l'action de l'eau bouillante: leur odeur de graisse est peu prononcée. Les autres proviennent des pieds de mouton; ils ont une apparence plus opaque que les premiers; ils contiennent évidemment une certaine quantité de graisse.

Plusieurs chiens auxquels ces deux espèces d'os furent offertes, les mangèrent pendant quelques jours également bien; mais après cinq ou six jours, une distinction bien tranchée s'établit entre ces produits : les animaux refusèrent les os de têtes de bœuf et de mouton, et nous dûmes renoncer à les employer. Les chiens qui mangeaient les os provenant des pieds de mouton, continuèrent à s'en nourrir pendant un mois à la dose de 250^{gr} par jour, sans jamais avoir donné aucun signe de répugnance, les recevant au contraire chaque matin avec une satisfaction non douteuse.

Pendant ce temps, ces animaux se sont toujours bien portés, sont restés vifs et gais; leur digestion était régulière; cependant leur poids a subi une légère diminution, ce qui indique que leur alimentation n'était pas complète. Ajoutons toutefois qu'après un mois de ce régime, le dégoût s'est manifesté par des signes non équivoques, ainsi que les annonces de l'inanition. Nous dûmes dès-lors nous borner à constater que le parenchyme organique des pieds de mouton avait suffi à l'alimentation pendant tout un mois.

Ce résultat, bien que remarquable, n'a rien de surprenant. Chacun sait que les animaux carnassiers de grande taille, que les chiens eux-mêmes, broient les os spongieux et s'en nourrissent, rejetant par la défécation les sels calcaires presque sans mélange. En enlevant aux os, à l'aide d'un acide, leur phosphate et leur carbonate de chaux, c'est leur faire subir une véritable préparation culinaire qui rend ici, comme dans une

multitude d'autres circonstances, l'aliment d'une mastication plus facile et d'une digestion plus prompte.

Il n'était pas aussi facile de comprendre comment les chiens qui acceptent pendant un mois les os de pieds de mouton déphosphatés, refusent, après quelques jours, les os de tête de bœuf et de mouton, également privés de leur partie saline.

Dans la vue de jeter quelque lumière sur cette anomalie singulière, au moins en apparence, nous avons analysé comparativement ces deux sortes d'os. Les os de pieds de mouton ont été trouvés composés pour 100 parties de

Eau.	47,22
Graisse	5,55
Matière qui se transforme en gélatine. .	17,30
Phosphates terreux et autres sels . . .	12,42
Matière animale insoluble	17,51
	100,00

Les os de têtes de bœuf ou de mouton contiennent :

Eau.	22,87
Graisse	11,54
Matière qui se transforme en gélatine. .	27,99
Phosphates terreux.	32,77
Matière animale insoluble	4,83
	100,00

Ainsi, la substance que les animaux refusent contient plus de graisse, plus de gélatine et plus de sels que celle qu'ils acceptent, et dont ils se nourrissent quelque temps. Celle-ci contient plus d'eau, et surtout plus de matière animale insoluble que la précédente. Est-ce à cette proportion de matière insoluble qu'il faut attribuer la préférence que les chiens lui accordent, et sa vertu nourrissante? On peut le supposer, mais rien jusqu'ici ne le prouve rigoureusement.

Toutefois, ce parenchyme des os de pieds de mouton, que les chiens mangent avec plaisir, et dont ils peuvent se nourrir exclusivement pendant un mois, est en partie composé de la matière organique qui se change facilement en gélatine. Il devenait curieux de savoir si, après avoir subi cette transformation,

cette matière conserverait au même degré ses propriétés nutritives temporaires.

Nous fîmes donc macérer dans l'eau chaude, mais non bouillante, une certaine quantité d'os de pieds de mouton déphosphatés, et nous nous procurâmes ainsi une gelée assez compacte, retenant encore par son odeur et sa saveur quelque chose de son origine, et dont la surface était recouverte d'une couche écumeuse contenant évidemment de la graisse.

Nous mîmes plusieurs chiens à l'usage de cette gelée; parmi eux se trouvaient ceux qui, précédemment, s'étaient nourris de pieds de mouton déphosphatés; les animaux soumis à ce régime ne tardèrent pas à présenter tous les caractères de l'inanition, et même à périr dans le marasme le plus complet.

Nous citerons comme exemple un chien qui s'était bien trouvé pendant un mois de la nourriture exclusive de pieds de mouton déphosphatés; après 10 jours de l'usage de la gelée faite avec ces mêmes pieds, il avait perdu 500 gr de son poids : son extérieur, alors, est entièrement changé; il n'a plus sa vivacité, il se soutient à peine; ses yeux sont ternes, son poil est hérissé; il répand une odeur infecte, il est poursuivi d'une diarrhée incessante. Cet état s'empire encore durant les jours suivans; enfin l'animal meurt le 13e jour de l'expérience dans une émaciation excessive, ayant cependant continué à manger la gelée jusqu'au dernier moment.

D'autres chiens qui débutèrent par manger de la même gelée, ne survécurent pas plus de 10 jours en en mangeant à discrétion.

Nous remarquâmes dans le cours de ces expériences, comme une circonstance curieuse, que ces animaux mangeaient avec une préférence marquée l'écume grasse de la surface et la gélatine qu'elle recouvrait immédiatement, et qu'ils délaissaient, au contraire, la gélatine qui occupait le fond du vase et qui était dépourvue de saveur graisseuse.

Ce n'est donc pas uniquement parce qu'ils retiennent de la graisse et des sels calcaires, que les os de pieds de mouton sont nutritifs; c'est probablement aussi à raison de leur condition de parenchyme organique. Ainsi s'est introduit expérimentalement un nouvel élément dans la grande question de l'alimentation,

et cet élément nous a fourni matière à des recherches ultérieures dont nous dirons les résultats.

Dans le but de nous éclairer sur son influence, nous résolûmes de soumettre les os eux-mêmes à l'expérience ; que si les os satisfaisaient seuls à une alimentation complète, on aurait une preuve de plus de l'influence de la condition organique sur les propriétés des alimens.

A cet effet, nous avons mis des chiens à un régime exclusivement composé d'os et d'eau ; mais aux uns les os étaient donnés crus, dépouillés, autant que possible, des chairs ; aux autres les os étaient donnés cuits, c'est-à-dire dépouillés complètement de toutes les parties molles et en partie de leur graisse.

Le résultat de ces expériences est celui-ci :

Les chiens qui ont mangé les os crus se sont parfaitement bien trouvés de ce régime ; ils l'ont subi sans interruption pendant trois mois, sans aucun trouble dans leur santé et sans aucune perte de leur poids.

Il n'en a pas été de même des chiens qui se sont nourris d'os cuits ; après deux mois de cette nourriture, ils sont morts avec tous les signes de l'inanition, et une diminution considérable de leur poids.

La conséquence naturelle de ces expériences, c'est que la condition d'organisation n'est pas toute-puissante, et qu'elle a besoin de se combiner à d'autres conditions pour produire une nutrition complète et de longue durée.

Mais pour donner à cette déduction toute la valeur désirable, il était nécessaire de l'établir sur un plus grand nombre de faits, et d'expérimenter comparativement sur les divers tissus animaux qui servent ordinairement à la confection de la gélatine et des diverses espèces de colle forte.

Nous fîmes, dans cette vue, plusieurs séries d'expériences.

EXPÉRIENCES SUR LES TENDONS.

La première eut pour sujet les *tendons ;*

La seconde, les *cartilages*, le *cuir cru* ou *tanné.*

Nous ne sommes en mesure de parler en ce moment que de

ce qui regarde les tendons; les autres expériences ne sont pas terminées : elles trouveront leur place dans un rapport supplémentaire que nous préparons.

Comme type de nos recherches sur les qualités nutritives des tendons, nous citerons le fait suivant qui, à lui seul, résume ce que nous avons observé sur ce point.

Le 23 mars dernier, un chien adulte, pesant 16^{kil},300, est mis à l'usage des tendons de bœuf, pour toute nourriture, avec l'eau pour boisson. Il a de l'un et de l'autre à discrétion, et l'aliment est renouvelé chaque matin.

Le premier jour, l'animal consomme 1 ½ kil. de tendons qui paraissent le satisfaire; mais à dater du 10 avril, il s'en dégoûte, n'y touche presque plus, et bientôt, le 15 avril, il les refuse formellement. Pesé à ce moment (23^{e} jour de l'expérience), il a perdu 1^{kil},800 de son poids, et offre d'ailleurs les signes non douteux de l'inanition. On change alors son régime, on lui donne des os crus qu'il mange avec avidité, à la dose de 2 kil. par jour. Il retrouve rapidement ses forces et son activité. Le 12 mai, il avait récupéré en poids 1 kil. et continuait à manger ses os avec satisfaction et à se bien porter.

Les tendons ne sauraient donc, pas plus que le parenchyme des os, suffire seuls à l'alimentation au-delà d'un certain temps.

EXPÉRIENCES SUR LES PROPRIÉTÉS NUTRITIVES DE L'ALBUMINE, DE LA FIBRINE ET AUTRES PRINCIPES IMMÉDIATS ANIMAUX.

Les nombreuses expériences qui précèdent ont surabondamment démontré que la gélatine est peu ou point nutritive. Mais ces propriétés négatives étaient-elles donc propres à cette substance? les principes immédiats animaux ou végétaux lui seraient-ils supérieurs? ou bien seraient-ils sur la même ligne? La Commission résolut de se livrer à des recherches qui pussent amener une solution quelconque à ces intéressantes et nouvelles questions. C'est ici que notre travail a pris une immense extension; car il ne s'agissait de rien moins que de répéter pour chacun de ces principes immédiats organiques, qui entrent

dans la composition de nos alimens, les mêmes essais que nous avions entrepris et terminés sur la gélatine.

Nous savions déjà, par les travaux de l'un de nous, que l'alimentation composée d'un seul élément était rarement suffisante, et qu'elle conduisait à la mort après un temps plus ou moins long.

Cependant, nous résolûmes d'examiner directement tous les faits qui pourraient se rapporter à la question.

EXPÉRIENCES SUR L'ALBUMINE.

Nous prîmes d'abord l'albumine qui, sous plus d'un rapport, se rapproche de la gélatine. Cependant il n'en est pas de cette substance comme de la gélatine : celle-ci est un produit de l'art; l'albumine, au contraire, existe toute formée dans l'économie et particulièrement dans le sérum du sang, dans celui de la lymphe, etc.; on pouvait donc présumer qu'une nourriture exclusivement composée d'albumine suffirait, au moins pour un temps, à l'alimentation. On va voir qu'il n'en fut pas ainsi.

Nous essayâmes d'en nourrir des chiens; mais nous fûmes promptement forcés d'abandonner notre entreprise, car plusieurs animaux auxquels nous donnâmes pour toute nourriture pendant quelques jours des blancs d'œufs cuits ou crus, n'y touchèrent pour ainsi dire pas, et se seraient certainement laissés mourir de faim à côté.

L'albumine seule coagulée ou liquide, de même que la gélatine, était donc instinctivement repoussée, délaissée par des animaux tourmentés par une faim des plus vives. (1)

Ces résultats relatifs à l'albumine étonneront; car si l'on s'accorde à regarder le blanc d'œuf durci comme difficile à digérer, du moins est-il qu'on ne saurait, d'après les notions communes, lui refuser les qualités d'un aliment.

(1) Comme nous avions à disposer de beaucoup de jaunes d'œufs, nous voulûmes nous assurer si les chiens consentiraient à s'en nourrir. A cette fin, nous donnâmes 12 à 14 jaunes d'œufs durs à des chiens bien portans et de grand appétit. Le premier jour, les jaunes d'œufs furent mangés avec quelques signes de répugnance; le deuxième, la répugnance fut plus marquée, et les jaunes d'œufs ne furent mangés qu'en partie; enfin, le quatrième jour, les animaux ne voulurent plus y toucher, bien qu'ils fussent réellement affamés.

Le blanc d'œuf, liquide ou cuit faiblement, passe d'ailleurs, comme on sait, pour un aliment léger et très propre à une bonne et facile assimilation.

On trouve, en effet, réunies dans le blanc d'œuf nombre de conditions favorables à la digestion : il est alcalin, il renferme des sels, et, en particulier, du sel marin en assez forte proportion ; la matière animale qu'il contient est la même qui se retrouve dans le chyle et dans le sang ; elle y est liquide et se coagule pourtant, par les acides de l'estomac, en flocons de peu de cohésion ; enfin le blanc d'œuf renferme quelques membranes organisées qui peuvent jouer dans la digestion un rôle utile et peut-être indispensable.

Malgré toutes ces bonnes raisons, l'albumine est repoussée par les animaux. On verra plus loin comment on peut s'expliquer, en partie au moins, un tel résultat : pour le moment, nous nous contenterons de bien établir les faits.

Après ces essais sur l'albumine, nous voulûmes étudier la fibrine.

EXPÉRIENCES SUR LES PROPRIÉTÉS NUTRITIVES DE LA FIBRINE.

Cette substance se présentait à nous avec une réputation, justement méritée, de substance nutritive par excellence. N'est-ce pas elle, en effet, qui forme presqu'en entier la chair musculaire, aliment principal de l'homme et des animaux carnassiers ?

Nous devions nous attendre à des résultats bien différens de ceux que nous avaient fournis la gélatine et l'albumine qui, en définitive, n'ont jamais servi exclusivement de nourriture à aucun animal.

Au lieu de faire nos premières expériences sur la chair musculaire, où la fibrine est unie aux tissus vasculaires, nerveux, cellulaires, nous préférâmes prendre cette matière dans son état de pureté, et, pour cela, nous employâmes la fibrine telle qu'elle s'extrait du sang de bœuf. Elle fut lavée avec soin, exprimée, afin de la séparer entièrement des autres élémens du

sang. C'est dans cet état de pureté, mais humide, qu'elle fut donnée aux animaux.

Ces nouvelles expériences, dont les détails seront publiés, nous ont offert, indépendamment de leur résultat, qui est des plus remarquables, plusieurs circonstances curieuses que nous allons rappeler.

La première impression de la fibrine du sang, ainsi épurée, a été la répugnance; mais bientôt les animaux qui s'y sont accoutumés, l'ont prise avec satisfaction pendant toute la durée des expériences qui, dans plusieurs cas, se sont prolongées jusqu'à 75 jours. Ce n'est que vers les derniers jours qu'un certain dégoût s'est prononcé. Dans une de ces expériences on crut qu'en ajoutant à la fibrine de la gélatine alimentaire, l'animal préférerait le nouvel aliment, mais il n'en fut rien : il continua à manger négligemment la fibrine, et ne toucha point à la gélatine.

Mais le fait le plus singulier, qui nous a beaucoup surpris, et sans doute surprendra tout le monde, c'est que, bien que nos animaux aient régulièrement mangé et digéré de 500 à 1000 grammes de fibrine, chaque jour, ils n'en ont pas moins offert graduellement, par la diminution de leur poids et leur maigreur croissante, les signes d'une alimentation insuffisante, et que l'un d'eux est réellement mort d'inanition, après avoir mangé tous les jours, pendant deux mois, un demi-kilogramme, et même la veille de sa mort 1 kilogramme de fibrine.

Chose remarquable! sur cet animal le sang avait presque entièrement disparu : malgré le soin que nous mîmes à le recueillir, peu d'instans après la mort, nous en obtînmes à peine 1 gramme de fibrine.

Voilà sans doute un résultat fort inattendu, et qui nous montre combien nous avons à faire avant d'avoir une théorie, même approximative, de la nutrition! Que la gélatine, que l'albumine ne nourrissent pas, on le comprend : ces matières n'entrent que pour une faible part dans l'alimentation de l'homme et des animaux. Mais que la fibrine, cette base organique de la viande, ne puisse, prise en quantité considérable, soutenir la vie au-delà d'un certain temps, voilà qui doit surprendre et qui mérite

de nouvelles investigations, auxquelles la Commission se propose de se livrer.

Il est vrai que la fibrine extraite du sang diffère sous plus d'un rapport de la fibrine des muscles; elle n'est point organisée, elle n'a point les principes sapides et odorans que la viande cède au bouillon; elle n'est pas intimement mélangée de vaisseaux, de nerfs et de cellulosité; enfin elle est privée des sels alcalins, terreux et du fer, qui se retrouvent dans le tissu musculaire. Ne serait-ce pas cette différence de composition qui se trouverait la raison du faible degré de ses qualités nutritives? car chacun sait par expérience que la viande nourrit complètement, même à une dose inférieure à celle où nous avons fait manger la fibrine du sang à nos chiens. Nous citerons d'ailleurs bientôt des faits qui ne laissent aucun doute à cet égard.

La fibrine de la viande, celle du sang, ne sont donc pas identiques. A ne considérer même que l'action des réactifs, la fibrine récemment coagulée est toujours plus soluble que celle dont la coagulation est ancienne.

Mais il est impossible d'expliquer ainsi les remarquables résultats qu'on vient de rapporter. Comme il est évident que la fibrine, à un état quelconque, ne nourrit pas, il faut bien en conclure ou bien que la fibrine, comme l'albumine, comme la gélatine, ne sont pas, étant prises seules, capables de fournir à l'estomac le produit qui peut se convertir en un chyle nutritif, ou bien qu'il leur manque quelque chose qui serait indispensable pour déterminer cette transformation. (1)

Pour éclaircir cette difficulté, nous avons résolu de faire deux séries d'expériences. Dans la première, les animaux seront alimentés avec de la fibrine du sang mêlée artificiellement aux élémens sapides et odorans de la chair des muscles; et dans la deuxième l'alimentation se fera avec la chair elle-même, mais dépouillée, autant que possible, de toutes les matières qui dans les muscles ne sont pas la fibrine.

(1) Entre la fibrine qui ne nourrit pas et la viande qui nourrit, y aurait-il une différence analogue à celle qui existe entre la fécule qui, à elle seule, ne se convertit pas en sucre, et le grain d'orge germé, où la fécule se saccharifie si aisément à la faveur de la diastase?

Ces expériences sont commencées, mais elles ne sont pas encore terminées; elles feront partie d'un rapport supplémentaire que nous nous proposons de présenter à l'Académie. Nous allons citer cependant les deux premières :

EXPÉRIENCES SUR LA FIBRINE DU SANG UNIE AUX PRINCIPES SAPIDES DE LA VIANDE.

1re *Expérience.* Du 14 avril 1841, un chien de forte taille est nourri exclusivement avec de la fibrine du sang de bœuf, bien lavée et arrosée avec du bouillon gras de la Compagnie hollandaise.

État de l'animal : vif, bien portant, pour la première fois soumis à l'expérimentation.

Age.	18 mois,
Poids	15 kilog.,
Quantité de fibrine mangée chaque jour.	1 kilog.,
Quantité d'excellent bouillon gras mêlé à la fibrine.	33 centil.

Le 19 avril, 5e jour. — L'animal mange bien son mélange et paraît satisfait de cette alimentation.

Poids . . . . . 15 kilog.

Le 3 mai, 17e jour. — L'animal se dégoûte de la fibrine et en perd, en la gaspillant, environ 500 grammes sur 1000.

Au lieu de 33 centilitres, on ajoute 50 centilitres de bouillon à 1000 grammes de fibrine.

Pendant 3 ou 4 jours il mange mieux, et à-peu-près entièrement ce qu'on lui donne.

Le 7 mai, 21e jour. — L'animal se dégoûte de nouveau de la fibrine, et en perd une très grande quantité.

On fait alors cuire la fibrine avec 50 centilitres de bouillon. Après cette préparation, la fibrine répand une odeur animalisée très appétissante.

Pendant les premiers jours qui suivent, l'animal mange avec

avidité son kilogramme de fibrine ainsi préparée, il n'en laisse rien. Mais bientôt il s'en dégoûte et finit par refuser d'en manger, quoique tous les jours on ait le soin de lui en donner de la nouvelle et préparée exactement de la même manière. On essaie de lui en donner lorsqu'elle est refroidie ou lorsqu'elle n'est que tiède; il la refuse dans tous les cas.

Le 15 *mai*, 31ᵉ jour. — L'animal refuse de manger, et laisse la fibrine cuite qu'on lui donne.

Poids de l'animal . . . . . 13 kilog.

2 kil. de perte en 31 jours.

On essaie de revenir à la fibrine crue, pendant 2 ou 3 jours; l'animal n'en mange pas davantage, et il refuse la fibrine, sous quelque forme qu'on la lui présente.

Du 15 au 19 mai, l'animal est resté sans manger, à côté d'un kilogramme de fibrine divisé en deux parties, dont l'une était cuite dans le bouillon et l'autre crue.

Expérience terminée le 19 *mai* (33ᵉ jour.) Ainsi, dès ce premier essai, l'alliance de la fibrine avec d'excellent bouillon contenant les principes sapides et les sels de la viande n'a pas suffi pour nourrir. Nous verrons si ce résultat, remarquable à plus d'un titre, se maintiendra dans nos expériences ultérieures.

EXPÉRIENCES SUR LA FIBRINE MUSCULAIRE.

Du 29 mars 1841, un chien, de moyenne taille, est nourri exclusivement avec du bœuf bouilli, privé de graisse et pressé dans un linge, après 24 heures de macération dans l'eau, dans le but de la dépouiller de sa saveur et de son odeur de viande, et de le rendre ainsi, autant que possible, semblable à la fibrine du sang.

Etat de l'animal : vif et bien portant, et pour la première fois soumis à l'expérimentation.

Age	de 18 mois à 2 ans,
Poids	$6^{kil},300$,
Quantité de bœuf mangée chaque jour.	250 grammes.

L'animal, quoique mangeant bien ses 250 grammes de bouilli par jour, maigrit graduellement. Cependant il conserve sa vivacité ; le poil est luisant et il ne présente aucunement les signes du marasme.

Le 12 mai, 43e jour. — L'animal est arrivé à un état de maigreur très considérable.

Poids . . . . . $4^{kil},800$.

$1^{kil},500$ de perte en 43 jours.

Jusqu'à ce moment, l'animal a toujours mangé ses 250 grammes de bouilli par jour, excepté depuis 5 ou 6 jours ; il en laisse un peu dans le fond de sa terrine.

Quoique très maigre, l'animal conserve sa vivacité.

24 mai, 55e jour. — Depuis le 12 mai, la quantité de bœuf bouilli que l'animal perd a augmenté de jour en jour ; et aujourd'hui, sur 250 grammes, il n'en mange environ que 60.

La maigreur est extrême, l'animal boit beaucoup, et la langueur commence à se manifester.

Il est évident que l'expérience touche à son terme, et que, sous cette forme, la fibrine, bien que plus nourrissante que la fibrine du sang unie au bouillon gras, ne convient pas encore pour une alimentation suffisante.

Il s'agit de savoir maintenant si de nouveaux faits viendront confirmer celui-ci : cela paraît très probable.

Toutefois ce n'est pas dans ce sens que nous interprétâmes d'abord nos résultats sur la fibrine. Nous supposâmes que son défaut de qualité alimentaire tenait à ce qu'elle avait été employée seule. Nous composâmes alors des régimes où se trouvèrent réunis les élémens que nous avions expérimentés isolément.

EXPÉRIENCES SUR L'ALIMENTATION PAR DES MÉLANGES DE GÉLATINE ET DE FIBRINE, DE GÉLATINE ET D'ALBUMINE, DE FIBRINE ET D'ALBUMINE, ET DE FIBRINE, DE GÉLATINE ET D'ALBUMINE.

Nous mîmes des animaux à l'usage, ceux-ci d'un mélange de gélatine et de fibrine; ceux-là de gélatine et d'albumine; d'autres eurent pour nourriture le mélange, en diverses proportions, de ces trois substances, et nous nous engageâmes ainsi dans une nouvelle série d'expériences qui furent et qui devaient être très nombreuses et très longues, et dont les résultats seraient, sans doute, d'un grand intérêt.

Ces résultats, nous allons vous les faire connaître :

Disons d'abord qu'ils ne furent pas entièrement en désaccord avec nos prévisions, c'est-à-dire que le mélange d'albumine et de fibrine, dans diverses proportions, ne fut point l'objet d'une répugnance aussi marquée que l'aurait été chacune des substances prises isolément. En général, on peut en continuer l'usage plus long-temps; mais dans tous les cas, après un laps de temps plus ou moins considérable, les animaux sont tombés dans le marasme et sont morts d'inanition en mangeant une quantité assez considérable de substances alimentaires.

Les divers mélanges employés dans ces expériences ont offert des effets différens : celui de gélatine et d'albumine a été le moins favorable; celui de fibrine et d'albumine a soutenu le plus long-temps la vie, et l'a prolongée jusqu'au 126e jour; avec la gélatine en petite quantité, l'albumine et la fibrine, dont la dose a été portée jusqu'à un kilogramme par jour, la vie s'est soutenue 121 jours. Mais, à ce moment, les alimens ne furent plus digérés, et les animaux moururent avec tous les signes du défaut d'alimentation, bien que leur estomac fût rempli et fortement distendu par une masse considérable d'alimens non chymifiés.

Mais ce qui ressort surtout de ces expériences, c'est que nos mélanges artificiels de fibrine, d'albumine et de gélatine, bien que nous eussions pris tous les soins nécessaires pour les rendre aussi appétissans que possible, ne donnaient, dans aucun cas

un bon aliment, et que, sous ce point capital, ils ne différaient pas, étant réunis, de ce qu'ils étaient isolés.

Cependant la viande crue où ces mêmes élémens se trouvent associés, mais selon les lois de la nature organique, est de toute notoriété un excellent aliment.

Bien qu'un tel fait ne pût être révoqué un instant en doute, nous voulûmes en avoir des preuves directes et expérimentales, ne fût-ce que pour ne point laisser une telle lacune dans notre travail.

Nous mîmes donc plusieurs chiens à l'usage d'une dose fixe de viande crue extraite de têtes de mouton; et, bien que la quantité consommée chaque jour n'eût jamais dépassé 300 grammes et ait été souvent moindre, la santé, le poids de ces animaux se sont maintenus intacts pendant 120 jours, époque à laquelle nous avons cessé l'épreuve, la regardant comme suffisante et terminée. N'est-il pas digne de remarque que 150 à 300 grammes de viande crue de qualité des plus médiocres ait une plus grande valeur nutritive que 1000 grammes de fibrine renforcée de plusieurs centaines de grammes de gélatine et d'albumine?

Les physiologistes seront sans doute frappés de ces résultats; ils se recommandent vivement à l'attention des chimistes.

Quel est donc ce principe particulier qui rend la viande un aliment si parfait? Est-ce la matière odorante et sapide qui joue ce rôle, comme cela semble probable? Les sels et la trace de fer qui s'y trouvent, les matières grasses et l'acide lactique qui en font partie, sont-ils, malgré leur faible proportion, pour quelque chose dans le résultat? Voilà de belles et importantes questions à résoudre, que nous résumerons en deux mots : *séparer de la viande un principe qui, réuni à l'albumine, à la gélatine ou à la fibrine, les convertisse en alimens suffisans pour les animaux carnivores.*

Tant que cette question ne sera pas résolue, il demeure bien évident qu'en fournissant à l'estomac ces matières seules ou mêlées d'une quantité trop faible des principes actifs de la viande, on n'obtiendra qu'une nutrition imparfaite.

EXPÉRIENCES SUR LES PROPRIÉTÉS NUTRITIVES DES SUBSTANCES GRASSES.

Après avoir examiné les propriétés nutritives des principaux élémens azotés, il importait d'étudier sous le même point de vue des substances non azotées, mais fort employées dans l'alimentation de l'homme et des animaux qui s'en rapprochent par la nature de leur régime : je veux parler de la graisse, du beurre, etc.

Quinze animaux adultes furent successivement mis à un régime exclusivement composé de corps gras (beurre frais, axonge, enfin, graisse de cœur de bœuf, c'est-à-dire de graisse encore contenue dans ses cellules organiques). Ces expériences se sont prolongées près d'une année (de 1837 à 1838). On va voir, dans le récit que nous allons faire, les raisons de cette longue durée.

Quatre expériences, qui furent faites d'abord avec le beurre frais, à la dose de 300 grammes par jour, ne nous donnèrent point de résultats, si ce n'est que les chiens, après avoir mangé le beurre avec avidité les deux premiers jours, refusèrent ensuite formellement d'y toucher, et seraient morts à côté, si l'on n'eût persisté à ne pas leur donner d'autre nourriture.

Nous fûmes plus heureux avec un cinquième animal, qui consentit à manger du beurre frais d'une manière irrégulière pendant 68 jours, et qui mourut ensuite d'inanition, quoique dans un état d'embonpoint remarquable. Pendant toute la durée de l'expérience, ce chien exhalait une forte odeur d'acide butyrique, son poil était gras au toucher, sa peau était onctueuse et couverte d'une couche graisseuse.

A l'autopsie nous trouvâmes tous les tissus, tous les organes infiltrés de graisse; le foie était, comme on dit en anatomie pathologique, *gras*. En le soumettant à l'analyse, on y a trouvé une très grande quantité de stéarine et peu ou point d'oléine. Il s'était fait dans cet organe une sorte de filtration du beurre.

L'alimentation avec l'axonge pure eut des résultats semblables : plusieurs animaux refusèrent d'en manger après l'avoir

acceptée les premiers jours avec plaisir. Un autre mourut le 18e jour, en prenant 250 grammes certains jours, et refusant le le plus souvent d'y toucher. Un autre enfin vécut jusqu'au 56e jour, en consommant habituellement 120 grammes d'axonge par 24 heures; encore se passa-t-il plus d'une journée où l'animal préféra l'abstinence à l'axonge qui lui était offerte.

Son autopsie nous montra, comme pour l'animal mort en mangeant du beurre, une atrophie générale des organes, mais une grande abondance de graisse, particulièrement sous la peau, où elle formait une couche de plus de 1 centimètre d'épaisseur.

Nous essayâmes si en mêlant une certaine proportion de pain à l'axonge on améliorerait ses effets; nous fîmes une pâtée composée de

Axonge.	120 grammes.
Pain blanc.	250 *idem*.

Mais l'animal qui fut soumis à cette nourriture ne s'en accommoda que quelques jours et la refusa ensuite.

Nous eûmes encore des résultats fort analogues en expérimentant avec la graisse qui environne le cœur du bœuf. Cette graisse est encore enveloppée dans son tissu cellulaire, et des parcelles de fibre musculaire y sont attachées çà et là.

Quatre chiens furent soumis à l'usage de cette substance. Ils la mangèrent d'abord avec avidité; mais tous quatre, au bout de 7 jours, la refusèrent. Ils en disséquaient, pour ainsi dire, minutieusement les morceaux, s'emparant des moindres parcelles de fibre musculaire et des lames qu'ils parvenaient à détacher du tissu cellulaire. Tous succombèrent : le 1er au 19e jour, le 2e le 24e jour, le 3e le 28e jour, le 4e le 35e jour. Des ulcérations s'étaient montrées sur la cornée transparente.

A l'autopsie, tous les organes étaient à-la-fois atrophiés, mais infiltrés de graisse; le foie était *gras*.

A l'opposé des animaux dont nous venons de rapporter l'histoire, un petit chien adulte vécut en parfaite santé pendant un an, en mangeant tous les jours 125 grammes de graisse de cœur de bœuf.

Un autre chien, qui avait pour tout aliment, chaque jour, 190 grammes de graisse de cœur de bœuf, vécut pendant six mois en santé parfaite; seulement il exhalait une odeur insupportable de graisse. Il aurait sans doute vécu plus long-temps, si l'on eût continué l'expérience.

Malgré cette diversité de résultats dans les six expériences sur la graisse de bœuf, puisque deux animaux en ont été nourris complètement pendant un laps de temps considérable, et que quatre sont morts en la mangeant, il est évident que, sous cette forme, la graisse a un avantage marqué non-seulement sur les autres principes immédiats azotés, précédemment examinés, mais aussi sur la graisse pure ou isolée.

EXPÉRIENCES SUR LES QUALITÉS NUTRITIVES DU GLUTEN ET DE LA FÉCULE.

Après ces essais fort incomplets sur les qualités nutritives des principes immédiats tirés des animaux, nous voulûmes faire quelques études sur les mêmes principes, mais tirés des végétaux, et examiner particulièrement les propriétés alimentaires du gluten et de la fécule.

Le gluten séparé, soit de la farine de froment, soit de la farine de maïs, nous offrit un phénomène que nous n'avions pas observé en expérimentant avec des principes immédiats organiques, qui, tous, excitent plus ou moins de répugnance chez les animaux obligés de s'en nourrir ou tout au moins d'en manger.

Le gluten, bien que son odeur soit fade et quelque peu nauséabonde, bien que sa saveur n'eût rien d'agréable, fut pris sans difficulté dès le premier jour, et les animaux ont continué d'en faire usage sans aucun dégoût pendant trois mois, sans aucune interruption. La dose était de 120 à 150 grammes par jour, et les animaux conservaient tous les caractères d'une excellente santé. Ce fait nous a d'autant plus frappés, qu'il est en opposition avec la règle qui semble résulter de faits très nombreux, précédemment exposés, savoir, qu'une substance alimentaire, surtout si c'est un principe immédiat isolé, n'est point apte à entretenir la vie au-delà d'un temps qui n'est jamais très long.

Voilà au contraire, une matière considérée autrefois comme un principe immédiat azoté qui sans aucune préparation ni assaisonnement, n'excite ni répugnance, ni dégoût, et qui seule nourrit parfaitement et pendant long-temps.

Un célèbre chimiste anglais, le docteur Proust, s'appuyant sur ce fait bien constant que le lait suffit, à lui seul, pour constituer un excellent aliment, a pris sa composition pour type, et ramené la composition générale de la nourriture des animaux à la forme suivante :

1° Une matière azotée	caséum ;
2° Une matière grasse	beurre ;
3° Une matière non azotée neutre	sucre de lait ;
4° Divers sels alcalins ou terreux.	

Cependant le gluten nourrit à lui seul, quoique plus simple dans sa constitution que le lait ou les alimens qu'on calculerait d'après la composition de celui-ci.

Il ne faudrait pourtant pas regarder le gluten comme un principe immédiat. Tel que nous l'avons employé, il retenait sans doute quelque trace de fécule. Par lui-même on sait d'ailleurs qu'il peut se résoudre en deux corps distincts, une substance albumineuse et le produit qu'on a appelé glaïadine. Cette dernière, à son tour, se partage en gluten proprement dit, en gomme et en mucilage.

Nos chiens mangeaient donc beaucoup de gluten uni à quelque peu d'albumine, de gomme, de mucilage, de fécule et même de sucre provenant de cette fécule. Cet aliment, simple en apparence, était donc assez composé en réalité. Mais ce n'est pas ce qu'on sait de sa composition chimique qui aurait suffi pour nous faire prédire son pouvoir nutritif.

EXPÉRIENCES SUR LES PROPRIÉTÉS NUTRITIVES DE LA FÉCULE.

La fécule, qui entre pour une part si notable dans le régime de l'homme et dans l'alimentation des animaux domestiques ; la fécule, qui existe en si grande proportion dans les farines des céréales et des légumineuses, ne nous a donné, dans nos expériences sur les chiens, presque aucun indice de propriétés

nutritives. Est-ce parce qu'elle avait été isolée des autres élémens avec lesquels elle est unie dans les végétaux, graines ou farines où elle se trouve? Cela n'est pas improbable; car c'est là un des résultats que nous avions généralement obtenus dans la longue suite de nos expériences.

D'abord sous la forme pulvéruleuse, humide ou sèche, les chiens auxquels on la présente, non-seulement ne cherchent point à s'en nourrir, mais ne la regardent point. Mêlée à l'eau bouillante et devenue empois, les animaux n'y touchent point davantage. Ils mourraient d'inanition à côté, sans essayer d'échapper à la mort en en mangeant, ne fût-ce que pour l'eau qui s'y trouve.

Pour arriver à en faire une sorte d'aliment moins dédaigné, nous fûmes obligés de composer des bouillies où nous ajoutions tantôt du beurre, tantôt de l'axonge, d'autres fois du sucre ou du sel, et quelquefois du pain, le tout en proportion assez considérable; et, cependant, malgré tous ces soins, toutes ces combinaisons qui donnaient à ces mélanges une odeur et une saveur agréables, nos chiens ont refusé généralement d'en faire usage, et si quelques-uns en ont pris pendant un certain temps, ils n'ont pas tardé à périr avec tous les symptômes de l'inanition, si souvent l'issue de nos tentatives.

Les substances qui nous ont servi dans nos expériences sont l'amidon, ou la fécule de froment, et la fécule de pomme-de-terre. Nous n'avons pas remarqué de différence notable entre ces deux fécules; si, toutefois, il y en avait une très légère, elle serait en faveur de la fécule de pomme-de-terre, que les animaux ont semblé prendre avec un peu moins de répugnance que l'amidon.

Il eût été, sans doute, curieux d'étudier et de comparer à la fécule les diverses espèces de farine, soit des céréales, soit des légumineuses, mais notre travail durait déjà depuis si longtemps, que nous avons craint de le prolonger davantage sans faire connaître à l'Académie les premiers résultats de nos recherches.

Voilà, messieurs, bien des faits intéressans, voilà bien des

expériences, voilà bien des résultats. L'Académie comprend maintenant, nous osons l'espérer, comment nous avons si souvent reculé à faire un rapport, et comment nous avons si souvent répondu que nous n'étions pas prêts. Cependant les questions dont nous avons entretenu l'Académie ne sont pas les seules que nous ayons examinées. Beaucoup d'autres, non moins importantes, ont été l'objet de nos investigations expérimentales, et les faits que nous avons constatés jusqu'ici ne le cèdent en rien, pour l'intérêt, à ceux que nous venons d'avoir l'honneur de présenter à l'Académie.

Dès que ce nouveau travail sera terminé, nous nous empresserons d'en faire l'objet d'un rapport spécial.

Nous compléterons ainsi la longue série de nos études sur l'alimentation, autant qu'un pareil sujet peut être épuisé.

CONCLUSIONS.

Nous serons très réservés dans les conclusions de cette première partie de notre travail, car n'avons-nous pas rendu évident, avant tout, que la science en est encore à ses premiers pas en tout ce qui regarde la théorie de la nutrition? Cependant nous croyons que les faits suivans sont établis par nos expériences, et hors de contestation :

1° On ne peut, par aucun procédé connu, extraire des os un aliment qui, seul ou mêlé à d'autres substances, puisse tenir lieu de la viande elle-même ;

2° La gélatine, l'albumine, la fibrine, prises isolément, n'alimentent les animaux que pour un temps très limité et d'une manière fort incomplète. En général, ces substances excitent bientôt un dégoût insurmontable, au point que les animaux préfèrent se laisser mourir plutôt que d'y toucher;

3° Ces mêmes principes immédiats, artificiellement réunis, et rendus d'une agréable sapidité par l'assaisonnement, sont acceptés avec plus de résignation et plus long-temps que s'ils étaient isolés; mais en définitive, ils n'ont pas une meilleure influence sur la nutrition, car les animaux qui en mangent,

même à des doses considérables, finissent par mourir avec tous les signes d'une inanition complète;

4° La chair musculaire, dans laquelle la gélatine, l'albumine et la fibrine sont réunies selon les lois de la nature organique, et où elles sont associées à d'autres matières, comme la graisse, les sels, etc., suffit, même en très petite quantité, à une nutrition complète et prolongée;

5° Les os crus ont le même avantage, mais la dose consommée en vingt-quatre heures doit être beaucoup plus forte que s'il s'agissait de la viande;

6° Toute espèce de préparation, telles que la décoction dans l'eau, l'action de l'acide chlorhydrique, et surtout la transformation en gélatine, diminue les qualités nutritives des os, et semble même, dans certains cas, les faire presque entièrement disparaître;

7° Cependant la commission n'a pas voulu se prononcer pour le moment sur l'emploi de la gélatine associée aux autres alimens dans la nourriture de l'homme. Elle a compris que les expériences directes pouvaient seules l'éclairer, à ce sujet, d'une manière définitive. Elle s'en occupe activement, et les résultats en seront exposés dans la seconde et dernière partie de ce rapport;

8° Le gluten, tel qu'on l'extrait de la farine de froment ou de maïs, satisfait à lui seul à une nutrition complète et prolongée;

9° Les corps gras, pris pour unique aliment, soutiennent la vie pendant quelque temps, mais ils donnent lieu à une nutrition imparfaite et désordonnée où la graisse s'accumule dans tous les tissus, tantôt à l'état d'oléine et de stéarine, tantôt à l'état de stéarine presque pure.

NOTE *sur certains genres de poissons et de reptiles qu'on ne peut classer d'une manière absolue, comme* marins *ou* d'eau douce.

Extrait d'une lettre adressée à M. ÉLIE DE BEAUMONT

Par M. VALENCIENNES. (1)

..... Il est très vrai que la forme de la Caudale et la nature des écailles qui recouvrent la base de cette nageoire établissent des rapports entre les Palœniscus et les Esturgeons, mais ils en établissent d'aussi frappans et de plus intimes avec d'autres poissons de familles différentes des Esturgeons et intermédiaires entre les Brochets et les Harengs; ou, pour parler notre langue ichthyologique, entre les *Lucioïdes* et les *Clupcoïdes;* et ceux-ci sont, comme les Esturgeons, des poissons qui séjournent dans nos eaux douces (les *Lucioïdes*), ou qui passent de l'eau douce dans l'eau salée, et *vice versa* (les *Clupcoïdes*).

Vous voilà donc rassuré sur le séjour des Palœoniscus.

Il faut d'ailleurs envisager la question du séjour des animaux d'une manière plus large, en ne distinguant pas des animaux marins et des animaux d'eau douce, soit que les animaux habitent les eaux douces ou marines sans respirer par l'intermédiaire de l'eau, soit, ce qui est physiologiquement plus singulier, que leur organe respiratoire étant branchial, ils ne puissent respirer que par l'intermédiaire de l'eau.

(1) Ayant eu à m'occuper de la question de savoir si certains bassins houillers considérés habituellement comme des bassins d'eau douce, pouvaient être considérés rigoureusement comme tels, j'avais cru trouver une difficulté dans la présence de poissons du genre *Palœoniscus*, attendu que des poissons de ce même genre existent en grand nombre dans le *Zechstein*, qui est une formation marine. Ayant consulté sur ce point M. Valenciennes, j'en ai reçu la réponse suivante, qui m'a paru de nature à intéresser toutes les personnes qui s'occupent de palœontologie. L. E. D. B.

Dans le premier cas, rien ne paraît d'une forme plus marine que les Cétacés; les Baleines, les Dauphins, les Marsouins sont généralement de la mer; mais nous avons le *Platanista* de Pline qui vit dans les eaux du Gange au-dessus de Bénarès, où l'eau de mer ne remonte plus. L'Orénoque nourrit, au-dessus des cataractes d'Aturès et de Maypurès, des Marsouins (*Toninas*), et le Beluga de Steller se tient dans les lacs et là où l'eau est douce Voilà donc pour les Cétacés.

Parmi les Mammifères, les Phoques nous donnent aussi un autre exemple d'animaux généralement marins qui se trouvent dans les eaux douces : ainsi, il s'en trouve dans le lac Baïkal, dans le petit lac Aral et dans la mer Caspienne, qui, moins salée que la mer, peut tout aussi bien être une eau douce qu'une mer, ou du moins c'est un passage, une liaison entre les deux.

Je n'ai pas à vous parler des oiseaux aquatiques; mais parmi les reptiles, rien ne semble plus une forme propre aux eaux douces que le Crocodile; c'est en effet dans tous les grands fleuves d'Afrique, d'Asie, d'Amérique qu'ils habitent. Mais le *Crocodile biporcatus* qui habite les Séchelles et autres toutes petites îles des Amirantes, comme les autres îles de la Polynésie, *Timor, Céram*, etc.,... nage dans la mer, s'y nourrit. Il ne faut pas argumenter, dans cette discussion, de la différence d'espèce, car ces légères nuances de forme que nous saisissons et auxquelles nous donnons l'importance qu'elles doivent avoir pour établir des espèces ne touchent en rien au fond de l'organisation; qu'il y ait deux petites arêtes sur le museau de ce Crocodile biporcatus, ou que le museau soit lisse comme celui du Crocodile du Nil, ils n'en sont pas moins tous deux crocodiles, faits sur un même type d'organisation, pour respirer, pour diriger, pour les sensations du système nerveux; et aussi lorsque nous retrouvons ce Crocodile biporcatus sur la côte de Coromandel, où il se trouve de grands affluens d'eau douce, l'animal vit alors dans les fleuves.

Je ne connais pas un genre de poissons que l'on puisse donner comme une forme marine. Ainsi les Raies, cette grande famille de mer, habitent les eaux douces d'Amérique; une Pastenague habite le Rio-del-Magdalena, à une hauteur où l'eau

de mer n'atteint jamais; elle se pêche dans les étangs voisins (*M. Roulin la possède ici à Paris*).

Les *Pleuronectes* (Limandes, Soles) remontent les rivières, la Loire jusque dans ses affluens, pour se faire frire à Roanne : ainsi vous voyez que ces *Pleuronectes flexus* auraient plus court, pour retourner à la mer, de s'embarquer sur le Rhône pour aller jouir de la Méditerranée. J'ai pêché des Limandes dans la Seine, à l'île Saint-Denis près Paris; la Sole remonte le Rhin jusqu'à Neuwied et Coblentz, et on les y mange comme dans un port de mer.

Les Aloses remontent périodiquement de la mer dans l'eau douce, et dans la Seine elles vont jusqu'à Provins; il y en a qui se fixent dans le lac de Garda, elles ne sortent jamais de ces eaux douces, c'est l'Agone des Italiens, qui vit aussi dans la Méditerranée. Les Anguilles passent, adultes, de l'eau douce dans la mer, et remontent quand elles viennent de naître; c'est le contraire des Aloses et des Saumons. Les lacs Biserte et autres, qui longuent la côte d'Afrique jusqu'à Tunis, sont pleins de Spares, de Sciènes, etc., poissons marins, et dont les mêmes espèces vivent en grandes troupes dans les deux natures d'eau. Les Muges font la même chose dans nos bassins d'Arcachon : il me semble que voilà beaucoup trop d'exemples. Les Mollusques vous sont, sous ce rapport, connus tout aussi bien qu'à moi. Nilson a trouvé, en Suède et en Norwège, nos Anodontes sur les côtes de la mer, là où il n'y a aucun affluent d'eau douce; et les curieuses expériences de M. Macculoch, que je répéterai d'une autre manière si jamais je suis en mesure de le faire, ont été faites aussi sur les Mollusques. Tous les animaux à respiration branchiale trouvent toujours assez d'oxigène dissous dans l'eau pour respirer, quoique les deux eaux ne se chargent pas d'une même quantité d'air.

CONSIDÉRATIONS *zoologiques, géologiques et géologico-géographiques sur les* AMMONITES *du terrain crétacé,*

Par M. ALCIDE D'ORBIGNY.

(Mémoire présenté à l'Académie des Sciences, le 23 août 1841.)

L'étude des corps organisés fossiles s'est le plus souvent bornée à des descriptions plus ou moins imparfaites d'espèces, sans qu'on y rattachât des vues générales, soit zoologiques, soit géologiques; et ces descriptions, souvent fautives, servirent pourtant de base à des applications géologiques qui, dès-lors, non-seulement pouvaient perpétuer des erreurs, mais encore étaient bien faites pour éloigner les géologues d'y attacher toute l'importance qu'elles méritent. Les Ammonites furent surtout dans ce cas; et un chaos inextricable régnait dans ce genre, malgré les figures données par Sowerby (1) et la monographie de M. de Haan (2), lorsque M. Léopold de Buch reconnut, à ces restes organisés, d'importans caractères intérieurs, jusqu'à lui toujours négligés, et dont il sentit l'utile application à la détermination des espèces. Dans trois mémoires (3) successifs, ce savant illustre s'occupa de décrire les lobes et les selles des cloisons d'Ammonites, et les appliqua à la formation de groupes, divisés d'après ces caractères. Néanmoins, la nature peu saisissable de ces corps fossiles, la difficulté de les étudier dans leur ensemble et avec des vues générales, ont, jusqu'à présent, empêché les naturalistes de s'en occuper utilement. La publication de ma paléontologie française ayant mis à ma disposition des matériaux

(1) *Mineral conchology of Great Britain.*

(2) *Monographiæ Ammoniteorum et Goniatiteorum.* 1825.

(3) Annales des Sciences naturelles, 1829, tome XVII, page 267. Loc. cit., tome XVIII, page 417, et tome XXIX, page 5.

immenses, je me suis livré, depuis un an, à l'examen minutieux des Ammonites, considérées sous le point de vue zoologique et géologique. Bientôt l'étude comparative de *cent quarante-quatre* espèces d'Ammonites du terrain crétacé, d'un nombre au moins égal d'espèces du terrain jurassique, et de milliers d'individus de tous les âges, m'ont mis à portée de découvrir beaucoup de faits qui me parurent intéressans par leur application à la géologie et par les caractères zoologiques des espèces, envisagées sous le rapport des modifications extérieures et intérieures qu'y apportent l'âge, le sexe ou l'altération des individus. J'ai cru devoir faire connaître ici ce travail étendu, dans l'espoir d'éclairer la science relativement à des êtres entièrement perdus et qui ne se trouvent plus que renfermés dans les couches de l'écorce terrestre.

Je diviserai ce Mémoire en trois chapitres, destinés à envisager la question sous le point de vue zoologique, géologique et géologico-géographiques.

CHAPITRE PREMIER.

CONSIDÉRATIONS ZOOLOGIQUES.

§ Ier. *Caractères extérieurs des Ammonites.*

Composition du test. — Le test, chez les Ammonites, et je dirai même chez tous les genres de la famille des *Ammonidæ*, est loin d'avoir la même contexture que chez les *Nautilus* et les *Spirula*, par exemple. Dans ces genres, il se compose de deux couches bien distinctes, l'une interne, toujours nacrée, brillante, dont les cloisons sont invariablement formées; l'autre externe, mince, opaque, revêtue, chez les Nautiles, de zones colorées. En étudiant sur les lieux et en recueillant un grand nombre de morceaux de Nautiles, d'Ammonites et d'Hamites, dans les couches d'argile du gault, du Boulonnais, où ces fossiles sont admirablement bien conservés, j'ai reconnu que la fossilisation ne change en rien la nature des deux couches dis-

tinctes de test des Nautiles, tandis que les Ammonites m'ont toujours montré la nacre à découvert, sans aucune pellicule opaque externe. Comme j'ai pu le voir sur les *A. Denarius*, *Lautus*, *Auritus*, *Splendens*, *Cristatus*, *Bouchardianus*, *Tuberculatus*, etc., et sur l'*Hamites attenuatus*, la nacre est toujours nue, et montre extérieurement les lignes d'accroissement; ainsi, outre les caractères différentiels déjà décrits, les Ammonites auraient une contexture de test bien distincte, et cette contexture serait propre à tous les genres à siphon dorsal et à cloisons découpées, composant la famille des Ammonidées.

Épaisseur du test. — En général, le test des Ammonites est mince; mais il offre beaucoup d'exceptions à cette règle, et j'en possède dont l'épaisseur, surtout sur les côtés, n'est pas moindre de cinq millimètres. Son épaisseur est très variable, suivant les espèces et suivant les diverses régions de ces espèces. S'il y a des côtes, des points d'arrêt transverses, des tubercules, des pointes, ou n'importe quelle aspérité ou saillie, c'est toujours là que le test est plus épais, et souvent le double du reste. Je crois pouvoir expliquer ce fait par le besoin qu'éprouve l'animal de niveler par un encroûtement interne la surface intérieure de sa coquille, afin d'y être plus commodément, comme on le voit chez les Mollusques Gastéropodes et Acéphales.

Différences entre le moule interne et les accidens extérieurs la coquille, déterminées par l'irrégularité de l'épaisseur du t
— Ce que je viens de dire de l'inégalité d'épaisseur du [illegible] suivant les parties, chez les Ammonites, n'a pas seulement un intérêt restreint, mais s'applique à des considérations très importantes sur les différences énormes qu'on remarque entre le moule intérieur de leur coquille et les accidens variés qui recouvrent leur test. Si le dépôt interne des matières calcaires, qui épaississent la coquille en dedans, se faisait également partout, il s'ensuivrait que les matières étrangères qui s'y sont déposées après la mort de l'animal, donneraient sur le moule la représentation exacte des accidens extérieurs de la coquille : les côtes y seraient aussi aiguës, les pointes aussi saillantes; mais la meilleure preuve que je puisse donner de l'inégalité de cet épaississement interne par l'animal, c'est que souvent telles espèces, dont le test

extérieur est fortement strié, sont entièrement lisses à l'état de moule, comme on le voit chez les *A. Velledæ*, *Latidorsatus*, *Mayorianus*, *Duvalianus*, *Juilleti*, *Calypso*, *Guettardi*, etc., ou bien les pointes aiguës qui ornent la coquille de quelques autres disparaissent entièrement dans le moule, ou sont remplacées par un faible tubercule, qu'on reconnaît chez les *A. Clementinus*, *Cryptoceras*, *Mammillaris* et *Lallierianus*. Il résulte de cette différence entre le moule et la coquille, que le plus ou moins de saillie des côtes et des pointes, la présence ou l'absence de celles-ci, ne doivent autoriser la création d'une espèce, qu'autant qu'on a pu l'étudier sur un grand nombre d'individus en divers états, ou lorsqu'il s'y joint des caractères de lobes ou d'enroulement spiral très tranchés.

Modifications des caractères extérieurs des Ammonites. — Ces modifications tiennent à plusieurs causes : aux limites naturelles variables de l'espèce ou variétés, aux suites d'accidens, aux sexes et à l'âge. Je traiterai séparément ces diverses questions.

Variétés naturelles. — Les limites des véritables variétés, chez les Ammonites, sont plus ou moins larges, suivant les espèces. Il en est dont tous les individus présentent identiquement les mêmes accidens extérieurs, au même diamètre, et c'est le plus ordinaire; tandis que d'autres offrent des différences très notables, tout en ayant les mêmes caractères de lobes et d'enroulement spiral. Dans la première série, je nommerai les *A. Beudanti*, *Grasianus*, *Quadrisulcatus*, *Semi-sulcatus*, *Mayorianus*, etc., où des centaines d'échantillons ne m'ont pas montré la moindre différence; mais je ne pourrais en citer que très peu parmi les espèces qui varient le plus, suivant l'âge et le sexe. Si, au même diamètre, le nombre des côtes ou des tubercules est, le plus souvent, le même, comme chez les *A. Fleuriausianus*, *Denarius*, etc., il y a au moins une différence notable dans le plus ou moins de compression de la coquille. Dans la seconde série, il est beaucoup d'Ammonites qui, au même diamètre, offrent des côtes plus ou moins saillantes, plus ou moins atténuées, comme chez les *A. Lautus*, *Rhotomagensis*, *Varians*, *Mantellii*, *Cristatus*, *Verrucosus*, etc., ou bien un plus grand nombre de côtes par tours, ainsi qu'on le trouve chez les *A. Mantellii*, *Rhotomagensis*, *Varians*, *As-*

tierianus, Inflatus, Interruptus, Martinianus, Mammillaris, etc. D'autres modifications plus rares et tout-à-fait exceptionnelles sont celles qu'on retrouve principalement chez l'*A. latidorsatus*, dont certains individus, pris au même diamètre, sont tantôt lisses, tantôt pourvus de côtes espacées transverses. Cette Ammonite est aussi l'une des espèces, peu nombreuses, qui m'ont présenté des différences notables dans l'enroulement spiral, sur des individus de même âge et de même diamètre. Il n'y a donc point de règles fixes sur les limites des variétés, celles-ci étant plus ou moins larges, suivant les espèces. C'est à l'observateur à chercher, dans les caractères intérieurs, les véritables limites de ces variétés ou de ces espèces.

Variétés accidentelles. — Cette série de modifications, assez communes parmi les Ammonites, amène les changemens les plus bizarres. Il paraît qu'elle est due aux lésions ou aux blessures de l'animal, dans le cours de son existence; blessures et lésions qui, l'empêchant de poursuivre la construction si régulière de sa coquille, font disparaître quelques accidens extérieurs, en font naître de nouveaux ou rendent très inégaux les deux côtés de la coquille. Quand ces modifications déforment la coquille et lui ôtent sa symétrie, il est facile de reconnaître qu'elles proviennent d'une lésion de l'animal, comme on l'a dit pour l'*A. Paradoxus* de Stahl, Zieten, difformité de l'*A. Amaltheus*. L'*A. Serpentinus*, *Brongniartii*, *Radiatus* et *Humphreisianus*, etc., que je possède, en fournissent également la preuve; mais lorsque ces accidens ont lieu sur la ligne médiane du dos, qu'ils viennent changer tout-à-fait la forme de cette partie, la coquille étant toujours régulière, on n'a, pour ainsi dire, aucun moyen de reconnaître s'il y a eu déformation, et l'on court risque alors de multiplier inutilement les espèces, quand on n'a pas le courage de briser les échantillons pour s'assurer si les tours intérieurs sont les mêmes. L'exemple le plus extraordinaire que je puisse citer de ce dernier mode d'accident, est celui de l'*A. interruptus*, figuré dans ma planche 32, fig. 8 (1), où une espèce à sillon dorsal, à côtes interrompues au milieu du dos et alternes de chaque côté de la

(1) Voyez page 115 de ma Paléontologie française.

ligne médiane, est devenue une Ammonite à dos rond, dont les côtes passent par dessus d'un côté à l'autre. Quelques personnes m'ayant manifesté des doutes sur cette anomalie si extraordinaire, j'ai cassé l'échantillon, et j'ai trouvé que le tour interne, au lieu d'avoir les côtes passant sur le dos, comme on le remarque dans le dernier tour, est sur l'avant-dernier, pourvu du sillon dorsal et des côtes alternes ordinaires à l'*A. interruptus*. Dès-lors, plus d'incertitude possible. Il devient donc indispensable, lorsqu'on trouve, dans un terrain quelconque, une Ammonite de forme anomale, de bien s'assurer si tous les tours ont les caractères propres à chaque âge, et si cette Ammonite ne résulte pas d'une déformation accidentelle.

Variétés de sexes. — Tous ceux qui ont étudié avec soin les *Ammonites* ont pu remarquer que des individus chargés extérieurement des mêmes côtes, des mêmes pointes, de la même distribution d'ornemens, avaient, à des diamètres semblables, une forme très renflée ou très comprimée. Observées superficiellement, ces différences ont quelquefois motivé la création d'espèces purement nominales, ainsi qu'on en peut juger par les *A. Interruptus*, *Denarius*, *Mantellii*, *Varians*, etc. Chaque fois qu'on rencontrait des individus comprimés ou renflés, on les regardait comme espèces distinctes. Lorsque je me trouvai en présence d'un grand nombre d'échantillons de chaque espèce, la distribution des lobes me fit reconnaître que le plus ou moins de compression n'apportait aucune différence dans ce caractère important, et que ces individus, plus ou moins comprimés, devaient appartenir à la même espèce. L'idée me vint alors que, par analogie à ce qu'on observe chez les Olives et autres genres de Gastéropodes où les sexes sont séparés, ces modifications devaient dépendre de la différence des sexes des animaux qui habitaient les coquilles; que les individus les plus comprimés avaient, sans doute, appartenu aux mâles, tandis que les individus renflés devaient être la demeure des femelles. Les animaux de ce sexe étant toujours plus larges et plus courts chez les Céphalopodes acétabulifères, parce qu'ils doivent contenir les œufs, je dus croire qu'il en était de même chez les Ammonites, dont la coquille avait nécessairement suivi le volume

des sexes qui l'habitaient. Une fois convaincu de ce fait, il restait à m'assurer des autres modifications extérieures qui accompagnent ordinairement les sexes, et des limites de celles-ci. J'ai remarqué, par exemple, que les coquilles des mâles, au même diamètre, ont, presque toujours, les côtes plus nombreuses, et que les tubercules intérieurs sont bien plus rapprochés de l'ombilic; tandis que, chez les femelles, au contraire, les côtes sont plus espacées, les tubercules plus éloignés de l'ombilic et plus saillans (*A. Interruptus, Denarius, Mantellii, Varians, Rhotomagensis*). La différence des sexes amène encore des modifications dans l'enroulement spiral de quelques espèces; j'ai observé que les *A. Denarius, Interruptus, Latidorsatus*, ont, par rapport au diamètre entier, le tour externe beaucoup plus large sur les individus comprimés que sur les individus renflés, la nature ayant, sans doute, apporté ainsi une légère compensation de volume intérieur. En résumé, la différence des sexes peut comprimer plus ou moins la coquille, éloigner ou rapprocher les côtes, les tubercules, les rendre plus nombreux par tour, et changer quelquefois le rapport de la largeur du dernier tour au diamètre entier.

Variétés d'âges (1). — Les modifications apportées par l'âge, chez les Ammonites, sont si étendues, qu'elles changent complètement l'aspect des espèces. Elles ont donné lieu aux plus graves erreurs, soit dans la description des espèces, soit dans leur application positive à la géologie. On pourrait même dire que ces modifications sont de véritables métamorphoses, que doivent subir plus ou moins complètement, presque toutes les Ammonites. Convaincu, depuis long-temps, de cette vérité par beaucoup de faits, j'ai voulu la constater sur un grand nombre d'espèces différentes. Les Ammonites, passées à l'état de fer oxidé ou hydraté, m'en ont surtout donné les moyens, en en brisant la coquille et enlevant successivement les tours, les uns après les autres, jusqu'au premier âge de chaque espèce. C'est ainsi qu'après beaucoup de recherches, de comparaisons et en sacrifiant un grand nombre d'échantillons, j'ai reconnu que l'accroisse-

(1) Personne n'avait encore abordé cette question;

ment, chez les Ammonites, apportait le plus souvent, cinq modifications principales suivant l'âge, savoir :

Première modification que j'appellerai *période embryonnaire.* —En thèse générale, les Ammonites commencent, dans le très jeune âge (à quelques millimètres de diamètre), par être entièrement lisses, et par avoir le dos rond, lors même qu'elles doivent, un peu plus tard, avoir une carène ou le dos aigu, ainsi qu'on le voit chez les *A. Bifrons* (Valcotii), *Cordatus*, *Cristatus*, etc.; et alors toutes pourraient être confondues ensemble, si l'enroulement spiral ne se montrait différent dès cet état embryonnaire. On conçoit néanmoins que ce caractère, assez limité, ne s'aidant d'aucun accident extérieur, ni même de la carène, le nombre de formes distinctes de cet âge est très restreint, et que leur distinction en espèces est, pour ainsi dire, impossible. (1)

Seconde modification que je nommerai *première période d'accroissement.* — A cet état lisse du premier âge des Ammonites en succède un autre chez les espèces chargées d'ornemens extérieurs; car pour les Ammonites toujours lisses, on conçoit qu'elles doivent continuer leur accroissement uniforme. Dans cette première période d'accroissement, les accidens qu'on remarque chez les Ammonites, qui plus tard doivent être striées ou costulées, sont la présence de saillies ou de légers tubercules qui se manifestent au pourtour de l'ombilic. Ceux-ci, d'abord à peine sensibles, s'élèvent peu-à-peu et restent seuls un temps plus ou moins long, suivant les espèces : c'est ordinairement à cet âge que la carène commence à se montrer. Pour quelques Ammonites qui n'ont pas d'autres ornemens extérieurs, comme les *A. Lallierianus* (*A. Inflatus* Reineck), *A. Peramplus*, par exemple, cet état paraît être complet, mais le plus grand nombre doit encore changer de formes (*A. Interruptus, Martinii, Asperrimus, Denarius, Auritus Lewesiensis, Camatteanus, Insignis, Deshayesi*). Quelquefois, lorsqu'il n'y a pas de tubercules, ce sont les côtes ou les stries qui naissent à cette époque de l'accroissement des Ammonites.

(1) M. Milne Edwards a trouvé ce caractère singulier chez les Crustacés. Ce serait donc une loi générale en zoologie.

Troisième modification que je considère comme la *dernière période d'accroissement.* — Tandis que les tubercules, les côtes du pourtour de l'ombilic se marquent davantage et s'élèvent, on voit plus ou moins tard, suivant les espèces, naître peu-à-peu, sur le dos ou sur les côtés, les côtes simples ou interrompues, les nodosités et les tubercules que doivent recevoir les diverses modifications propres à chaque espèce. Si l'Ammonite est destinée à ne présenter qu'une seule rangée de tubercules sur le milieu ou sur les côtés du dos, elle est complète; mais si elle en comporte plusieurs, comme on le remarque chez les *A. Mammillaris* et *Lyelli*, ceux-ci se succèdent de l'extérieur à l'intérieur jusqu'au nombre fixé par la nature. Quand les Ammonites sont arrivées à joindre les ornemens du dos à ceux du pourtour de l'ombilic, tous se prononcent davantage pendant quelque temps, et alors les espèces sont couvertes de tout le luxe d'ornemens qu'elles peuvent atteindre. Cet état, le plus durable, puisqu'il occupe ordinairement les trois quarts de l'existence et de l'accroissement des Ammonites, peut être regardé comme l'état réellement *adulte*. C'est celui qu'il faut choisir pour décrire une espèce avec le maximum de ses caractères spécifiques (*A. Leopoldinus, Interruptus, Dispar, Denarius Splendens, Bicurvatus, Inflatus, Camatteanus, Verneuilianus* et un très grand nombre d'espèces des terrains jurassiques telles que les *A. Lamberti, Bancksii*, etc.) Que les Ammonites conservent ou non ces dispositions extérieures, passé un certain moment, les accidens extérieurs, tout en restant foncièrement les mêmes, commencent à s'atténuer, les saillies sont moins fortes et s'effacent peu-à-peu, l'espèce, tout en s'accroissant encore, n'est plus aussi parfaite, elle dégénère.

Quatrième modification. *Première période de dégénérescence.* — Beaucoup d'Ammonites restent, jusque dans leur plus grand accroissement, dans l'état de la troisième modification (*A. interruptus, Denarius, Astierianus, Auritus, Mammillaris*, etc., etc.) seulement les côtes s'éloignent de plus en plus, les tubercules se prononcent davantage. Il arrive aussi très souvent que, plus âgées, les côtes et les stries du dos s'effacent peu-à-peu, et finissent par disparaître entièrement, tandis que les tubercules

latéraux, où les côtes de cette partie sont plus espacés, deviennent bien plus saillans, et restent ainsi seuls, pendant une longueur d'accroissement plus ou moins limitée. Cette période, qui correspond en tout à la première période d'accroissement, puisqu'elle représente les Ammonites dans l'état où elles étaient à cet âge, peut être appelée *première période de dégénérescence*, les Ammonites perdant déjà quelques-uns de leurs caractères extérieurs. (*A. Dispar, Clementinus, Radiatus, Bicurvatus, Lewessiensis*, des terrains crétacés; et, dans les terrains jurassiques les *A. Lamberti, Mutabilis, Plicomphalus, Triplicatus, Decipiens, Murchisonæ, Banksii, Insignis.*)

Cinquième modification, que j'appellerai *dernière période de dégénérescence*. — Parmi les Ammonites que je viens de citer, il en est beaucoup qui restent toujours, à leur plus grand diamètre connu, dans l'état précédemment indiqué; mais j'ai pu en observer aussi un bon nombre, qui, après avoir conservé plus ou moins long-temps cette modification, finissent par en changer. Les côtes ou les tubercules latéraux s'éloignent de plus en plus, en s'abaissant peu-à-peu, et disparaissent enfin entièrement, laissant la coquille aussi lisse, dans son dernier tour que dans le premier, à l'état embryonnaire. Elle est dès-lors, au maximum de son accroissement, redevenue ce qu'elle était en naissant. (*A. Dispar, Clementinus, Bicurvatus, Lewessiensis, Radiatus*, dans les terrains crétacés, et les *A. Lamberti, Mutabilis, Murchisonæ, Insignis, Banksii* (1), etc., des terrains jurassiques.)

En résumé, suivant l'âge, chez les Ammonites, il y a évidemment un nombre limité de modifications d'*accroissement* et de *dégénérescence*. Ces modifications ne sont point dues au hasard, mais elles tiennent à des métamorphoses périodiques, tranchées, toujours très régulières, que subissent la plupart des Ammonites et qui s'opèrent invariablement dans un ordre de succession toujours régulier. Chacune, en effet, lisse dans le très jeune âge, se couvre plus tard, dans le cours de son accroissement, de tubercules autour de l'ombilic, puis de côtes, de stries ou de

(1) J'ai observé cette dernière espèce dans cet état, chez M. Royer à Cirey (Haute-Marne).

tubercules sur le dos. Elle est alors *adulte*. Arrivée au maximum de sa complication extérieure, tous ces ornemens commencent à s'altérer; elle dégénère. Ses stries, ses côtes dorsales disparaissent d'abord; elle perd ensuite ses côtes ou ses tubercules latéraux et devient, dans la *vieillesse*, tout aussi simple extérieurement qu'elle l'était dans l'âge *embryonnaire*.

La différence énorme du moule intérieur avec les accidens extérieurs de la coquille, les variétés naturelles, les variétés accidentelles, les variétés de sexes et surtout le grand nombre de variétés d'âges, n'étant pas suffisamment connues, on conçoit dans quel inextricable chaos se trouvait le grand genre Ammonite, chacun voulant établir des espèces sur des échantillons isolés, sans avoir préalablement étudié les limites de celles-ci dans leur ensemble, et sans savoir, dès-lors, où s'arrêter. On conçoit facilement aussi, qu'eût-on reconnu ces nombreuses causes d'erreurs, on se serait souvent trouvé très embarrassé, même en apportant à ce travail la plus scrupuleuse attention, si l'on n'avait eu à sa disposition que les caractères extérieurs. On eût vu chacun étendre ou restreindre arbitrairement les limites des espèces; et le plus beau, le plus grand, et le plus utile de tous les genres de coquilles fossiles, aurait perdu l'importance de son application à la géologie, demeurant dès-lors plutôt un objet de simple curiosité pour les collecteurs, qu'un moyen de rectification pour le paléontologiste. Heureusement, il n'en est pas ainsi. Un caractère ignoré trop long-temps, celui des ramifications des cloisons, la forme, le nombre des lobes et des selles, sont venus déterminer ces limites d'une manière irrévocable, et fixer toutes les incertitudes. On en doit la première application à M. Léopold de Buch. Ce célèbre géologue sut apprécier, dès son premier Mémoire (1), toute l'importance que devait acquérir l'application de ce caractère à la fixation des limites de l'espèce chez les Ammonites; et dans plusieurs publications postérieures (2), il y ajouta un grand nombre de faits des plus intéressans. Néanmoins, personne

(1) Annales des sciences naturelles, 1829, tome XVII, page 267.

(2) Annales des sciences naturelles, tome XVIII, page 417, tome XXIX, page 5.

depuis n'a osé aborder l'étude des lobes, des cloisons, et à peine, en dehors des précieux travaux de M. de Buch, trouve-t-on quelques Ammonites observées sous ce dernier point de vue, encore, faut-il le dire, sans beaucoup d'exactitude. Il est vrai qu'il y fallait apporter une scrupuleuse attention ; et le zoologiste qui voulait ainsi bien étudier les Ammonites, devait s'astreindre à dessiner lui-même ces caractères difficiles à saisir, à les mesurer dans leurs détails, afin de ne pas partir d'un faux principe pour rectifier des erreurs, au risque de les perpétuer indéfiniment. C'est ce que j'ai fait, et l'étude des lobes et des selles, en fixant mes idées sur les limites des variétés telles que je viens de les décrire, doit, en outre, comme on le verra plus loin, me donner un grand nombre d'observations nouvelles.

Bouche des Ammonites.

Parmi les caractères extérieurs des Ammonites, il en est un qui, tout en ayant été indiqué, laisse encore beaucoup à faire: c'est celui de la bouche. M. Defrance figura le premier quelques bouches complètes (1) et je fus assez heureux pour lui communiquer alors quelques matériaux; mais, faute de moyens d'étude, les faits isolés, recueillis dans ce premier essai, ne pouvaient se rattacher à aucune considération générale ; et ces restes étant rares dans les collections, personne, depuis, n'a repris la question. Après en avoir observé un bon nombre, je suis arrivé à des résultats que je crois intéressans sous le rapport de la forme de ces bouches avec celle de la carène dorsale, et des sections naturelles dans lesquelles les Ammonites peuvent être classées. J'ai reconnu que les modifications de la bouche sont de deux natures. Elles suivent les lignes extérieures d'accroissement et la courbure des côtes de tous les âges, et l'on peut alors les voir extérieurement sur le test; ou bien elles n'ont aucun rapport avec les lignes ordinaires d'accroissement et la courbure des côtes, constituant ainsi une partie tout-à-fait disparate avec le reste. Dans le premier cas, je les nommerai *bouches constantes;* dans le second, *bouches momentanées.*

(1) Dictionnaire des sciences naturelles.

Les *bouches constantes* peuvent être classées en trois séries :

Dans la première se trouvent les bouches pourvues d'une seule languette médiane dorsale, se prolongeant sur le dos bien au delà des dernières côtes (1) comme un long rostre. Cette disposition, que j'ai reconnue sur un bon nombre d'espèces, appartient à deux modifications tout-à-fait différentes des formes extérieures : 1° aux Ammonites ornées d'une quille carénale saillante, comme toutes les espèces du groupe des ARIETES (dans les terrains jurassiques, *A. Turneri*, *Multicostatus*, *Rotiformis*, *Bucklandi*, *Obtusus*, etc.) ; toutes celles du groupe des CRISTATI (des terrains crétacés, *A. cristatus*, *Bouchardianus*, *Roissyanus*, *Varians*) ; et quelques-unes de celles des FALCIFERI des terrains jurassiques ; 2° aux Ammonites pourvues d'un profond canal indépendant des côtes, caractérisant le groupe des TUBERCULATI (des terrains crétacés, *A. Laurus*, *Tuberculatus*). Ainsi, les Ammonites munies de quilles tranchantes ou d'un canal profond, appartiendraient à la même division de bouches et se rapprocheraient bien plus par ce caractère, qu'on ne l'aurait pensé d'après les accidens extérieurs.

Dans la deuxième série des *bouches constantes*, non-seulement la bouche forme une languette ou un rostre dorsal, correspondant à la ligne médiane du dos, à la quille ou au canal ; mais il y a, de plus, de chaque côté de la coquille, une autre languette, également saillante, correspondant aux coudes ou aux fortes inflexions qu'on remarque dans les côtes ou les stries latérales de la coquille. Cette forme de bouche se trouve dans les deux groupes que j'ai précédemment cités, chez les FALCIFERI (*A. bifrons* (*Walcotii* Sowerby), *Serpentinus*, etc.) et les TUBERCULATI (*A. falcatus*) ; elle serait donc en rapport avec le rapprochement immédiat de ces groupes.

Une troisième série des *bouches constantes*, la plus simple de toutes, est celle qui paraît exister chez un très grand nombre d'Ammonites, auxquelles, jusqu'à présent, on n'a encore reconnu d'autres bouches que celles des lignes d'accroissement plus ou moins courbes, plus ou moins droites du bord de la coquille,

(1) Voyez *Paléontologie française*, terrain crétacé (Pl. 88, fig. 1, 3, 4 ; Pl. 92, fig. 1).

comme dans le groupe des HETEROPHYLLI (des terrains crétacés *A. Heterophyllus*, *Velledæ*, *Infundibulum*, *Semistriatus*, *Alpinus*, etc.); des LIGATI (*A. Beudanti*, etc.), des CLYPEIFORMI (*A. Clypeiformis*, *Gevrilianus*, *Requienianus*, etc.), des COMPRESSI (*A. Largilliertianus*, *Vibrayeanus*, *Beaumontianus*, etc.). Cette série de bouches paraît la plus nombreuse et la moins restreinte, puisqu'elle se trouve dans un grand nombre d'espèces. Les bouches qui lui appartiennent, tout en se rapprochant de celles des Nautiles, offrirent cette différence qu'elles sont invariablement saillantes en avant, à la partie dorsale, au lieu d'être échancrées.

Je nomme *bouches momentanées* les bouches qui, au lieu de se trouver, à tous les âges, sur les lignes extérieures d'accroissement, n'apparaissent que de temps en temps, soit qu'elles laissent, de distance en distance, des traces sur la coquille, soit qu'elles n'y en laissent aucune. Lorsqu'elles laissent des traces, elles sont intermédiaires entre les *bouches constantes* et les *bouches momentanées*, et représentent alors l'analogue des varices des *Cassis*, des *Murex*, des *Ranella*, des *Tritons* parmi les Gastéropodes (1). On peut penser que ces anciennes bouches sont des points de repos dans l'accroissement, des instans où l'animal pouvait craindre d'autant moins les chocs qu'il avait, dans cet état, un bourrelet plus ou moins épais, et je croirais volontiers que ces épaississemens périodiques dans les espèces coïncidaient avec les époques de fécondation où les animaux devaient se rapprocher davantage des côtes et se trouver plus exposés à briser leur frêle coquille. Quoi qu'il en soit, je trouve ces restes évidens dans les points d'arrêt d'un grand nombre d'Ammonites appartenant à des groupes différens, mais toutes aux espèces à dos rond, et jamais à celles dont le dos est caréné, sillonné, interrompu, tuberculeux ou canaliculé, ce qui donne une valeur de plus aux diverses modifications de cette partie. On les trouve parmi les LIGATI (*A. Latidorsatus*, *Parandieri*, *Mayorianus*, *Raresulcatus*, *Subfasciculuris*, *Ligatus*, *Cassida*, *Emerici*, *Royerianus*, *Belus*); parmi les HETEROPHYLLI. (*A. Incertus*, *Tortisulcatus*, *Guettardi*, *Calypso*), et

(1) MM. de Buch et Sowerby l'avaient reconnu pour l'*A. Bakeriæ*. Voyez l'explication des trois planches d'Ammonites, par M. Leopold de Buch. Pl. 2, fig. 4.

parmi les CAPRICORNI (*A. Inæqualicostatus*, *Subfimbriatus*, *Honnoratianus*, *Lepidus*, *Matheroni*, *Quadrisulcatus*, *Striati-sulcatus*, *Duvalianus*). On les retrouve encore sur quelques Ammonites des terrains jurassiques, mais seulement chez un très petit nombre. Ces restes des anciennes traces de bouche sont infléchis en avant, forment un point saillant sur la ligne dorsale médiane, et l'examen d'un grand nombre de sujets, m'a prouvé qu'ils sont toujours accompagnés d'un bourrelet plus épais que les parties voisines du reste du test.

Les *bouches accidentelles* qui ne laissent pas de traces sont les plus extraordinaires; elles jettent dans un embarras extrême, lorsqu'il s'agit de mettre en rapport leur présence et l'accroissement régulier de la coquille. Avant d'exposer mes idées sur leur formation, je crois devoir les décrire. Elles consistent en deux séries de formes; elles représentent d'abord un très fort bourrelet épais, le plus souvent oblique aux lignes d'accroissement et aux côtes, et infléchi en avant, comme on le voit chez l'*A. Astierianus* des terrains crétacés, et sur un assez bon nombre d'Ammonites des terrains jurassiques, telles que les *A. Brongniartii*, *Gervilii*, etc., etc., toutes ayant encore le dos rond, et appartenant au groupe des CORONARI. Leur seconde modification, plus disparate encore avec l'accroissement régulier des espèces, est celle où l'on remarque, sur des espèces à côtes transverses, une forte languette de chaque côté de la bouche, comme la bouche que j'ai figurée à l'*A. Macilentus* (1) des terrains crétacés, celle de l'*A. Brackenridgii*, et celle de beaucoup d'autres que je possède, et que je décrirai dans ma faune des terrains jurassiques.

Si l'on trouvait ces bouches chez les Ammonites d'une même taille, dans chaque espèce, on pourrait croire qu'elles tiennent à l'âge adulte, et qu'elles se forment, comme celles des *Cyprea*, à l'instant où la coquille ne doit plus s'accroître; mais il n'en est pas ainsi; et plusieurs exemples m'ont prouvé que ces bouches se trouvent à tous les âges sur les individus bien entiers. Il faut donc supposer que, pour accroître de nouveau sa co-

(1) Voyez Pl. 42 de ma Paléontologie.

quille, l'animal est obligé de détruire cette première bouche, qu'il reforme plus tard, quand il en éprouve le besoin. Ceci paraîtrait d'autant plus vraisemblable, que la partie sans cloison du dernier tour ne semble que provisoirement construite, puisqu'elle se modifie dès qu'il vient s'y former des loges, comme chez beaucoup d'Ammonites. Je pourrai le démontrer par plusieurs exemples, dans les terrains jurassiques, où l'accroissement est toujours régulier dans la partie loculée ; tandis qu'il se rétrécit, les tours sont moins larges et finissent par n'avoir pas, près de la bouche, la moitié du diamètre des parties tout-à-fait terminées. J'insiste surtout sur ce caractère singulier, qui peut-être expliquera les formes si bizarres des autres genres d'Ammonidées dont je dois traiter.

On voit, en résumé, que les formes différentes des bouches d'Ammonites coïncident toujours avec celles du dos des espèces, suivant que cette partie est en quille ou en canal, qu'elle est tuberculée, lisse ou costulée. Ces diversités de formes du dos prennent donc une grande valeur pour les groupes qu'on peut créer dans le genre Ammonite, confirment beaucoup de groupes déjà formés par M. de Buch, et me serviront de base pour la création de plusieurs autres, lorsque, plus loin, j'étudierai les Ammonites sous le point de vue de leur classification.

Avant de passer aux caractères internes des Ammonites, il me reste à parler de deux choses distinctes : de leur enroulement spiral et des rapports de ses modifications avec les autres caractères ; de l'accroissement de la taille propre aux espèces.

L'*enroulement spiral* des coquilles a déjà occupé plusieurs savans, parmi lesquels je citerai MM. Moseley (de Cambridge), Naumann de Freyberg, qui ont reconnu que les coquilles enroulées le sont suivant des spirales logarithmiques. M. Elie de Beaumont (1), d'après les suggestions de M. Léopold de Buch, a successivement mesuré une Goniatite et trois Ammonites des terrains jurassiques, et il a également trouvé qu'elles étaient enroulées à-peu-près suivant des spirales de même nature. Pourtant il a remarqué que la spirale de deux de ces Ammonites

(1) Société philomatique de Paris 1841, page 45, séance du 17 avril 1841.

rentre, vers la fin de son enroulement, un peu en dedans de la spirale logarithmique. Sans avoir étudié mathématiquement l'enroulement des Ammonites, j'ai pu reconnaître que, sur un grand nombre d'espèces, l'enroulement est invariable chez les Ammonites adultes, mais qu'il varie deux fois et même souvent trois, suivant les divers âges : 1° Si l'on prend l'Ammonite à son état embryonnaire, par exemple, à l'instant où la spirale commence, on la verra d'abord croître on ne peut plus rapidement dans le premier, ou dans les premiers tours, et sortir de l'enroulement qu'elle doit avoir plus tard. 2° Après cette période ordinairement très courte, la spirale devient régulière, et se continue, le plus souvent ainsi, tout le temps de l'existence. 3° D'autres fois, comme l'a observé M. Élie de Beaumont, la spirale, au lieu de s'accroître toujours régulièrement, à la dernière période de dégénérescence, à l'instant où les Ammonites viennent à perdre leurs derniers ornemens extérieurs, rentre, le plus souvent, en dedans de l'enroulement régulier qu'elle a suivi jusqu'alors. On dirait qu'à cette époque où l'animal n'a plus la force ou la faculté de reproduire extérieurement les nombreux ornemens dont la coquille était chargée, il cesse aussi de croître régulièrement de volume, et dégénère de toutes les manières ; ainsi, d'après ce qui précède, il y aurait certainement trois époques distinctes dans l'enroulement spiral des Ammonites : l'état embryonnaire, l'état stationnaire ou adulte, et l'état de dégénérescence. On concevra facilement que c'est à l'état stationnaire seul qu'on doit mesurer une Ammonite.

Il est bien entendu que, dans ces proportions, je ne parle que de tours de spire pourvus de cloisons ; car, les deux derniers tiers de l'enroulement, toujours destinés à contenir l'animal, et dépourvus, dès-lors, de cloisons, suivent rarement l'enroulement régulier, à moins que ce ne soit dans certaines espèces spéciales. Ils sont presque toujours plus étroits que le reste (comme je l'ai dit à propos des bouches), et se rétrécissent de plus en plus, depuis la dernière cloison jusqu'à la bouche.

On a peut-être remarqué que, dans mes descriptions, je ne prends pas la largeur du dernier tour, par rapport au diamètre entier de l'espèce, sur la hauteur de la ligne médiane

de la bouche, considérée par rapport au diamètre, comme si l'Ammonite était coupée en deux, mais bien sur la partie externe du tour, pris du bord de l'ombilic, en comparant sa largeur au diamètre entier. Je trouvais deux grands inconvéniens à mesurer mathématiquement l'enroulement spiral sur la ligne médiane, ou la largeur comparative du premier et du second tour: le premier, d'être souvent obligé de rompre ou de couper l'échantillon, pour arriver à le mesurer convenablement, et je ne pouvais le faire sur des échantillons qui m'étaient confiés, je n'aurais plus dès-lors eu un ensemble de faits; le second et le plus grave, consistant en ce que j'avais remarqué que des mesures prises dans ce sens, différaient si peu les unes des autres, qu'elles ne seraient pas assez tranchées pour le géologue, qui ne peut donner beaucoup de temps à la reconnaissance des espèces, et d'ailleurs, ce mode de mensuration n'accusait en rien l'énorme différence qui existe extérieurement entre les espèces à tours embrassans et les espèces à tours découverts. Ces dernières considérations m'ont décidé à prendre pour base la largeur extérieure et non intérieure du dernier tour, relativement au diamètre entier, ce qui me donne des limites de variation beaucoup plus étendues, et montre de suite les différences qui existent entre les espèces; mais, pour complément, j'ai toujours rapporté ce diamètre aux recouvremens des tours les uns par les autres, en l'indiquant scrupuleusement.

Si, eu égard au plus ou moins de recouvrement des tours de spire, chez les Ammonites, je jette un coup-d'œil rapide sur les espèces, je le trouverai des plus variables. On voit, en effet, dans certaines espèces, les tours simplement appliqués les uns sur les autres, et seulement en contact (*A. Subfimbriatus, Honnoratianus, Lepidus, Quadrisulcatus, Striatisulcatus, Strangularis, Juilleti*); d'autres fois les tours se recouvrent de plus en plus jusqu'à cacher le quart de leur largeur (*A. Cryptoceras, Fasciculatus, Duvalianus, Lyelli*, etc.). De ce point ils vont, en se recouvrant encore davantage, jusqu'à ne montrer que la moitié de leur largeur à découvert (*A. Leopoldinus, Interruptus, Tuberculatus, Mammillaris*). Ils se recouvrent encore plus dans quelques autres Ammonites, où moins du quart

de la largeur des tours est apparent (*A. Beudanti*, *Tortisulcatus*, *Belus*, *Latidorsatus*, etc.). Dans certaines autres espèces, l'ombilic se rétrécit de plus en plus, le dernier tour enveloppe tous les autres, et la spire devient tout-à-fait embrassante (*A. pulchellus*, *Semisulcatus*, *Velledæ*, *Largilliertianus*, etc.). Si l'on compare les deux extrêmes, il y aura disparité complète de forme, tandis qu'il y a passage évident, sans interruption, depuis les tours entièrement à découvert, jusqu'aux tours tout-à-fait embrassans, et ce plus ou moins de recouvrement des tours n'est pas toujours en rapport avec les caractères qui peuvent servir de base à la distinction des groupes, tout en étant, comme on le verra, toujours relatif au nombre des lobes des cloisons.

Aux différences des sexes j'ai aussi fait remarquer que le recouvrement des tours, et, par la même raison, la largeur du dernier, par rapport au diamètre, variait suivant les sexes, et que les tours, plus larges chez les mâles que chez les femelles, l'étaient presque toujours en raison de la compression de la coquille.

De la taille des Ammonites.

L'accroissement s'arrête plus ou moins tôt chez les Ammonites, et n'est en rapport ni avec la complication des accidens antérieurs, ni avec la complication des caractères internes des cloisons. Je ne sais même pas s'il serait facile d'établir quelques rapprochemens entre le plus ou moins grand volume qu'atteignent les espèces et la durée probable de leur existence; rien ne peut révéler le temps qui devait s'écouler entre la formation de chaque cloison ou de tel point d'arrêt externe, et même si le temps était identique pour toutes les espèces. C'est donc une question qui ne sera, sans doute, jamais résolue, et, dans tous les cas, tout hypothétique. Il n'en est pas ainsi de la taille propre à chaque espèce, et de celle-ci, comparée aux accidens extérieurs et intérieurs, sous la condition toutefois de subordonner cette comparaison aux variétés d'âge, que j'ai passées en revue; pourtant je puis dire que chaque espèce paraît avoir un diamètre qu'elle ne dépasse pas. Par exemple, dans les ter-

rains crétacés : 1° les *A. Striatisulcatus*, *Belus*, *Calypso*, *Picturatus*, *Pretiosus*, *Verrucosus*, *Crassicostatus*, *Asperrimus*, *Bravaisianus* et *Itierianus*, etc., restent toujours de petite taille, c'est-à-dire d'un diamètre au-dessous de trois centimètres; 2° les *A. Dufrenoyi*, *Ligatus*, *Parandieri*, *Macilentus*, *Emerici*, *Duvalianus*, *Tuberculatus*, *Regularis*, etc., sont plus grandes, sans pourtant passer le diamètre de cinq centimètres; 3° les *A. Astierianus*, *Fascicularis*, *Subfimbriatus*, *Latidorsatus*, *Denarius*, *Falcatus*, et beaucoup d'autres n'atteignent jamais dix centimètres de diamètre, tout en en ayant toujours plus de cinq; tandis que, 4° les *A. Clementinus*, *Lewesiensis*, *Peramplus*, *Clypeiformis*, *Bidichotomus*, *Rhotomagensis*, *Rusticus*, etc, vont, dans leur accroissement, au diamètre de trente centimètres; il en est, dans le nombre, qui, comme l'*A. Lewesiensis*, atteignent jusqu'à un mètre de diamètre. Ainsi, sous ce point de vue, chaque espèce d'Ammonite semble avoir une limite fixe d'accroissement; sans cela, toutes arriveraient aux mêmes diamètres, ce qui est loin d'avoir lieu.

J'ai dit que la taille propre aux espèces n'était pas en rapport avec les accidens extérieurs ou les ornemens dont elles sont chargées. Il suffit, pour s'en convaincre, de comparer les plus petites, les *A. Pretiosus*, *Striatisulcatus*, *Verrucosus*, *Asperrimus* et *Bravaisianus*, dont les ornemens sont très compliqués, aux plus grosses espèces qui manquent, pour ainsi dire, d'ornemens, comme les *A. Peramplus*, *Clypeiformis* et *Lewesiensis*.

J'ai dit encore que la complication des cloisons n'est pas non plus toujours en rapport avec la taille des espèces. Les nombreuses ramifications des *A. Belus*, *Calypso*, *Picturatus*, etc., par exemple, peuvent le prouver, puisqu'elles ont des parties très compliquées, et qu'elles sont pourtant dans les plus petites tailles.

§ II. *Caractères intérieurs des Ammonites.*

Chaque Ammonite se compose intérieurement d'un plus ou moins grand nombre de cloisons, se succédant régulièrement pendant un grand nombre de tours de spires; et, au-dessus de celles-ci, d'une partie vide, occupant toujours les deux tiers environ du dernier tour. Tous les zoologistes s'accordent sur les fonctions de cette vaste cavité supérieure aux cloisons, destinée à contenir l'animal.

Fonctions des cloisons. — Rien n'est plus simple que les fonctions des cloisons chez les Ammonites et chez tous les autres genres cloisonnés. A les voir si compliquées, on serait tenté de leur attribuer une grande importance dans l'économie animale, tandis qu'elles ne sont que l'analogue des vessies aériennes ou natatoires des poissons. Comme je l'ai dit ailleurs (1) pour la *Sepia*, les *Spirules* et les *Bélemnites*, ces cloisons, servant à retenir de l'air, sont appelées à soutenir l'animal, à le rendre plus léger au sein des eaux et à faciliter sa natation; aussi voit-on le nombre des loges, formées par elles, s'augmenter à mesure que l'animal s'accroît, afin de compenser toujours également la pesanteur de celui-ci, et de maintenir l'équilibre parfait, dans toutes les périodes de l'existence, entre l'animal et sa coquille, chargée, d'un autre côté, de le protéger.

Forme des cloisons. — Les bords des cloisons, chez les Ammonites, sont formés de *lobes* et de *selles*. Les premiers, dirigés en arrière par rapport à l'enroulement spiral, sont, comme l'a judicieusement pensé M. de Buch, les représentans des digitations nombreuses que devait avoir le pourtour du manteau chez l'animal; ils ont servi à fixer l'animal à sa coquille; sans eux, le siphon étant dorsal, l'animal aurait pu ballotter d'un côté à l'autre; aussi concevra-t-on facilement que ces lobes soient invariablement formés de parties aiguës, tandis que les selles et leurs ramifications, dirigées toujours en avant, ne sont,

(1) Histoire générale et particulière des Céphalopodes acétabulifères, introduction, et à l'article *Bélemnites* de la Paléontologie française, page 34.

au contraire, que l'intervalle compris entre les grandes ou les petites divisions des lobes, et, dès-lors, offrent toujours des parties obtuses et souvent arrondies en feuilles très larges, comme on le voit chez les *A. Calypso, Guettardi, Thetys, Velledæ, Alpinus,* etc.

Motifs d'erreurs dans l'étude des cloisons. — Les lobes et les selles des cloisons étant formés par les bords du *manteau* et appliqués sur la paroi interne de la coquille, il s'ensuit qu'ils sont recouverts et entièrement cachés, lorsque le test existe, et que leur présence à l'extérieur n'est due qu'à l'altération d'une partie ou à la disparition complète du test. Dès qu'on les aperçoit, on peut être sûr qu'on a sous les yeux un moule intérieur et non une coquille complète; que, dès-lors, les accidens extérieurs sont déjà atténués. Les dessins de ces cloisons sont apparens dans le moule sur la matière étrangère qui en a rempli toutes les cavités, lorsque le test existait encore, et s'est modelée sur toutes les parties. Comme les ramifications des cloisons sont immédiatement appliquées sur le test, il en résulte qu'elles sont d'autant plus divisées qu'elles sont extérieures, puisque le centre de la cloison est lisse, et que les troncs des grandes divisions partent de ce point pour se ramifier à la circonférence. J'insiste sur cette disposition, qui pourrait induire en erreur une personne non avertie. Si le moule est très frais, qu'il n'ait subi aucune altération, les divisions des cloisons se présentent avec tout leur luxe de détails; mais si au contraire, par l'usure, une légère couche extérieure de ce moule est enlevée, dès-lors un grand nombre de détails disparaissent, et, avec la même disposition générale, on a des cloisons bien différentes de ce qu'elles doivent être; la dissemblance des cloisons augmente en raison de l'altération extérieure jusqu'à la rendre complète. Il est donc, en tout cas, indispensable de s'assurer, lorsqu'on étudie les cloisons, de la non-altération des parties externes, afin d'avoir la véritable forme de ces cloisons.

Variétés naturelles des cloisons. — Je n'ai observé aucune variété naturelle dans les cloisons. Toutes prises au même âge donnent exactement les mêmes dispositions générales, et ne varient que dans des limites très restreintes et seulement dans

les derniers détails des petites digitations des lobes et des selles. Je signalerai pourtant un cas qui détermine quelques légères différences, non dans la forme générale, non dans les détails, mais dans l'allongement ou le raccourcissement de ces mêmes parties, sans y apporter d'autres modifications. Ce cas a lieu généralement dans les dernières cloisons qu'une Ammonite a formées avant sa mort, et paraît être la suite d'une maladie ou de la vieillesse. Il consiste dans les cloisons les plus près les unes des autres. Celles-ci, au lieu de conserver entre elles la distance ordinaire croissante, se rapprochent, tout-à-coup, assez brusquement, dans les trois ou quatre dernières; et alors, toutes les ramifications des lobes et des selles, ne pouvant plus acquérir la même extension, il en résulte que ces parties deviennent infiniment plus raccourcies sur elles-mêmes, tout en conservant la même largeur. On peut dire aussi, en thèse générale, que plus les loges sont espacées dans une espèce, plus les digitations des lobes sont allongées. Je regarde l'écartement des cloisons comme le signe d'un état parfait de santé chez l'Ammonite, tandis que le plus ou moins de rapprochement de ces cloisons tient évidemment à un état maladif. Je n'ai point remarqué de différence due aux variétés des sexes.

Variété d'âge des cloisons. — Si la forme générale des cloisons est invariable pour les six *lobes primordiaux* (le lobe *dorsal*, le lobe *ventral*, les deux lobes *latéraux-supérieurs* et les deux lobes *latéraux-inférieurs*), il n'en est pas ainsi de la complication des ornemens de ces lobes et du nombre des lobes auxiliaires, tous variant suivant les âges, mais dans des limites bien différentes de celles des accidens extérieurs.

1° Une Ammonite prise dans l'état embryonnaire, par exemple, quel que soit le nombre des lobes auxiliaires qu'elle devra offrir plus tard, est toujours pourvue au moins des six lobes primordiaux que j'ai indiqués. Dès cet instant, les lobes et les selles montrent les grandes divisions qu'elles comporteront ultérieurement : ils sont paires ou impaires dans leurs ramifications; mais ces ramifications sont des plus simples, offrant souvent une pointe pour chaque grande branche future, ou un large feston, pour représenter la division d'une selle qui devra, dans

l'avenir, former un grand nombre de feuilles. Ainsi, toutes les parties, comme l'Ammonite elle-même, sont dans leur plus grande simplicité, à cette différence près, entre les caractères intérieurs et extérieurs, que l'Ammonite offre déjà tous les indices des caractères de lobes dont elle sera ornée, tandis qu'elle n'a encore aucun des ornemens extérieurs dont elle doit se couvrir.

2° De ce premier âge jusqu'à la mort, les cloisons n'éprouvent pas de métamorphoses comme les caractères extérieurs. Elles se compliquent, de plus en plus, tout le temps de l'existence des Ammonites, et ne montrent qu'une complication toujours croissante et jamais de dégénérescence. Il y a donc encore, à cet égard, disparité complète des caractères internes aux modifications que l'âge apporte extérieurement. Sur les côtés des premières pointes des lobes, de l'âge embryonnaire, qui représentent une branche, on voit naître peu-à-peu d'autres pointes qui en retracent les rameaux. Chacune se divise de plus en plus; les branches se forment; les rameaux se dessinent; les digitations de ceux-ci apparaissent successivement et se multiplient, et la pointe simple de l'âge embryonnaire est représentée, dans l'âge adulte, par une grande branche, souvent ornée de beaucoup de rameaux et d'un grand nombre de digitations. Il en est de même des selles; elles se partagent de plus en plus par des lobes accessoires; le feston entier de l'âge embryonnaire se divise de nouveau, il se subdivise encore; les lobes accessoires croissent et se ramifient à l'infini, et dans l'âge adulte, le simple feston est remplacé par un grand nombre de feuilles plus ou moins divisées, et souvent par des ornemens on ne peut plus compliqués. Il est à remarquer que la complication des ornemens se multiplie tout le temps de la durée de l'existence chez les Ammonites.

Nombre des lobes. — J'ai dit encore que l'âge embryonnaire était toujours pourvu au moins des six lobes primordiaux. Parmi les Ammonites qui ne doivent avoir que ceux-ci (les *A. Subfimbriatus, Honnoratianus, Quadrisulcatus, Striatisulcatus, Strangularis* et *Juilleti* des terrains crétacés, et l'*A. fimbriatus* des terrains jurassiques), les lobes et les selles sont au grand complet pour le nombre, et n'ont plus qu'à se compliquer dans leurs ornemens; mais il n'en est pas ainsi pour la plupart des Ammo-

nites qui doivent avoir plus de lobes. Souvent il y a déjà un ou deux lobes auxiliaires dès l'âge embryonnaire, comme on le voit chez l'*A. Interruptus*, et ce nombre est toujours en raison de celui qui devra exister plus tard. Les autres apparaissent successivement à diverses époques de l'accroissement, jusqu'à leur maximum numérique, qui existe le plus souvent au commencement de l'état *adulte* ou de la seconde période d'accroissement.

En résumé, l'âge n'apporte de modifications aux cloisons que 1° dans la complication des ornemens des divisions, celles-ci existant dès l'âge embryonnaire, et se compliquant seulement, de plus en plus, tout le temps de la durée de l'existence de l'Ammonite; 2° dans le nombre des lobes auxiliaires, ce qui a lieu principalement dans les premières périodes de l'existence des espèces; ainsi, en comparant toujours des individus de même taille, pour le nombre, la forme et les détails des lobes, on acquerra, de suite, la certitude de l'identité ou des différences qui existent, et l'on saura positivement si les individus sont ou non d'espèces distinctes. En prenant toujours un individu adulte pour dessiner les cloisons, on aura les divisions complètes. Dès-lors les différences dues à l'âge disparaîtront entièrement; et les caractères internes des cloisons seront toujours applicables à la reconnaissance des limites parmi les espèces.

Rapport du nombre des lobes avec le plus ou moins de recouvrement des tours extérieurs. — Si le nombre des lobes est souvent des plus variables, relativement à l'accroissement plus ou moins rapide des espèces, il l'est beaucoup moins, quand on le compare au recouvrement des tours les uns sur les autres, ou bien à la largeur de ces mêmes tours. En effet, si je confronte, sous ce point de vue, toutes les espèces, je trouverai que :

1° Chez les Ammonites dont tous les tours sont en contact, et ne se recouvrent nullement (les *A. Subfimbriatus, Honnoratianus, Quadrisulcatus, Striatisulcatus, Strangularis* et *Juilleti*), leur nombre est invariablement au minimum. Ces espèces ont, de chaque côté, les *deux* lobes *primordiaux* (le lobe *latéral-supérieur* et le lobe *latéral-inférieur*).

2° Chez les Ammonites dont le quart environ de chaque tour

est caché (*A. Cryptoceras, Duralianus, Lyelli, Varicosus, Regularis*), les lobes sont, le plus souvent, au nombre de trois de chaque côté, c'est-à-dire les deux lobes primordiaux avec un seul lobe auxiliaire: ils varient pourtant jusqu'au maximum de cinq.

3° Chez les Ammonites, dont la moitié seulement des tours est apparent dans l'ombilic (*A. Leopoldinus, Parandieri, Interruptus, Tuberculatus, Michelinianus, Mammillaris, Gevrilianus* et *Auritus*), les lobes varient de trois à six, les limites étant déjà plus larges.

4° Chez les Ammonites, dont le quart seulement des tours est apparent dans l'ombilic (*A. Tortisulcatus, Impressus, Splendens, Beudanti, Beius, Latidorsatus, Guettardi, Quercifolius*, etc.), le nombre des lobes varie de cinq à neuf, ce nombre croissant évidemment à mesure que l'enroulement embrasse davantage.

5° Enfin, chez les Ammonites, dont le dernier tour enveloppe tous les autres (*A. semisulcatus, Thetys, Picturatus, Terverii, Alpinus, Largilliertianus*, etc.), ce nombre ne varie plus que de huit à dix, ce dernier chiffre étant le plus élevé que je connaisse dans les Ammonites.

Ainsi, le nombre des lobes, chez les Ammonites, est certainement en raison du recouvrement des tours de spire les uns sur les autres, puisqu'on voit les espèces à tours contigus et non recouverts, en avoir seulement deux de chaque côté; les espèces à tours à demi découverts, varier dans les limites de cinq à neuf lobes de chaque côté, tandis que les espèces pourvues de tours entièrement embrassans en montrent huit ou dix, atteignant alors le maximum du nombre connu. Le motif du plus grand nombre de lobes, en raison de la largeur des tours de spire, se présente de lui-même. L'animal avait alors une plus grande surface à couvrir de ramifications dans les tours embrassans que dans ceux qui sont à découvert; il lui fallait donc plus de largeur dans les lobes et les selles, ou un plus grand nombre de lobes. La nature a préféré ce dernier moyen.

Cloisons exceptionnelles.

On a toujours cru que les cloisons des Ammonites étaient symétriquement placées et correspondaient parfaitement à l'admirable régularité de la coquille; que le lobe dorsal, par exemple, était invariablement situé sur la ligne médiane, et que les autres étaient, à égale distance, répartis de chaque côté. Il n'en est pourtant pas ainsi, puisque j'ai découvert des exceptions à ces règles sur quatre espèces, les *A. Denarius*, *Splendens*, *Fittoni* et *Lyelli*, dans lesquelles le lobe dorsal, au lieu d'occuper la ligne médiane, est placé tantôt à droite, tantôt à gauche de cette ligne, et indifféremment, suivant les individus, le milieu du lobe correspondant aux côtés du dos. Cette anomalie m'ayant frappé, j'ai voulu savoir si elle existait dès le premier âge; et j'ai trouvé (fait plus curieux encore) qu'à l'état embryonnaire, les espèces citées ont les cloisons symétriques comme les autres Ammonites; que le lobe dorsal ne se jette de côté qu'à l'instant où la coquille commence à prendre les tubercules du dos; exemple exceptionnel de véritable métamorphose, dans la position et la forme des cloisons. Tout en regardant cette exception comme très curieuse, je suis loin de lui accorder une grande valeur dans la classification des groupes, tous les autres caractères étant les mêmes que ceux des espèces voisines pour la forme. Ce n'est vraiment qu'une anomalie.

Une autre série de cloisons exceptionnelles, qui offre également de l'intérêt, mais ne peut davantage servir de base à aucun groupe, est celle qu'on remarque chez les *A. Vibrayeanus* et *Mosensis*. Dans le premier cas, les lobes et les selles n'offrent aucune division, aucune ramification; ils sont tous arrondis et entiers, mais non anguleux, comme ceux des Goniatites. Dans le second cas, les divisions des cloisons sont moins disparates. On reconnaît au milieu de beaucoup de digitations confuses des lobes et des selles assez distinctes.

Cloisons non exceptionnelles. — Les cloisons non exceptionnelles peuvent, en raison de leurs formes, de leurs ramifications, être divisées et subdivisées à l'infini, puisqu'elles affectent un

grand nombre de modifications. J'ai déjà parlé du nombre des lobes et de leurs rapports avec les formes extérieures : voyons maintenant si les autres modifications peuvent également y être appliquées. Les cloisons se composent de lobes et de selles, et ces lobes sont divisés en parties paires ou impaires.

Lobes divisés en parties paires (1). — J'appelle ainsi les lobes qui, à l'exception du lobe dorsal, lequel l'est toujours, sont formés à leur extrémité, de deux rameaux égaux séparés en bas, sur la ligne médiane, par une petite selle accessoire (*A. Duvalianus, Vernieulianus, Mantellii, Rhotomagensis, Juilleti, Quadrisulcatus, Striatisulcatus*, etc., etc.).

Lobes divisés en parties impaires. — Ces lobes, au lieu d'être divisés par une selle accessoire en deux rameaux égaux à leur extrémité, sont, au contraire, formés par un seul rameau conique que termine une pointe, et s'il y a des selles accessoires, elles sont latérales et paires (*A. Denarius, Cryptoceras, Leopoldinus, Auritus, Mayorianus, Varians, Lewesiensis*, etc.).

Selles divisées en parties paires. — Les mêmes divisions, que pour les lobes, forment les selles divisées en parties paires. Elles ont, à leur extrémité supérieure, deux parties égales séparées par un lobe accessoire; elles se rapportent d'abord à toutes les espèces à lobes paires (*A. Duvalianus, Mantellii, Rhotomagensis, Juilleti, Quadrisulcatus, Striatisulcatus*); et à un très grand nombre d'espèces à lobes impaires (*A. Denarius, Lautus, Dupinianus, Leopoldinus, Diphyllus, Velledæ, Lewesiensis, Mayorianus, Varians*, etc.); ainsi, d'un côté, toutes les espèces à lobes formés de parties paires, ont invariablement les selles également formées de parties paires, tandis que le plus grand nombre des lobes formés de parties impaires ont aussi les selles formées de parties paires. Sur 81 espèces à lobes formés de parties impaires, 62 ont des selles pourvues de parties paires et 19 seulement de parties impaires.

Selles divisées en parties impaires. — Les selles que j'appelle ainsi sont celles qui, au lieu d'être partagées sur le milieu par

(1) M. Léopold de Buch, paraît n'avoir pas connu ce mode de division, au moins n'en trouvai-je aucune trace dans ses importans travaux.

un seul lobe accessoire, le sont par deux, de manière à ce qu'il y ait une feuille médiane (*A. Deshayesi, Verrucosus, Martinii, Pretiosus, Jeannoti, Impressus*); ou bien le lobe accessoire, au lieu de partager la selle en deux parties égales, est placé sur le côté, et dès-lors, la selle est divisée en deux parties très inégales (*A. Regularis, Tuberculatus, Auritus, Lautus*, etc.).

Après ces grandes divisions, on conçoit qu'il y en a beaucoup d'autres nées de leur combinaison, suivant que toutes les selles ou tous les lobes sont formés de parties paires ou impaires, ou qu'il n'y ait que les premiers qui se trouvent dans cette condition. Mais ces divisions sont toutes spéciales aux espèces, et ne peuvent, en aucune manière, s'appliquer aux généralités. Pour qu'elles soient néanmoins comprises, je vais les indiquer en tableau, en prenant pour point de départ les lobes formés de parties impaires.

Lobes formés de parties impaires.
- Selles paires.
  - Partout.
  - La première paire seulement.
- Selles impaires.
  - Partout.
  - La première impaire seulement.

Après ces caractères de lobes formés de parties paires ou impaires, il y en a un autre important qui vient se compliquer encore avec eux et multiplier les combinaisons : c'est celui de la longueur relative du *lobe dorsal*, par rapport au *lobe latéral-supérieur*; ainsi, dans certains cas, le lobe dorsal est le plus long; et 1° les lobes sont paires (*A. striatisulcatus, Strangularis, Verneulianus, Mantellii, Rhotomagensis, Fleuriausianus, Woolgari*); 2° les lobes sont impaires, avec les selles impaires (*A. Varicosus, Delaruei, Bouchardianus, Roissyanus, Inflatus*); avec les selles paires (*A. Largilliertianus*).

Le lobe dorsal est égal au lobe latéral-supérieur, 1° avec les lobes paires (*A. Juilleti, Duvalianus, Quadrisulcatus, Requienianus*); 2° avec les lobes impaires : A. les selles impaires (*A. sinuosus, Pretiosus, Belus, Ligatus, Regularis, Martinii*, etc.); B. les selles paires (*A. crassicostatus, Semisulcatus, Latidorsatus, Mammillaris*, etc.)

Le lobe dorsal est plus court que le lobe latéral-supérieur,

1° avec les lobes paires (*A. Ophiurus*, *Subfimbriatus*); 2° avec les lobes impaires : A. les selles impaires (*A. clypeiformis*, *Jeannoti*, *Deshayesi*, *Goupilianus*, etc.); B. les selles paires (*A. Denarius*, *Grasianus*, *Diphyllus*, *Mayorianus*, *Velledæ*, etc.)

§ III. *Rapports entre les caractères extérieurs et intérieurs.*

Si je cherche maintenant les rapports qui existent entre ces deux séries de formes, il me sera facile de démontrer qu'il y a souvent concordance parfaite, et que les unes peuvent servir à faire juger des autres et à combiner des groupes tout-à-fait naturels. Outre ce que j'ai dit de la largeur des tours de spire comparée au nombre des lobes, je vais offrir quelques exemples des espèces qui présentent des caractères intérieurs et extérieurs communs.

1° Parmi les Ammonites à lobes formés de parties paires, j'en trouve une série caractérisée par ses tours seulement contigus, cylindriques, lisses, ou marqués, de distance en distance, de points d'arrêt; et ayant toujours deux lobes de chaque côté (*A. Subfimbriatus*, *Honnoratianus*, *Quadrisulcatus*, *Striatisulcatus*, *Strangularis*, *Juilleti*). Toutes ces Ammonites ont, du reste, le même *facies* extérieur.

2° Encore parmi les Ammonites à lobes formés de parties paires, il existe une autre série où les tours, plus ou moins recouverts, sont chargés, sur le dos, de plusieurs rangées de tubercules, dont une médiane; le nombre des lobes et des selles paires est toujours au-dessus de deux (*A. Rhotomagensis*, *Fleuriausianus*, *Woolgari*, *Verneuilianus*, etc). Toutes ont aussi extérieurement le même aspect.

3° Parmi les Ammonites à lobes formés de parties impaires, dont les selles sont paires, il existe une série qui possède le lobe dorsal le plus long et très large, appartenant aux espèces à tours comprimés, pourvues, sur le dos, d'une quille saillante, et dont la bouche entière est en pointe (*A. Roissyanus*, *Bouchardianus*, *Inflatus*, *Delaruei*, etc.).

4° Une autre série existe encore parmi les Ammonites à lobes formés de parties impaires dont les selles sont impaires, à lobe

dorsal très étroit et le plus court, appartenant aux espèces à tours comprimés ou anguleux, pourvus, sur la ligne dorsale, d'un sillon très profond, où est logé le lobe dorsal (*A. tuberculatus*, *Lautus*, *Auritus*).

Ces quatre exemples, pris dans les espèces de lobes et de formes tout-à-fait différens, suffisent, je pense, pour prouver évidemment qu'il y a rapport des formes extérieures aux formes intérieures, et que, dès-lors, la forme des lobes acquiert une valeur d'autant plus grande dans la classification des espèces par groupes, qu'elle coïncide avec les ornemens extérieurs dont les Ammonites sont couvertes, et surtout avec la forme du dos. De l'union intime de ces deux séries de caractères peuvent naître des groupes bien distincts parmi le grand genre Ammonite.

Division des Ammonites par Groupes.

Je reviens maintenant sur la classification des Ammonites par groupes naturels; et je vais développer l'ingénieuse classification de M. Léopold de Buch, en l'appliquant aux Ammonites des terrains crétacés. Voici les résultats que me fournit, relativement à ces dernières, la combinaison des caractères de lobes et de selles, avec les formes extérieures du dos et les autres accidens. Je suis obligé d'embrasser la totalité des Ammonites pour arriver à y classer les espèces des terrains crétacés.

Espèces à quille dorsale entière.

1er Groupe. Les ARIETES, Buch. — *Coquille* ornée, sur les côtés, de côtes toujours simples, rayonnantes, en saillie. *Dos* carré, pourvu d'une quille médiane. *Siphon* saillant, placé dans la quille dorsale. *Bouche* prolongée en rostre. *Cloisons* formées de lobes et de selles impaires (1). Lobe dorsal aussi profond que large, plus long que le lobe latéral supérieur. La selle latérale monte beaucoup plus haut que les autres; la selle dorsale est très courte. Ce groupe ne contient que des espèces propres aux couches inférieures du lias (*A. Bucklandi*, *Obtusus*, *Rotiformis*, etc.).

2e Groupe. Les FALCIFERI, Buch. — *Coquille* comprimée, pourvue latéralement de plis infléchis en avant, formant souvent un coude sur le milieu de leur

(1) Ces caractères de selles et de lobes *pairs* et *impairs* ont été introduits par moi dans la caractéristique des groupes. Il en est de même de ceux des bouches complètes

longueur, sans tubercules. *Dos* aigu, saillant, en quille étroite, contenant le siphon. *Bouche* complète, pourvue, au milieu et de chaque côté, de pointes saillantes. *Cloisons* formées de lobes impaires et de selles presque paires. La selle dorsale est immense de largeur, et son lobe accessoire pourrait être pris pour le lobe latéral supérieur. Ce dernier est toujours beaucoup plus long que le lobe dorsal. Ce groupe est spécial aux couches supérieures du lias (*A. serpentinus* Schl., *Murchisonæ*, *Falcifer*, *Bifrons*, etc.).

3e Groupe. Les Cristati, d'Orb.— *Coquille* comprimée, ornée sur les côtés, de côtes bifurquées et infléchies en avant, sans former de coude, pourvues ou non de tubercules saillans. *Dos* saillant en quille et contenant le siphon. *Bouche* à l'état parfait, prolongée en rostre saillant, sûr la ligne médiane du dos. *Cloisons* formées de lobes généralement divisés en parties impaires, et en selles paires. Lobe dorsal, plus long que le lobe latéral supérieur. La selle latérale moins élevée que les autres. La selle dorsale, très haute. Ce groupe diffère des *Arietes* par ses côtes bifurquées ou ornées de pointes sur le milieu de leur longueur, au lieu d'être simples, par sa selle latérale, plus basse que la selle dorsale et non pas plus élevée que celle-ci, et par sa selle dorsale, très longue. Il diffère des *Falciferi* par ses côtes élevées, ornées de pointes et sans coude; par le lobe dorsal le plus long, au lieu d'être le plus court; par la selle dorsale, qui n'est pas d'une longueur démesurée. Ce groupe ne se compose que d'espèces propres aux terrains crétacés (*A. Helius*, *Ixion*, *Cultratus*, de l'étage néocomien inférieur, *A. Roissyanus*, *Cristatus*, *Bouchardianus*, *Delaruei*, *Inflatus*, *Varicosus*, *Senequieri*, *Hugardianus* du gault ou grès vert inférieur (*A. Bravaisianus*, *Tricarinatus* et *Varians* (1) de la craie chloritée ou grès vert supérieur).

Espèces à dos canaliculé.

4e Groupe. Les Tuberculati, d'Orb.—*Coquille* ornée latéralement, de côtes et de tubercules: ceux-ci alternes sur les côtés du dos. *Dos* pourvu, sur la ligne médiane, d'un canal profond, bien distinct. *Bouche* complète, représentant un rostre allongé, correspondant au canal dorsal. *Cloisons* formées de lobes et de selles divisés en parties impaires. Lobe dorsal, plus court que le lobe latéral supérieur et si étroit qu'il ne remplit que la largeur du canal dorsal. Toutes les espèces de ce groupe, bien circonscrit, appartiennent au terrain crétacé moyen (*A. Tuberculatus*, *Lautus*, *Auritus*, du gault ou grès vert inférieur; *A. Falcatus* de la craie chloritée).

Espèces à dos tranchant, sans être en quille.

5e Groupe. Les Clypeiformi, d'Orb. — *Coquille* comprimée, généralement

(1) Cette dernière espèce a le lobe dorsal plus court, sans avoir aucun des autres caractères des *Falciferi*; peut-être appartient-elle à un petit groupe spécial aux grès vert supérieur.

lisse ou peu ornée de rides. *Dos* tranchant en biseau, sans quille. *Spire* à tours larges, le plus souvent embrassans. *Bouche? Cloisons* divisées en un grand nombre de lobes, formés de parties impaires et de selles formées de parties paires ou presque paires. Lobe dorsal, plus court que le lobe latéral supérieur. Les selles et les lobes larges et courts. Les espèces qui se placent dans ce groupe appartiennent aux terrains crétacés (*A. clypeiformis*, *Gevrilianus*, *Nisus*, *Difficilis*, de l'étage néocomien inférieur; *Bicurvatus* du Gault; *Requienianus* et *Goupilianus* de la craie chloritée ou grès vert supérieur).

Espèces à dos saillant et crénelé sur la ligne médiane.

6e Groupe. Les Amaltheï, Buch. — *Coquille* pourvue, sur les côtés, de très légères côtes infléchies en avant, le dos aigu divisé en plis saillans, transverses, représentant une surface crénelée. *Bouche* pourvue en avant, sur la ligne médiane, d'un rostre, dont les crénelures sont les anciennes traces. *Cloisons* formées de lobes et de selles divisées en parties impaires. Lobe dorsal, plus court que le lobe latéral supérieur. Toutes les espèces appartiennent au terrain jurassique ou oolitique (*A. Amaltheus*, *Cordatus*, *Serratus*, etc.).

7e Groupe. Les Pulchelli, d'Orb. *Coquille* élégamment divisée, sur les côtés, en côtes saillantes droites et nullement infléchies, qui passent d'un côté à l'autre, en laissant, sur le dos, un tubercule comprimé, qui vient représenter une série de crêtes. *Bouche ? Cloisons* formées de lobes, divisés en parties impaires, et de selles, divisées en parties paires. Lobe dorsal à-peu-près égal en longueur au lobe latéral inférieur. Toutes les espèces sont des terrains crétacés inférieurs (*A. Pulchellus* du terrain néocomien, *A. Brottianus* et *Itierianus*, du gault ou grès vert inférieur).

8e Groupe. Les Rhotomagenses, d'Orb.—*Coquille* à tours renflés, carrés ou ovales, ornés de côtes saillantes, plus ou moins chargées de tubercules sur quatre ou cinq lignes, dont une rangée sur la ligne médiane du dos; ce qui la rend plus ou moins anguleuse. *Cloisons* formées de lobes et de selles divisées en parties paires. Le lobe dorsal est plus long que le lobe latéral supérieur. Ce groupe diffère des *Armati* par son dos, pourvu de plusieurs rangées de tubercules, dont une médiane, par ses lobes paires et par son lobe dorsal, toujours le plus long. Toutes ces espèces sont des terrains crétacés moyens (*A. Rhotomagensis*, *Woolgari*, *Carolinus*, *Verneuilianus*, *Pailleteanus*, *Fleuriausianus*, *Mantelli* (1), *Papalis*, *Vertebralis*, *Deverianus*, *Rusticus*, *Renauxianus*, des craies chloritées ou grès verts supérieurs, et l'*A. Lyelli* (2) du Gault).

(1) L'*A. Mantelli*, sans avoir le tubercule dorsal, est pourvu de la même disposition de lobes, et de rangées latérales de tubercules.

(2) L'*A. Lyelli* est la seule espèce du gault, et en même temps la seule Ammonite de ce groupe qui, tout en ayant les tubercules, les lobes paires des autres espèces, a néanmoins le lobe dorsal plus court. C'est une des jolies exceptions qui prouvent la différence des formes suivant les étages. On devra peut-être en former un groupe à part, vu ses cloisons non symétriques.

Espèces à dos excavé, pourvu de tubercules sur les côtés.

9e Groupe. Les DENTATI, Buch. — *Coquille* plus ou moins renflée, ornée de côtes, souvent bifurquées au pourtour de l'ombilic, où elles forment d'ordinaire un tubercule. L'extrémité des côtes fait saillie de chaque côté du dos, dont le milieu est excavé. *Cloisons* formées de lobes divisés en parties impaires, et de selles, généralement divisées en parties paires. Lobe dorsal, égal ou plus court que le lobe latéral supérieur. Toutes les espèces appartiennent aux terrains crétacés inférieurs. *Première division:* espèces à tubercules impairs sur les côtés du dos (*A. Verrucosus*, du terrain néocomien, *A. Interruptus* (*Dentatus* Sow.), *Denarius, Splendens, Fittoni, Guersanti, Mosensis, Raulinianus, Camatteanus*, du gault ou grès vert inférieur. *Seconde division:* espèces à tubercules pairs sur les côtés du dos (*A. Dufrenoyi, Pretiosus, Neocomiensis, Sinuosus, Asperrimus*, du terrain néocomien; *A. Michelinianus, Archiacianus, Regularis, Tardefurcatus, Mammillaris, Nodoso-costatus*, du gault ou grès vert inférieur).

10e Groupe. Les ORNATI, Buch. — *Coquille* peu renflée, à dos étroit, bordé de tubercules; une autre rangée de tubercules à la décurrence de la spire, vers le milieu des flancs. *Cloisons* formées de lobes et de selles, composés de parties impaires. Le lobe dorsal toujours infiniment plus court que le lobe latéral supérieur. Toutes les espèces sont de l'Oxford-Clay (*A. Duncani, Callowiensis, Castor, Pollux*).

Espèces à dos plus ou moins carré.

11e Groupe. Les FLEXUOSI, Buch. — *Coquille* pourvue, latéralement ou au pourtour de l'ombilic, d'une rangée de tubercules et d'une autre de chaque côté du dos, le milieu de celui-ci formant une légère saillie. Entre les deux rangées de tubercules des côtés, sont, le plus souvent, des côtes qui s'infléchissent en avant. *Cloisons* formées de lobes, divisés en parties impaires, et de selles, divisées en parties paires. Le lobe dorsal plus court que le lobe latéral supérieur; le lobe latéral supérieur très large. Toutes les espèces sont du terrain néocomien inférieur (*A. Leopoldinus, Cryptoceras, Radiatus, Heliacus, Castellanensis*).

12e Groupe. Les COMPRESSI, d'Orb. — *Coquille* généralement très comprimée, composée de tours larges, très embrassans, pourvus de côtes ou de stries sur le côté, toutes peu infléchies et allant sur les côtés du dos former des tubercules. *Dos* étroit, comme tronqué et coupé carrément. *Cloisons* composées d'un grand nombre de lobes, formés de parties impaires, et de selles, souvent formées de parties paires. Lobe dorsal très grand, beaucoup plus long que le lobe latéral supérieur. Toutes les espèces sont spéciales aux terrains crétacés (*A. compressissimus, Didayanus*, du terrain néocomien; *A. quercifolius*, du gault

A. Largilliertianus, *Beaumontianus*, *Sartousianus*, *Vibrayeanus* (1), *Feraudianus*, *Lafresnayanus*, *Catillus*, de la craie chloritée ou du grès vert supérieur).

13e Groupe. Les ARMATI, Buch. — *Coquille* à tours carrés, pourvue, sur les côtés du dos, d'une rangée de tubercules saillans, et, sur les flancs, d'un ou de plusieurs autres. *Dos* large, carré, se joignant à angle étroit avec les flancs. *Cloisons* composées de lobes formés de parties impaires, et de selles, formées de parties paires. Lobe dorsal, plus long ou égal au lobe latéral-supérieur, celui-ci, placé au milieu des flancs et toujours étroit, par rapport à la selle dorsale. Toutes les espèces sont des terrains jurassiques, et surtout des couches supérieures (*A. Perarmatus*, *Bakeriæ*, *Longispinus*, etc.).

14e Groupe. Les ANGULICOSTATI d'Orb. — *Coquille* épaisse, à tours presque ronds, pourtant marqués, de chaque côté du dos, de légères saillies qui rendent cette partie presque carrée. *Dos* beaucoup plus étroit que les flancs. Des côtes élevées, alternes passent sur le dos d'un côté à l'autre. *Cloisons* composées de lobes formés de parties impaires, et de selles le plus souvent paires. Le lobe dorsal plus court que le lobe latéral supérieur; les lobes auxiliaires obliques vers l'ombilic: ils appartiennent aux terrains crétacés inférieurs (*A. Angulicostatus*, *Martinii*, *Crassicostatus*, *Gargarsensis*, *Cornuelianus* *Deshayesi*, du terrain néocomien. Les *A. Milletianus*, *Puzosianus*, *Fissicostatus* du gault ou grès vert inférieur). Ce groupe ne diffère des *Planulati* que par le dos carré qui le caractérise.

15e Groupe. Les CAPRICORNI, Buch. — *Coquille* à tours très convexes, ornés de côtes prononcées, simples, droites, sans tubercules ni épines. *Dos* large, présentant souvent une surface plus grande que celle des flancs. *Cloisons* composées de lobes formés de parties impaires (2), et de selles formées de parties paires. Lobe dorsal le plus long; les lobes des côtés larges. Toutes les espèces sont des terrains jurassiques (*A. Capricornus*, *A. Angulatus*, etc.).

Espèces à dos arrondi, convexe.

16e Groupe. Les HETEROPHYLLI, d'Orb. — *Coquille* comprimée, formée de tours presque toujours embrassans, apparaissant rarement dans l'ombilic. Les côtés sont lisses, légèrement striés ou sillonnés. *Dos* peu large, très convexe. *Cloisons* symétriques, divisées en un grand nombre de lobes très ramifiés, formés de parties impaires, et de selles le plus souvent formées de parties paires. Lobe dorsal, presque toujours plus court que le lobe latéral supérieur. Le grand nombre de rameaux des lobes laisse entre eux des selles, figurant, à leur

(1) Cette espèce n'est ici que d'après ses caractères extérieurs. Elle est anormale partout, en raison de la singulière disposition de ses lobes non divisés.

(2) Je n'ai pas vu de lobes de ce groupe; j'en prends la description sur les figures données par M. de Buch. C'est le seul groupe que je n'aie pu observer en nature.

partie supérieure, des feuilles larges ou des massues arrondies, plus ou moins divisées, dont l'aspect est tout-à-fait particulier. On peut en faire deux divisions : 1° les espèces à selles formées de parties impaires, contenant l'*A. Heterophyllus* des terrains jurassiques; 2° les espèces à selles divisées en parties paires, toutes propres aux terrains crétacés inférieurs (*A. Incertus*, *Infundibulum*, *Semistriatus*, *Tortisulcatus*, *Calypso*, *Guettandi*, *Semisulcatus*, *Thetys*, *Morelianus*, *Picturatus*, *Terverii*, *Diphyllus*, *Rouyanus*, du terrain néocomien inférieur, et les *A. Velledæ* et *Alpinus*, du gault ou grès vert inférieur). On voit que les espèces des terrains crétacés se distinguent nettement, par les selles, des espèces des terrains jurassiques.

Ce groupe, que M. de Buch n'a pas formé, parce qu'il n'en connaissait qu'une seule espèce, a été très bien senti par lui (1). Il est maintenant aussi nombreux que beaucoup d'autres.

17e Groupe. Les Ligati, d'Orb. — *Coquille* comprimée, généralement lisse ou peu ondulée, marquée, le plus souvent, de distance en distance, de sillons ou de côtes, anciens points d'arrêt des bouches successives. *Dos* convexe, quelquefois un peu comprimé. *Cloisons* composées de lobes formés de parties impaires, et de selles le plus souvent paires. Le lobe dorsal plus court que le lobe latéral supérieur; les derniers lobes auxiliaires souvent obliques en arrière, vers l'ombilic; les selles, très divisées, ne représentent jamais de feuilles. Toutes les espèces sont des terrains crétacés (*A. Ligatus*, *Intermedius*, *Cassida*, *Dispar*, *Flexisulcatus*, *Emerici*, *Belus*, *Royerianus*, *Impressus*, *Inornatus*, *Carteroni*, *Grasianus*, *Cesticulatus*, *Raresulcatus*, du terrain néocomien; *A. Beudanti*, *Latidorsatus*, *Parandieri*, *Clementinus*, *Mayorianus*, *Dupinianus*, *Versicostatus*, du gault ou grès vert inférieur; *A. Lewesiensis*, *Peramplus*, *Prosperianus*: du grès vert supérieur ou craie chloritée).

18e Groupe. Les Planulati, Buch. — *Coquille* discoïdale, comprimée, composée de tours plus ou moins cylindriques, ornés de stries ou de côtes serrées, se partageant, vers le milieu ou les deux tiers des flancs, en plusieurs branches, sans être pourvues, à cette jonction, d'aucune pointe. *Dos* rond. *Cloisons* formées de lobes toujours divisés en parties impaires; et de selles formées, le plus souvent, de parties paires. Le lobe dorsal ou plus long ou plus court que le lobe latéral supérieur; les lobes auxiliaires fortement obliques en arrière, vers l'ombilic. Ce groupe est propre aux terrains jurassiques ou oolitiques (*A. Communis*, *Polyplocus*, *Plicatilis*, *Annulatus*). J'y rapporte provisoirement trois espèces des terrains crétacés inférieurs (*A. Macilentus*, *Seranonis* et *Consobrinus*, dont je ne connais les lobes qu'en partie). Ce groupe s'est donc arrêté aux couches les plus inférieures du terrain crétacé, si toutefois les trois espèces citées ont bien les caractères de lobes de cette division.

(1) Annales des sciences naturelles, 1830, tome XXIX, page 27.

19e Groupe. CORONARII, Buch. — Ce groupe, portant les caractères des *Planulati*, s'en distingue seulement par la présence d'une pointe ou d'un tubercule, au point de jonction des bifurcations des côtes ou des stries qui partent par faisceaux. Tours de spire élevés. *Cloisons* composées de lobes formés de parties impaires, et de selles formées de parties paires. Le lobe dorsal plus court que le lobe latéral-supérieur; les lobes auxiliaires obliques; le lobe latéral-supérieur est en dehors, et le lobe latéral inférieur est en dedans des tubercules. Ce groupe caractérise principalement l'oolite inférieure (*A. Blagdeni*, *Bechei*, *Contractus*, etc.).

20e Groupe. MACROCEPHALI, Buch. — *Coquille* analogue pour la forme, les côtes ou les stries, à celles du groupe des *Coronarii*, avec cette différence qu'elle est souvent plus renflée, et que le tubercule, au lieu d'être placé vers la moitié de la largeur du tour de spire, est plus près de l'ombilic : il en résulte que les lobes latéraux-supérieurs et inférieurs sont tous deux en dehors du tubercule, au lieu d'être l'un en dehors, l'autre en dedans, comme chez les *Coronarii*. Les espèces les plus bombées sont propres aux terrains jurassiques (*A. Lallierii*, *Brochii*, *Banksii?*). Les suivantes sont propres au terrain néocomien inférieur (*A. Astierianus*, *Fascicularis*, *Jeannoti*, *Bidichotomus*).

21e Groupe. Les FIMBRIATI, d'Orb. — *Coquille* discoïdale; spire formée de tours cylindriques, le plus souvent contigus, sans se recouvrir en aucune manière, lisses ou ornés transversalement, de distance en distance, de côtes saillantes ou de sillons, anciens points d'arrêt des bouches successives. *Bouche* circulaire. *Cloisons* symétriques, formées de lobes et de selles divisés en parties paires, toujours élargis à leur extrémité et étroits à leur base. Lobe dorsal souvent le plus long. Ce groupe, l'un des mieux caractérisés, se trouve dans les terrains jurassiques inférieurs et dans les terrains crétacés inférieurs (*A. fimbriatus* et *Jurensis* du lias, et *A. Inæqualicostatus*, *Subfimbriatus*, *Ophiurus*, *Honnoratianus*, *Recticostatus*, *Lepidus*, *Quadrisulcatus*, *Striatisulcatus*, *Strangularis*, *Duvalianus*, *Juilleti*, *Matheroni*, du terrain néocomien). On voit que le plus grand nombre des espèces appartient au terrain néocomien, qu'il caractérise parfaitement.

CHAPITRE II.

CONSIDÉRATIONS GÉOLOGIQUES.

§ I. *Examen critique du nombre d'espèces d'Ammonites.*

En réunissant tous les noms donnés par les auteurs aux Ammonites des terrains crétacés, décrites dans tous les pays, je trouve qu'avant mon travail on en connaissait *soixante-dix-huit* espèces. Sur ce nombre, *neuf* seulement (*A. Goodhalli*, Sow. *Concinnus*, *Trisulcosus*, *Histrix*, Phill., *Stobœi*, Nilson, *Vertebralis*, Sowerby, *Cinctus*, Mantell, et *Polyopsis*, Dujardin), me sont inconnues, soit que je n'aie pu les voir en nature, soit qu'elles ne se trouvent pas en France, soit enfin qu'elles aient été trop imparfaitement figurées pour être bien positivement reconnaissables. J'ai donc pu examiner comparativement *soixante-neuf* espèces d'Ammonites des terrains crétacés signalées ou décrites. En appliquant à ces espèces une révision sévère : 1° de la synonymie, pour détruire les doubles emplois de noms divers donnés à la même Ammonite; 2° des différences apportées par la conservation des individus, pourvus ou non de leur test; 3° des différences énormes déterminées par l'âge et le sexe, différences que j'ai signalées aux considérations zoologiques, je suis arrivé à trouver que, sur ce nombre de 69, *trente-huit* espèces, ou plus de la moitié, ne sont que nominales ou de simples variétés (1); et l'analyse terminée, il ne me reste que *trente-et-une* espèces positives des 69 que j'ai pu étudier en nature.

N'eussé-je eu que ces 31 espèces en France, c'eût été déjà beaucoup sur la totalité des Ammonites connues ailleurs; mais

(1) Il serait trop long de retracer ici le nom de ces Ammonites qui sont toutes, du reste, indiquées aux synonymies des espèces. Voyez, par exemple, dans ma Paléontologie française, *A. Interruptus*, page 211, *A. Mantellii*, page 340 *A. Mammillaris*, page 250. *A. Varians*, page 311, etc., etc. Aux tables générales de l'ouvrage, tous les synonymes seront expliqués avec leur renvoi.

un appel fait aux personnes qui, sur notre territoire, s'occupent de géologie ou s'intéressent aux progrès de cette science, les a trouvées partout disposées à me seconder dans mon travail; et bientôt, grâce à leurs importantes communications, les collections de toutes les parties de la France, réunies dans mon cabinet aux produits des courses que je n'ai moi-même cessé de faire dans ce but, depuis plus de sept ans, m'ont offert l'ensemble le plus complet qu'on ait jamais eu sur un seul point, soit en espèces individuelles, soit en échantillons de chacune de celles-ci, seul moyen d'en fixer rigoureusement les limites. Loin de n'avoir que 31 espèces d'Ammonites, je me suis trouvé alors en présence du nombre immense de *cent quarante-quatre espèces* des terrains crétacés, dont *cent treize* étaient encore non décrites avant mon travail. J'eus à dater de ce moment la satisfaction de pouvoir prouver que la France, si peu connue sous le rapport de ses fossiles, et dont on n'avait étudié partiellement que de petites parties sous ce point de vue; que la France, sous ce rapport, dis-je, pouvait se montrer la plus riche partie du monde dès qu'on voudrait l'étudier dans son ensemble, et ne reculer devant aucune des nombreuses difficultés que présentait cette manière de l'envisager dans cet intérêt.

Le nombre élevé des espèces d'Ammonites en France, n'est pas à mes yeux d'un pur intérêt numérique. Je tiens peu à décrire quelques centaines d'espèces nouvelles de plus ou de moins; mais, comme mon principal but est l'application de la zoologie à la géologie, on sent que, plus ce nombre croissait, plus les matériaux augmentaient de valeur pour cette application, en me donnant soit un plus grand nombre d'espèces par terrain, soit un plus grand nombre de formes identiques pouvant servir à la détermination de ces mêmes terrains. En effet, après avoir étudié les espèces d'Ammonites sous ce point de vue, après avoir comparé tous les autres fossiles qui se trouvent toujours avec telles et telles Ammonites, après avoir été vérifier moi-même au nord, au midi, à l'ouest et à l'est de la France, la superposition des couches qui les renferment, leur ordre de succession dans ces mêmes couches, je suis parvenu, sans tenir compte de la couleur et de la nature argilleuse ou sili-

ceuse des roches (1), à reconnaître positivement par les Ammonites et par les autres animaux conservés avec elles: 1° qu'il y a évidemment eu *trois grands étages géologiques* bien tranchés, bien distincts, dans les terrains crétacés; 2° que chacun de ces étages possède sa faune spéciale bien caractérisée, surtout, par les Ammonites qui s'y trouvent.

§ II. *Division des terrains crétacés en trois étages distincts.*

Pour l'intelligence des généralités qui vont suivre, je crois devoir donner l'explication des trois grandes divisions des terrains crétacés, telles que je les envisage, avec leur synonymie dans les auteurs et dans les différentes langues.

1er Étage. NÉOCOMIEN. — C'est le *terrain crétacé inférieur*, cité depuis très long-temps par M. Elie de Beaumont; le *terrain néocomien* de M. Montmollin; le *groupe inférieur* de M. d'Archiac (2). Je le divise en deux séries de couches.

Néocomien inférieur, comprenant le *calcaire*, l'*argile à Spatangues* et les *marnes bleues* (3) de la Haute-Marne, de Saint-Dizier, de Wassy; les calcaires identiques de Vendeuvre, de Marolle (Aube) et de Neuchâtel (Suisse); les calcaires et les marnes de Girondas (Vaucluse), de Saint-Jullien (Hautes-Alpes), d'Escragnolle, des Lattes, de Caussols (Var), de Lagne, de Castellane, de Cheiron, de Sisteron, de Robion, de Barème, de Leous (Basses-Alpes, e Cassis (Bouches-du-Rhône, etç.. etc.).

Néocomien supérieur, comprenant les marnes supérieures de Cassis (Bouches-du-Rhône, de Vergons (Basses-Alpes), de Gargas (Vaucluse); les *argiles ostréennes* et les *argiles à plicatules* (3) de Bailly-aux-Forges, de Wassy Marne), qu'on trouve à la Villeneuve, entre Ervy et Marolle (Aube); aux environs d'Auxerre (Yonne).

2e Étage. GAULT. — *Glauconie sableuse* de M. Brongniart, le *grès vert* inférieur, le *gault* des Français, le *blue-clay*, le *blue-marl*, le *gault*, le *galt* de M. Smith, le *lower green-sand* des Anglais, le *gruner sandstein* de M. Boué. C'est le *groupe moyen* de M. d'Archiac. Je le divise également en deux séries de couches.

(1) Déjà deux savans avaient reconnu dans leurs importans travaux, la vérité de ce fait: M. Brongniart en mettant les terrains noirâtres de la montagne des Fis, dans le terrain crétacé; M. Dufrénoy, en rapportant toutes les roches dures et noirâtres des Pyrénées à cette même formation.

(2) Peut-être le terrain de *Weald* ou *Weald-Clay* fait-il partie de l'étage néocomien.

(3) Ces couches sont décrites par M. Cornuel de Wassy.

Gault inférieur, comprenant l'argile de Wissant (Pas-de-Calais), les grès de Machéroménil (Ardennes), de Varennes (Meuse), de Copt-point, de Remgener, de Lyme-regis et Ridge (Angleterre).

Gault supérieur, comprenant les argiles du Gaty, de Maurepaire, etc. (Aube), des côtes noires, de Valcourt, de Droyes, de Moutier-en-Der (Haute-Marne), de Saint-Florentin (Yonne), de Sénéfontaine (Oise), les grès verts de la perte du Rhône (Ain), du cap La Hève (Seine-Inférieure), le grès vert d'Escragnolle (Var), les roches noirâtres de la montagne des Fis (Savoie), etc.

3e Étage. CRAIE CHLORITÉE. — *Glauconie crayeuse* de M. Bronguiart, le *grès vert supérieur,* la *craie chloritée*, la *craie tufau*, la *craie blanche*, la *craie supérieure* des Français, l'*Upper-Green-Sand*, le *Chalk-marl*, le *Chalk* des Anglais, le *Chloritesche Kreide* des Allemands.

Craie inférieure ou *craie chloritée.* J'y comprends le grès vert supérieur, a craie tufau du cap Gris-nez (Pas-de-Calais), de Rouen, du Havre (Seine-Inférieure), le grès vert d'Honfleur (Calvados), la craie à baculites de Valogne (Manche), la craie tufau et les grès verts de la Sarthe et des rives de la Loire, les grès verts d'Uchaux (Vaucluse) (1), d'Auxon, de Laubrecel (Aube), du Mont Blainville (Meuse), de la Malle d'Escragnolle (Var), de Vergous, de Barème (Basses-Alpes), de Cassis, de la Ciotat et de la Cadieres (Bouches-du-Rhône, les craies et les grès verts de tout le bassin pyrénéen, etc.

Craie supérieure. La *craie blanche de Paris* et de tout le bassin parisien, les craies supérieures de Tours, de la Flèche, de Vendôme, dans le bassin de la Loire; la craie de Maëstrich, Ciply, etc. Cette dernière série du terrain crétacé ne contient plus d'Ammonites.

DIVISION DES AMMONITES PAR ÉTAGE.

Si, maintenant que j'ai défini ce que j'entends par les trois étages des terrains crétacés, je cherche le nombre des espèces d'Ammonites qui ont vécu à chaque époque, je trouverai les résultats suivans:

Étage néocomien	75 espèces.
Étage du gault	42 espèces.
Étage de la craie	27 espèces.

(1) C'est tout-à-fait à tort, que M. Michelin rapporte cette couche au même étage que le Gasty (Aube). Uchaux et Gozeau qui sont identiques, appartiennent évidemment à l'étage des craies chloritées, et ne contiennent pas une seule espèce des gaults supérieurs. Tous les rapprochemens sont fautifs à cet égard, comme il me sera facile de le prouver. Les Ammonites d'Uchaux sont toutes sans exception, de l'étage de l'*A. Rhotomagensis*, dont l'âge est bien connu.

Ainsi, sans avoir égard aux formes, je trouve que les espèces d'Ammonites si nombreuses dans les terrains jurassiques, sont dans les terrains crétacés : 1° au maximum de leur développement numérique, à l'étage des terrains néocomiens ; 2° qu'elles ont déjà diminué de près de la moitié, sous ce rapport, à l'étage du gault ; 3° qu'elles ont diminué, de nouveau, de la moitié du chiffre qu'elles atteignaient encore dans le gault, à l'époque de la craie chloritée, en cessant tout-à-fait d'exister avec les couches moyennes de la troisième époque, à laquelle aucune espèce ne survit. La race des Ammonites ne se montre plus dans les couches supérieures des terrains crétacés, les craies blanches ou craies supérieures. Les Ammonites ont donc diminué progressivement de nombre, des étages inférieurs aux étages supérieurs du terrain crétacé.

Je vais étudier comparativement, par étage, les espèces qui s'y trouvent, et voir quelles sont les espèces qui leur sont spéciales ou communes.

1er Étage. *Terrain néocomien.*

Les *soixante-quinze* espèces d'Ammonites des terrains néocomiens n'appartiennent pas toutes au même horizon géologique; et je ne doute pas qu'on ne parvienne à les diviser par couches distinctes, en les rapportant aux couches si tranchées qu'on observe dans le département de la Haute-Marne; mais, en attendant que des observations précises viennent fixer sur l'analogie de ces couches avec celles qui contiennent des Ammonites en Provence et dans les Alpes, je crois devoir ne les diviser qu'en étage néocomien inférieur et néocomien supérieur.

Espèces d'Ammonites propres à l'étage néocomien inférieur.

Ammonites.			Ammonites.		
Angulicostatus, d'Orb.	*Paléont. fr.*	Pl. 46	Jeannoti, d'Orb.	*Paléont. fr.*	Pl. 56
Asperrimus, d'Orb.	*id.*	Pl. 60	Juilleti, d'Orb.	*id.*	Pl. 50. 11 :
Astierianus, d'Orb.	*id.*	Pl. 28	Leopoldinus, d'Orb.	*id.*	Pl. 21. 22
Bidichotomus, Leymerie.	*id.*	Pl. 57	Lepidus, d'Orb.	*id.*	Pl. 48
*Calypso, d'Orb. (1)	*id.*	Pl. 52	Ligatus, d'Orb.	*id.*	Pl. 38
Carteroni, d'Orb.	*id.*	Pl. 61	*Macilentus, d'Orb.	*id.*	Pl. 42
Cassida, Raspail.	*id.*	Pl. 89	Morelianus, d'Orb.	*id.*	Pl. 54
Castellanensis, d'Orb.	*id.*	Pl. 25	Neocomiensis, d'Orb.	*id.*	Pl. 59
Clypeiformis, d'Orb.	*id.*	Pl. 42	Ophiurus, d'Orb.	*id.*	Pl. 36
Compressissimus, d'Orb.	*id.*	Pl. 61	Picturatus, d'Orb	*id.*	Pl. 54
Cryptoceras, d'Orb.	*id.*	Pl. 24	Pulchellus, d'Orb.	*id.*	Pl. 40
Cultratus, d'Orb.	*id.*	Pl. 46	Quadrisulcatus, d'Orb.	*id.*	Pl. 49
Didayanus, d'Orb.	*id.*	Pl. 108	Radiatus, Bruguières.	*id.*	Pl. 26
Difficilis, d'Orb.	*id.*	Pl. 41	Recticostatus, d'Orb.	*id.*	Pl. 40
Diphyllus, d'Orb.	*id.*	Pl. 55	Rouyanus, d'Orb.	*id.*	Pl. 110
*Dispar, d'Orb.	*id.*	Pl. 45	Semistriatus, d'Orb.	*id.*	Pl. 41
Fascicularis, d'Orb.	*id.*	Pl. 29	Semisulcatus, d'Orb.	*id.*	Pl. 53
Gevrilianus, d'Orb.	*id.*	Pl. 43	Seranonis, d'Orb.	*id.*	Pl. 109
Grasianus, d'Orb.	*id.*	Pl. 44	Simplus, d'Orb.	*id.*	Pl. 60
Heliacus, d'Orb.	*id.*	Pl. 25	Sinuosus, d'Orb.	*id.*	Pl. 60
Helius, d'Orb.	*id.*	Pl. 57	Subfascicularis, d'Orb.	*id.*	Pl. 30
Honnoratianus, d'Orb.	*id.*	Pl 37	Subfimbriatus, d'Orb.	*id.*	Pl. 35
Incertus, d'Orb.	*id.*	Pl. 30	Terverii, d'Orb.	*id.*	Pl. 54
Inæqualicostatus, d'Orb.	*id.*	Pl. 29	Thetys, d'Orb.	*id.*	Pl. 53
Infundibulum, d'Orb.	*id.*	Pl. 39	Tortisulcatus, d'Orb.	*id.*	Pl. 51
Intermedius, d'Orb.	*id.*	Pl. 38	Verrucosus, d'Orb.	*id.*	Pl. 58
Ixion, d'Orb.	*id.*	Pl. 56			

Espèces d'Ammonites propres à l'étage néocomien supérieur.

Ammonites.			Ammonites.		
Belus, d'Orb.	*Paléont. fr.*	Pl. 52	Guettardi, Raspail.	*Paléont. fr.*	Pl. 53
*Cesticulatus, Leym. (2)	*id.*	Pl. 81	Impressus, d'Orb.	*id.*	Pl. 52
Consobrinus, d'Orb.	*id.*	Pl. 47	Inornatus, d'Orb.	*id.*	Pl. 55
Cornuelianus, d'Orb.	*id.*	Pl. 112	Martinii, d'Orb.	*id.*	Pl. 58
Crassicostatus, d'Orb.	*id.*	Pl. 59	Matheroni, d'Orb.	*id.*	Pl. 48
*Deshayesi, Leym.	*id.*	Pl. 85	Nisus, d'Orb.	*id.*	Pl. 55
Dufrenoyi, d'Orb.	*id.*	Pl. 33	Pretiosus, d'Orb.	*id.*	Pl. 58
Duvalianus, d'Orb.	*id.*	Pl. 50	*Raresulcatus, Leym.	*id.*	Pl. 85
Emerici, Raspail.	*id.*	Pl. 51	Royerianus, d'Orb.	*id.*	Pl. 112
Flexisulcatus, d'Orb.	*id.*	Pl. 45	Striatisulcatus, d'Orb.	*id.*	Pl. 49
Gargasensis, d'Orb.	*id.*	Pl. 59	Strangulatus, d'Orb.	*id.*	Pl. 49

(1) Les espèces précédées d'un astérisque (*) sont celles sur lesquelles il peut me rester quelques doutes, comme appartenant aux couches néoconiennes.

(2) Les espèces suivies d'un astérisque ont été indiquées dans le texte et les planches

On voit, en résumé, que les Ammonites du terrain néocomien se divisent en deux époques bien distinctes, contenant des espèces différentes, et que la décroissance de nombre, que j'ai signalée aux étages, se montre même dans les époques, puisque les couches supérieures contiennent beaucoup moins d'espèces que les couches inférieures. Jusqu'à présent, je ne connais aucune espèce des terrains néocomiens, se trouvant simultanément dans les terrains jurassiques, et aucune ne passe des marnes ou de l'argile à plicatules, la partie la plus supérieure des terrains néocomiens, aux couches les plus inférieures du gault. Je n'ai même trouvé, sur aucun point, de lieu où ces couches ne soient parfaitement distinctes et séparées par des sables; elles contiennent toujours leurs espèces propres; ainsi, toutes les espèces que je viens de citer sont caractéristiques des terrains néocomiens.

2e Étage. *Gault ou grès vert inférieur.*

Les *quarante-deux* espèces d'Ammonites du gault ou grès vert inférieur, pourraient également se diviser en deux séries, l'une appartenant toujours aux couches les plus inférieures, l'autre aux couches les plus supérieures; mais ces divisions sont loin d'être aussi tranchées que celles des terrains néocomiens, puisqu'on trouve quelquefois des mélanges des deux séries, ce qui ne paraît pas avoir lieu dans les terrains néocomiens. Il est vrai qu'ici la puissance des couches n'est jamais aussi grande, et les remaniemens y sont beaucoup plus fréquens. Quoi qu'il en soit, voici les espèces divisées en couches supérieures et inférieures :

de ma Paléontologie comme étant du gault. Je me suis positivement assuré, depuis, dans une course dans les départemens de l'Aube et de la Haute-Marne, qu'elles sont toutes du terrain néocomien supérieur, ou de l'époque des Ammonites de Gargas, près d'Apt, qui, en Provence, est la même que l'argile à plicatules de la Haute-Marne et de l'Aube.

Espèces d'Ammonites propres aux couches inférieures.

Ammonites.			Ammonites.		
Archiacianus, d'Orb.	*Paléont. fr.*	Pl. 70	Milletianus, d'Orb.	*Paléont. fr.*	Pl. 77
Auritus, Sowerby	*id.*	Pl. 65	Mosensis, d'Orb.	*id.*	Pl. 67
Bicurvatus, Michelin.	*id.*	Pl. 84	Nodosocostatus, d'Orb.	*id.*	Pl. 75
Bouchardianus, d'Orb.	*id.*	Pl. 88	Puzosianus, d'Orb.	*id.*	Pl. 78
Cristatus, Deluc.	*id.*	Pl. 88	Quercifolius, d'Orb.	*id.*	Pl. 83
Denarius, Sowerby.	*id.*	Pl. 62	Raulinianus, d'Orb.	*id.*	Pl. 68
Fissicostatus, Phillips.	*id.*	Pl. 76	Regularis, Bruguières.	*id.*	Pl. 71
Fittoni, d'Archiac.	*id.*	Pl. 64	Splendens, Sowerby	*id.*	Pl. 63
Guersanti, d'Orb.	*id.*	Pl. 67*	Tardefurcatus, Leymerie	*id.*	Pl. 71
Lautus, Sowerby.	*id.*	Pl. 64	Tuberculatus, Sowerby	*id.*	Pl. 66
Michelinianus, d'Orb.	*id.*	Pl. 69			

Espèces d'Ammonites propres aux couches supérieures.

Ammonites.			Ammonites.		
Alpinus, d'Orb.	*Paléont. fr.*	Pl. 83	*Latidorsatus, Mic.	*Paléont. fr.*	Pl. 80
Beudanti, Brongniart.	*id.*	Pl. 33.34	Lyelli, Leymerie	*id.*	Pl. 74
Brottianus, d'Orb.	*id.*	Pl. 85	Mammillaris, Schloth.	*id.*	Pl. 72.73
Camatteanus, d'Orb.	*id.*	Pl. 69	*Mayorianus, d'Orb.	*id.*	Pl. 79
Clementinus, d'Orb.	*id.*	Pl. 75	Parandieri, d'Orb.	*id.*	Pl. 38
Delaruei, d'Orb.	*id*	Pl. 87	Roissyanus, d'Orb.	*id.*	Pl. 89
Dupinianus, d'Orb.	*id.*	Pl. 81	Senequierianus, d'Orb.	*id.*	Pl. 86
Hugardianus, d'Orb.	*id.*	Pl. 86	Varicosus, Sowerby	*id.*	Pl. 87
*Inflatus, Sowerby. (1)	*id.*	Pl. 90	Velledæ, Michelin	*id.*	Pl. 82
Interruptus, Bruguières	*id.*	Pl. 31.32	Versicostatus, Michelin	*id.*	Pl. 81
Ilierianus, d'Orb.	*id.*	Pl. 112			

Les espèces du gault, comme celles du terrain néocomien, sont divisées en deux faunes, l'une supérieure, l'autre inférieure, mais bien moins séparées. On trouve quelquefois les mêmes espèces dans ces deux couches, lorsqu'elles appartiennent à des bassins différens, et je pourrais surtout citer quelques espèces propres aux deux, les unes pourtant plus communes dans les couches inférieures, qui paraissent leur être spéciales (*A. Denarius, Cristatus*), les autres plus particulièrement spéciales aux couches supérieures, où elles sont bien plus nombreuses (*A. Mammillaris, Beudanti, Dupinianus*).

J'ai déjà dit qu'aucune espèce des terrains néocomiens ne s'était jusqu'à présent trouvée, parmi les espèces du gault. Il en

(1) Les espèces marquées d'une astérisque sont les plus supérieures de toutes, et les seules qui se soient trouvées mélangées aux Ammonites de l'étage de la craie chloritée.

est de même de celles-ci, que je n'ai jamais rencontrées dans les couches néocomiennes. Si maintenant je cherche, dans l'étage des craies chloritées, les espèces du gault qui pourraient s'y être mélangées, j'aurai à noter trois exemples bien positifs, l'*A. latidorsatus*, *Mayorianus*, *Inflatus*. La première se trouvant mélangée avec des espèces de la craie chloritée, à Cassis (Bouches-du-Rhône), au cap la Hève, près du Havre (Seine-Inférieure); la seconde, qui est dans le même cas, à Cassis et à Vergons (Basses-Alpes), et la troisième également à Montblainville (Meuse). Il y aurait donc, dans le gault, trois espèces, parmi les plus supérieures seulement, qui se rencontreraient quelquefois avec des Ammonites d'un étage plus supérieur encore. Je reviendrai sur ce sujet, en cherchant à expliquer ce mélange accidentel; j'espère n'en pas moins démontrer, d'une manière positive, que toutes les espèces sont bien caractéristiques de leur étage.

3e Étage. *Craie chloritée, ou grès vert supérieur.*

Sur les *vingt-sept* espèces d'Ammonites de la craie chloritée, la craie tufau, ou grès vert supérieur, toutes appartiennent aux couches inférieures, les couches supérieures, ou la craie blanche, ne contenant plus d'Ammonites. Dans la partie inférieure de la craie, il y a pourtant encore des espèces qu'on trouve toujours dans les premières couches, et d'autres toujours dans les dernières. Le nom des espèces suit;

Ammonites.			Ammonites.		
Beaumontianus, d'Orb.	*Pal. fr.*	Pl. 98	Papalis, d'Orb.	*Paléont. fr.*	Pl. 109
Bravaisianus, d'Orb.	*id.*	Pl. 91	Peramplus, Sowerby	*id.*	Pl. 100
Carolinus, d'Orb.	*id.*	Pl. 91	Prosperianus, d'Orb.	*id.*	Pl. 100
Catillus, Sowerby	*id.*	Pl. 97	Renauxianus, d'Orb.	*id.*	Pl. 27
Deverianus, d'Orb.	*id.*	Pl. 100	Requienianus, d'Orb.	*id.*	Pl. 93
Falcatus, Mantell.	*id.*	Pl. 99	Rhotomagensis, Defrance	*id.*	Pl. 105.106
Feraudianus, d'Orb.	*id.*	Pl. 96	Rusticus, Sowerby	*id.*	Pl. 111
Fleuriausianus, d'Orb.	*id.*	Pl. 107	Sartousianus, d'Orb.	*id.*	Pl. 94
Goupilianus, d'Orb.	*id.*	Pl. 94	Tricarinatus, d'Orb.	*id.*	Pl. 91
Lafresnayeanus, d'Orb.	*id.*	Pl. 97	Varians, Sowerby.	*id.*	Pl. 92
Largilliertianus, d'Orb.	*id.*	Pl. 95	Verneuilianus, d'Orb.	*id.*	Pl. 98
Lewesiensis, Sowerby.	*id.*	Pl. 101.102	Vibrayeanus, d'Orb.	*id.*	Pl. 96
Mantellii, Sowerby	*id.*	Pl. 103.104	Woolgari, Sowerby	*id.*	Pl. 108
Pailletteanus, d'Orb.	*id.*	Pl. 102			

Si l'ensemble des espèces ne peut être divisé par époque, je puis pourtant dire que j'ai toujours rencontré l'*A. Mantellii* dans les couches les plus inférieures de cet étage, tandis que l'*A. Rhotomagensis* paraît en occuper les couches moyennes; et j'ai remarqué qu'on ne trouvait que très rarement ces deux espèces ensemble. Dans les parties de la France où la craie chloritée a un grand développement (le sud-ouest, par exemple), les Ammonites ne disparaissent pas avec les derniers dépôts de la partie inférieure de cet étage, mais bien dans les couches moyennes supérieures, les dernières ne contenant plus aucune trace d'Ammonites. Ainsi aucune espèce ne passe jusqu'à la craie blanche, où les Ammonites ne paraissent pas avoir existé. Jusqu'à présent, aucune espèce de la craie chloritée ne s'étant trouvée dans les couches du gault, il est certain que toutes les espèces que j'ai citées dans ce troisième étage sont bien caractéristiques, et peuvent servir à le faire distinguer, sous quelque aspect minéralogique qu'il se présente.

RÉSUMÉ.

En résumé, après la disparition complète des Ammonites des terrains jurassiques, on voit naître à la surface du globe, à la première époque des terrains néocomiens, *cinquante-trois* espèces tout-à-fait différentes des espèces ensevelies dans la formation précédente. On voit ces espèces disparaître peu-à-peu, pendant la durée des terrains néocomiens, jusqu'à la période supérieure, où elles sont remplacées par *vingt-deux* espèces bien distinctes des premières, qui, elles-mêmes, ne survivent pas aux derniers dépôts néocomiens. Avec les premières couches du gault inférieur, il naît bien vingt-deux espèces d'Ammonites; mais ces espèces ne ressemblent en rien à celles des terrains néocomiens supérieurs. Elles sont spécifiquement distinctes, et pourvues de caractères tout-à-fait disparates. De même que pour les espèces néocomiennes, celles du gault s'anéantissent successivement, et sont encore, aux parties supérieures, remplacées par vingt-deux espèces bien caractérisées dont aucune ne survit à l'époque des dernières couches du gault. On voit de nou-

veau naître, avec l'étage des craies chloritées, une série d'Ammonites bien différentes de celles des terrains néocomiens et du gault, et qui s'en distingue par des formes particulières; puis enfin, celles-ci disparaissent tout-à-fait dans les couches moyennes supérieures, en même temps que les Ammonites s'effacent pour toujours de la surface du globe. Les Ammonites des terrains crétacés sont donc nées à cinq époques successives, dont trois surtout présentent, chaque fois, après l'anéantissement complet des espèces qui existaient, l'arrivée de nouvelles séries bien distinctes des premières. On peut dire, en conséquence, que les terrains crétacés, non-seulement se divisent en trois étages géologiques bien tranchés, mais encore que ces trois étages se subdivisent chacun en deux séries de couches, les unes inférieures, les autres supérieures, ayant chacune leurs espèces particulières. Ce résultat des plus importans, auquel je suis arrivé après avoir comparé des milliers d'Ammonites de toutes les parties de la France, et avoir vérifié la superposition des couches, prouve évidemment qu'il n'existe pas *quelques coquilles isolées, caractéristiques des terrains*, comme on l'a dit jusqu'à présent, mais que toutes les espèces du genre Ammonite, sans exception, *sont caractéristiques*, que toutes peuvent indiquer positivement le terrain auquel elles se rapportent, et ne laisser aucun doute sur leur application, quand elle sera faite avec critique et avec la connaissance parfaite des espèces.

Il me reste à expliquer pourquoi quelques espèces peuvent se trouver avec celles d'un étage supérieur à celui qu'elles caractérisent, afin de détruire tous les doutes qu'on pourrait élever à leur égard. Je remonterai un peu haut pour développer mon opinion, qui se rattache à d'autres considérations générales d'une grande importance.

Les Ammonites, à n'en pas douter, étaient des animaux pélagiens, vivant au sein des mers, et ayant probablement les mêmes manières de vivre que les Nautiles, dont elles différaient néanmoins par beaucoup de caractères intérieurs, et principalement par les divisions du bord postérieur de leur manteau; mais elles avaient ce caractère commun avec les Nautiles, qu'

mesure qu'elles grandissaient, pour compenser le poids qu'acquérait l'animal, celui-ci remplissait d'air une loge de plus au moyen d'une cloison, afin de rétablir l'équilibre, comme je l'ai dit aux caractères zoologiques. Il en résultait qu'à la mort de l'animal, la coquille, remplie d'air dans ses cloisons, ne tombait jamais au fond des eaux; mais, comme les coquilles des Nautiles et de la spirule, elle était transportée à leur surface par les courans et les vents, et jetée ensuite sur la côte. Cette propriété de surnager dont la coquille est douée, vient résoudre deux questions: l'une zoologique, l'autre géologique.

La première consiste dans l'opinion qu'il peut encore exister des Ammonites vivantes au sein des mers actuelles. Je répondrai négativement par ce seul fait de la nature de la coquille. Si les Ammonites vivaient encore, comme la coquille ne pourrait tomber au fond des mers par suite de l'air qu'elle contient, elle serait indubitablement jetée sur quelque côte, comme le sont les Nautiles et les spirules, et elle ne saurait manquer d'être rencontrée par les innombrables collecteurs de coquilles, répandus depuis des siècles sur toutes les parties du monde. Il faut donc renoncer pour toujours à l'espoir de trouver des Ammonites vivantes.

La seconde question est de pure application à ce qu'on observe dans les couches à fossiles. Les coquilles des Ammonites surnageant à la surface des eaux, ont été transportées ainsi jusqu'aux côtes des mers de l'époque où elles vivaient, et n'ont pu, dès-lors, se déposer au milieu de ces mêmes mers, où avaient lieu les principaux dépôts.

Cette supposition explique pourquoi le nombre des Ammonites, qu'on rencontre dans les différens bassins, est en raison inverse de la puissance des bancs, les plus épais ne contenant que peu d'Ammonites, tandis que les plus minces en renferment bien davantage. Elle explique encore pourquoi l'on trouve ordinairement beaucoup plus d'Ammonites au pourtour d'un bassin géologique quelconque que dans son milieu, les coquilles étant toujours jetées sur le littoral. Lorsqu'on rencontre seulement des Ammonites adultes isolées dans une couche, on doit supposer que cette couche s'est formée, lorsque la faune

de cette époque était en pleine vie, tandis que les amas d'Ammonites de tous les âges, qu'on remarque dans certains lieux doivent provenir de causes générales qui ont pu détruire tous les individus d'une espèce et les jeter ensemble à la côte, causes inconnues, mais puissantes, dans lesquelles il faut évidemment chercher les motifs : 1° de l'extinction des espèces d'une faune entière, 2° de leur remplacement par des espèces caractérisant une autre faune, 3° de la séparation des formations, des étages de ces formations, et de la distinction des couches propres aux étages des différens terrains contenant des faunes particulières.

De la coquille, surnageant à la surface des eaux, naît enfin l'explication des Ammonites, des couches inférieures, qui se trouvent dans les couches supérieures, sans avoir pourtant vécu simultanément. Je suppose que des Ammonites se soient déposées sur les côtes des mers vers la fin d'une époque géologique quelconque, et qu'elles s'y soient peu-à-peu recouvertes des matières étrangères qui composent ordinairement les couches. Si, de l'instant où elles se sont déposées jusqu'à l'instant où une autre faune commence à naître, il s'est passé assez de temps pour que les loges des Ammonites se soient, par suite d'une action chimique, remplies, soit de carbonate de chaux, soit de sulfure de fer, comme on l'observe souvent, soit encore de matières étrangères par suite des fractures du test, la coquille restera dans ces couches à l'état de roche, et ne surnagera plus à la surface ; mais, au contraire, s'il n'y a pas eu plus de temps ni plus d'altération qu'entre notre époque et celle des fossiles tertiaires de l'âge de Grignon ou de Dax, les Ammonites auront encore leurs loges pleines d'air ; les couches détruites par une dénudation mettront, de nouveau les coquilles d'Ammonites à flot : elles viendront se déposer simultanément avec celles qui vivent à cette seconde époque, et alors il y aura mélange d'espèces de deux faunes, sans que pourtant ces espèces aient vécu ensemble. C'est ainsi que je m'explique la réunion de quelques espèces, toujours les plus supérieures d'une faune avec les espèces les plus inférieures d'une autre, postérieure à celle-ci. Ces explications satisfont avec d'autant plus de raison pour les espèces du gault, que j'ai citées, que ce

mélange n'arrive que lorsque l'étage inférieur n'existe plus et a été détruit par une dénudation, comme on le voit à Cassis, à Vergons et près du Havre, où le gault n'existe pas et a été complètement anéanti par une cause inconnue.

Lorsqu'on voit les Ammonites plus susceptibles que les autres Mollusques, par la légèreté de leur coquille, d'être transportées d'une couche à l'autre, appartenir pourtant à des époques bien tranchées, on doit attacher plus d'importance à leur distribution qu'à celle des autres genres; car elle prouve évidemment qu'entre chacune des époques géologiques, où les Ammonites ont vécu, il s'est passé assez de temps pour que leur coquille ait perdu la propriété de surnager à la surface des mers, à moins qu'à cette époque, l'action chimique fût beaucoup plus intense qu'elle ne l'est depuis la période tertiaire jusqu'à notre époque, où cette action n'est plus générale. Dans tous les cas, les Ammonites, appartenant aux animaux les plus parfaits des Mollusques, offrent par ce motif et par la fragilité de leur coquille, plus de garanties pour leur distribution géologique que les autres coquilles infiniment plus susceptibles d'être remaniées dans les couches.

§ 3. *Rapport des caractères zoologiques des Ammonites avec les différentes époques géologiques auxquelles elles ont vécu.*

J'ai dit que toutes les espèces d'Ammonites, de chaque étage de terrain, pouvaient être considérées comme caractéristiques. Il me reste maintenant à chercher si, parmi ces espèces, il est des groupes de formes plus ou moins particuliers à ces étages et susceptibles de prouver, plus que des espèces isolées, les changemens qui se sont opérés aux différentes époques, tout en donnant aussi aux géologues de nouveaux moyens de distinguer zoologiquement ces mêmes époques.

Si, avant de puiser, dans l'ensemble des formes extérieures et intérieures des Ammonites, des caractères positifs de groupes, je cherche, dans les accidens purement extérieurs, un facies plus général, qui puisse faire distinguer l'ensemble des formes des Ammonites de chaque étage, je trouverai les résultats suivans:

1° Parmi les Ammonites du terrain néocomien, un caractère

extérieur, qui frappe et appartient surtout à cet étage est la présence, chez trente Ammonites sur soixante-quinze, de sillons ou de côtes transverses, qui viennent représenter, de distance en distance, sur chaque tour de spire, les différens points d'arrêt des anciennes couches. En effet, ce caractère remarquable est bien marqué chez les Ammonites dont les noms suivent :

A. Belus.	A. Honnoratianus.	A. Rarèsulcatus.
Calypso.	Inæqualicostatus.	Royerianus.
Cassida.	Incertus.	Semisulcatus.
Cesticulatus.	Intermedius.	Seranonis.
Difficilis.	Juilleti.	Strangularis.
Dispar.	Lepidus.	Striatisulcatus.
Duvalianus.	Ligatus.	Subfascicularis.
Emerici.	Matheroni.	Subfimbriatus.
Flexisulcatus.	Ophiurus.	Tortisulcatus.
Guettardi.	Quadrisulcatus.	Terverii.

On voit que ce caractère est surtout saillant dans le terrain néocomien, tandis qu'il existe à peine sur quelques espèces des terrains jurassiques. Dans le gault, il ne se montre plus que chez quatre espèces (*A. Mayorianus*, *Latidorsatus*, *Parandieri* et *Dupinianus*); ainsi l'on peut dire que la forme extérieure dominante et la plus particulière au terrain néocomien est celle de ces points d'arrêt.

2° Au milieu des formes diverses si variées des Ammonites du gault ou grès vert inférieur, où les ornemens extérieurs sont très saillans, on remarque un caractère plus général que tous les autres : c'est la présence, de chaque côté du dos, d'une rangée de saillies plus ou moins tuberculeuses, formées par les côtes, qui, alternes ou paires, y sont ou non interrompues. Je trouve ce caractère chez vingt-sept Ammonites sur quarante-deux ; beaucoup plus de la moitié du nombre total.

A. Archiacianus.	A. Hugardianus.	A. Nodosocostatus.
Auritus.	Inflatus.	Puzosianus.
Brottianus.	Itierianus.	Quercifolius.
Camatteanus.	Interruptus.	Raulinianus.
Cristatus.	Lautus.	Regularis.
Delaruei.	Mammillaris.	Splendens.
Denarius.	Michelinianus.	Tardèfurcatus.
Fittoni.	Milletianus.	Tuberculatus.
Guersanti.	Mosensis.	Verrucosus.

Quoique ce caractère ne soit pas spécial au gault, puisque je le retrouve sur beaucoup d'espèces des terrains néocomiens et sur quelques-unes de la craie chloritée, j'ai cru devoir l'indiquer comme le plus général parmi les Ammonites du gault.

3° Un caractère plus rare dans les autres terrains vient se montrer surtout chez les Ammonites de la craie chloritée ou grès vert supérieur: c'est celui de plusieurs rangées latérales, et souvent d'une rangée médiane de tubercules, placées sur les côtés ou sur le dos. On le voit dans les espèces suivantes, chez quinze Ammonites sur vingt-sept; un peu plus de la moitié.

A. Bravaisianus.	A. Lafresnayeanus.	A. Rusticus.
Carolinus.	Mantelli.	Varians.
Deverianus.	Papalis.	Verneuilianus.
Fleuriausianus.	Renauxianus.	Vertebralis.
Falcatus.	Rhotomagensis.	Woolgari.

On peut donc signaler ces rangées de tubercules comme caractérisant la plus grande partie des Ammonites des craies chloritées.

En résumé, comme caractères dominans dans chacun des étages des terrains crétacés, les formes purement extérieures donnent aux terrains néocomiens les points d'arrêt; au gault, deux rangées de saillies près du dos; aux craies chloritées, plus de deux rangées de saillies près du dos.

En appliquant des caractères plus certains et plus tranchés, résultant de la réunion simultanée des formes extérieures et intérieures, je trouve les groupes d'Ammonites dont j'ai parlé aux généralités zoologiques, divisés par terrains, ainsi qu'il suit:

1re *division.* Groupes étrangers aux terrains crétacés, et propres aux terrains jurassiques.

Les Arietes de Buch, propres au lias inférieur.
Les Falciferi de Buch, propres au lias supérieur.
Les Amalthei de Buch, propres aux différentes couches jurassiques.
Les Ornati de Buch, propres à l'*Oxford-clay*.
Les Capricorni de Buch, des terrains jurassiques ou oolitiques.
Les Coronari de Buch, propres à l'oolite inférieure.
Les Armati de Buch, propres aux couches supérieures des terrains jurassiques.

2^e^ *division.* Groupes contenant, en même temps, des espèces propres aux terrains oolitiques ou jurassiques, et aux terrains crétacés.

Les Heterophylli d'Orbigny, propres au lias supérieur dans les terrains jurassiques, existent dans les terrains crétacés, seulement à l'étage néocomien inférieur et au gault. Les espèces, tout en se trouvant dans deux formations à-la-fois, se distinguent néanmoins très nettement; les espèces du terrain jurassique par leurs selles, formées de parties impaires; les espèces des terrains crétacés par leurs selles, formées de parties paires.

Les Macrocephali de Buch, sont propres aux terrains jurassiques et se trouvent encore, mais en très petit nombre, dans les couches crétacées les plus inférieures (le néocomien inférieur) les plus rapprochées de l'époque où l'ensemble du groupe vivait.

Les Fimbriati d'Orb., dont il existe à peine deux espèces dans le terrain jurassique inférieur, tandis qu'il y en a, dans le terrain néocomien seulement, douze espèces ne passant pas aux étages superieurs des terrains crétacés.

Les Planulati de Buch. Ce groupe, propre au terrain jurassique, m'a fourni trois espèces dans l'étage néocomien des terrains crétacés.

3^e^ *division.* Groupes spéciaux aux terrains crétacés.

Les Cristati d'Orb. se trouvant en très petit nombre dans les terrains néocomiens, au maximum dans le gault, et réduits à une seule espèce, même différente de caractère, dans la craie chloritée. Ce groupe est donc plus particulièrement propre au gault.

Les Tuberculati d'Orb., inconnus au terrain néocomien, à leur maximum dans le gault inférieur et réduits à une seule espèce dans la craie chloritée.

Les Clipeiformes d'Orb., se trouvant dans les trois étages des terrains crétacés.

Les Pulchelli d'Orb., appartenant aux étages néocomien et du gault.

Les Rhotomagenses d'Orb., spéciaux à la craie chloritée, la seule espèce du gault qui s'y rapporte, ayant des caractères différens des autres espèces.

Les Dentati de Buch, propres seulement aux étages néocomien et du gault, inconnus dans la craie chloritée: ils sont surtout nombreux dans le gault.

Les Flexuosi de Buch ne se trouvant que dans l'étage néocomien inférieur.

Les Compressi d'Orb. En très petit nombre dans l'étage néocomien et dans le gault : ils sont à leur maximum de nombre dans l'étage de la craie chloritée.

Les Angulicostati d'Orb. Propres à l'étage néocomien et au gault.

Les Ligati d'Orb. Les espèces en sont très nombreuses, surtout aux étages néocomien et du gault : elles le sont très peu dans la craie chloritée.

On voit, dès-lors, que, sur *vingt-et-un* groupes que font admettre les caractères zoologiques,

1° *Sept* sont spéciaux aux terrains oolitiques ou jurassiques ;

2° *Dix* sont propres aux terrains crétacés ;

3° *Quatre* contiennent en même temps des espèces des deux terrains.

Quelques détails encore avant de me résumer.

Sur les dix groupes propres aux terrains crétacés, quatre (les CRISTATI, les CLYPEIFORMES, les COMPRESSI et les LIGATI) se trouvent dans les trois étages, mais le premier plus particulier au gault, le troisième plus particulier aux craies chloritées ; le dernier, au contraire, plus particulier aux deux étages inférieurs. Trois groupes (les PULCHELLI, les DENTATI, les ANGULICOSTATI) ne se trouvent que dans les deux étages inférieurs, le terrain néocomien et le gault. Deux groupes (les TUBERCULATI et RHOTOMAGENSES) existent, au contraire, dans les deux étages supérieurs, le gault et la craie chloritée, le premier plus spécial au gault, le second propre à la craie chloritée. Après ces distinctions, il reste un groupe, les FLEXUOSI, propre seulement au terrain néocomien inférieur. On voit donc que, si quelques-uns des groupes sont plus ou moins largement répartis sur deux ou trois étages, ils paraissent néanmoins caractériser plus particulièrement tel ou tel.

Sur les quatre groupes contenant, en même temps, des espèces propres aux terrains jurassiques et crétacés, l'un, les HETEROPHYLLI se compose d'espèces dont les caractères sont différens suivant ces terrains, et peuvent toujours les faire reconnaître. Deux autres, les MACROCEPHALI et les PLANULATI, sont spéciaux aux terrains jurassiques ; et, s'ils contiennent quelques espèces dans les terrains crétacés, elles sont peu certaines, puisque je n'ai pu en voir les lobes, et se rencontrent toutes dans l'étage le plus inférieur qui est en contact avec le terrain jurassique ; dernières traces de ces mêmes formes, indiquant que la nature n'a pas voulu, dans ce cas, procéder brusquement, comme elle l'a fait dans presque tous les autres groupes. Il me reste le groupe des FIMBRIATI, qui, comme on le voit par les espèces, est plus

particulier à l'étage néocomien. Il est à remarquer, du reste, que pour tous les groupes qui contiennent, en même temps, des espèces des deux terrains, ces espèces appartiennent toujours aux étages inférieurs des terrains crétacés, et jamais à l'étage supérieur.

De tout ce qui précède, exposé fidèle des faits que j'ai pu observer sur les Ammonites, je crois qu'on peut tirer les conséquences suivantes, qui sont d'un haut intérêt dans l'ordre de succession des êtres à la surface du globe, et dans l'application de leurs formes à la reconnaissance des terrains:

1° Il existe des limites tranchées entre les faunes propres à chaque formation ou terrain, puisqu'aucune des espèces d'Ammonites ne passe des terrains jurassiques aux terrains crétacés.

2° Il existe, à chaque grande époque géologique, non-seulement des espèces distinctes, mais des séries de formes zoologiques spéciales le plus souvent tranchées, comme on peut le voir dans la distribution des groupes par terrain.

3° Ce changement de forme dans la succession des êtres est d'autant plus marqué, qu'il a lieu entre des époques plus importantes; il y a plus de différences entre les formes propres aux terrains jurassiques et crétacés, qu'il n'y en a, par exemple, entre les différens étages des terrains crétacés eux-mêmes.

4° Les affinités qu'on remarque entre les groupes d'espèces des étages du terrain crétacé, prouvent évidemment, non-seulement que ces étages appartiennent à l'une des grandes coupes géologiques, mais qu'ils se séparent nettement, sous ce rapport d'affinité, des étages des terrains jurassiques, qui ont aussi leurs caractères généraux spéciaux; ainsi, les terrains crétacés constituent bien une *formation*, un *terrain* distinct des terrains jurassiques.

5° Les différens étages des terrains crétacés, tout en offrant des affinités et des passages réciproques de groupes d'Ammonites, ont cependant des formes extérieures distinctes, la nature ayant, à chaque époque, varié ses productions, et leur ayant donné un *facies* d'ensemble facile à saisir.

6° Les différens étages, indépendamment du facies général ont, ou des groupes spéciaux de formes, ou, du moins, un

nombre dominant d'espèces de ces groupes qui peuvent presque toujours les faire reconnaître.

7° Dans tous les cas, les espèces d'Ammonites sont entièrement distinctes par terrain, et suivant les étages de ces terrains, et toutes peuvent servir à les distinguer nettement les uns des autres, sous quelque forme minéralogique qu'elles s'y présentent.

CHAPITRE III.

CONSIDÉRATIONS GÉOLOGICO-GÉOGRAPHIQUES.

Dans les deux chapitres précédens, il a été question des caractères zoologiques des espèces, de la distribution de ces espèces par terrains et suivant les étages de ces terrains; maintenant je me propose de traiter l'ensemble des formes, suivant leur distribution géographique au sein des bassins qui constituaient les mers de l'époque des terrains crétacés ou les différens golfes de ces mers, qui paraissent avoir eu des faunes plus ou moins distinctes, se rapportant aux mêmes époques. Les considérations dans lesquelles je suis entré à l'égard des Céphalopodes acétabulifères existant aujourd'hui (1), prouvent qu'indépendamment des espèces communes aux différens bassins maritimes, il existe, en ce moment, dans chaque mer, un certain nombre d'espèces propres à chacune d'elles. Cherchons à reconnaître, en réunissant tous les faits, s'il en était ainsi à l'époque des mers anciennes.

Pour procéder méthodiquement, je vais passer successivement en revue les différens étages géologiques, et comparer entre eux les bassins, ou les golfes de ces bassins qui existaient alors, par rapport aux espèces qui vivaient dans chacun d'eux.

1er ÉTAGE, NÉOCOMIEN.

L'étage néocomien a été observé, jusqu'à présent, dans le

(1) Voyez Annales des Sciences naturelles, juillet 1841.

bassin provençal et du *Dauphiné* (1), formé des départemens du Gard, des Bouches-du-Rhône, du Var, des Hautes et Basses-Alpes, de Vaucluse, de la Drôme et de l'Isère. Il a encore été observé dans le *bassin de la Seine* ou *bassin parisien*, dans les départemens de l'Aube, de la Haute-Marne, de l'Yonne et de la Meuse. Il se trouve aussi sur plusieurs points du Jura, dans le département du Doubs, près de Neuchâtel en Suisse, et dans la Savoie. Je vais donner successivement, pour chacune de ces trois divisions géographiques, la liste des espèces qu'on y rencontre.

Étage néocomien du bassin provençal et du Dauphiné.

Couches inférieures.

A. Angulicostatus.
* Asperrimus. (2)
* Astierianus.
Calypso.
Carteroni.
Cassida.
Castellanensis.
Clypeiformis.
Compressissimus.
Cryptoceras.
Cultratus.
Didayanus.
Difficilis.
Diphyllus.
Dispar.
Fascicularis.
* Grasianus.
A. Heliacus.
Helius.
Honnoratianus.
Inæqualicostatus.
Incertus.
Infundibulum.
Intermedius.
Ixion.
Jeannoti.
* Juilleti.
Leopoldinus.
Lepidus.
Ligatus.
Macilentus.
Morelianus.
* Neocomiensis.
Ophiurus.
A. Picturatus.
Pulchellus.
* Quadrisulcatus.
Radiatus.
Recticostatus.
Rouyanus.
* Semistriatus.
Semisulcatus.
Seranonis.
Simplus.
Sinuosus.
Subfascicularis.
Subfimbriatus.
Terverii.
Thetys.
Torti sulcatus.
* Verrucosus.

Couches supérieures.

A. Belus.
Consobrinus.
Crassicostatus.
Dufrenoyi.
Duvalianus.
Emerici.
A. Flexisulcatus.
Gargasensis.
Guettardi.
Impressus.
Inornatus.
Martinii.
A. Matheroni.
Nisus.
Pretiosus.
Strangulatus.
Striati sulcatus.

(1) Je donne ici la circonscription de ces bassins, me servant à l'avenir, pour l'un et pour l'autre, seulement du titre souligné.

(2) Les espèces précédés d'une * sont des Hautes-Alpes, de Saint-Julien-Beauchêne, et m'ont été communiquées par M. Rouy de Gap : elles n'ont pu être citées aux espèces.

Étage néocomien du bassin parisien.

Couches inférieures.

A. *m* Bidichotomus (1) *a*
m Difficilis.
Cryptoceras. *a*
A. *m* Leopoldinus. *a*
m Radiatus. *a*

Couches supérieures.

A. Cesticulatus. *a*
m Cornuelianus.
m Deshayesi. *a*
A. *m* Nisus. *a*
m Rarésulcatus. *a*
m Royerianus.

Étage néocomien du Jura.

Couches inférieures.

A. *b* Astierianus. (2) *
b Cryptoceras.
b Carteroni.
b Castellanensis.
A. *b* Gevrilianus.
Leopoldinus. *
b Radiatus. *

Couches supérieures.

A. Deshayesi.

Par tout ce qui précède, on peut voir que le bassin pyrénéen et du sud-ouest de la France n'a pas montré, jusqu'à présent, de terrain néocomien ; qu'il en est de même du golfe de la Loire et des parties nord de la France, où les autres étages crétacés sont si développés. Si maintenant on compare entre elles les trois faunes locales que je viens de signaler dans l'étage néocomien, on trouvera qu'elles se composent, jusqu'à présent, au bassin provençal, de 68 espèces; au bassin de la Seine, de 11 espèces ou d'un peu plus du sixième du nombre; et au Jura,

(1) Les espèces d'Ammonites précédées d'un *m* sont du département de la Haute-Marne; elles ont été recueillies par MM. Cornuel et Royer. Je cite ici ces messieurs, n'ayant pu les indiquer dans le texte de ma Paléontologie.

Les espèces suivies d'un *a* sont des départemens de l'Aube et de l'Yonne.

(2) Les espèces précédées d'un *b* sont du département du Doubs et m'ont été communiquées par MM. Carteron, Gevril et Parandier.

Les espèces suivies d'une * sont des environs de Neuchâtel.

de 8 espèces, ou de moins du huitième de l'ensemble du bassin provençal. Ces simples données de chiffres, sans avoir égard aux formes, devraient prouver, soit un plus grand développement dans l'époque néocomienne de Provence, soit une faune distincte, indiquée par le grand nombre d'espèces. Je crois que l'un et l'autre existent en effet, et les espèces pourront le démontrer, par la comparaison suivante des trois localités.

1° Dans le bassin provençal, je trouve, au sein des couches inférieures du terrain néocomien, *cinquante-et-une espèces*, sur lesquelles *quatre*, les *A. Difficilis*, *Leopoldinus*, *Cryptoceras* et *Radiatus*, existent également dans le bassin parisien, et *six*, les *A. Astierianus*, *Cryptoceras*, *Carteroni*, *Castellanensis*, *Leopoldinus* et *Radiatus*, dans le Jura. Il en résulte qu'il reste encore, après ces espèces communes, quarante-quatre espèces jusqu'à présent spéciales au bassin provençal, dans les couches inférieures de l'étage néocomien.

J'ai dit que je connaissais *dix-sept* espèces des couches supérieures du bassin provençal, sur lesquelles, *une* seule, l'*A. Nisus* est commune au bassin parisien, et aucune au Jura, d'où il résulte qu'il reste seize espèces spéciales au bassin provençal.

De ces faits il est impossible de ne pas conclure, qu'à l'époque inférieure et à l'époque supérieure du terrain néocomien, le bassin provençal ne fut séparé du bassin parisien, puisque, tout en présentant des espèces communes qui indiquent l'identité des couches, ou la contemporanéité des deux mers, les faunes montrent une aussi grande différence dans la composition des espèces. S'il manquait quelques couches correspondantes, on pourrait croire qu'il y a eu des parties anéanties dans le bassin parisien, tandis qu'au contraire, comme je l'ai reconnu sur les lieux, toutes les couches provençales s'y retrouvent. Les couches inférieures du système inférieur de Provence correspondent, par exemple, aux marnes bleues du département de la Haute-Marne. Les calcaires chloriteux ou compactes, contenant l'*A. Radiatus*, correspondent à l'argile et au calcaire à spatangues du même lieu, tandis que les calcaires noirâtres ou blanchâtres, contenant le *Nautilus requienianus*, correspondent à l'argile ostréenne de la Haute-Marne, et les

argiles de Gargas (Vaucluse) et de Vergons (Basses-Alpes) sont tout-à-fait les représentans de l'argile à plicatules de la Haute-Marne et de l'Aube, puisque ces différentes couches contiennent des espèces identiques et témoignent de la plus parfaite concordance. Je crois donc que le bassin provençal, à l'époque néocomienne, était séparé du bassin parisien, et qu'il a été infiniment plus favorisé sous le rapport de sa faune d'Ammonites.

2° Dans le bassin parisien, je trouve, parmi les couches inférieures du terrain néocomien, cinq espèces, sur lesquelles, comme je l'ai dit, quatre sont communes au bassin provençal, et trois (les *A. Cryptoceras*, *Leopoldinus* et *Radiatus*) existent simultanément dans le Jura. Il reste, après ces distinctions, *une* seule espèce (l'*A. Bidichotomus*) propre au bassin parisien.

Des six espèces des couches supérieures, une seule (l'*A. Nisus*) se trouve, en même temps, dans le bassin provençal, et une seule encore (l'*A. Deshayesi*) dans le Jura. Il y en a dès-lors *quatre* spéciales au bassin parisien, du département de l'Aube et de la Haute-Marne.

De même que pour le bassin Provençal on voit évidemment qu'indépendamment des espèces communes, il y a un assez bon nombre d'espèces distinctes dans le bassin Parisien, annonçant une faune différente de celle de la Provence.

3° En comparant les espèces du Jura à celles du bassin de la Provence, je trouve, dans les couches inférieures, six espèces communes; j'en trouve trois avec le bassin parisien, et seulement une (l'*A. Gevrilianus*) tout-à fait distincte. Dans les couches supérieures je n'en connais qu'une seule espèce commune au bassin parisien.

Tout en reconnaissant quelques différences entre les espèces du Jura et celles du bassin parisien, si j'en juge par les autres corps organisés qui se trouvent dans l'un et dans l'autre, il y aurait identité parfaite de faune, ce qu'on entrevoit par les espèces d'Ammonites communes; ainsi, d'après les fossiles, je considérerais le lambeau néocomien du Jura comme appartenant à la même mer que le terrain néocomien du bassin parisien.

Le résumé de l'étage néocomien est : qu'à cet *étage* des terrains crétacés en France, il existait deux bassins ou deux mers contemporaines, le bassin provençal et le bassin parisien, dont les faunes, tout en ayant plusieurs espèces communes, avaient certainement, chacune en particulier, une zoologie beaucoup plus distincte, que ne l'ont aujourd'hui, sous ce rapport, la Méditerranée et l'Océan; qu'à cette époque, soit que tout eût été enlevé proportionnellement, soit qu'il n'y eût pas de bassin aqueux dans le bassin pyrénéen actuel, et dans le golfe de la Loire, ils ne montrent, jusqu'à présent, aucune trace positive de l'étage néocomien inférieur; que ces mers, qui étaient distinctes à l'instant des premiers dépôts du terrain néocomien, se sont conservées dans les mêmes conditions, vers la fin de cet étage géologique, ce qui est parfaitement indiqué par les faunes; qu'enfin le bassin provençal contient, en même temps, un bien plus grand développement d'épaisseur des couches, que le bassin parisien, et une faune infiniment plus nombreuse en animaux pélagiens, telles que devraient l'être les Ammonites.

J'ai fait encore une autre observation générale, c'est que les couches du terrain néocomien paraissent s'être déposées tranquillement, puisque nulle part je n'ai vu de grands remaniemens, comme j'en signalerai dans l'étage du gault.

Les espèces d'Ammonites qu'on trouve réparties dans tous les bassins, sont : 1° à la couche inférieure les *A. Astierianus*, *Cryptoceras*, *Leopoldinus*, *Difficilis*, *Radiatus*; 2° à la couche supérieure l'*A. Nisus*.

2e ÉTAGE DU GAULT OU GRÈS VERT INFÉRIEUR.

Cet étage est beaucoup plus répandu en France que l'étage néocomien. On le trouve dans le bassin provençal, principalement à Escragnolle (Var) et à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Dans le bassin parisien, à Wissant (Pas-de-Calais), au Havre (Seine-Inférieure, à Beauvais (Oise) et dans les départemens de l'Aube, de l'Yonne et de la Haute-Marne. Dans le bassin du sud-ouest il est indiqué pour le département de l'Aude. Dans le Jura, la Savoie et le département de l'Ain, il est encore très étendu,

ainsi que dans les Ardennes. Voici les faunes distinctes de ces différens bassins ou localités.

Bassin provençal.

Couches inférieures.

A. Fissicostatus. * (1) — A. Milletianus. — A. Nodosocostatus.

Couches supérieures.

A. Alpinus. *
Beudanti. *
Camatteanus. *
Delaruei. *
Interruptus. *

A. Lyelli. *
Latidorsatus. *
Mammillaris. *
Majorianus. *
Parandieri. *

A. Roissyanus. *
Senequierianus. *
Versicostatus.

Bassin parisien.

Couches inférieures.

A. *c* Auritus.
c Bouchardianus.
Bicurvatus. *a*
c Denarius.
Regularis. *a*
Fissicostatus.

A. *c* Cristatus.
Tardefurcatus. *a*
c Fittoni.
c Lautus.

c Splendens.
c Tuberculatus.

Couches supérieures.

A. *c* * Beudanti. *a b*
Clementinus.
c Delaruei.
c * Dupinianus. *a*
c Inflatus. *a*

A. *c* * Interruptus. *a b*
* Lyelli. *a b.*
* Latidorsatus. *a*
c * Mammillaris. *a*
Parandieri. *a*

A. Velledæ. *a*
* Versicostatus. *a*
c Varicosus.

Gault du Jura, de l'Ain, du Doubs et de la Savoie.

Couches inférieures.

A. * Denarius, *d* (2) — A. * Fissicostatus.
* Milletianus. *d z*
Regularis. *d z* — A. Bouchardianus.

(1) Les espèces suivies d'une * sont d'Escragnolle (Var).

Les espèces précédées d'une * sont du département de la Haute-Marne : elles ont été observées par MM. Cornuel, Royer et par moi.

Les espèces suivies d'un *b* sont des environs de Beauvais.

Les espèces marquées d'un *a* sont du département de l'Aube.

Les espèces précédées d'un *c* sont de Wissant (Pas-de-Calais) et des côtes d'Angleterre.

(2) Les espèces suivies d'un *d* sont de la porte du Rhône.

Les espèces suivies d'un *z* sont de la montagne des Fis et des autres parties de la Savoie, et m'ont été communiquées par MM. de Wiegmann et Hugard.

Les espèces précédées d'une * sont du département du Doubs.

Couches supérieures.

A. * Beudanti. *d z*	A. Hierianus. *d*	A. * Mammillaris. *d z*
Brottianus. *d*	Inflatus *d z*	Mayorianus. *d z*
Cristatus. *d*	* Interruptus. *d z*	* Parandieri.
Dupinianus. *z*	* Lyelli. *z*	Varicosus. *d z*
Hugardianus. *d z*	Latidorsatus.	Velledæ. *z*

Gault des Ardennes et de la Meuse.

Couches inférieures.

A. Archiacianus.	A. Mosensis.	A. Raulinianus.
Bicurvatus.	Michelinianus.	Regularis.
Denarius.	Milletianus.	Tardèfurcatus.
Fissicostatus.	Puzosianus.	
Guersanti.	Quercifolius.	

Couches supérieures.

A. Beudanti.	A. Lyelli.	A. Velledæ.
Inflatus.	Mammillaris.	
Interruptus.	Dupinianus.	

Les différentes listes qui précèdent, montrent que l'étage du gault est plus répandu que l'étage néocomien ; pourtant il n'existe pas, jusqu'à présent, dans l'ancien golfe de la Loire, et il est peu certain dans le sud-ouest de la France, et seulement encore dans les parties qui avoisinent le plus le bassin Provençal. En comparant ces diverses faunes, comme je l'ai fait à l'étage néocomien, je trouve qu'elles se composent, dans le bassin provençal, de 16 espèces; dans le bassin de la Seine ou bassin parisien, de 25 espèces; dans le Jura et la Savoie, de 20 espèces; dans les Ardennes et la Meuse, de 20 espèces. Ces chiffres, sans avoir égard aux faunes, prouveraient une répartition à-peu-près égale d'espèces par bassin, et offriraient, dès-lors, une différence énorme entre les proportions relatives qui existent à l'étage néocomien. Je vais maintenant comparer entre elles les formes des quatre localités.

1° Au sein du bassin provençal, je reconnais dans les couches inférieures, trois espèces, dont une seule spéciale, l'*A. nodoso-costatus*, les autres se trouvant toutes dans les différens bassins; et dans les couches supérieures, treize espèces, sur lesquelles huit

sont communes au bassin parisien, sept au Jura et à la Savoie, quatre aux Ardennes et à la Meuse. Il resterait, après ces soustractions, seulement quatre espèces (les *A. Alpinus*, *Camatteanus*, *Roissyanus* et *Senequierianus*), qui seraient, jusqu'à présent, spéciales au bassin Provençal, et toutes appartenant aux couches supérieures. La comparaison que je viens de faire est loin de m'offrir les mêmes résultats que pour l'étage néocomien. Il y a beaucoup plus d'espèces communes dans le gault; et tout me porterait à croire qu'à l'époque du gault supérieur, le bassin provençal avait changé sa circonscription; qu'il communiquait plus avec les autres bassins qu'à l'époque de l'étage néocomien; que quelques dislocations de terrain avaient permis à un plus grand nombre d'espèces de passer d'une mer dans l'autre, ces mers ayant pourtant encore des espèces spéciales.

2° Le bassin parisien m'offre, dans les couches inférieures, douze espèces; cinq sont communes au Jura, cinq aux Ardennes et deux à la Provence; néanmoins il resterait encore cinq espèces propres, toutes se trouvant à Wissant: les *A. Auritus*, *Fittoni*, *Lautus*, *Splendens* et *Tuberculatus*. Dans les couches supérieures, je connais 13 espèces, dont huit se trouvent simultanément dans le bassin provençal, dix dans le Jura, et sept dans les Ardennes et la Meuse. Il ne me reste plus qu'une espèce tout-à-fait propre au bassin parisien: c'est l'*A. Clementinus*. Les dissemblances disparaissant, pour ainsi dire, par la comparaison, on peut seulement dire qu'à l'époque des couches inférieures du gault, le bassin parisien et d'Angleterre avaient, dans le nord, deux dépôts, celui de Wissant et celui de Folstone, contenant des espèces tout-à-fait différentes de celles qu'on rencontre dans les autres bassins, à la même époque.

3° Le Jura, la perte du Rhône et la Savoie, offrent jusqu'à présent, dans les couches inférieures, cinq espèces, dont quatre se trouvent au sein du bassin parisien et quatre dans les Ardennes. Il n'en reste aucune espèce spéciale. Dans les couches supérieures, je remarque que, sur quinze espèces, huit sont communes au bassin provençal, onze au bassin parisien et six aux Ardennes. Il ne reste plus ensuite que trois espèces spéciales, les *A. Brottianus* et *Itierianus*, de la perte du Rhône, et l'*A. Hugardia-*

nus de la perte du Rhône et de la Savoie. On voit que la plus grande analogie existe entre le bassin parisien, le Jura et la Savoie, qu'on pourrait peut-être y réunir.

4° Le gault des Ardennes et de la Meuse a offert, jusqu'à ce jour, treize espèces des couches inférieures, dont deux sont communes à la Provence, cinq au bassin parisien et quatre au Jura; après quoi il restera encore sept espèces, les *A. Archiacianus*, *Guersanti*, *Mosensis*, *Michelinianus*, *Puzosianus*, *Quercifolius* et *Raulinianus*, propres aux Ardennes et à la Meuse. Les couches supérieures me présentent sept espèces se trouvant toutes, sans exception, dans le bassin parisien et le Jura, et cinq communes au bassin provençal. De ces faits il faut probablement conclure que les Ardennes, par les espèces des couches supérieures, sont identiques au bassin parisien, dont elles paraissent avoir fait partie, tout en ayant, comme à Wissant, dans les couches inférieures, un lambeau contenant un assez bon nombre d'espèces propres à cette localité.

En résumé, à l'époque où le gault formait ces premiers dépôts, dans le nord du bassin parisien, à Wissant, dans les Ardennes et la Meuse, ce bassin était, au moins, aussi distinct du bassin provençal qu'aux étages néocomiens. Les deux mers avaient peu de communication, ce qui est indiqué par les espèces; mais les dislocations sans nombre qui ont amené les dénudations successives si remarquables de cette époque, indiquées par les espèces chariées, pourraient prouver qu'il s'est fait alors quelques ruptures entre les bassins, et qu'il s'est établi des communications plus nombreuses; néanmoins, le golfe crétacé de la Loire ne contient pas encore de gault, et je ne cite cet étage qu'avec doute et encore sur le point le plus méridional du bassin pyrénéen, avoisinant le bassin provençal. Ces communications, établies entre les mers provençales et parisiennes sont évidemment marquées par le grand nombre d'espèces qui leur sont communes à l'époque du gault supérieur, chiffre bien différent du nombre obtenu jusqu'alors dans les époques antérieures, et prouvant une différence notable dans la composition spécifique des faunes, qui, néanmoins, conservent encore par bassin des espèces distinctes. Le bassin pyrénéen et le golfe crétacé de la Loire se

trouvent à la fin du gault, dans les mêmes conditions qu'au commencement de cette époque.

Un fait que j'ai reconnu dans toutes les localités de gault, et qui viendrait appuyer l'hypothèse qu'à cet étage des terrains crétacés ont eu lieu des dislocations sans nombre, et que, dès-lors, beaucoup de couches ont pu disparaître de certaines parties et interrompre leur ordre de succession naturel, c'est que presque partout les couches ont été remaniées, triturées, soit à l'instant de leur dépôt, soit postérieurement et à une époque où les corps organisés étaient déjà en partie fossiles. Si je cherche des exemples de ce que j'avance, je les trouverai évidens : 1° au sein des couches inférieures de Wissant; 2° dans les Ardennes et la Meuse (1), où les fossiles, empâtés d'une roche noirâtre, très compacte, ont été roulés ainsi, et déposés, par couches, au sein d'un dépôt argileux ou siliceux, évidemment postérieur au premier; 3° dans les couches supérieures du Gasty et de Maurepaire (Aube), où des rognons, plus durs, sans doute roulés par les eaux, et renfermant l'*A. Interruptus* adulte, et un grand nombre d'autres fossiles, se sont déposés par bancs au sein de l'argile plus supérieure, contenant l'*A. Latidorsatus*, qu'on ne rencontre jamais dans ces mêmes rognons, et qui, comme je l'ai reconnu, se trouve partout aux parties les plus supérieures de cet étage; ainsi les rognons ici appartiendraient encore à une époque antérieure aux argiles qui les contiennent. Ces faits, que tous les géologues ont pu observer comme moi, expliquent facilement pourquoi le gault ne forme, le plus souvent, que des lambeaux de dépôts, qu'on ne peut suivre au pourtour des bassins, comme on le fait de la craie blanche, du terrain néocomien et même dans les terrains jurassiques. Cela prouve encore que l'époque du gault a été surtout marquée par des dénudations profondes; que des courans violens, soit généraux, soit produits par des dislocations, ont, à presque toutes les couches de cet étage, empêché qu'elles ne

(1) M. D'Archiac (*Mémoires de la Société géologique*, tome III, page 282, 585) cite ces rognons roulés, dans les Ardennes.

se déposassent lentement et sans perturbation, enlevant les dépôts d'un endroit pour les transporter dans un autre.

Les espèces d'Ammonites qu'on trouve dans tous les bassins sont les suivantes: couches inférieures, *A. Fissicostatus* et *Milletianus;* couches supérieures, *A. Beudanti*, *Interruptus*, *Lyelli*, *Latidorsatus*, *Mammillaris*, *Versicostatus*.

3e ÉTAGE, CRAIE CHLORITÉE, CRAIE TUFAU OU GRÈS VERT SUPÉRIEUR.

L'étage de la craie chloritée est infiniment plus répandu en France que l'étage néocomien et le gault. On le trouve très bien développé et ayant souvent une grande puissance dans le bassin provençal, dans le bassin parisien, dans le golfe de la Loire, dans le bassin pyrénéen ou du sud-ouest, sur quelques points du Jura, dans les Ardennes et le Cotentin. Voici la liste des espèces propres à ces bassins ou à ces golfes :

Bassin provençal.

A. Beaumontianus. (1)	A. Largilliertianus.	A. Requienianus. *a*
Bravaisianus. *a*	Mantellii.	Rhotomagensis. *a*
Deverianus. *a*	Papalis. *a*	Sartousianus.
Feraudianus.	Prosperianus. *a*	Varians.
Falcatus.	Peramplus. *a*	
Goupilianus. *a*	Renauxianus.	

Bassin parisien.

A. Falcatus. (2) *d*	A. *c* Mantellii. *d*	A. *c* Varians. *d*
Largilliertianus.	*c* Rhotomagensis *d*	Woolgari.
c Lewesiensis.	Rusticus.	

Golfe de la Loire, jusqu'à la Sarthe.

A. Beaumontianus.	A. Goupilianus.	A. Vibrayeanus.
Carolinus.	Mantellii.	Woolgari.
Catillus.	Peramplus	Lewesiensis.
Fleuriausianus.	Rhotomagensis.	
Falcatus.	Varians.	

(1) Les espèces suivies d'un *a* sont d'Uchaux (Vaucluse), et correspondent aux couches de Gozeau.

(2) Les espèces précédées d'un *c* sont de Wissant (Pas-de-Calais) et d'Angleterre. Les espèces suivies d'un *d* sont du département de l'Aube.

Bassin pyrénéen ou du Sud-Ouest.

A. Carolinus.	A. Pailletteanus.	A. Varians.
Fleuriausianus.	Rhotomagensis.	Woolgari.
Mantellii.	Tricarinatus.	

Jura.

A. Mantellii.	A. Rhotomagensis.	A. Varians.

Ardennes et Meuse.

A. Falcatus.	A. Renauxianus.	A. Catillus.

Cotentin et environs de Valognes.

A. Verneuilianus.	A. Lewesiensis.	A. Lafresnayanus.

Ces séries d'espèces me donnent, au bassin provençal, seize espèces ou beaucoup plus de la moitié du total connu; au bassin parisien, 8; au golfe de la Loire et de la Sarthe, 13; au bassin pyrénéen et du sud-ouest, 8; au Jura, 3; aux Ardennes, 3; au Cotentin, 3. On voit que le bassin provençal est, comme à l'étage néocomien, le mieux réparti en espèces, et que le golfe crétacé de la Loire et le bassin pyrénéen commencent à offrir à l'étage des craies chloritées autant et plus d'espèces que le bassin parisien. L'examen des formes me donnera sans doute quelques faits curieux, tirés de la comparaison des faunes locales. Je vais les passer en revue à cet effet.

1° Dans le bassin provençal, sur les seize espèces qui s'y trouvent, cinq sont communes au bassin parisien, sept à la Loire, trois au sud-ouest. Il en reste, après ces distinctions, sept (les *A. Bravaisianus*, *Deverianus*, *Feraudianus*, *Papalis*, *Prosperianus*, *Requienianus* et *Sartousianus*) ou près de la moitié, qui jusqu'à présent sont spéciales à ce bassin, ce qui porterait à croire qu'il s'est encore trouvé à cette époque avec une faune en partie spéciale, annonçant son isolement des autres bassins, et qu'il est enfin dans les mêmes conditions qu'à l'époque du gault.

2° Le bassin parisien m'a montré huit espèces, dont cinq se trouvent simultanément en Provence, six dans le golfe de la

Loire et quatre dans le bassin pyrénéen. Il ne reste jusqu'à présent, après ces rapprochemens, que l'*A. rusticus* qui soit propre au bassin parisien.

3° Le golfe de la Loire, sur les treize espèces, m'en donne sept communes au bassin provençal, cinq au bassin parisien, et six au bassin pyrénéen. Il n'y a donc qu'une espèce, l'*A. Vibrayeanus*, spéciale au golfe de la Loire, qui, tout en différant du bassin parisien, pourrait en être une dépendance.

4° Le bassin pyrénéen, de la Charente-Inférieure à Perpignan, m'a offert, jusqu'à ce jour, huit espèces, sur lesquelles trois se trouvent, en même temps, dans le bassin provençal, quatre dans le bassin parisien et six dans le golfe de la Loire. Il en reste deux spéciales, les *A. Pailletteanus* et *Tricarinatus*. Des comparaisons que j'ai faites, il résulterait que le bassin pyrénéen, tout en paraissant avoir des espèces spéciales, se rapproche plus du golfe de la Loire que de toutes les autres parties des mers de l'étage de la craie chloritée.

5° Les espèces du Jura sont celles qu'on trouve indistinctement partout, et en particulier dans le bassin parisien.

6° Les espèces des Ardennes se rapprochent plus de celles de la Loire que de celles des autres bassins.

7° Enfin, les Ammonites du Cotentin, tout en montrant deux types distincts des autres bassins, indiquent, par l'*A. Leevesiensis*, leur identité d'époque avec le troisième étage des terrains crétacés.

En résumé, à la première époque de la craie chloritée, la seule dont je m'occuperai ici, puisque, seule, elle contient des Ammonites, les mers de cet étage ont changé de forme. Les deux bassins dont j'ai parlé, le bassin provençal et le bassin parisien, existent dans leur intégrité, mais le dernier a pris un plus grand accroissement, puisqu'il s'étend jusqu'au Cotentin d'un côté, et dans tout le golfe de la Loire, jusqu'alors étrangers au terrain crétacé ; tandis que le bassin pyrénéen, l'un des plus vastes de cette époque, vient aussi se dessiner, et recevoir, dans toutes ses parties, les mers de l'époque de la craie chloritée. Ainsi, dans le troisième étage des terrains crétacés, il existe trois bassins distincts, le bassin provençal, le bassin parisien et le

bassin Pyrénéen, contenant des espèces distinctes; mais ces bassins, ayant, sans doute, plus de communication entre eux qu'aux époques antérieures, ont un bien plus grand nombre d'espèces communes, mélangées à leurs espèces propres.

L'effet des remaniemens qui ont eu lieu à l'époque du gault s'est encore manifesté aux instans où se déposaient les premières couches de la craie chloritée, puisque, comme je l'ai signalé, on trouve sur quelques points où le gault est anéanti, au Havre et à Cassis, des mélanges de fossiles évidemment transportés, appartenant les uns au gault, les autres à la craie chloritée; la masse enveloppante ne contenant, comme je m'en suis assuré, que des foraminifères de l'étage des craies chloritées, ce qui prouve que ces dépôts appartiennent bien à cet étage, et que les espèces du gault y ont été transportées. Les parties supérieures paraissent être déposées d'une manière plus régulière, surtout dans le bassin Pyrénéen et dans le golfe de la Loire, où aucun de ces mélanges n'existe, pas plus que dans les couches inférieures.

Du reste, les Ammonites qu'on trouve dans tous les bassins à-la-fois sont les suivantes : *A. Rhotomagensis*, *A. Mantellii* et *A. Varians*.

RÉSUMÉ GÉOLOGICO-GÉOGRAPHIQUE.

Les conclusions géologico-géographiques qu'on peut tirer de la répartition des espèces d'Ammonites au sein des couches des terrains crétacés, sont :

1° Que lors des dépôts néocomiens, depuis les premières jusqu'aux dernières couches, il n'existait en France, au moins d'après les connaissances actuelles, que deux bassins distincts, le bassin provençal, borné à l'ouest par les Cévennes, à l'est par les Alpes; et le bassin parisien, dont le littoral, sur les terrains jurassiques, s'étend du département de l'Aube et de l'Yonne, par la Haute-Marne, jusqu'au Jura, ou, de l'autre côté, jusqu'en Angleterre. Ces deux bassins avaient chacun leur faune particulière, bien tranchée, tout en possédant assez d'espèces communes pour qu'on ne puisse douter de leur contemporanéité.

2° Qu'à l'époque du gault inférieur, ces deux mers sont restées dans les mêmes conditions; mais que, pendant cette première période, les grands effets des courans, marqués par le transport des espèces, provenus, sans doute, de dislocations partielles, ont vraisemblablement ouvert de larges communications entre ces deux mers, puisqu'aux couches supérieures du gault on trouve un bien plus grand nombre d'espèces communes entre les bassins qu'il n'en existait aux époques néocomiennes.

3° Que l'étage de la craie chloritée a changé tout-à-fait l'aspect des mers crétacées. Les deux premiers bassins sont restés, relativement à la distribution des espèces et à leurs proportions, ce qu'ils étaient à l'époque du gault supérieur; mais au bassin parisien s'est joint le golfe du Cotentin et le golfe de la Loire, jusqu'alors étrangers aux terrains crétacés; et l'étage de la craie a envahi, en même temps, l'immense bassin pyrénéen, depuis le département de la Charente-Inférieure jusqu'aux Pyrénées-Orientales; ainsi, vers la dernière époque des terrains crétacés où les Ammonites ont vécu, ces mers avaient pris en France et dans toute l'Europe une extension au moins du double de ce qu'elles étaient à l'instant où elles se sont montrées pour la première fois avec les terrains néocomiens.

NOTE *sur le prétendu parasite de l'Argonauta Argo*,

Par M. O. G. COSTA,

Professeur de zoologie à Naples.

M. Delle Chiaje a été le premier à faire connaître l'existence d'un corps organisé placé entre le manteau de l'*Argonauta Argo* et sa coquille. Il le regarda comme un parasite, et il le plaça parmi les vers dans le genre *Tricocephalus*. Je ne veux pas m'étendre ici sur les objections qu'il y aurait à faire contre cette manière de voir, car elles ne peuvent échapper à aucun helminthologiste qui aura l'occasion d'observer ce pré-

tendu parasite qui, du reste, a été si mal décrit et figuré qu'on aurait quelque peine à le reconnaître. Mais je crois qu'il ne sera pas sans utilité d'en publier un dessin exact, en y joignant le peu d'observations que j'ai pu faire sur le petit nombre d'individus qui, à des époques différentes, me sont tombés entre les mains.

La figure 2ª (Pl. 13) représente ce corps grossi presque vingt fois. *a, b* indiquent le tronc; *c c* un appendice terminal, et *e f* les deux cirrhes tentaculaires. Sur le dos du corps *a, b*, on remarque une double série de tubercules acétabulaires, qui, comme ceux des cirrhes vélifères de l'Argonaute, vont s'adapter à la cavité de la carène de la coquille. Ces tubercules sont figurés de face dans la figure 2ᵇ, pour en démontrer la disposition et la forme. Dans la partie interne du corps, il y a une espèce de poche (*i, i, i*) partagée en plusieurs divisions (3 ou 4) remplies d'une substance gélatineuse à demi transparente et d'une couleur rosée ou de chair avec des taches dont les unes sont de couleur rouge de sang, et quelques autres, quoique en moindre nombre, de couleur violet foncé, comme on les voit dans la planche ci-jointe. On doit remarquer cependant qu'il y a, outre ces taches, deux qui sont symétriques pour la forme et pour la disposition, telles qu'elles sont indiquées par la lettre *g*, la couleur desquelles est d'un rouge bien plus vif que les autres.

A cette poche dont nous venons de parler, succèdent les replis de la membrane externe située en dessus, et du côté interne un prolongement de la muqueuse qui constitue une sorte de fanon dans la partie plus large duquel naît un cirrhe *e f* dont l'extrémité se partage en deux appendices tentaculaires. La partie inférieure de ce fanon est environnée dans les bords supérieurs et inférieurs, d'une membrane frangée très délicate, comme cela se voit dans le dessin.

A l'extrémité *b*, succède un appendice en forme de cirrhe très long *c c c*, qui en s'amincissant successivement, va se terminer par une pointe très fine. Vers sa base on observe une membrane *d*, de figure triangulaire, traversée par deux cordons *x x*, qui partent de la même extrémité *b*, et qui, en divergeant quelque peu, et grossissant, se terminent avant de rejoindre le bord de

la membrane à laquelle on dirait qu'ils servent d'appui comme les bâtons d'un éventail.

Enfin la surface externe de la membrane qui recouvre le ventricule (si on peut le nommer ainsi) est tachée légèrement et finement d'une couleur plus foncée. Les taches sont formées par de très petits vaisseaux, recourbés presque en spirale, comme on les voit dans la figure 2ᵉ.

Dans les cas très rares où j'ai rencontré le corps dont je viens de faire la description, c'était toujours sur une Argonaute femelle qui commençait à pondre ses œufs, lesquels, comme chacun le sait, s'attachent sur la face de l'avant-dernier tour de la spire. Le présumé parasite adhère à l'extrémité de la même carène avec tant de force qu'on doit faire des efforts pour l'en détacher. Il est très mobile et très contractile. Les mouvemens de ses appendices sont d'une vivacité telle que ce n'est qu'avec peine que les yeux parviennent à les distinguer. Et lorsque on a vaincu l'adhésion de son corps avec la surface interne de la coquille, ces mouvemens ressemblent à ceux qui agitent la queue d'un lézard séparée du tronc. La cirrhe terminale *c c c* se courbe aussi dans ce cas, de la manière représentée dans la planche.

De tout ce qui précède, il est bien facile d'apercevoir que ce corps par son organisation ne peut pas être considéré comme jouissant d'une existence indépendante ; car il n'est doué d'aucun organe spécial qui pourrait en prolonger la vie. L'extrémité *a* semble être coupée de sorte qu'on pourrait soupçonner que ce prétendu ver était mutilé dans ce point, ou qu'il est une partie intégrale du mollusque auquel il appartient. Mais j'ai trouvé très souvent l'Argonaute tout-à-fait dépourvue de ce corpuscule. Et d'ailleurs, les individus dans lesquels je l'ai rencontré, n'offraient aucune cicatrice ou trace de mutilation. Ainsi il n'y a pas à douter que ce corps ne soit une partie accessoire qui est probablement destiné à la fécondation des œufs, en un mot le *spermatophore* de l'Argonaute, qui est l'anologue (sans être tout-à-fait le même) de celui que l'habile et savant naturaliste M. Milne Edwards a découvert dans plusieurs autres genres d'animaux, et particulièrement dans la *Sepiola*.

J'avoue que le petit nombre d'observations exposées dans

cette note, n'est pas suffisant pour établir le rôle et les fonctions de l'être dont nous venons de parler. Mais je crois cependant que ces observations pourront bien servir à d'autres pour les engager à continuer cette étude sans se laisser préoccuper par l'opinion singulière de ceux qui veulent considérer ce corps comme un vrai parasite; et, du reste, s'il en était ainsi, ce prétendu Helminthe serait l'analogue de l'Hectodactyle (Octopodis, Cuv.), et jamais un Tricocéphale, avec lequel il n'a pas le moindre rapport.

EXPLICATION DES FIGURES (Planche 13).

Fig. 2. Le prétendu parasite de l'Argonaute, de grandeur naturelle.
Fig. 2ª. Le même, grossi.
Fig. 2ᵇ. Portion du bord acétabulifère.
Fig. 2ᶜ. Taches de la membrane externe.

NOTE *sur l'appareil vasculaire de la Velelle* (Armenistarium (1) velella),

Par M. O. G. COSTA.

En traitant de la Velelle dans la faune du royaume de Naples, j'ai fait voir que le plateau ou portion horizontale et infundibuliforme du squelette de ce zoophyte, est constitué par des canaux cartilagineux disposés sur deux plans et enroulés en spirale. L'un de ces tubes forme la face supérieure de cette lame, l'autre la face inférieure; les tours de spire sont dirigés en sens contraire, et chacun de ces canaux s'ouvre au dehors par son extrémité située sur le bord du plateau et communique avec le canal de la face opposée par une série d'anastomoses placées sur

(1) Le nom d'Amenistarium a été donné de temps immémorial à cet animal par les Grecs, et en 1757, Carbusio en publia une bonne description et un excellent dessin dans les *Miscellaneæ Tovinesi*, vol. III, p. 206. C'est pour cette raison que j'ai cru devoir reprendre la dénomination générique très ancienne d'*Armenistarium*. (Voyez ce genre dans la Faune du royaume de Naples).

une ligne transversale, disposée de façon à décrire une croix avec la ligne occupée par la portion verticale du squelette et à correspondre par ses extrémités aux deux orifices extérieurs dont il vient d'être question. Ce système de canaux renferme un liquide légèrement gélatineux et du centre de la double spire naissent quelques vaisseaux verticaux, lesquels se ramifient dans l'extérieur de la crête ou portion verticale de cette sorte de squelette.

Jusqu'ici je n'étais pas parvenu à découvrir les liaisons qui doivent exister entre cet appareil tubulaire et les parties molles de l'animal, ni la manière dont les matières nutritives se distribuent à ces derniers; mais en poursuivant mes recherches, je suis parvenu à résoudre quelques-unes de ces questions et à constater, touchant la structure des Velelles, quelques faits nouveaux qui me semblent de nature à intéressser les zoologistes.

Si on a soin de diviser le manteau ou enveloppe dermique de la *Velella*, de manière à ce que l'on puisse enlever les viscères tout en gardant la partie qui adhère à la face concave du squelette, on parvient à voir nettement le réseau vasculaire du dernier. Afin d'atteindre ce but, il faut s'y prendre avec une extrême délicatesse et préparer l'animal de manière que la membrane de la surface du squelette ne se détache pas, et que les vaisseaux soient injectés par le fluide nourricier. Ce n'est qu'après une série d'essais pénibles et difficiles que je suis parvenu à atteindre le but pour lequel je ne peux conseiller autre chose qu'une patience constante et ingénieuse.

Le dessin ici annexé (Pl. 13, fig. 3) montre que deux vaisseaux principaux servent à la circulation dans ce genre d'animaux, vaisseaux dont les rameaux partent précisément de deux pôles opposés qui se trouvent sur les bords de la ligne d'entrecroisement de la crête, avec le plateau du squelette. Ces deux rameaux de différens calibres s'avancent de manière à circonscrire la cavité gastrique de l'animal, et se ramifiant successivement, donnent naissance de tous côtés à de très petits vaisseaux. De ces deux rameaux, l'un est toujours plus grand que l'autre. Le premier se partage immédiatement en deux branches dont l'une, située du côté intérieur, se prolonge de façon à aller

joindre par ses extrémités le rameau opposé, et l'autre branche fournit de gros ramuscules qui s'anastomosent avec les extrémités des dernières divisions du même rameau. Du tronc principal de chacun naissent, comme des pédoncules, de petits vaisseaux qui s'en vont animer les appendices claviformes et tubercules dont toute la face inférieure de l'animal est garnie. Ce fait, joint à celui déjà exposé dans la faune, me paraît montrer que ce sont là des organes sécréteurs destinés à l'élaboration d'un liquide circulatoire, et en même temps à l'excrétion de ce mucus qui revêt la Velella. Du reste, je ne nie pas que ces tubercules ne puissent jouer également le rôle d'oviducte. On doit remarquer aussi que le liquide qui remplit ces vaisseaux est d'une couleur rouge violet qui va se décolorant au fur et à mesure que les vaisseaux diminuent de calibre. Parmi ces derniers, on observe un réseau vasculaire très fin qui est rempli d'un liquide blanc-lacté. Je n'ai pu suivre les dernières ramifications de cet appareil vasculaire, à cause de leur finesse et du défaut de couleur des matières contenues dans leur intérieur. Je ne tairai pas même qu'une bonne partie de la décoloration des extrémités capillaires, a pu bien être produit par la préparation à laquelle j'ai dû soumettre la Velella pour arriver au résultat dont il vient d'être question. En soulevant soigneusement la pellicule qui recouvre le squelette de la Velella, et en observant à une loupe très forte les lignes de séparation, j'ai aperçu aussi des vaisseaux extrêmement déliés, au moyen desquels la partie molle de l'animal communique avec le squelette. Enfin, les deux troncs principaux se prolongent vers le périmètre pour joindre chacun de son côté le trou des canaux spiraux qui composent le squelette.

La figure 3 (Planche 13) représente cet appareil vasculaire de la Velelle, grossi du double seulement de sa grandeur naturelle.

SUITE *de la description de quelques Mollusques, provenant de la campagne de l'Astrolabe et de la Zélée* (1),

Adressée à l'Académie des Sciences, le 26 juillet 1841,

Par MM. HOMBRON et JACQUINOT.

Genre PATELLE.

PATELLE CANNELÉE. *P. strigilis.*

Testâ ovali, convexâ, obliquè conicâ, extus duobus coloribus imbutâ, supernè nigro-rufescente; inferiùs fusco-lutescente, punctis albis raris instructâ, costis radiantibus, viginti quatuor præcipuis, subæqualibus, obtusis, extra marginem subprominulis; vertice albo, obtuso, excentrali; intùs nigro-purpurascente; fundo pallidè flavescente.

Long. 65 mill.; larg. 50 mill. — Habite les îles Auckland.

PATELLE BLANCHE. *P. alba.*

Testâ ovato-ellipticâ, depressâ, albâ; cristis carinatis, asperis, extra marginem prominulo-dentatis; vertice excentrali, obtuso; intùs albâ, nitidâ, fundo et margine nigro submaculatis.

Long. 37 mill.; larg. 30 mill. — Habite Taïti.

PATELLE ARDOISÉE. *P. ardosiæa.*

Testâ ovato-rotundatâ, subobliquè convexo-conicâ, extùs colore ardosiæ tinctâ, intùs argenteo-cærulescente, aliquoties albo opaco; striis radiantibus, tenuibus, confertis, cinctâ quadraginta præcipuis; margine integro; verticè obtuso, excentrali, rufo.

Long. 55 mill.; larg. 47 mill. — Habite l'île Juan-Fernandez.

PATELLE MARQUETÉE. *P. tessellata.*

Testâ elevato-ellipticâ, convexo-conicâ, extùs intùsque flavescente; lineolis fasciisque undulatis, transversis, nigro-rufescentibus ornatâ; striis radiantibus, confertis, præcipuis circiter triginta duo. Vertice acuto, griseo; fornice eodem colore imbuto.

Long. 28 mill.; larg. 22 mill. — Habite l'île Mangareva.

(1) Voir le cahier de juillet de ces Annales, page 62.

PATELLE OBSCURE. *P. obscura.*

Testâ elevato-ellipticâ, convexâ, obliquè conicâ, atro-fuscâ, lævitèr albido tessellatâ; intùs albido cærulescente; fornice rufo-nigricante. Vertice excentrali, subobtuso; margine integro, zonâ nigrâ intùs cincto.

Long. 26 mill.; larg. 20 mill. — Habite Talcahuano.

PATELLE POLAIRE *P. polaris.*

Testâ convexo-ellipticâ, oblongâ; dorso obtuso, rude; extùs fusco-rufescente; intùs nigro purpurascente; margine integro, irregulare.

Long. 30 mill.; larg. 22 mill. — Habite les îles Powell.

PATELLE NOUEUSE. *P. nodosa.*

Testâ elevato-subellipticâ, obliquè conicâ, rugosâ; costis confertis, tuberculosis, undecim crassioribus pallidè subflavescentibus, alteris albido nigroque maculatis. Vertice excentrali, atro-fusco; margine dentato, intùs albido et nigro-purpurascente radiatâ; fundo atro, in laciniis albicante.

Long. 32 mill.; larg. 27 mill. — Habite la Nouvelle-Zélande.

PATELLE RAYONNÉE. *P. radiatilis.*

Testâ maximè radiatâ, ovali, depressissimâ, nigro-purpurascente; costellis numerosis, radiantibus, æqualibus, irregulariter separatis, interstitiis albido-rufescente pictis; apice curvo, excentrali: intùs albâ, nitidâ; margine integro, fusco zonato; fundo pallidè fusco.

Long. 31 mill.; larg. 26 mill. — Habite la Nouvelle-Zélande.

PATELLE DEUIL. *P. luctuosa.*

Testâ angulatissimâ, stellatâ, ellipticâ, rugosâ, fusco-nigrâ; costis radiantibus, separatis, præcipuis quinque, novem aut decem adjunctis, totis excedentibus marginem; vertice obtuso, subexcentrali, intùs nitido, albo cyanescente; margine angulato, atro-zonato.

Long. 33 mill.; larg. 28 mill. — Habite Mindanao.

PATELLE ENSANGLANTÉE. *P. cruentata.*

Testâ ovali, convexo-depressâ, albâ, fasciis albis fuscisque radiatim pictâ; costis confertis, numerosis, radiantibus; vertice fusco-nigrante, acuto, centrali; margine inæqualiter undulato, subdenticulato: intus margaritaceâ, profundo cruentatâ.

Long. 24 mill., larg. 19 mill. — Habite la Nouvelle-Guinée.

PATELLE ÉTOURNEAU. *Patella sturnus.*

Testâ convexo-subellipticâ, lævigatâ, nigrâ, maculis subviridibus albisque variegatâ; intùs fusco-nigrante, raris punctis albis sparsâ; apice prope marginem inclinato; margine integro, atrâ zonâ cincto, maculis albidis picto.

Long. 23 mill.; larg. 17 mill. — Habite la Nouvelle-Zélande.

PATELLOÏDE ANTARCTIQUE. *Patelloides antarctica.*

Testâ convexo-ovali, lævigatâ, fusco-oleagineâ, circa marginem fasciis albo-virescentibus pictâ; vertice incumbente: subtùs, albâ anticè, fuliginosâ, posteriùs; fornice rufo-castaneo; limbo integro, nigrâ zonâ albidè maculatâ cincto.

Long. 31 mill.; larg. 23 mill. — Hab. les îles Auckland.

PATELLE CALLEUSE. *P. callosa.*

Testâ ovali, depressâ; fasciis albis nigrisque radiatim pictâ: intùs albâ; fundo incrassato, calloso, albo; apice elevato, acutissimo; margine integro, lineis nigris et albis alternatim colorato.

Long. 18 mill.; larg. 14 mill. — Habite Vavao.

Genre CYTHÉRÉE.

CYTHÉRÉE DE FOULLIOY. *Cytherea tessellata.*

Testâ subovali, crassâ, turgidâ; anticè, præcipuè, subglobosâ et tenuissimè striatâ, posticè subcompressâ; sed etiam striatâ, inæquilaterâ, nitidâ, albâ; punctis tenuibus, castaneis, confertis, absolutè notatâ; radiorum fascibus rufis sparsorum transversim pictâ; natibus lateribusque albis, parvis litturis fuscis, tesselatis; margine integro: intùs immaculatâ.

Dimension: 13 lignes. — Habite Saint-Georges (Iles Salomon).

Genre SIPHONAIRE.

SIPHONAIRE A CÔTES. *Siphonaria costata.*

Testâ fusco-rufescente, elongato-ovatâ, obliquè conicâ; costis undulatis, radiantibus, pluribus eminentioribus, circiter septem et triginta: apice subcentrali, acutâ, posteriori recurvâ; siphunculo fortiter proeminente; intùs fuscâ, impressione musculari et siphone pallidioribus; siphone bipartito, latissimo; margine castaneo-lineolato, fimbriato.

Dimension: 25 lignes. — Habite Otago (Tavaï-Pounamou, Nouvelle-Zélande).

OBSERVATIONS

SUR LA STRUCTURE ET LES FONCTIONS DE QUELQUES ZOOPHYTES, MOLLUSQUES ET CRUSTACÉS DES CÔTES DE LA FRANCE,

Par M. H. MILNE EDWARDS.

(Lues à l'Académie des Sciences, dans sa séance du 16 août 1841.)

En me livrant d'une manière spéciale à l'étude des animaux qui habitent les côtes de la France, je ne me suis pas appliqué à dresser le catalogue des productions zoologiques de notre littoral, ni à enrichir nos musées par la découverte d'espèces nouvelles. Je me suis proposé, avant tout, l'investigation anatomique et physiologique de ceux, parmi ces êtres, qui appartiennent à des types imparfaitement connus et qui me semblaient les plus propres à fournir des notions précises sur les modifications introduites par la nature dans la structure et dans les fonctions des animaux. Effectivement ce qui, à mon sens, ralentit les progrès de la zoologie, ce n'est pas le défaut d'observations sur les formes extérieures et sur les traits distinctifs des espèces variées dont la liste s'accroît chaque jour avec une étonnante rapidité; mais bien le manque de données suffisantes sur l'organisation intérieure et sur la physiologie d'un grand nombre de ces êtres, connaissances sans lesquelles cette branche de l'histoire naturelle manque de bases solides et se présente dépouillé de ses principaux titres à l'intérêt des hommes de science.

Dans les communications que j'ai eu, à diverses reprises, l'honneur de faire à l'Académie, j'ai rendu compte des recherches que j'avais entreprises de la sorte sur les Crustacés, les Annelides, les Ascidies et les Polypes de nos côtes. Les observations qui font le sujet de ce Mémoire ont été dirigées d'après les

mêmes principes, et ont été, pour la plupart, recueillies l'année dernière durant un voyage sur les bords de la Méditerranée. Les unes sont, en quelque sorte, une suite des précédentes, et se rattachent à l'histoire des Crustacés et des Polypes; les autres ont, pour objet les Mollusques et les Acalèphes. J'en rendrai compte successivement en exposant d'abord celles relatives à cette dernière classe d'animaux.

CHAPITRE PREMIER.

Observations sur divers Acalèphes.

En poursuivant mes recherches sur les Acalèphes de la Méditerranée, j'ai porté mon attention sur les deux grandes familles de l'ordre des Médusaires aussi bien que sur les Béroïdes et les Physophoriens, et en observant les Aurélies, les Chrysaores et les Pélagies si communs dans ces parages, j'étais arrivé à des résultats qui me paraissaient nouveaux, relativement à la distinction des sexes chez ces zoophytes et à leur premier état, transitoire comme celui d'une larve; mais depuis mon retour à Paris, ayant eu connaissance du travail intéressant de M. Siébold sur le même sujet (1), j'ai vu que cet habile naturaliste m'avait devancé dans l'observation de la plupart de ces faits, et si j'en parle ici, c'est seulement pour reconnaître ses droits à des découvertes que je m'étais d'abord attribuées dans une lettre adressée de Montpellier à un de mes confrères et publiée par extrait dans les Comptes rendus de nos séances. Dans le Mémoire que je vais avoir l'honneur de communiquer aujourd'hui à l'Académie, je laisserai donc de côté tout ce qui est relatif aux Médusaires dits Phanérocarpes, groupe sur lequel portent les travaux de M. Siébold, et je me bornerai à l'exposé des observations que j'ai eu l'occasion de faire sur les Médusaires dits Cryptocarpes, sur les Béroïdiens et sur les Physophoriens. Une nouvelle espèce d'Equorée m'a fourni un exemple du mode de structure propre au

(1) Beitrage zur Naturgeschichte der Wirbellosen thiere (neueste Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig. 1839.)

premier de ces groupes; parmi les Béroïdiens, j'ai étudié un Béroé proprement dit, et une espèce nouvelle qui devra former le type d'une division générique particulière; enfin ce sont deux espèces de Stéphanomies qui m'ont fourni quelques matériaux nouveaux pour servir à l'histoire des Physophoriens.

§ I.

*Observations sur l'*Æquorea violacea, *espèce nouvelle de la famille des Méduſaires dites Cryptocarpes.*

Presque tous les Méduſaires dont la structure a été étudiée avec quelque soin, sont pourvus d'organes générateurs très apparens. Ainsi chez les Rhizostomes, les Aurélies, les Chrysaores, les Pélagies, etc., on trouve vers la partie centrale du disque quatre de ces organes disposés en croix et faciles à reconnaître par leur conformation et leur couleur; dans ces derniers temps on a même constaté que chez ces Acalèphes, il existe des organes mâles aussi bien que des organes femelles, et que les sexes sont séparés. Mais chez d'autres Méduſaires on ne découvre aucune disposition analogue à celle qui est si apparente chez les animaux dont il vient d'être question, et on ne connaît pas les organes destinés aux fonctions de la reproduction. Aussi M. Eschscholtz, à qui on doit un travail très considérable et très important sur les Acalèphes en général, divise-t-il les Méduſaires en deux groupes, les Phanérocarpes et les Cryptocarpes, caractérisés par la présence ou par le manque d'ovaires visibles (1). Les Equorides sont au nombre de ces Méduſaires cryptocarpes: or, en étudiant une espèce de ce groupe, je me suis assuré, non-seulement de l'existence d'un appareil générateur chez ces Acalèphes, mais aussi de la distinction des sexes, et si les zoologistes ont jusqu'ici méconnu ces organes, c'est parce que ceux-ci ne ressemblent à l'appareil reproducteur des Méduſaires ordinaires ni par leur position, ni par leur mode de conformation.

L'animal qui m'a fourni l'occasion de constater ce fait a été

(1) System der Acalephen. In-4. Berlin, 1829.

pêché à peu de distance du port de Cette, et appartient au genre Equorée, tel que M. Eschscholtz a circonscrit cette division ; car sa cavité stomacale occupe un grand espace au milieu de la face inférieure de l'ombrelle, se continue latéralement avec une multitude de canaux étroits et s'ouvre au dehors par une bouche dépourvue de cirrhes ou de tentacules et incapable de s'allonger en forme de trompe. Mais, considéré comme espèce, ce Médusaire ne me paraît pouvoir être rapporté à aucune des Equorées, déjà décrites par les auteurs; il se rapproche beaucoup de l'*Æquorea Forskalina* (1), qui habite les mêmes mers, et de *Æquorea ciliata* (2) découvert sur les côtes de l'Amérique, mais il s'en distingue facilement et pourra, à raison de la couleur de diverses parties de son corps, recevoir le nom d'*Æquorea violacea*.

Le disque ou ombrelle de ce Médusaire est peu bombé, hyalin et garni tout autour de filamens tentaculaires très courts, grêles et de couleur violacé (3). Le nombre de ces appendices capilloïdes est très considérable, et dans les intervalles qu'ils laissent entre eux on trouve une série de tubercules et de vésicules disposées avec une grande régularité. Un de ces tubercules, ayant la forme d'un petit mamelon (4), occupe le milieu de chacun de ces intervalles, et de l'un et l'autre côté de chacun de ces mamelons, on voit deux vésicules hémisphériques ou ovalaires qui renferment deux ou quelquefois trois corpuscules sphériques (*e*, *e*). Immédiatement au-dessous de cette série d'organes marginaux, se trouve une bordure membraneuse très délicate (*b*, *b*), qui ressemble assez à un ruban, et qui, en se contractant, paraît remplir les fonctions d'un organe de natation; il est aussi à noter que la surface interne de cette espèce de voile circulaire, est le siège d'un mouvement ciliaire très prononcé.

(1) *Medusa æquorea* Forskal. Descriptiones animalium quæ in itinere orientali observavit, page 110, et Icon. tab. 32 (figure reproduite par Bruguières dans l'Encyclopédie méthodique, Vers, planche 95, fig. 3). — *Æquorea Forskalea* Peron. Histoire des Méduses, page 24. — *Æquorea Forskalina* Eschscholtz. Syst. der Acalephen, pag. 109.

(2) Eschscholtz, Syst. der Acalephen, p. 109, tab. 9, fig 1.

(3) Planche 1, fig. 1.

(4) Planche 1, fig. 1 *c*, *d*.

La cavité gastrique très grande, comme chez toutes les Equorées, occupe environ un tiers du diamètre de l'ombrelle, et est entourée par une bordure membraneuse qui devient verticale dans le repos, et qui est beaucoup trop courte pour en clore l'ouverture (1); celle-ci reste par conséquent toujours béante, et se trouve seulement un peu rétrécie lorsque les fibres disposées circulairement dans ce petit voile marginal et remplissant les fonctions d'un sphincter, viennent à se contracter. Supérieurement, cette bordure membraneuse s'insère à un anneau un peu calleux, et au-dessus de ce cercle étroit, on voit une rangée d'ouvertures assez grandes, serrées les unes contre les autres, et conduisant dans autant de canaux disposés en rayons près de la surface inférieure de l'ombrelle (2), ces canaux, au nombre de 74, se rétrécissent un peu en s'éloignant de l'estomac, et gagnent en ligne droite le bord de l'ombrelle où ils paraissent déboucher à angle droit dans un vaisseau marginal (3) analogue à celui qui se voit chez les Aurélies. Si j'avais eu à ma disposition des moyens d'injection lorsque je faisais l'examen de cette Equorée, il m'aurait été facile de constater directement le mode de terminaison de ces vaisseaux; mais je n'avais pas d'instrumens propres à cet usage, et par conséquent je ne me prononce pas d'une manière positive sur l'existence de ces anastomoses apparentes. J'ajouterai cependant que ce canal marginal circulaire m'a paru fournir une petite branche à chacun des filamens tentaculaires dont le bord du manteau est garni, et que c'est sur son trajet que se trouvent les vésicules et les mamelons inter-tentaculaires mentionnés plus haut. On distingue aussi un prolongement de ce canal annulaire dans l'intérieur de chacun de ces mamelons (4), et le sommet de ceux-ci paraît être perforé, de sorte que ces organes ont beaucoup d'analogie avec les orifices marginaux observés par M. Ehrenberg chez les Rhizostomes, et peuvent être considérés aussi comme des émonctoires.

(1) Planche 1, fig. 1 *a*.
(2) Planche 1, fig. 1 *a*, 1 *b*, *c*, *c*.
(3) Fig. 1 *b*, *d*, *d*.
(4) Fig. 1 *c*, *a*.

On voit donc que, sous le rapport de la conformation de l'appareil gastro-vasculaire, les Equorées tiennent, pour ainsi dire, le milieu entre les Pélagies et les Aurélies, et diffèrent principalement de ces derniers par le nombre plus considérable des canaux périphériques et par l'absence de ramifications dans ces canaux.

Enfin dans notre Equorée, de même que dans les espèces de ce genre, déjà décrites par les zoologistes, il naît de la face inférieure du corps une multitude de lamelles membraneuses, disposées autour de l'estomac en manière de rayons (1). Ces lamelles correspondent aux canaux que nous avons déjà vus se rendre de l'estomac vers le bord de l'ombrelle; mais elles n'occupent qu'environ les trois quarts de leur longueur, car elles ne commencent pas immédiatement sur le bord de la bouche, et se terminent à une assez grande distance du bord de l'ombrelle. Deux de ces lamelles sont suspendues ainsi parallèlement au-dessous de chaque canal, ou plutôt il n'existe au-dessous de chacun de ces tubes qu'une sorte de ruban replié sur lui-même du côté externe, de façon à paraître double. On compte par conséquent 74 de ces doubles rayons lamelleux, qui sont libres par leur bord inférieur et finement plissé de chaque côté; on y remarque aussi une multitude de stries obliques de couleur violette, et en examinant ces stries au microscope, je me suis assuré qu'ils constituent les organes sexuels de ces Acalèphes. Effectivement, chez les uns, j'y ai trouvé des granules ayant l'apparence d'ovules, et chez un autre individu où ces corps ne se montraient pas de même, j'en ai vu sortir une multitude de Zoospermes (2) extrêmement vivaces et analogues par leur forme et par leur mode de locomotion aux animalcules spermatiques des Aurélies et de divers Mollusques. Il me paraît donc évident que ces lamelles sont ou des ovaires ou des testicules suivant les individus, et que sous le rapport des organes de la reproduction, les Equorées diffèrent des Méduses ordinaires non parce qu'elles manquent d'un appareil générateur spécial ou parce

(1) Planche 1, fig. 1 ^{a} et 1 ^{b}, g.

(2) Planche 1, fig. 1 ^{d}.

que cet appareil est caché, mais seulement par la position extérieure et la disposition des organes sexuels; chez les Acalèphes que l'on a nommés Phénérocarpes, ces organes sont logés profondément entre les racines du prolongement buccal et entrent dans la composition des parois de l'estomac, tandis que chez nos Equorées que l'on a appelées des Cryptogames, ces mêmes organes sont tout-à-fait distincts de la cavité digestive centrale et flottent librement à l'extérieur sous la surface inférieure de l'ombrelle.

Je regrette de ne pas avoir eu l'occasion d'examiner d'autres Médusaires dits Cryptocarpes, de m'assurer si une disposition semblable des organes générateurs existe d'une manière générale dans ce groupe; mais je suis porté à croire qu'il en est ainsi, car plusieurs auteurs ont figuré des lamelles rayonnées à la face inférieure de l'ombrelle chez ces animaux, et il est probable que les fonctions de ces parties sont partout les mêmes.

§ II.

Description du Lesueuria vitrea, *type d'un genre nouveau de la famille des Béroïdes.*

L'on s'accorde généralement à classer dans l'embranchement des animaux rayonnés tous les Zoophytes marins, qui, organisés pour la nage, ressemblent un peu à des champignons par leur forme extérieure, et se font remarquer par la transparence et l'aspect gélatineux de leurs corps. La plupart des zoologistes rangent dans la même classe un certain nombre d'animaux marins dont la conformation générale diffère de celle de ces Méduses, mais dont les tissus présentent le même caractère et dont la structure est également appropriée à la natation. Quelques auteurs cependant trouvent que ces êtres, connus sous les noms de Béroïdes et de Physophorides ont plus d'analogie avec les Mollusques qu'avec les Méduses, et les séparent des autres Zoophytes pour les placer avec les Ascidies dans la grande division des Mollusques acéphales dont les représentans principaux sont les Huîtres, les Moules, etc. Une discordance d'opinion si

grande, entre des hommes qui font autorité dans la science, ne peut dépendre que de l'imperfection de nos connaissances relatives au mode d'organisation de ces animaux à affinités douteuses; et en effet, les formes extérieures de ces êtres ont été décrites avec assez d'exactitude, mais les naturalistes qui ont eu l'occasion de les observer ne se sont que peu appliqués à en étudier la structure intérieure.

En explorant la baie de Nice, j'ai trouvé en assez grande abondance un de ces animaux, qui, à raison de sa transparence vitrée, se prête admirablement aux recherches physiologiques, et qui m'a permis ainsi de constater quelques faits dont la connaissance pourra intéresser les zoologistes. Cet animal est de la famille des *Béroïdes* et se rapproche des *Mnenies* de M. Eschscholtz et des *Alcinoés* de M. Rang, mais ne me paraît pouvoir rentrer dans aucune des divisions génériques déjà établies, et devra probablement constituer le type d'un genre nouveau que nous désignerons sous le nom de LESUEURIA, en l'honneur du compagnon de Péron, dont les travaux sur les Acalèphes appellent la reconnaissance des zoologistes.

Le corps de notre *Lesueuria* (1), long d'environ deux centimètres est ovalaire et assez fortement comprimée, de façon à offrir quatre pans d'inégale grandeur ou plutôt deux faces et deux bords dont la disposition est parfaitement symétrique. Son extrémité supérieure est creusée par une dépression évasée et profonde (2), qui simule l'entrée d'une cavité intérieure, mais qui n'est point perforée, et qui donne naissance par son bord à huit côtes verticales légèrement saillantes; quatre de ces côtes descendent jusqu'à l'extrémité inférieure du corps, et occupent la ligne de jonction des deux faces élargies du corps avec les deux pans plus étroits, que nous avons désignées ci-dessus sous le nom de bords; les autres côtes que l'on pourrait appeler *accessoires* n'occupent que la moitié de la longueur de l'animal, et sont disposées par paires sur les deux faces dont il vient d'être question; enfin, de même que les précédentes, elles sont garnies de cils

(1) Planche 2, fig. 1, et planche 3, fig. 1.
(2) Planche 3, fig. 1.

vibratiles. La conformation de la portion inférieure du corps est plus compliquée. On y remarque d'abord huit grands lobes arrondis par le bas et séparés entre eux par des échancrures très profondes. Pour en faciliter la description, je les distinguerai en lobes principaux, lobes latéraux et lobes accessoires. Les lobes principaux (1), au nombre de deux, occupent la presque totalité de la moitié inférieure des deux faces du corps, et sont contiguës par leurs bords avec les lobes marginaux (2) qui sont également au nombre de deux; ces derniers terminent les petits côtés ou bords latéraux du corps, et sont divisés chacun en trois lobules vers leur bord inférieur; enfin les lobes accessoires (3), au nombre de quatre, recouvrent en partie les lobes principaux, et vont rejoindre comme ceux-ci les lobes marginaux; ils naissent de la surface externe des premiers de ces lobes dans l'espace compris entre le bord latéral de ceux-ci et l'extrémité inférieure des côtes ciliées accessoires dont il a déjà été question, de façon à laisser entre eux un espace assez considérable. Quatre tentacules (4) de longueur médiocre et de forme conique naissent au point de jonction des lobes marginaux avec les lobes accessoires et les lobes principaux, et une bordure membraneuse les unit au bord des grands lobes correspondans.

Les franges vibratiles qui garnissent les huit côtes dont il a déjà été question sont disposées par petites rangées transversales et fixées sur une série de petites crêtes arrondies et parallèles (5), ce sont de petites lanières membraneuses plus ou moins profondément divisées en filamens vers le bout et offrant, quant à leur disposition et à leurs mouvemens, la plus parfaite ressemblance avec ceux des Cydipes et des Béroés. Celles des côtes latérales se terminent au bord inférieur des lobes marginaux, et on ne trouve pas d'appendices vibratiles sur le bord de ces lobes; mais celles des côtes accessoires se continuent avec une rangée simple de filamens semblables, qui borde tout

(1) Planche 3, fig. 1, *d*.
(2) Planche 3, fig. 1, *b*.
(3) Planche 3, fig. 1, *c*.
(4) Planche 3, fig. 1, *e*.
(5) Planche 4, fig. 2.

autour la portion libre de chacun de ces lobes accessoires. Les lobes principaux ne présentent rien de semblable, mais se terminent chacun par deux lèvres d'inégale longueur que séparent un sillon transversal; la lèvre interne descend beaucoup plus bas que la lèvre externe, et au milieu de celle-ci on remarque un petit lobule saillant et obtus (1). L'ouverture buccale occupe l'extrémité inférieure du corps et consiste en une large fente transversale comprise entre les deux lobes principaux, et bornée de chaque côté par les lobes latéraux qui ont une grande épaisseur et s'avancent très loin entre les premiers (2). Enfin l'entrée de la cavité digestive est rétrécie par une membrane froncée, qui se porte des lobes principaux aux lobes latéraux, et le pourtour de l'orifice ainsi circonscrit est garni par un grand nombre d'appendices filiformes et très contractiles (3), qui constituent une espèce de frange transversale et correspondant par leur insertion au fond du sillon que nous avons déjà indiqué comme divisant l'extrémité de ces lobes en deux lèvres superposées.

La cavité alimentaire occupe l'axe du corps, et consiste principalement en une grande excavation de forme à-peu-près cylindrique, qui surmonte l'ouverture buccale, et qui peut être considérée comme une *chambre pharyngienne* (4). Cette chambre communique librement au-dehors par l'ouverture dont il vient d'être question, et s'étend jusque vers le tiers supérieur du corps, où elle se termine brusquement. Dans sa partie inférieure, elle n'offre rien de particulier; mais dans sa moitié supérieure on aperçoit deux appendices membraneux, qui correspondent à la ligne médiane des lobes principaux, et qui ressemblent assez à une sorte d'intestin droit suspendu au milieu de l'appareil digestif, mais qui, dans la réalité, consistent chacun en une double lamelle membraneuse, légèrement froncée et adhérant aux parois de cette cavité (5). Cet organe ne renfermait pas de corps oviforme; mais d'après sa structure et d'a-

(1) Planche 2, fig. 3.
(2) Planche 3, fig. 1, *f*.
(3) Planche 2, fig. 3, et planche 3, fig. 1.
(4) Planche 3, fig. 1, *g*.
(5) Planche 2, fig. 4, *g*, et planche 4, fig. 1, *i*.

près sa ressemblance avec l'appareil générateur des Cydippes, je suis porté à le considérer comme étant un *ovaire*. A la voûte de la cavité pharyngienne, se trouve une ouverture médiane qui conduit dans une seconde chambre commune à l'appareil digestif et au système vasculaire, et tout autour on aperçoit une multitude de cils vibratiles qui se meuvent avec rapidité et déterminent l'entrée des liquides gastriques dans ce système de canaux.

L'orifice dont il vient d'être question débouche dans une cavité subpyriforme (1), qui occupe l'extrémité supérieure de l'axe du corps et qui constitue comme l'estomac des Méduses une sorte de réservoir central de l'appareil circulatoire. Tous les gros vaisseaux en partent, et le trajet de ceux-ci est facile à constater soit par l'observation des mouvemens du liquide chargé de globules, qui les traverse sans cesse pendant la vie, soit par l'injection de matières colorantes dans leur intérieur. Quatre de ces troncs naissent dans le tiers inférieur de cette cavité gastrique et se dirigent obliquement en haut et en dehors (2); parvenue au fond de la grande dépression infundibuliforme de l'extrémité supérieure du corps (3), ces canaux se divisent chacun en deux branches, qui continuent à se porter en haut et en dehors jusqu'à ce qu'elles aient gagné le bord de cette excavation, puis se recourbent en bas et suivent les côtes ciliées dont il a déjà été question. Le vaisseau qui longe ainsi chacune des côtes accessoires se continue ensuite sur le lobe accessoire correspondant dont il suit le bord libre jusqu'à la base de l'appendice tentaculaire; le vaisseau qui marche sous chacune des côtes ciliées principales, parvenu au bord inférieur des lobes latéraux, se recourbe en haut et en dedans pour aller se terminer au même point que le précédent, et les deux branches nées d'un même tronc primitif se réunissent ainsi de nouveau au sommet de la grande échancrure qui sépare le lobe accessoire des deux lobes principaux correspondans. Deux autres canaux (4) naissent

(1) Planche 3, fig. 1, et planche 4, fig. 1, *c*.
(2) Planche 3, fig. 1, et planche 4, fig. 1, *d*, *d*.
(3) Planche 3, fig. 1, *a*.
(4) Planche 3, fig. 1, *b*.

également des côtés du réservoir central, mais un peu plus bas que les troncs que je viens de décrire, et se portent directement en bas en suivant la ligne médiane qui divise en deux moitiés symétriques chacun des lobes principaux; ces vaisseaux sont placés très superficiellement comme les précédens et offrent à leur extrémité inférieure un petit renflement pyriforme, d'où naissent deux branches qui se portent directement en dehors en suivant le bord du repli labial externe de ces lobes, puis se recourbent en haut et vont s'anastomoser avec les deux branches que nous avons déjà vus se réunir dans l'angle formé par la jonction du lobe accessoire avec le lobe latéral; une branche se détache de ce point anastomotique, et descend le long de l'appendice tentaculaire correspondant (1). Enfin de chacun de ces mêmes points de jonction naît un autre canal (2) qui suit le bord inférieur du lobe principal, et qui, arrivé sur la ligne médiane de ce lobe se réunit à son congénère, pour constituer un tronc médian (3) qui remonte en ligne droite vers le réservoir central en longeant la face interne du lobe et en marchant par conséquent au-dessous du vaisseau superficiel que nous avons déjà vu suivre le même trajet; à son extrémité supérieur, il s'élargit et communique avec l'extrémité inférieure de la cavité centrale de l'appareil vasculaire, laquelle représente comme, je l'ai déjà dit, l'estomac des Méduses.

Un liquide incolore, mais chargé de petits globules arrondis, circule dans ce système de canaux, et paraît être mis en mouvement par les cils vibratiles dont l'entrée du réservoir central est garni. Le courant n'est ni rapide ni régulier, mais paraît se diriger de bas en haut dans les canaux situés sous les côtes ciliés et de haut en bas dans les canaux appartenant aux lobes principaux.

Le cercle circulatoire est, par conséquent, complet, et il est à noter que les vaisseaux des deux faces opposées du corps ne communiquent directement entre eux que par l'intermédiaire

(1) Planche 3, fig. 1, *e*.
(2) Planche 3, fig. 1, *i*.
(3) Planche 3, fig. 1, *j*.

du réservoir gastrique. Au-dessous du renflement pyriforme de l'extrémité inférieure du vaisseau superficiel et médian du lobe principal, on aperçoit un petit appendice cylindrique et tubulaire (1) qui naît au fond du sillon situé sous la base de la lèvre externe de ce même lobe, et qui est entourée à sa base par de nombreux filamens tentaculaires. Cet organe est ouvert librement à son extrémité inférieure et se termine par quatre lobules (2); un canal dilatable en occupe toute la longueur et se termine supérieurement par un tubercule arrondi qui fait saillie dans l'intérieur du renflement vasculaire placé au-dessus, et qui paraît être perforé de façon à établir une communication entre le système circulatoire et l'extérieur; on peut considérer, par conséquent, ces organes comme des appareils excrétoires et les comparer à ceux que M. Ehrenberg a décrits chez certaines Méduses, et que ce savant désigne sous le nom d'*anus*.

D'après les détails qui précèdent, on a pu voir que la structure des Lesueuria est plus compliquée que celle attribuée jusqu'ici aux animaux de la même famille, et cependant les organes dont il vient d'être question ne sont pas les seuls dont ces animaux sont pourvus, ils en possèdent d'autres dont l'importance est non moins considérable.

Lorsqu'on examine avec attention le fond de la grande excavation de l'extrémité supérieure du corps (3), on y aperçoit quatre mamelons qui correspondent à la ligne médiane des quatre lobes principaux, et au milieu de ces bosselures on découvre un petit tubercule qui occupe l'axe du corps et qui se fait remarquer par sa couleur rouge (4); sa forme est sphérique, et sa surface granulée de façon à présenter exactement l'aspect de ces corps brillans qu'on trouve au pourtour de l'ombrelle de la plupart des Méduses, et que M. Ehrenberg considère comme étant des yeux. Le savant que je viens de citer a remarqué au-dessous de chacun de ces points oculiformes des Méduses un petit corps jaunâtre ou blanchâtre qui paraît y envoyer

(1) Planche 3, fig. 1, et planche 2. fig. 3, *b*.
(2) Planche 2, fig. 3, *c*.
(3) Planche 2, fig. 2.
(4) Planche 3, fig. 1, et planche 4, fig. 1, *k*.

deux filamens, mais qui ne donne pas d'autres branches; M. Ehrenberg pense que ces corps sont des ganglions nerveux, mais son opinion a été rejetée par quelques naturalistes comme ne reposant pas sur des preuves suffisantes.

Dans l'animal dont la description nous occupe ici, j'ai constaté l'existence d'un organe semblable, et sa conformation est tellement caractéristique, qu'on ne pourra, je le crois, se refuser à admettre que c'est bien réellement le centre d'un système nerveux. Effectivement, presque immédiatement au-dessous du point oculiforme se trouve un corps subpyriforme d'apparence ganglionnaire (1), qui est d'un tissu plus opaque que les parties voisines, et qui donne naissance à un grand nombre de filamens. La disposition de cet appareil a la plus grande analogie avec celle du système nerveux des Biphores (2); seulement les filamens que je considère comme étant des nerfs ne sont pas placés tous sur le même plan, et forment quatre faisceaux qui descendent obliquement vers le bord inférieur et externe des lobes principaux du corps; quelques-uns de ces filamens déliés paraissent s'arrêter vers la base des lobes accessoires, mais on peut suivre la plupart jusqu'auprès de la rangée d'appendices filiformes située près du bord de chacun des lobes principaux, et pendant leur trajet vers cette partie plusieurs paraissent se ramifier. Enfin il existe aussi, au milieu de chacune des côtes ciliées, un petit filament longitudinal (3) qui paraît être aussi de nature nerveuse, et qui donne de chaque côté une multitude de ramuscules; ceux-ci naissent par faisceaux, d'une manière très régulière, au-dessous de chacune des crêtes transversales auxquelles se fixent les franges vibratiles, et vers le milieu de l'espace que ces crêtes laissent entre elles; il paraîtrait même exister un petit renflement ganglif.rme à l'origine des branches correspondantes aux crêtes, mais je n'oserais affirmer que la tache qu'on aperçoit dans ce point appartienne réellement à

(1) Planche 3, fig. 1, et planche 4, fig. 1, *l*.

(2) Voyez les figures que j'ai données du système nerveux des Biphores, dans la nouvelle édition du Règne animal de Cuvier (Mollusques, Pl. 121).

(3) Planche 4, fig. 2.

l'appareil dont il est ici question. A l'extrémité supérieure du corps les filamens verticaux se continuent au-delà des côtes ciliées et se réunissent deux à deux en se dirigeant vers le ganglion central placé sous le point oculiforme; j'ai pu les suivre jusque tout auprès de cet organe, mais il m'a été impossible de m'assurer si effectivement ils communiquent avec lui. Quoi qu'il en soit, il me paraît évident que les Lesueuries possèdent un système nerveux bien distinct, et que ce système, loin de ressembler à celui dont M. Grant a annoncé l'existence chez les Cydippes, offre la plus grande analogie avec celle des Tuniciers. Cette analogie est en faveur de l'opinion de M. de Blainville touchant les affinités naturelles des Béroïdes avec les Mollusques; mais tout ce que nous savons du mode de structure des autres parties du corps montre l'existence de liens bien plus nombreux et plus étroits entre ces animaux et les Acalèphes ordinaires. Du reste, les passages entre les Mollusques et les Zoophytes sont plus nombreux et plus marqués qu'on ne l'admet généralement; et pour mettre la classification de cette partie du règne animal en harmonie avec les véritables principes d'une méthode naturelle, il faudrait peut-être rapprocher plus qu'on ne l'a fait ces deux grandes divisions.

§ III.

Observations sur le Beroe Forskalii.

La *Medusa beroe*, observée par Forskal (1) dans la mer Méditerranée, et désignée par quelques zoologistes sous les noms de *Beroe ovatus* (2), de *Beroe elongatus* (3), d'*Idya Forskahlii* (4), de *Beroe Chiajii* (5), etc., est très commune dans la

(1) Descriptiones animalium quæ in itinere orientali observavit P. Forskal, page 111.

(3) Lamouroux, Dictionnaire classique d'histoire naturelle, tome II, page 298. — Delle Chiaje, Mem. sul Anim. s. vert. Di Nap. tomes III et IV.

(3) Risso, *Histoire naturelle de l'Europe méridionale*, tome V, page 303. C'est à tort que l'auteur ne mentionne que six côtes longitudinales : il en existe huit.

(4) Lesson, *Mémoire sur les Béroïdes*, Annales des Sciences naturelles, deuxième série, tome V, page 258.

(5) Lesson, loc. c. page 256.

baie de Nice, et y présente des variations individuelles si considérables, qu'au premier abord, on serait porté à le considérer comme formant deux ou même trois espèces distinctes; mais ces différences paraissent dépendre principalement de l'âge de ces animaux, et on trouve facilement tous les degrés intermédiaires entre les états les plus disparates. Les individus de petite ou de moyenne taille sont presque incolores (1); ceux d'une grande taille offrent une teinte ferrugineuse ou rose violacé plus ou moins intense, due à une multitude de petits points de cette couleur répandu dans le tissu hyalin du corps (2). Ces derniers individus sont aussi plus aplatis que les premiers, et la grande ouverture buccale qui les termine inférieurement est moins souvent contractée; mais ces différences ne sont pas les seules qui paraissent dépendre de l'âge de nos Béroés, et, en examinant attentivement ces animaux, on en découvre d'autres qui sont encore plus propres à en imposer sur l'identité spécifique de ces animaux. Effectivement, chez les jeunes individus, les huit côtes ciliées dont le corps de l'animal est garni longitudinalement, n'en occupent souvent que la moitié supérieure, tandis que, dans les grands, ces mêmes côtes s'étendent jusque tout auprès du bord inférieur ou buccal. Enfin, il existe, comme nous le verrons bientôt, des modifications encore plus considérables dans la disposition des canaux ou vaisseaux circulatoires dont le corps de ces Acalèphes est creusé; mais toutes ces particularités dépendent évidemment du degré de développement de l'animal, et ne peuvent être considérées comme caractéristiques d'espèces distinctes, car ils se nuancent d'un individu à un autre, et sont toujours d'autant plus marqués que les individus soumis à l'examen comparatif sont plus éloignés entre eux par leur âge et leur volume.

Cette diversité dans l'aspect et dans la structure des différens individus appartenant évidemment à une même espèce, est encore augmentée par les changemens qui peuvent s'opérer dans la forme générale d'un même individu, suivant qu'il est en repos

(1) Planche 6, fig. 1.
(2) Planche 5, fig. 1.

ou en mouvement, qu'il contracte ou qu'il dilate la grande ouverture terminale de son corps, qu'il s'allonge, qu'il se renfle en forme de boule, qu'il se renverse sur lui-même de façon à ressembler à une cloche à bords relevés, ou qu'il fasse rentrer l'extrémité supérieure de son corps au point de prendre l'apparence d'un cylindre percé aux deux bouts. Il en résulte de grandes difficultés, lorsqu'on veut assigner à cette espèce des caractères précis, et la distinguer des autres espèces décrites par les auteurs. Effectivement, la plupart des particularités de forme, de couleur, ou même de structure, que les zoologistes signalent comme propres à caractériser ces espèces, sont seulement de ces traits mobiles que nous avons vus changer d'individu à individu, et, dans l'état actuel de la science, il serait difficile de dire en quoi la Béroé de la Méditerranée diffère réellement de celle trouvée aux Antilles par Brown (1), et considérée généralement comme le type de l'espèce appelée *Beroe ovatus* par les classificateurs (2), de celle observée par Othon Fabricius (3) et par Saars (4) dans les mers du Nord, et décrite par ces naturalistes sous le nom de *Beroe cucumis*, même du *Beroe capensis* de Chamisso (5), du *Beroe punctata* du même naturaliste (6), et du *Beroe macrostomus* de Peron et Lesueur. (7)

Je ne chercherai donc pas à débrouiller la synonymie de ces Acalèphes, et, pour éviter en même temps des rapprochemens qui pourraient être erronés et des distinctions inutiles, je me bornerai à désigner l'espèce dont il est ici question sous le nom de *Beroe Forskalii*, et à la considérer comme étant identique avec le *Medusa Beroe albens* de Forskal (8), avec le *Medusa beræ rufescens* du même auteur, ou le *Beroe rufescens* des zoo-

(1) Hist. of Jamaica, tab. 43. fig. 2, reproduite dans l'Encyclop. Vers. Planche 90, fig. 2.

(2) Lamarck, Histoire des animaux sans vertèbres, 2e édition, tome III, page 50.

(3) Fauna Groenlandia, page 461.

(4) Beskrivelser over Polyp., etc. page 30, planche 6, fig. 15.

(5) Mémoires des Curieux de la nature de Bonn, tome X, page 30, fig. 4. — Eschscholtz, Syst. der Acalephen, page 37.

(6) Chamisso, loc. cit. Planche 31, fig. 1. — Eschscholtz, loc. cit. Planche 3, fig 2.

(7) Voyage aux Terres Australes, planche 31, fig. 1.

(8) Op. cit.

logistes modernes (1), et avec le *Beroe ovata* de M. Delle Chiaje (2), et l'*Idya Forskahlii* de M. Lesson. (3)

Plusieurs naturalistes ont cru que le corps de ces Béroés avait la forme d'un sac ouvert aux deux bouts (4); et effectivement, lorsque l'animal n'est pas dans son plus grand état de dilatation, son extrémité supérieure est rentrée en elle-même, et se fronce de façon à simuler un orifice assez grand, bien que contracté, et opposé à celui qui occupe l'extrémité inférieure de son corps: mais cette apparence est trompeuse, et lorsqu'on observe avec un peu de persévérance un de ces Acalèphes placé vivant dans de l'eau de mer, on ne tarde pas à se convaincre de l'absence de ce prétendu orifice central à la partie supérieure du corps, et à s'apercevoir que ce point est occupé par une fossette au centre de laquelle est logé un organe oculiforme (5) analogue à celui dont il a été question chez le *Lesueuria vitrea*. Cette fossette est dirigée transversalement, et divise l'animal en deux moitiés semblables correspondantes aux deux faces aplaties de son corps; on y remarque une bordure membraneuse décrivant deux ellipses qui seraient réunies par le gros bout, et qui embrasseraient dans ce point l'organe oculiforme (6). Cette membrane est à son tour garnie d'une espèce de frange marginale, composée d'appendices filiformes renflés vers le bout et groupés de façon à offrir un aspect arborescent. Enfin, la frange et la membrane qui la porte sont très contractiles, et lorsqu'elles se déplacent, elles affectent souvent la forme de deux petites couronnes, et peuvent alors faire croire facilement à l'existence

(1) Eschscholtz, loc. cit. page 38. — Dujardin, Annotations de la deuxième édition de Lamarck, tome III, page 52.

(2) Mem. su la storie e notomia degli animali senza vertebre. Di Napoli, tome IV.

(3) Annales des Sciences naturelles, deuxième série, tome V, page 258.

(4) Ainsi Cuvier indique comme caractères du genre *Idya* d'Oken (ou Béroé proprement dit) d'avoir le corps en forme de sac, garni de côtes ciliées et *ouvert aux deux bouts* (Règne animal, tome 3, page 281, 2e édition).

M. Delle Chiaje décrit et figure ces deux grandes ouvertures opposées, et dit que l'eau qui pénètre dans la grande cavité du corps des Béroés par l'ouverture antérieure (ou inférieure) sort par l'orifice antérieure (voyez Mem. sul Anim. s. vert. tome II, pages 50 et 57, planche 31, fig. 21, et tome IV, page 12, planche 52, fig. 1).

(5) Planche 5, fig. 4, *i*, et Pl. 6, fig. 1*b*, *a*.

(6) Planche 5, fig. 4, *j*, et Pl. 6, fig. 1*b*, *c*.

d'une ouverture bilobée ou de deux ouvertures distinctes dont elles formeraient le bord ; mais l'espace qu'elles circonscrivent n'est pas perforé.

L'organe oculiforme situé au centre de cette bordure frangée et occupant l'axe du corps de l'animal, est un petit mamelon pyriforme à la base duquel se trouve un point sphérique de couleur rouge et d'aspect granuleux, qui renferme plusieurs corpuscules cristalloïdes, et qui repose à son tour sur une petite masse arrondie d'apparence ganglionnaire, mais ne donnant pas distinctement naissance à des filamens comme cela a lieu dans l'Acalèphe dont il vient d'être question dans l'article précédent. Il est cependant à noter qu'ici encore on voit un organe filiforme qui s'étend de l'extrémité supérieure de chacune des côtes ciliées vers ce point gangliforme, et je suis porté à croire que ce sont des nerfs allant y aboutir ; il m'a paru aussi que ces filamens se divisent chacun en deux branches à l'extrémité supérieure de la côte ciliée correspondante, et se continuent ainsi le long de ces bandes verticales. Il me semble donc bien probable que les Béroés, de même que les Lesueuria, sont pourvus d'un système nerveux à centre ganglionnaire unique, très analogue à celui des Biphores, et ne ressemblant en rien à l'appareil nerveux annulaire que M. Grant croit exister chez les Cydippes. (1)

La grande cavité qui occupe presque toute la longueur du corps de notre Béroé, et qui communique librement avec l'extérieur par l'ouverture située à sa partie inférieure, est à parois lisses, et ne m'a offert aucune trace de l'appareil intestinal que M. Delle Chiaje a cru y avoir trouvé (2) ; j'ai examiné une vingtaine d'individus appartenant bien certainement à la même espèce que ceux observés par ce savant, et il m'a été facile de

(1) *On the nervous system. of the Beroe pileus*, by R. Grant. Trans. of the Zool. Soc. of London, tome 1, page 9.

(2) Voici comment M. Delle Chiaje s'exprime à ce sujet : « L'interno del Beroe è voto e l'acqua qui vi s'introduce per l'oriticio anteriore esce del posteriore, communicando con quello il principio del *canale degli alimenti dritto, attacato intorno con molti intestini ciechi alle pareti interne del corpo, ed essendo poi aperto verso il foro posteriore di questo* » (Op. cit. tome IV, page 12, planche 52, fig. 3 *a*).

m'assurer de l'absence constante de ce tube alimentaire. Au fond de cette grande cavité pharyngienne, se trouve une ouverture transversale garnie de deux lèvres épaisses, renflées, et d'un tissu plus consistant que celui du reste du corps (1). Ces lèvres ne se rencontrent que vers le milieu de leur bord libre, et, par conséquent, laissent l'ouverture qui les sépare béante de chaque côté. La cavité qu'elles servent à clore de la sorte est très petite, et correspond évidemment à l'estomac central des Méduses et à la cavité qui, dans le genre *Lesueuria*, fait l'office d'un réservoir central pour l'appareil circulatoire; vers sa partie inférieure, on y distingue deux ouvertures arrondies, placées sur la ligne médiane des lèvres dont il vient d'être question, et correspondant par conséquent au milieu des deux faces un peu aplaties du corps; ces orifices conduisent, comme nous le verrons bientôt, dans le système vasculaire interne, et au-dessus d'eux, la cavité gastrique se prolonge sous la forme de deux loges garnies supérieurement de quelques cils vibratiles, et donnant chacune naissance à deux canaux superficiels, dirigés à droite et à gauche à-peu-près comme chez le *Lesueuria*, mais beaucoup plus courts. Bientôt ces canaux se divisent chacun en deux branches, et il en résulte pour l'une et l'autre surfaces du corps quatre troncs vasculaires qui correspondent aux côtes ciliées et qui descendent verticalement sous ces côtes jusqu'au bord de la grande ouverture occupant l'extrémité inférieure du corps (2). Là, ces huit troncs débouchent dans un vaisseau transversal, annulaire, et celui-ci communique à son tour avec deux trous verticaux situés sur un plan beaucoup plus profond que tous les précédens; enfin ces deux canaux montent verticalement en longeant la face interne de la grande cavité pharyngienne, et vont déboucher dans la cavité stomachique par les deux orifices dont il a déjà été question.

Dans le jeune âge, les divers canaux dont je viens d'indiquer le trajet sont d'une simplicité extrême; mais, chez les individus de moyenne taille, chacun d'eux donne naissance à une multi-

(1) Planche 6, fig. 1 *d*.
(2) Planche 6, fig. 1 *e*.

tude de prolongemens plus ou moins claviformes qui se prolongent à droite et à gauche dans la substance du corps et qui se terminent en cul-de-sac (1). Par les progrès de l'âge, ces cœcums se ramifient de plus en plus, et ils finissent par s'anastomoser entre eux, de façon que, chez les individus de grande taille, tout l'espace compris entre les huit troncs longitudinaux est occupé par un réseau vasculaire assez serré (2), et que ce réseau superficiel communique fréquemment avec celui développé de la même manière à la surface interne du corps par les divisions des deux troncs profonds du système circulatoire.

L'appareil vasculaire que je viens de décrire est rempli par un liquide en mouvement, chariant avec lui une multitude de globules circulaires et incolores. Le courant se dirige de l'anneau vasculaire inférieur vers le sommet du corps dans l'intérieur des huit canaux superficiels, placés sous les côtes ciliés, et redescend ensuite en sens contraire par les deux canaux profonds qui se rendent dans le vaisseau annulaire déjà mentionné, et complètent ainsi le cercle circulatoire. Le liquide nourricier circule de la sorte avec assez de rapidité, et cependant il n'existe aucun moteur semblable à celui qui détermine ce mouvement chez les animaux supérieurs. Les Béroés n'ont point de cœur, et leurs vaisseaux ne paraissent pas être contractiles comme ceux de beaucoup de vers; mais certains de ces vaisseaux sont garnis intérieurement de cils vibratiles, et ce sont les mouvemens de ces cils qui produisent le courant circulatoire. Les cils vibratiles qui suppléent ainsi au cœur ne sont pas répandus dans tous les gros troncs et n'existent d'une manière bien évidente que dans l'anneau vasculaire de l'extrémité inférieure du corps et dans la partie la plus voisine des canaux qui en naissent: ils y exécutent des mouvemens très rapides et sont d'une finesse si grande, qu'il m'a été impossible de les distinguer dans l'état de repos.

La disposition générale de l'appareil vasculaire offre, comme on a pu le voir, beaucoup d'analogie avec celle du système circulatoire des Lesueuria; mais une différence importante

(1) Planche 6, fig. 1^e.

(2) Planche 6, fig. 1^e.

consiste dans l'absence de toute trace d'appareil excrétoire, qui, chez ces derniers, termine chacun des vaisseaux longitudinaux profonds. Je n'ai pu découvrir dans cette partie du corps aucun orifice semblable, et pendant long-temps j'ai pensé que le système vasculaire des Béroés ne pouvait communiquer avec l'extérieur que par l'intermédiaire de la bouche ; mais, en examinant attentivement ces animaux à l'état vivant, et lorsque rien ne gênait leurs mouvemens, je me suis assuré de l'existence de deux émonctoires, situés, non au bord inférieur du corps, comme chez les autres Acalèphes; mais, à son extrémité supérieure dans le fond de la fossette, qui loge l'organe oculiforme. Effectivement, lorsque cette partie était dans un grand état d'extension, j'ai souvent vu une sorte d'ampoule s'y montrer tout-à-coup de l'un ou de l'autre côté de la fossette terminale (1). La vésicule, ainsi formée, se renflait rapidement et laissait apercevoir dans son intérieur un mouvement de rotation ou de tourbillonnement rapide; puis elle s'ouvrait par son sommet, laissait échapper les matières ainsi agitées et se contractait ensuite au point de disparaître complètement et de ne laisser d'autre trace de son excrétoire, qu'un pore à peine visible. Ces ampoules excréteurs et ces pores communiquent avec la cavité gastrique servant de réservoir central de l'appareil vasculaire, et sont placés latéralement en dehors de la membrane frangée qui occupe le milieu de la fossette (2). Je n'ai pu constater l'existence que de deux de ces émonctoires, savoir un pour chaque moitié du corps, et ils occupent l'extrémité supérieure de l'espace compris entre les côtes mitoyennes et externes, de façon à être opposés entre eux, l'un se trouvant à gauche et l'autre à droite de l'organe oculiforme. D'après leur position, j'ai pensé qu'il devait y en avoir quatre, ce qui aurait rendu l'animal parfaitement symétrique; mais il m'a été impossible de découvrir la moindre trace d'un second pore de chaque côté du corps.

La saison de l'année pendant laquelle j'ai étudié les Béroés, n'étant pas celle de la multiplication de ces animaux, je n'ai pu

(1) Planche 5, fig. 4, *k*.
(2) Planche 6, fig. 1*b*, *d*, *d*.

observer d'une manière satisfaisante les organes générateurs de ces animaux. M. Delle Chiaje dit qu'à la surface interne de chacune des huit côtes ciliées se trouve un oviducte longitudinal auquel sont appendues de chaque côté des grappes d'ovules (1). Chez les grands individus que j'ai eu l'occasion d'observer, j'ai vu quelque chose de semblable; mais d'après le résultat d'un examen attentif, je suis porté à croire que la description donnée par le savant anatomiste de Naples, n'est pas tout-à-fait exacte. En effet, j'ai trouvé de chaque côté des bandes frangées dont j'ai déjà eu l'occasion de parler si souvent, une multitude de grappes de couleur rosée et de forme irrégulière qui me paraissent devoir être des ovaires (2), mais ces grappes renfermées dans l'épaisseur du tissu du corps ne consistaient que dans des boursouflures multipliées de la membrane qui tapisse les canaux vasculaires prenant naissance de chaque côté des huit troncs verticaux superficiels; les petites loges formées par ces boursouflures communiquaient avec la cavité du vaisseau, et celui-ci ne se rendait pas dans un oviducte particulier, mais dans le tronc vasculaire correspondant. Enfin, j'ajouterai encore que les granules rougeâtres accumulés dans les parois de ces grappes ressemblaient exactement à ceux répandus dans toute la longueur des canaux secondaires du système vasculaire des individus de grande taille. En admettant que cette membrane froncée constitue réellement l'ovaire, la disposition de l'appareil générateur serait moins différente de ce qui existe chez les Méduses ordinaires qu'on ne l'aurait supposée d'après les recherches de M. Delle Chiaje.

Lorsqu'on examine au microscope le tissu de ces Acalèphes, on y distingue une multitude de filamens d'une ténuité extrême qui s'entrecroisent en différens sens et qui pourraient bien être de nature musculaire. Il existe aussi près de la surface du corps un nombre immense de corpuscules pyriformes terminés par une sorte de queue très grêle, qui ressemblent beaucoup à ceux dont la peau de certaines Méduses est garnie, et

(1) Op. cit. tome IV, page 12.

(2) Planche 5, fig. 1, et Pl. 6, fig. 1ᵉ.

qui semblent devoir être des organes sécréteurs. J'avais pensé que ces glandules pourraient bien être la source de la lumière phosphorescente dont les Béroés brillent avec tant d'éclat; mais en observant avec attention cette lueur, il m'a semblé qu'elle partait principalement du voisinage des côtes ciliées, tandis que c'est dans l'intervalle comprise entre ces côtes que se trouvent les granules pyriformes. La lumière que ces animaux répandent ainsi, avait été aperçue par Forskal et observée plus récemment par Rolando; elle est de couleur verte et offre souvent beaucoup d'intensité; pour en déterminer l'émission, il suffit d'exciter l'animal en l'irritant mécaniquement, mais lorsque les décharges, ainsi produites, se succèdent rapidement, leur intensité s'affaiblit beaucoup.

J'ajouterai encore qu'au dessous du vaisseau annulaire, il excite sous les tégumens communs un nombre considérable de filamens parallèles disposés transversalement, de façon à représenter une sorte de sphincter autour de la grande ouverture buccale, et cette disposition explique la forte contractilité de cette partie. Quant aux organes moteurs des franges vibratiles, formant les huit côtes longitudinales, je n'ai pu rien distinguer. Ces franges, comme on le sait, sont fixées sur de petites crêtes transversales disposées à-peu-près comme les échelons d'une échelle, et elles paraissent différer par leur structure des cils vibratiles avec lesquels on les confond souvent; en effet, ce ne sont pas des appendices filiformes, mais des lanières membraneuses plus ou moins profondément subdivisées vers leur extrémité libre et constituent par leur ensemble une petite palette semi-ovalaire (1). Les mouvemens de ces appendices flabelliformes sont très rapides et ne s'interrompent que rarement quand l'animal est vigoureux, mais cessent dès qu'on touche la partie qui en est le siège. Les diverses rangées de franges superposées sur une même côte sont indépendantes entre elles quant à leurs mouvemens, et en général l'excitation portée sur l'une n'influe pas sur l'action des rangées voisines. Enfin, il paraîtrait aussi que l'animal possède la faculté d'exécuter ou d'arrêter ces mou-

(1) Planche 6, fig. 1 c.

vemens à volonté, et il est à noter qu'ils persistent très longtemps dans les fragmens de ces côtes frangées, séparées du reste du corps, et cela sans changer de caractères, car on les arrête encore en touchant le fragment; mais dans les portions ainsi isolées, la sensibilité se perd plutôt que la contractilité, car au bout d'un certain temps, les vibrations de ces franges persistent avec force et ne s'arrêtent plus sans l'influence du contact d'un corps étranger.

§ IV.

Description de la STEPHANOMIA CONTORTA *et de la* STEPHANOMIA PROLIFERA.

De tous les êtres bizarres dont la mer fourmille, il n'en est peut-être aucun qui soit aussi singulier et aussi embarrassant pour les zoologistes que ces longues guirlandes animées, découvert par Péron et Lesueur, durant leur mémorable voyage aux terres australes, et désignés par ces observateurs habiles sous le nom générique de *Stéphanomies*. Effectivement, par leur forme générale, ces Zoophytes ne ressemblent en rien aux animaux ordinaires, et l'anomalie de leur structure est si grande qu'au premier abord il est même impossible de se former une idée de la nature des organes variés et nombreux dont ils sont pourvus; enfin leur étude est doublement difficile, parce qu'on ne les rencontre que rarement, et parce que la délicatesse de leurs tissus est si grande qu'il est plus rare encore de prendre, sans les briser, ceux que l'on voit flotter près de la surface de la mer. Aussi nos connaissances sur les Stéphanomies, de même que sur les autres animaux de la famille des Physophoriens, sont-elles restées très incomplètes, et voit-on parmi les zoologistes les opinions les plus discordantes relativement à leurs affinités naturelles. Malgré l'imperfection des observations que j'ai eu l'occasion de faire sur la structure de ces êtres, je n'hésite donc pas à les publier ici, car elles me semblent pouvoir intéresser les naturalistes, et je ne prévois pas le moment où il me sera possible de les continuer.

On n'avait pas encore, que je le sache, rencontré de Stéphanomies dans nos mers, et celle que j'ai trouvée dans la petite baie de Villefranche près de Nice, me paraît différer spécifiquement de celles décrites jusqu'ici; elle se rapproche cependant beaucoup de celle désignée par Péron et Lesueur sous le nom de *Stephanomia uviformis* (1), et considérée par M. Eschscholtz comme le type de son genre *Apolemia* (2); je proposerai de l'appeler *Stephanomia contorta*, à raison de la manière dont son rachis est enroulé en spirale.

Lorsque cet animal nage dans la mer, il a beaucoup de l'aspect du Physophore de Forskal. Effectivement, il offre supérieurement une masse arrondie résultant de l'assemblage des organes natateurs (3), et porte en dessous une multitude de filamens, de suçoirs et de vésicules, mais ces vésicules ne sont pas disposées de même que chez cette dernière espèce, et au lieu d'être ramassées en couronne, elles garnissent une sorte de tige ou de queue traînante. Pour débrouiller la structure compliquée de cette masse, il est nécessaire de la dérouler en partie, et on voit alors qu'elle se compose, comme la *Stephanomia uviformis*, de divers systèmes appendiculaires et d'une portion principale désignée communément sous le nom de *tige*. De même que chez les autres Physophoriens, il existe, à l'extrémité supérieure de cette tige, un petit appareil hydrostatique dont la structure est, du reste, plus compliquée qu'on ne l'avait pensé (4). En effet, cette extrémité de la tige, pyriforme et séparée des parties voisines par un étranglement, est creusée d'une cavité assez grande qui se continue inférieurement avec le canal dont le reste de la tige est creusée, et qui paraît communiquer au dehors par un pore central déjà signalé chez les Physophores par M. de Blainville (5). Cette cavité renferme un liquide jaune rougeâtre, et

(1) *Voyage de découvertes aux Terres Australes.* Hist. nat. Méduses, etc. Pl. (La principale figure de cette planche a été reproduite en partie dans le Dictionnaire des Sciences naturelles, Zoologie, planche 3.)

(2) System der Acalephen, p. 143.

(3) Planche 7, fig. 1, *a*.

(4) Planche 8, fig. 1, *b* et fig. 2.

(5) Manuel d'actinologie, p. 116.

loge, en outre, une vessie aérienne qui est ouverte par sa partie inférieure, et qui est maintenue dans sa position centrale par des cloisons membraneuses disposées radiairement et tendues entre ses parois et celles de la grande cavité pyriforme (1), à-peu-près de la même manière que les cloisons dont le tube alimentaire est environné chez les polypes de l'ordre des Alcyoniens. La tige (2) est très longue et comprimée latéralement, de façon à ressembler à un ruban épais contourné en spirale; l'un de ses bords est garni d'une sorte de petite crête membraneuse, l'autre donne attache au système appendiculaire et paraît être légèrement bosselé. Un canal central en occupe toute la longueur, fournit d'espace en espace une branche latérale destinée aux appendices, et communique supérieurement avec la cavité dont il vient d'être question; mais à l'extrémité inférieure de la tige, il se termine en cul-de-sac, et ne m'a pas offert l'orifice qu'un zoologiste habile a cru y apercevoir et a désigné sous le nom d'anus (3); une ouverture inférieure ne me paraît exister que chez les individus mutilés dont le canal central a été déchiré accidentellement par la séparation d'une portion de la tige. Enfin cette tige elle-même est garnie d'une multitude de lames membraneuses longitudinales, serrées les unes contre les autres comme les feuillets d'un livre, et fixées par leur bord sur les parois du tube central (4). Lorsque les tissus de notre zoophyte ont été exposés pendant quelque temps à l'action de l'alcool, il devient très facile de constater ce mode de structure, déjà signalée par Péron et Lesueur, dans la tige d'une espèce voisine; mais pendant la vie, il n'est pas aussi apparent, et toutes ces lames adhèrent entre elles de façon à former une masse en apparence homogène.

Les appendices de cette Stéphanomie sont de trois espèces : les uns constituent des instrumens de natation; d'autres portent des vésicules plus ou moins pyriformes, et d'autres encore, que j'appellerai *proboscidifères*, sont essentiellement caractérisés

(1) Planche 8, fig. 3.
(2) Planche 7, fig. 1, *b*; Pl. 8, fig. 1, *a*.
(3) Manuel d'actinologie, p. 116.
(4) Planche 8, fig. 5.

par l'existence d'un sac préhensile, ayant la forme d'une sorte de calice.

Les organes de natation forment d'ordinaire une masse ovoïde et alors se recouvrent en partie les uns les autres, de façon à simuler une disposition radiaire et à paraître comme s'ils étaient imbriqués (1); mais ce mode de groupement tient uniquement à la courbure en spirale de la tige qui les porte, et ces appendices ne constituent dans la réalité qu'une seule série linéaire, occupant la portion supérieure de la tige, au bord de laquelle ils sont fixés au moyen d'un pédoncule filiforme (2). Chacun d'eux (3) a la forme d'un cône tronqué vers le sommet et fortement comprimé vers la base, et se compose de trois parties : le *pédoncule*, dont il vient d'être question; une portion extérieure, que j'appellerai l'*étui*, et une partie interne, que je désignerai sous le nom de *sac*.

L'*étui* (4) est formé par un tissu d'un aspect gélatineux, mais d'une consistance assez grande, qui ressemble à la portion la plus dense du corps des Méduses, et qui ne perd pas sa transparence par l'action de l'alcool; dans sa moitié inférieure, cet étui est plein; mais, dans sa partie supérieure, on aperçoit une grande excavation ouverte au dehors, et c'est dans l'intérieur de cette fosse que se trouve le *sac*. Celui-ci (5) est une poche membraneuse, de forme trapézoïde, qui s'ouvre également au dehors par un grand orifice circulaire (6), situé au sommet de l'organe, et qui reçoit l'eau dans son intérieur. Son tissu est un peu moins transparent que celui de l'étui, et, par l'immersion dans l'alcool, il devient tout-à-fait opaque, et paraît composé de fibres musculaires parallèles; mais, ce qui l'en distingue surtout, c'est la contractilité dont il est doué. Effectivement, pendant la vie de l'animal, l'étui n'est le siége d'aucun mouvement, tandis que le sac se dilate et se resserre alternativement, de façon

(2) Planche 7, fig. 1, *a*.
(2) Planche 8, fig. 1.
(3) Planche 8, fig. 4, *c*.
(4) Planche 8, fig. 4, *b*.
(5) Planche 8, fig. 4, *c*.
(6) Planche 8, fig. 4, *d*.

à se remplir d'eau et à l'expulser tour-à-tour, et c'est à l'aide des jets de liquide ainsi produits que l'animal se déplace. Le pédoncule (1) se fixe au milieu du bord inférieur de l'étui, et se prolonge à travers la substance subcartilagineuse de cet organe, pour gagner le bord correspondant du sac où il se divise en deux branches, qui divergent et suivent ce bord jusque dans le voisinage de l'ouverture supérieure. Enfin, il est encore à noter que, pendant son trajet à travers l'étui, ce filament présente trois petits appendices lobulaires, et que sa portion libre, est assez longue pour ne gêner en rien les mouvemens de l'organe natateur.

La portion de la tige qui donne attache aux organes natateurs ne porte pas d'autres appendices, et c'est de la partie suivante de cette tige (2) que naissent les *organes proboscidifères* et les *appendices à vésicules*.

Les *organes proboscidifères* offrent une structure très compliquée et se composent d'un pédoncule (*b*), d'une foliole (*c*), d'une sorte de trompe contractile et affectant en général la forme d'un calice (*d*), d'une tigelle (*e*) et de divers tentacules plus ou moins filiformes (*f*). Le *pédoncule* est cylindrique, assez gros et semblable par son aspect à la tige commune dont il naît; à son extrémité, il porte la *foliole* qui consiste en une lame semicartilagineuse très mince, et courbée en forme de nacelle; à la base de cette expansion qui ressemble assez à une bractée, le pédoncule paraît se continuer avec la trompe (3). Celle-ci est rétrécie à sa base en forme de *col;* mais bientôt se renfle considérablement et constitue une sorte de sac ouvert à son extrémité et extrêmement contractile. Tantôt les bords de cet orifice sont resserrés de façon que la trompe devient pyriforme, tantôt ils se dilatent de manière à simuler un calice, et d'autres fois, s'épanouissant encore davantage, ses bords se recourbent en dehors jusqu'à sa base (4). Vers le fond de la partie cupuliforme de la

(1) Planche 8, fig. 4, *a*.
(2) Planche 9, fig. 1.
(3) Planche 9, fig. 2, *d*.
(4) Planche 9, fig. 1.

trompe, on remarque une série de stries verticales, de couleur rouge orangé qui font saillie dans sa cavité et qui ont l'apparence d'un tissu glandulaire; examinées au microscope, elles se montrent formées d'une multitude de villosités assez semblables à celles qu'on aperçoit à la surface de la membrane ovarienne de divers Acalèphes et, comme nous le verrons bientôt, elles paraissent constituer, en effet, l'organe générateur femelle. Enfin le fond de la cupule m'a semblé être en communication avec un petit canal qui règne dans toute la longueur de son pédoncule, et qui va déboucher dans le canal central de la tige; aussi suis-je porté à considérer cet organe comme une espèce de suçoir servant à l'introduction des matières nutritives en même temps qu'à la préhension. J'ajouterai encore que dans la substance des parois du col ou portion rétrécie de la trompe, on distingue, à l'aide du microscope, une multitude de vésicules ovoïdes.

Les *filamens tentaculaires*, dont le nombre varie, naissent du col de la trompe, près de l'insertion de celui-ci sur la folliole en forme de nacelle dont il a déjà été question (1). Au premier abord on pourrait croire que ces appendices forment une sorte de couronne autour de ce col, mais en les examinant avec attention, on voit qu'ils se fixent tous en série linéaire sur un de ses bords, absolument comme nous l'avons déjà vu pour les appendices de la tige, et que leur groupement en faisceau dépend de la courbure du col en spirale. Ils sont très longs, extrêmement contractiles, et offrent toujours une disposition plus ou moins marquée à se tordre ou à se rouler en spirale; leur portion basilaire est formée par un tissu gélatineux qui n'offre rien de remarquable; leur portion moyenne, qui est un peu élargie, et aplatie en forme de ruban, présente au contraire une structure très particulière (2); quelquefois elle paraît être vide, mais en général on y aperçoit une multitude de vésicules disposées avec une très grande régularité. Ces vésicules sont de deux sortes: les unes assez grandes et de forme ovoïde sont toujours inco-

(1) Planche 9, fig. 1 et 2, *f*.
(2) Planche 9, fig. 3 et 4.

lores et constituent de chaque côté du tentacule une série linéaire marginale; ils sont remplis de liquides et logent dans leur intérieur une seconde utricule fusiforme et jaunâtre (1). Les autres vésicules (2) sont beaucoup plus étroites, et ont souvent une forme naviculaire; mais elles se recouvrent les unes les autres de façon à ne laisser voir que leur extrémité et à simuler autant de granules sphériques (3); elles occupent le milieu du tentacule et sont disposées par rangées transversales un peu obliques, mais très régulières; tantôt elles sont incolores, tantôt colorées en rouge orangé. Enfin la troisième portion des filamens tentaculaires s'amincit de nouveau, et n'est jamais colorée, mais renferme encore des vésicules ovoïdes beaucoup plus petites que les précédentes et composées chacune d'une tunique extérieure transparente et d'un sac interne froncé (4). Ces utricules, de même que les vésicules naviculaires, présentent quelquefois un phénomène très remarquable qui s'observe surtout lorsqu'ils sont devenus libres, et qui, au premier abord, pourrait induire en erreur sur leur véritable nature; souvent on les voit éclater tout-à-coup et produire une sorte de boyau ou de queue; les utricules de la portion terminale du tentacule ne donnent ainsi naissance qu'à un cœcum d'apparence membraneux dont la longueur est de deux ou de trois fois celle de la tunique externe (5). Mais les vésicules naviculaires de la portion moyenne laissent sortir un appendice filiforme, qui paraît être d'abord enroulé en spirale à sa base, et qui s'allonge par secousses successives au point de constituer une espèce de queue extrêmement longue, et à donner à ces corps singuliers l'apparence d'animalcules spermatiques (4); mais ils n'exécutent jamais de mouvemens semblables à ceux des Zoospermes, et me paraissent devoir être considérés comme des organes urticans analogues à ceux de diverses Méduses, car sur la membrane

(1) Planche 8, fig. 6.
(2) Planche 8, fig. 7.
(3) Planche 9, fig. 4.
(4) Planche 8, fig. 8, *a*.
(5) Planche 8, fig. 8, *b*.
(6) Planche 8, fig. 9.

tégumentaire des bras et du disque de plusieurs de ces derniers Acalèphes, les Pélagies, par exemple, on trouve des groupes de vésicules d'une structure analogue qui expulsent de la même manière une sorte de queue filiforme.

Enfin, il naît aussi de la base du col de la trompe un appendice beaucoup plus gros que les précédens, et que j'ai désigné ci-dessus sous le nom de *Tigelle* (1); il est cylindrique, contourné irrégulièrement et composé d'un tissu granuleux, assez semblable à celui du pédoncule de ces appareils proboscidifères; en général, il est simple, mais lorsqu'il a acquis un développement considérable, on en voit naître souvent d'espace en espace des filamens tentaculaires semblables à ceux du col de la trompe. (2)

Les *appendices à vésicules* (3) qui naissent de la tige comme les organes proboscidifères, ont une structure moins compliquée, et consistent essentiellement en un pédicelle portant deux ou plusieurs sacs pyriformes (4) et un ou plusieurs prolongemens flabellaires (5) tantôt simples, tantôt garnis d'un ou de plusieurs groupes de vésicules (6). Ces sacs pyriformes qui naissent sur le pédicelle d'espace en espace, par un col étroit, sont très contractiles et leur intérieur paraît communiquer avec le tube central de la tige au moyen d'un canal capillaire creusé dans le pédicelle dont il vient d'être question; on remarque aussi au bas du col de la plupart de ces sacs un filament flabelliforme d'une structure analogue à celle du pédicelle, ou bien une petite masse d'aspect framboisée; enfin ces filamens flabelliformes se bifurquent quelquefois et se terminent par de petites touffes de vésicules de diverses grandeurs, lesquelles renferment chacune une cavité et offrent quelquefois une certaine ressemblance avec les organes natateurs. (7)

Les organes proboscidifères et les appendices dont il vient

(1) Planche 9, fig. 2, *e*.
(2) Planche 9, fig. 1, *e'*.
(3) Planche 9, fig. 1, *g*.
(4) Planche 9, fig. 1, *h*.
(5) Planche 9, fig. 1, *i*.
(6) Planche 9, fig. 1, *j*.
(7) Planche 9, fig. 1, *j'*.

d'être question naissent comme les organes natateurs du bord de la tige commune, et y forment une seule rangée linéaire. Leur disposition m'a paru être très régulière ; en effet, les organes proboscidifères naissent à des distances à-peu-près égales et dans chacun des espaces compris entre deux de ceux-ci, il existe deux appendices à vésicules. La longue guirlande feuillée représentée par la portion moyenne et inférieure de la Stéphanomie, se compose ainsi d'une série de segmens qui se répètent en quelque sorte, chacun d'eux étant pourvu d'un organe proboscidifère, précédé et suivi d'un appendice à vésicule. Le nombre de ces groupes de parties homologues varie suivant les individus, et paraît augmenter avec l'âge ; ceux qui sont placés les plus près de l'appareil natateur sont dans un état de développement plus avancé que ceux situés vers l'intrémité inférieure de la tige, et ces différences portent sur les deux sortes d'organes dont ils sont composés. Dans les organes proboscidifères les plus inférieurs, et en apparence les plus jeunes, la foliole en forme de nacelle manque, ou est très petite ; la tigelle, lorsqu'elle existe, est simple et ne porte pas de filamens, et les appendices tentaculaires peuvent également manquer, tandis que, dans les groupes situés plus haut, la foliole offre des dimensions de plus en plus considérables, et la tigelle s'allonge et se complique. Je suis même porté à croire qu'elle peut donner naissance non-seulement à des filamens tentaculaires semblables à ceux du col de la trompe, mais à des organes proboscidifères complets et à toutes les parties portées sur la tige elle-même, car il m'a semblé reconnaître une de ces tigelles dans un embranchement de la tige garnie de tous ces organes (1). A l'extrémité inférieure de l'exemplaire figurée dans la planche 7 on apercevait un appendice à vésicule dépourvue de filament flabellaire ainsi que de grappes, et portant un seul sac pyriforme. Le pénultième n'offrait aussi qu'un seul sac, mais avait déjà un petit appendice flabellaire ; l'antépénultième portait deux sacs pyriformes et des vestiges de grappes ; un peu plus haut sur la tige, chacun de ces appendices offrait trois sacs fixés à un pédicelle beaucoup

(1) Planche 7, fig. 1, *b'*.

plus long et deux ou plusieurs filamens flabellaires dont l'un souvent divisé en deux ou trois branches terminées par des paquets de vésicules très bien développés. Enfin, il est aussi à noter que ces divers organes se détachent très souvent de la tige commune, et que cette séparation est plus facile vers la partie supérieure que vers le bas de celle-ci. Les sacs pyriformes se détachent par la rupture de leur pédicelle; les organes proboscidiformes par la désunion de la foliole d'avec le col de la trompe, en sorte que celle-ci en tombant porte avec elle les filamens tentaculaires et la tigelle (1), et il est encore à noter que le fragment, ainsi séparé, continue à vivre, et ressemble beaucoup dans cet état à plusieurs corps désignés par les zoologistes sous le nom de Physophores.

En décrivant les diverses parties de la Stéphanomie tortillée, je me suis abstenu de toute conjecture sur leurs usages, parce que les individus que j'avais eu l'occasion d'observer n'avaient pas vécu assez long-temps pour me fournir quelques notions précises à cet égard; mais en étudiant une autre espèce, j'ai été assez heureux pour constater divers faits propres à me guider dans ces déterminations, et je reviendrai par conséquent sur ce sujet, lorsque j'aurai exposé les résultats auxquels l'examen de ce dernier Acalèphe m'a conduit.

C'est également dans la baie de Nice que j'ai rencontré cette seconde espèce de Stéphanomie, à laquelle je donnerai le nom de *Stephanomia prolifera*, mais je ne l'ai trouvée que mutilée. Elle se distingue de l'espèce précédente par l'absence de folioles et de filamens tentaculaires à la base des trompes et par la longueur considérable des sacs pyriformes (2). Je crois devoir y rapporter une portion de tige qui m'a montré un appareil hydrostatique, et quelques organes natateurs semblables à ceux de l'extrémité supérieure de la série chez la Stéphanomie contournée; mais je ne puis en donner une description complète, et je n'en aurais même pas fait mention, si les fragmens que j'ai examinés ne m'avaient offert quelques particularités dignes d'intérêt.

(1) Planche 9, fig. 2.

(2) Planche 10, fig. 1.

La portion postérieure de cette Stéphanomie vivait très bien quand je l'ai étudiée; en examinant au microscope ses diverses parties, je me suis assuré d'abord que le liquide contenu dans le tube médian de la tige et dans l'étui de l'appareil hydrostatique passe facilement dans les branches latérales qui se rendent aux organes proboscidiformes et aux appendices à vésicules. Puis j'ai vu que les sacs (1) fixés sur ces appendices sont également remplis d'un liquide et sont le siège d'un mouvement vibratile très énergique déterminé par des cils dont le sommet de leur cavité est garni. Or, en rapprochant ces faits de ceux que j'avais probablement constaté chez les Béroés, je suis porté à en conclure que, chez les Stéphanomies, les sacs pyriformes sont des organes d'impulsion pour le fluide nourricier, et peuvent par conséquent être comparés, jusqu'à un certain point, à des cœurs.

Les vésicules en grappes, qui naissent sur les mêmes appendices que ces sacs, étaient très volumineux et présentaient entre elles des différences très grandes. Les unes (2), transparentes et circulaires, ressemblaient à ceux dont j'ai déjà parlé en décrivant la Stéphanomie contournée, mais étaient évidemment plus développées et ressemblaient encore davantage aux organes natateurs de l'extrémité supérieure de la tige; on y distinguait un étui assez consistant en forme d'ampoule, un sac intérieur ouvert à son sommet, et un pédoncule filiforme disposé à-peu-près comme dans les organes natateurs. Les autres vésicules (3) étaient plus grandes, de forme ovalaire et de couleur blanc de lait, avec une bande longitudinale jaune orangé; on y distinguait deux tuniques membraneuses et un corps intérieur offrant beaucoup de ressemblance avec les vésicules naviculaires des filamens tentaculaires de la Stéphanomie tortillée : c'était à la présence de ces corps qu'était due la bande colorée dont il vient d'être question, et l'intérieur de la tunique interne était occupé par une matière lactée; celle-ci s'échappait facilement

(1) Planche 10, fig. 5.
(2) Planche 10, fig. 6 et 7.
(3) Planche 10, fig. 8.

sous l'influence d'une légère pression et se montrait alors composée d'une multitude innombrable de corpuscules blancs animés d'un mouvement très vif. A l'aide d'un microscope puissant, ces corpuscules (1) m'ont paru être pyriformes et se terminer par une queue extrêmement grêle; leurs mouvemens étaient aussi tout-à-fait semblables à ceux des animalcules spermatiques, et il m'était impossible de les considérer autrement que comme de véritables zoospermes.

Les capsules ovoïdes, groupés près des sacs pyriformes, sont donc des *testicules*, et ces singuliers animaux sont, par conséquent, pourvus d'organes mâles.

La plupart des auteurs considèrent comme étant des ovaires toutes les vésicules plus ou moins semblables aux sacs pyriformes dont il a été question il y a quelques instans; mais cette opinion ne repose sur aucune observation directe, et ne s'accorde nullement avec les faits que j'ai constatés relativement à la structure et aux usages de ces parties. Il me fallait donc chercher les ovaires, et je crois les avoir trouvés dans l'intérieur des trompes; effectivement, les côtes granuleuses et colorées qui se voient dans cette partie (2) étaient comme farcies d'une multitude de corpuscules sphériques de diverses grandeurs et offrant tout-à-fait l'aspect d'ovules. Il me semble donc bien probable que ces replis sont les ovaires, et il est à remarquer que leur position, aussi bien que leur structure, rappelle tout-à-fait ce qui se voit chez tous les polypes de la classe des Zoanthaires et de celle des Alcyoniens.

En m'appuyant sur ces observations, je me vois conduit à admettre que les Stéphanomies sont pourvus d'oganes sexuels distincts, et que les parties mâles sont portées sur les appendices à vésicules, tandis que les parties femelles sont portées sur les organes proboscidifères. Ces Acalèphes seraient donc hermaphrodites, si l'on considère les divers appendices dont il vient d'être question comme appartenant à un seul individu; mais les auteurs ne sont pas d'accord sur ce point, et quelques zoologistes pensent que ces corps résultent de l'assemblage d'un

(1) Planche 10, fig. 9.
(2) Planche 10, fig. 4.

grand nombre d'individus, réunis à la manière des Polypes, sur une tige commune, et, si l'on parvenait à démontrer l'exactitude de cette hypothèse, on verrait peut-être que les deux ordres d'appendices, dont j'ai parlé plus haut, sont constitués par des individus des deux sexes. Le mode de développement de ces parties, la facilité avec laquelle elles se séparent de la masse commune, la ressemblance qui existe entre les vésicules sphériques des appendices mâles et les organes natateurs de la tige commune, sont des faits qui pourraient être cités à l'appui de cette dernière manière de voir, et la disposition de l'appareil natateur commun à tout l'agrégat, ne fournirait pas un argument solide en faveur de l'opinion contraire, puisque, dans la classe des Polypes, on connaît aussi des animaux agrégés (les Pennatules), qui naissent sur une tige terminée par un instrument, n'appartenant en propre à aucun des individus ainsi réunis; mais, dans l'état actuel de la science, il ne me paraît pas possible de trancher ces questions. Les discuter ici serait donc prématuré, et j'espère pouvoir y revenir dans une autre occasion.

Quoi qu'il en soit, nous voyons que les Stéphanomies n'offrent dans leur mode d'organisation aucune analogie directe avec les Mollusques, et, bien qu'elles n'aient presque rien de rayonné dans leur conformation, c'est avec les Zoophytes, qu'elles me semblent avoir le plus d'affinité, et, par conséquent, je ne crois pas devoir adopter, à l'égard de la classification de ces êtres singuliers, les innovations proposées dans ces dernières années par mon savant collègue M. de Blainville.

(*La suite à un prochain cahier.*)

EXPLICATION DES FIGURES.

Planche 1. Equorée violacée. *Æquorea violacea* Nob.

Fig. 1. L'animal, vu de profil et de grandeur naturelle.

Fig. 1 *a*. Le même, vu en dessous.

Fig. 1 *b*. Portion de la surface inférieure de l'ombrelle: — *a a*. Portion de la cavité gastrique et orifices des canaux rayonnans. — *b b*. Portion du voile marginal ou sphincter de l'estomac. — *c c*. Canaux rayonnans. — *c' c'*. Portion terminale de ces canaux. — *d d*. Canal marginal du disque. — *e e*. Portion du voile marginal de l'ombrelle. — *f f*. Tentacules. — *g*. Rubans membraneux, suspendus à la face inférieure de l'ombrelle et constituant les organes de la génération.

Fig. 1 *c*. Portion du bord de l'ombrelle, fortement grossie. — *a a*. Canal marginal. — *b b*. Voile marginal. — *c c*. Tentacules. — *d*. Mamelon inter-tentaculaire, portant un pore excrétoire. — *e e*. Tubercules vésiculaires, renfermant des corpuscules sphériques.

Fig. 1 *d*. Zoospermes du même.

Planche 2. Lesueurie vitrée. *Lesueuria vitrea* Nob.

Fig. 1. L'animal, vu de côté et grossi au double.

Fig. 2. Extrémité supérieure du corps, vue en dessus.

Fig. 3. Extrémité inférieure de l'un des lobes principaux. — *a*. Extrémité du vaisseau médian superficiel. — *b*. Appendice proboscidiforme. — *c*. Extrémité de cet appendice, garni de quatre festons et percé au centre. — *d d*. Lobule qui recouvre cet appendice et les filamens tentaculiformes. — *e e*. Bord inférieur du lobe principal.

Fig. 4. Coupe verticale au niveau de la portion supérieure de la cavité pharyngienne. — *a*. Cavité pharyngienne. — *b b*. Les deux vaisseaux médians profonds des lobes principaux. — *c*. Ouverture cardiaque. — *d*. Cavité gastrique ou réservoir central de l'appareil vasculaire. — *e*. Vaisseaux médians superficiels des lobes principaux. — *f*. Surface externe de ces lobes. — *g*. Organes reproducteurs.

Planche 3. Appareil circulatoire de la Lesueurie vitrée.

Fig. 1. L'animal, fortement grossi et injecté. — *a*. Extrémité supérieure du corps. — *b b*. Lobes marginaux. — *c*. Lobe accessoire. — *d*. Lobe principal. — *e*. Appendice tentaculaire. — *f*. Bords de l'ouverture buccale. — *g*. Cavité pharyngienne. — *h*. Vaisseau médian superficiel. — *i*. Vaisseau marginal inférieur. — *j*. Vaisseau médian profond.

Planche 4. Suite de l'anatomie de la Lesueurie vitrée.

Fig. 1. Portion de l'appareil digestif, système nerveux, etc. — *a*. Cavité pharyngienne. — *b*. Portion supérieure de cette cavité, garnie de cils vibratiles. — *c*. Réservoir central du système circulatoire. — *d*. Troncs ascendans qui en naissent. — *e e*. Canaux qui longent les côtes latérales ou principales. — *f*. Canaux qui longent les côtes accessoires. — *g*. Canal médian superficiel. — *h*. Canal médian profond. — *i*. Organes de la génération. — *j*. Lobules qui occupent le fond de la fosse infundibuliforme de l'extrémité supérieure du corps. — *k*. Organe oculiforme. — *l*. Ganglion nerveux. — *m m*. Faisceaux de nerfs qui en partent.

Fig. 2. Portion de l'une des côtes ciliées, vue de face. — *a a*. Parois du canal qui longe la côte et qui renferme un liquide chariant des globules. — *b b*. Bande épaisse, occupant le milieu de la côte. — *b' b'*. Crêtes transversales, se continuant avec cette bande et portant les appendices vibratiles. — *c c*. Ces appendices. — *d*. Filament nerveux longitudinal. — *e e*. Branches qui en naissent au niveau des crêtes ciliées. — *f f*. Branches qui en naissent dans l'espace compris entre ces crêtes.

Fig. 3. Portion de la même côte, vue de profil. Les lettres ont la même valeur que dans la figure précédente.

Planche 5. Organisation du Béroé de Forskal.

Fig. 1. Individu adulte, de grandeur naturelle.

Fig. 2. Extrémité supérieure du même, vu de côté. — *a*. Pan médian. — *b*. Pan latéral. — *c*. Pan costal. — *d*. Fossette terminale.

Fig. 3. La même partie, médiocrement dilatée, vue en dessus et indiquée par les mêmes lettres.

Fig. 4. La même partie, vue de face et fortement dilatée. — *a*, *a*. Pan médian, divisé par le vaisseau profond (*e*). — *b*, *b*. Pans latéraux. — *c*, *c*. Pans costaux. — *f*, *g*. Côtes ciliées, situées entre ces deux pans. — *h*. Cavité digestive. — *i*. Organe oculiforme. — *j*. Appendices frangés, occupant le milieu de la fosse terminale. — *k*. Ampoules anales.

Planche 6. Suite de l'organisation du Béroé de Forskal.

Fig. 1. Individu jeune, représenté de grandeur naturelle.

Fig. 1 *a*. Le même, grossi et représenté avec le système circulatoire injecté. — *a*. Grande ouverture de l'extrémité inférieure du corps et anneau vasculaire inférieur. — *b*. L'un des deux canaux profonds.

Fig. 1 *b*. Extrémité supérieure du corps très dilatée. — *a*. Organe oculiforme. — *b*. Filamens se rendant aux côtes ciliées. — *c*. Membrane frangée. — *d*, *d*. Pores excrétoires.

Fig. 1 *c*. Portion de l'une des côtes ciliées.

Fig. 1 *d*. Lèvres de la cavité stomacale.

Fig. 2 *a*. Portion de l'appareil vasculaire de l'individu adulte.

Planche 7. Stéphanomie tortillée. *Stephanomia contorta* Nob.

Grossie au triple. — *a*. Organes natatoires. — *b*. Portion de la tige portant les appendices à vésicules, etc. — *b'* Branche latérale de cette tige.

Planche 8. Organisation de la Stéphanomie tortillée.

Fig. 1. Portion supérieure de la tige déroulée. — *a*. Tige. — *b*. Organe hydrostatique. — *c*, *c*. Organes natateurs.

Fig. 2. Organe hydrostatique, grossi davantage.

Fig. 3. Coupe transversale du même au niveau de l'orifice inférieur de la vessie interne.

Fig. 4. Un des organes natateurs. — *a*. Pédicelle. — *b*. Etui. — *c*. Sac. — *d*. Orifice.

Fig. 5. Portion de la tige.

Fig. 6. L'une des vésicules marginales des appendices tentaculaires.

Fig. 7. Vésicules de la portion centrale de ces appendices (voyez planche 9, fig. 3 et 4).

Fig. 8. Vésicules incolores des mêmes appendices : *a*. dans l'état ordinaire, *b*. après avoir éclaté.

Fig. 9. L'un de ces vésicules, après avoir émis son filament.

Planche 9. Suite de l'organisation de la Stéphanomie tortillée.

Fig. 1. Portion terminale de la tige, garnie de ses appendices. — *a*. Tige. — *b*. Appendices proboscidifères. — *c*. Foliole. — *d*. Trompe. — *e*. Tigelle filiforme. — *e'* Appendice semblable plus développé. — *f*. Filamens tentaculaires. — *g*. Appendices à vésicules. — *h*. Sacs ou vésicules

pyriformes. — *i.* Appendice filiforme de ces organes. — *j.* Grappes rudimentaires. — *j'* Grappes plus développées.

Fig. 2. L'un des appendices proboscidifères, séparé de sa base et devenu libre. Les diverses parties sont indiquées par les mêmes lettres que dans la figure précédente.

Fig. 3. Portion supérieure de l'un des appendices tentaculaires (*f*.), grossi davantage.

Fig. 4. Portion de l'organe précédent, grossi encore plus.

Planche 10. Stéphanomie prolifère. *Stephanomia prolifera* Nob.

Fig. 1. Portion terminale de la tige. Les diverses parties sont indiquées par les mêmes lettres que dans les figures de la planche précédente.

Fig. 2. L'un des organes proboscidiformes, contracté et devenu libre.

Fig. 3. Portion terminale de l'appendice filiforme, grossi davantage.

Fig. 4. Trompe, grossi davantage et montrant les ovaires.

Fig. 5. L'un des organes pyriformes (*h*). — *a*. Sa base. — *b*. Extrémité où se voit le mouvement ciliaire.

Fig. 6 et 7. Sphérules (natateurs ?) des appendices en grappes.

Fig. 8. Vésicule testiculaire.

Fig. 9. Zoospermes.

Recherches *sur le développement des os*,

Par M. Flourens.

(Cinquième Mémoire, lu à l'Académie des Sciences le 4 octobre 1841.)

Formation et résorption des couches osseuses.

On a vu par mes précédentes expériences (1) quel est le mécanisme précis selon lequel s'opère le développement des os.

Il y a, dans un os qui se développe, deux faits à expliquer : l'accroissement des parois mêmes de l'os, et l'accroissement du canal médullaire.

Or, tout os a deux faces, l'une externe, et l'autre interne. Du côté de l'externe s'ajoutent sans cesse de nouvelles couches, addition qui fait l'accroissement des parois de l'os; du côté de

(1) Voyez Annales des Sciences naturelles, 2e série, tome XV, page 241.

l'intérne se résorbent sans cesse des couches anciennes, résorption qui fait l'accroissement du canal médullaire. (1)

Il y a donc, dans tout os, deux faces à phénomènes inverses et opposés, et, si je puis ainsi dire, un *endroit* et un *envers* : un *endroit* par lequel il reçoit sans cesse des molécules nouvelles, et un *envers* par lequel il perd sans cesse les molécules anciennes.

L'os se forme donc par couches, il se résorbe par couches; mais quel est le mécanisme particulier de cette *formation* et de cette *résorption* ? question nouvelle, et dont la solution réelle, la solution complète aura été, pour la première fois peut-être, tentée dans ce Mémoire.

Je pose en fait que le véritable rôle du périoste dans la formation des os, malgré tout ce qui a été écrit sur ce sujet depuis Duhamel, n'est point connu. Pour ce qui concerne la résorption, on est bien moins avancé encore. On ne sait pas même s'il y a un organe particulier pour ce phénomène. J. Hunter a beau dire qu'*il n'est pas plus difficile de concevoir la résorption par les vaisseaux absorbans que la formation par les artères*. Une explication aussi vague n'explique rien. (2)

Sans doute il faut toujours poser l'action générale, et des artères pour la formation, et des vaisseaux absorbans, soit lymphatiques, soit veineux (3), pour la résorption. Mais, indépendamment de cette action générale et commune, il faut ici une action spéciale et déterminée; il faut un appareil particulier pour la formation, il faut un appareil particulier pour la résorption; et, je le répète, le premier de ces appareils a été à peine indiqué jusqu'ici, le second n'a pas même été soupçonné encore.

(1) Voyez Annales des Sciences naturelles, tome XIII, page 104.

(2) C'est ce qu'Alexandre Macdonald avait déjà senti. Voici ce qu'il dit : « *J. Hunterus credit partes solidas absorberi actione, uti vocat, contraria actioni arteriarum quâ formantur, et difficultatem fugit, dicendo æque difficile esse animo concipere, vasis absorbentibus os removeri, ac arteriis os formari* (Alexandre Macdonald, *Disputatio inauguralis de necrosi ac callo*, 1799).

(3) Surtout *veineux*, si l'on en juge, du moins, par les expériences les plus récentes sur l'absorption.

L'opinion de Duhamel sur le rôle que joue le périoste dans la formation des os, est connue de tout le monde. Selon Duhamel, l'os n'est que le périoste ossifié.

« J'ai tâché d'établir, dit-il, que les os croissent en grosseur par la sur-addition des couches du périoste, lesquelles, en s'ossifiant, forment l'épaississement des parois du canal médullaire. (1)

Il dit ailleurs : « Le fait n'est pas douteux ; sûrement les lames du périoste s'ossifient et contribuent (2) à l'augmentation de grosseur des os ». (3)

Il dit encore : « Les os commencent par n'être que du périoste ; car je regarde les cartilages comme un périoste fort épais ». (4)

Il dit enfin : « Les os augmentent en grosseur par l'addition de lames très minces, qui faisaient partie du périoste avant que d'être adhérentes aux os, avant que d'en avoir acquis la dureté ». (5)

Parle-t-il du *cal*? Voici comment il s'exprime : « J'ai fait voir, dit-il, que le *cal* n'est point, comme on le croyait, un épanchement de suc osseux, mais qu'on en est redevable à l'épaississement et à l'ossification de plusieurs lames du périoste, qui forment une espèce de virole osseuse, laquelle assujettit les bouts d'os rompus; j'ai fait voir que ces lames du périoste qui étaient membraneuses, deviennent ensuite cartilagineuses, et qu'elles acquièrent enfin la dureté des os ». (6)

« C'est le périoste, dit-il encore, qui, après avoir rempli la plaie des os, ou s'être épaissi autour de leurs fractures, prend

(1) Cinquième *Mémoire sur les os*, page 111. — *Mémoires de l'Académie des Sciences*, année 1743.

(2) *Contribuent*, parce qu'il suppose le concours de l'extension, laquelle comme je l'ai prouvé, n'est qu'une supposition gratuite. (Annales des Sciences naturelles, 2e série, tome XIII).

(3) Duhamel, quatrième *Mémoire sur les os*, page 101. — *Mémoires de l'Académie des Sciences*, année 1743.

(4) Sixième *Mémoire sur les os*, page 315. — *Mémoires de l'Académie des Sciences*, année 1743.

(5) Quatrième *Mémoire sur les os*, page 88.

(6) Troisième *Mémoire sur les os*, page 355. — *Mémoires de l'Académie des Sciences*, année 1742.

ensuite la consistance du cartilage et acquiert enfin la dureté des os (1). »

Telle est donc l'opinion formelle de Duhamel : l'ossification n'est que la transformation du périoste en os.

J'ai répété toutes les expériences de Duhamel. J'ai vu, comme lui, tantôt le périoste entourer les bouts fracturés de l'os, et, en s'ossifiant, former autour de ces bouts fracturés, une sorte de *virole osseuse ;* tantôt pénétrer entre ces bouts fracturés, et, en s'ossifiant encore, les unir l'un à l'autre par une sorte de continuité osseuse (2). J'ai vu, comme lui, le périoste s'épaissir, se tuméfier d'abord ; puis les lames internes de ce périoste tuméfié se transformer en cartilage ; et puis ces lames cartilagineuses se transformer en os.

Comment se fait-il donc qu'une opinion si nettement exprimée, et fondée sur des expériences si sûres, n'ait pas été généralement admise, ou plutôt, et à parler plus exactement, comment se fait-il que, à commencer par Haller, elle ait été combattue par presque tous les physiologistes?

Je n'hésite pas à le dire : c'est que ces physiologistes, pour juger l'opinion de Duhamel, se sont bornés à répéter ses expériences ; et que ses expériences n'étaient pas, à beaucoup près, les plus propres à résoudre la difficulté. Pour mon compte, j'avais déjà répété toutes les expériences de Duhamel, que la plupart de mes doutes subsistaient encore. Il fallait donc agrandir et varier le champ de l'expérience. Il fallait surtout se faire une idée plus juste du mode même des expériences qu'on employait.

Vous fracturez un os, et vous croyez avoir produit un fait simple. Mais vous n'avez pu rompre l'os sans rompre le périoste, et par conséquent les vaisseaux de ce périoste, et très souvent

(1) Premier *Mémoire sur les os*, page 107. — *Mémoires de l'Académie des Sciences*, année 1741.

(2) « J'ai quelquefois remarqué, dit Duhamel, que l'épaississement du périoste qui enveloppe les fractures se prolongeait pour remplir l'intervalle qui se trouve entre les bouts d'os rompus, précisément comme j'ai dit que le périoste s'allongeait pour remplir les petites plaies d'os ; or, cette interposition est bien propre à rendre l'union de l'os plus exacte qu'elle ne le serait, si les os n'étaient assujettis que par la virole osseuse..... (Premier *Mémoire sur les os*, page 108. — *Mémoires de l'Académie des Sciences*, année 1741).

aussi les vaisseaux des parties voisines. De là effusion de lymphe, de sang; puis endurcissement de cette lymphe et de ce sang épanchés; et, en un mot, tout ce qui se rapporte au prétendu *cal provisoire*.

Le véritable *cal* est une portion d'os nouvelle. Et, comme on le verra bientôt, cette portion d'os nouvelle résulte de l'ossification d'une portion du périoste. Le prétendu *cal provisoire* est un fait étranger à la formation de l'os proprement dite. Le prétendu *cal provisoire* n'est que le résultat de la rupture des vaisseaux, soit du périoste, soit des parties voisines.

Pour démêler, pour saisir le vrai mécanisme de la formation du *cal*, ou, à parler plus généralement, de la formation des os, il fallait donc des expériences dans lesquelles on ne touchât ni au périoste, ni aux parties voisines, ni par conséquent aux vaisseaux de ce périoste et de ces parties. Je dis plus : il ne fallait pas même toucher à l'os, du moins à la face de l'os qui répond au périoste. Car, en effet, c'est entre cette face de l'os et le périoste que doivent se passer tous les phénomènes qu'on se propose d'observer.

Or, ce mode expérimental dans lequel on ne touche ni au périoste, ni à la face de l'os qui répond au périoste, ni, à plus forte raison, aux parties voisines, ce sont les expériences de Troja qui me l'ont fourni.

On connaît ces grandes et belles expériences. Troja sciait un os long en travers, un os des membres, par exemple; et puis, portant un stylet dans le canal médullaire de cet os, il en détruisait toute la membrane. Au bout de quelque temps, l'os dont la membrane médullaire avait été détruite, tombait en nécrose; et, tout autour de cet os nécrosé, il se formait un os nouveau.

Or, dans cette expérience, n'est-il pas évident qu'on ne touche qu'à la membrane médullaire et à la face interne de l'os? On ne touche ni à la face externe de l'os ni au périoste, c'est-à-dire à aucune des parties entre lesquelles doit se passer le phénomène qu'il s'agit d'observer.

Ce sont des expériences, faites à la manière de celles de Troja, qui m'ont permis enfin de juger, et, si je ne me trompe, de

confirmer la théorie de Duhamel. Mais ces expériences ne s'en sont pas tenues là. Tout en me donnant, dans le périoste externe, l'appareil de la formation des os, elles m'ont donné, dans la membrane médullaire ou périoste interne, l'appareil de leur résorption.

Il y a donc, dans les os, un appareil de formation, et c'est le périoste externe; il y a un appareil de résorption, et c'est la membrane médullaire ou périoste interne; et ces deux propositions sont démontrées, je crois, jusqu'à la dernière évidence par les pièces que je mets sous les yeux de l'Académie.

La pièce n° 1 est la moitié d'un radius de bouc, scié en long. Ce radius est un os entièrement nouveau; et, dans cet os nouveau se trouve enfermé de toute part un os ancien, un os nécrosé, un os dont la membrane médullaire avait été détruite.

Voici comment l'expérience qui m'a fourni ce résultat, résultat beaucoup plus complet qu'aucun de ceux obtenus par Troja lui-même, a été conduite. Troja (1), et tous ceux qui ont répété ses expériences, nommément Alexandre Macdonald (2), le plus habile de tous; Troja, dis-je, et tous ceux qui sont venus après lui, commençaient par scier en travers l'os dont ils voulaient détruire la membrane médullaire, c'est-à-dire qu'ils commençaient par pratiquer l'amputation du membre. Il n'y avait donc qu'une portion d'os qui fût conservée, qui fût soumise à l'expérience, et qui par conséquent pût se reproduire. Le reste de l'os et du membre était perdu.

J'ai voulu, dans mon expérience, conserver l'os entier. Je me suis donc borné à pratiquer un trou sur le radius; et puis, portant un stylet, par ce trou, dans le canal médullaire, j'en ai détruit toute la membrane. Ainsi tout l'os a été conservé, et tout l'os a pu se reproduire.

C'est en effet ce qui a eu lieu. Le radius, conservé tout entier, s'est reproduit tout entier.

Et ce n'est pas tout. Tout comme il s'est formé un os entière-

(1) *De novorum ossium, in integris aut maximis, ob morbos, deperditionibus, regeneratione experimenta*, 1775.

(2) *Disputatio inauguralis de necrosi ac callo*, 1799.

ment nouveau, il s'est formé aussi une membrane médullaire entièrement nouvelle.

Quant à l'os ancien, il est enfermé de toute part, comme je viens de le dire, dans l'os nouveau; mais il y est mobile, mais il en est séparé partout par la nouvelle membrane médullaire, et déjà même il est en partie résorbé, en partie détruit par elle; car c'est elle qui, comme on le verra bientôt, constitue l'organe particulier de la résorption des os.

Le radius que je décris ici, examiné de dehors en dedans, et sur la coupe, offre donc, d'abord le périoste, puis l'os nouveau, puis la membrane médullaire nouvelle, puis l'os ancien, et, dans l'os ancien, les débris de la membrane médullaire ancienne, de la membrane médullaire qui a été détruite.

Lors donc qu'on détruit la membrane médullaire d'un os entier, cet os entier meurt, et il se forme tout autour de cet os mort un os nouveau qui l'embrasse de toute part.

De plus, l'os nouveau est absolument semblable à l'os ancien; il en reproduit la forme, la structure, et jusqu'aux plus petits détails de forme et de structure. (1)

Enfin il se forme une nouvelle membrane médullaire, tout comme il s'est formé un os nouveau; et l'os ancien, contenu dans l'os nouveau, est peu-à-peu détruit et résorbé par cette membrane.

La pièce n° 2 est la seconde moitié du radius que je décris; mais on a ôté de cette moitié l'os ancien, l'os nécrosé, l'os qui formait séquestre. Il ne reste donc plus ici que la nouvelle membrane médullaire et l'os nouveau.

Enfin la pièce n° 3 est ce même os ancien et nécrosé, ôté, comme je viens de le dire, de la seconde moitié du radius nouveau.

Cet os ancien est vu ici par sa face externe; or, on remarquera d'abord que cette face externe est tout usée, toute corrodée, et l'on remarquera ensuite que le corps seul de l'os subsiste. Les

(1) Le radius que j'examine, comparé au radius de l'autre jambe du même animal, s'est trouvé seulement plus gros: c'est qu'il contenait l'os ancien sur lequel il s'était formé.

deux extrémités, mais la supérieure que l'inférieure, ont déjà disparu, détruites et résorbées par la membrane médullaire.

La pièce n° 4 est la moitié d'un radius de cochon, scié en long.

L'animal avait été opéré de la même manière que le précédent; mais il a survécu beaucoup moins long-temps à l'expérience. Aussi, d'une part, l'os nouveau n'est-il pas encore entièrement formé; et, de l'autre, la résorption de l'os ancien est-elle beaucoup moins avancée.

On voit, dans l'intérieur de la pièce n° 4, l'os ancien et nécrosé, l'os dont la membrane médullaire a été détruite.

Autour de cet os ancien est une membrane épaisse, laquelle est la membrane médullaire nouvelle; et, entre cette membrane médullaire nouvelle et le périoste, également très épais, se forme l'os nouveau, dont l'ossification n'est encore complète que sur quelques points.

La pièce n° 5 est la seconde moitié de ce même radius, dont on a ôté l'os ancien, l'os nécrosé et qui formait séquestre.

Tout, dans la pièce que j'examine en ce moment, est à remarquer.

Dans les points où le nouvel os est déjà formé, cet os nouveau se trouve placé entre le périoste et la nouvelle membrane médullaire. Dans les points où il ne paraît pas encore, ces deux membranes, la membrane médullaire nouvelle et le périoste, sont unies l'une à l'autre, et semblent n'en faire qu'une, et cette membrane, qui paraît unique, est partout très facilement divisible en plusieurs lames ou feuillets distincts.

Enfin, et ceci est plus remarquable encore, à la face interne de la membrane médullaire nouvelle se voit un tissu d'un aspect singulier, ou plutôt une surface toute parsemée de petits mamelons et de petits creux. C'est par cette surface, tour-à-tour creuse et mamelonnée, que la membrane médullaire nouvelle agit sur l'os ancien, le saisit, le ronge, et finit par le résorber.

Et ce que je dis ici est démontré aux yeux par la pièce n° 6.

Cette pièce n° 6 est l'os ancien, retiré de la pièce même que je viens de décrire.

Or, cet os ancien, vu par sa face externe, est tout usé, tout

corrodé; et, ce qui paraîtra sans doute plus décisif encore, c'est que partout l'érosion de l'os répond aux points de la nouvelle membrane médullaire à surface tour-à-tour creuse et mamelonnée, c'est que partout, à chaque creux de l'os, répond un mamelon de la membrane médullaire, et, à chaque creux de la membrane médullaire, une saillie de l'os.

Les pièces que je viens de faire passer sous les yeux de l'Académie montrent :

1° Que la destruction de la membrane médullaire d'un os est suivie d'abord de la mort de cet os; et ensuite de la formation d'une membrane médullaire nouvelle et d'un os nouveau;

2° Que l'os nouveau se forme entre la membrane médullaire nouvelle et le périoste,

3° Que cette membrane médullaire nouvelle et ce périoste ne forment d'abord qu'une seule et même membrane, très épaisse et divisible en plusieurs feuillets;

4° Que la membrane médullaire nouvelle, d'abord unie au périoste, s'en sépare peu-à-peu, et, par l'interposition même de l'os nouveau, lequel, comme il vient d'être dit, se forme entre ces deux membranes;

5° Que le tissu de la membrane médullaire nouvelle, d'abord très épais, très dense, comme on le voit dans les pièces n^os^ 4 et 5, et fort semblable au tissu fibreux du périoste, alors très épais aussi, prend peu-à-peu une texture plus délicate, plus fine, se creuse de cavités, de mailles, se remplit de sucs et présente enfin une membrane médullaire nouvelle, tout aussi régulière, tout aussi parfaite que la primitive (1), comme on le voit dans les pièces n^os^ 1 et 2;

Et 6° que la face interne de la membrane médullaire nouvelle, tour-à-tour creuse et mamelonnée, dissout et ronge peu-à-peu l'os ancien et finit par le résorber.

La membrane médullaire des os est donc l'appareil de leur résorption.

(1) Et même la structure propre en paraît alors marquée. La nouvelle membrane médullaire, dans les points où elle est entièrement formée, présente tout-à-fait, par son tissu délicat et *raréfié*, l'aspect de la moelle de *sureau*.

Tels sont les faits qui résultent des pièces que je viens de présenter à l'Académie. Les pièces qui suivent jettent un jour nouveau sur ces premiers faits; car elles en donnent la succession, la marche, et, si je puis ainsi dire, la génération complète.

Mais je commence par avertir que les expériences auxquelles ces nouvelles pièces sont dues, ont toutes été faites à la manière de Troja et de Macdonald, c'est-à-dire qu'on a commencé, sur chaque animal soumis à l'expérience, par pratiquer l'amputation du membre. Après cela, un stylet a été porté dans le canal médullaire de l'os scié en travers, et la membrane médullaire a été détruite.

Quatre lapins ont été opérés de la manière que je viens de dire.

De ces quatre lapins, le premier a été tué soixante-douze heures, le deuxième quatre-vingt-seize heures, le troisième sept jours, et le quatrième huit jours après l'opération.

La pièce n° 7 est le tibia du premier lapin, du lapin qui n'a survécu que soixante-douze heures à l'opération.

Je viens de le dire, et il sera inutile de le répéter pour les pièces suivantes, ce tibia avait été scié en travers, et la membrane médullaire en avait été totalement détruite.

Sur la pièce que j'examine, le périoste a été fendu longitudinalement et détaché ensuite de l'os par la dissection.

Or, sur la face externe et vers le bout inférieur de l'os, mis à nu, se voit une petite couche blanche, de consistance cartilagineuse. Cette couche cartilagineuse, déjà même ossifiée sur quelques points, est le commencement du tibia nouveau.

Mais ce qu'il importe le plus de remarquer ici, c'est que cette couche cartilagineuse, germe d'un os nouveau, se continue avec le périoste, devenu très épais, qu'elle en émane et qu'elle le suit, ou ne s'en détache qu'avec déchirure, quand on fait effort pour l'en séparer.

Dans la pièce n° 8, le fait que j'indique en ce moment se montre avec plus d'évidence encore. Cette pièce est le tibia du lapin, qui a survécu quatre-vingt-seize heures à l'expérience.

D'abord la couche cartilagineuse a beaucoup plus d'étendue:

elle recouvre l'os entier; et, en second lieu, elle se continue de la manière la plus manifeste avec le périoste.

Ainsi donc, lorsque la membrane médullaire d'un os a été détruite:

1° Le périoste, auquel pourtant il n'a point été touché, s'épaissit et se gonfle;

2° Il se forme sur la face externe de l'os ancien une couche cartilagineuse;

3° Cette couche cartilagineuse émane du périoste et ne peut en être détachée que par déchirure;

Et 4° Cette couche cartilagineuse est le premier germe de l'os nouveau.

Ainsi donc l'os se forme dans le cartilage; le cartilage est formé par le périoste; l'ossification n'est donc que la transformation du périoste en os.

La pièce n° 9 est le tibia du lapin qui a survécu sept jours à l'opération.

Une portion d'os nouveau est déjà formée vers le bout inférieur de l'os ancien; et ce n'est pas seulement un os nouveau qui reparaît en ce point, c'est aussi une membrane médullaire nouvelle, qui déjà existe, qui déjà a pris sa place, et qui déjà, partout où l'os nouveau est complètement formé, le sépare complètement de l'os ancien.

Enfin, la pièce n° 10, c'est-à-dire le tibia du lapin qui a survécu huit jours à l'opération, offre un os nouveau entièrement formé; et, dans cet os nouveau, une membrane médullaire nouvelle; et dans cette nouvelle membrane médullaire, l'os ancien déjà presque (1) partout séparé par elle de l'os nouveau.

On le voit donc: un rapport constant lie la production d'une nouvelle membrane médullaire à la production d'un nouvel os. A mesure qu'il se forme un os nouveau, il se forme une nouvelle membrane médullaire. Mais d'où provient cette membrane médullaire nouvelle?

Elle provient du périoste. On a vu, dans les pièces n°s 4 et 5,

(1) Je dis *presque*, parce que, sur cette pièce, la membrane médullaire n'est pas encore, en effet, complètement formée.

la membrane médullaire nouvelle tenir au périoste. On voit ici, dans les pièces n^os^ 9 et 10, le périoste, parvenu au bout inférieur de l'os, au bout scié, se replier et se porter entre les deux os, l'ancien et le nouveau, pour y former la membrane médullaire. Et cette continuité de la membrane médullaire et du périoste se voit encore mieux dans la pièce n° 11.

On a détaché, sur cette pièce, le périoste et la membrane médullaire dans une certaine étendue, et, dans toute cette étendue, on voit ces deux membranes se continuer l'une avec l'autre de la manière la plus complète.

Le périoste ne forme donc pas seulement l'os nouveau; il forme, quoique par un mécanisme très différent, et particulier pour chaque genre de formation, et l'os nouveau et la membrane médullaire nouvelle.

La pièce n° 12 est une portion de radius de bouc. Sur cette portion d'os le périoste avait été entièrement détruit, et il s'y était entièrement reproduit.

On voit sur cette pièce, une lame d'os qui se continue avec une lame de périoste. Une même lame est ainsi, os sur un point, et périoste sur l'autre.

La pièce n° 13 est une portion du tibia d'un lapin, portion d'os sur laquelle il avait été pratiqué un trou.

On voit, sur cette pièce, d'un côté, le trou de l'os qui subsiste encore; et, de l'autre, un prolongement du périoste qui pénétrait dans ce trou, et qui, en s'ossifiant, l'aurait rempli.

Il ne me reste plus qu'à examiner deux pièces. Ces deux pièces, marquées des n^os^ 14 et 15, sont les deux moitiés du tibia d'un canard.

Sur les animaux de mes premières expériences, c'est la membrane médullaire qui avait été détruite et le périoste qui était resté intact. Aussi, l'os qui s'était formé, s'était-il formé du côté du périoste et à l'extérieur de l'os ancien.

Sur le canard dont je parle en ce moment, j'ai fait une expérience inverse. La membrane médullaire a été respectée, et tout le périoste a été détruit. Aussi l'os nouveau s'est-il formé du côté de la membrane médullaire et dans l'intérieur de l'os ancien.

Les deux pièces, nos 14 et 15, montrent d'abord le périoste qui s'est entièrement reproduit, et ensuite l'os nouveau contenu dans l'os ancien.

Lorsque le périoste externe a été détruit, la membrane médullaire, ou *périoste interne*, partage donc le privilège du *périoste externe* et le remplace, jusqu'à un certain point, pour la reproduction et la formation des os.

Je tire, des expériences contenues dans ce Mémoire, ces trois conclusions générales :

1° Il y a, dans les os, un appareil de formation, et cet appareil est le périoste;

2° Il y a un appareil de résorption, et cet appareil est la membrane médullaire;

3° La membrane médullaire, ou périoste interne, n'est qu'une continuation du périoste externe.

Je n'ai traité, dans ce Mémoire, que du mécanisme général de la formation des os; je traiterai, dans un autre, du mécanisme particulier de la formation du *cal*.

Recherches *sur le développement des os.*

Par M. Flourens.

(Sixième Mémoire, lu à l'Académie des Sciences, le 11 octobre 1841.)

Formation du cal.

La formation du cal n'est qu'un cas particulier du cas général de la formation des os. Avoir donné le mécanisme de la formation des os, comme je l'ai fait dans mon précédent Mémoire (1), c'est donc avoir donné aussi, et par cela même, le mécanisme de la formation du cal.

Le cal est une portion d'os, et cette portion d'os se forme

(1) Voyez page 232.

comme l'os entier. C'est le périoste qui produit le cal comme il produit l'os.

Or, on a déjà vu comment le périoste produit l'os, il ne reste donc plus qu'à faire voir comment il produit le cal.

Trois opinions principales ont successivement régné sur la formation du cal : la première est celle qui a précédé Duhamel, la seconde est celle de Duhamel lui-même, la troisième est celle de Haller.

Voici comment Duhamel rend compte de l'opinion qui régnait avant lui.

« On se contente d'admettre ordinairement, dit-il, que cette grosseur osseuse, que l'on nomme le cal, et qui réunit les os fracturés, est formée par un épanchement de suc osseux qu'on suppose qui transsude ou de l'os même, ou des parties voisines, et l'on croit que ce suc osseux soude l'un à l'autre les deux bouts d'os rompus, à-peu-près comme les plombiers soudent avec de l'étain deux bouts de tuyau. (1)

« D'autres, ajoute-t-il, ont cru qu'outre cet épanchement de suc osseux, les extrémités des fibres osseuses rompues s'allongeaient et se joignaient les unes aux autres, à-peu-près comme le font les parties molles. » (2)

D'après ces deux opinions, ou plutôt d'après cette opinion, car il est aisé de voir que les deux n'en font guère qu'une, la réunion des bouts d'os rompus se faisait donc, soit par le simple épanchement d'un suc osseux, soit par cet épanchement combiné avec l'allongement des fibres osseuses. Telles étaient les idées reçues, avant Duhamel, sur la formation du cal.

Duhamel ne tarda pas à s'en faire d'autres.

Dès ses premières expériences, tantôt fracturant les os, tantôt se bornant à pratiquer sur ces os de simples trous, il vit toujours le périoste ou s'ossifier autour des bouts d'os fracturés pour les unir par une sorte de *virole osseuse*, ou pénétrer entre ces bouts pour les unir par une sorte de *continuité osseuse* (3),

(1) *Observations sur la réunion des fractures des os*, premier Mémoire, page 99. — *Mémoires de l'Académie des Sciences*, année 1741.

(2) *Ibid.*, page 99.

(3) Voyez ce que j'ai déjà dit là-dessus dans mon précédent Mémoire.

ou s'enfoncer enfin dans les trous des os pour remplir ces trous.

Et voici les conclusions qu'il tira de ces faits :

« Ces expériences, dit-il, lèvent, je crois, les principales difficultés qu'on avait sur la réunion des fractures et sur la formation des cicatrices qui opèrent la guérison des plaies des os; car si l'on avait peine à concevoir que des fibres dures et raides, comme le sont celles des os, fussent capables de s'allonger, de s'étendre et de se souder les unes aux autres, on a lieu d'être satisfait quand on voit que ce sont les fibres molles, ductiles et expansibles du périoste qui se gonflent, qui prêtent, qui s'allongent, qui se soudent. (1) »

« On ne sera point non plus en peine, continue-t-il, de savoir d'où transsude le suc osseux qu'on croyait nécessaire pour former le cal, puisqu'on voit que c'est le périoste qui, après avoir rempli les plaies des os, ou s'être épaissi autour de leurs fractures, prend ensuite la consistance de cartilage, et acquiert enfin la dureté des os. » (2)

Il n'y a donc, selon Duhamel, ni *suc osseux épanché* ni *allongement des fibres osseuses :* le cal n'est que l'*endurcissement du périoste.* (3)

A peine cette opinion de Duhamel fut-elle connue, que Haller se hâta de la combattre; et, s'il est permis de le dire, il se hâta trop.

Alexandre Macdonald l'a déjà remarqué : on voit trop, dans Haller, le parti pris de combattre les idées de Duhamel. « Aussi, ajoute Alexandre Macdonald, paraît-il beaucoup plus occupé d'accommoder les expériences à son opinion que son opinion aux expériences. » (4)

La plupart des objections de Haller ne portent pas plus contre

(1) *Observations sur la réunion des fractures des os*, premier mémoire, page 107. — *Mémoires de l'Académie des Sciences*, année 1741.

(2) *Ibid.*, page 107.

(3) Ce sont ses propres expressions. *Ibid.*, page 107.

(4) *Si opinionem præclari hujus physiologi de ossium formatione animo contemplemur, non possumus non existimare illum præjudicatam opinionem contra sententiam Hamelii accepisse, ideòque experimenta ad opinionem, potius quàm opinionem ad experimenta animo accommodasse* (Alexandre Macdonald : *Disputatio inaugularis de necrosi ac callo*, page 98).

l'opinion de Duhamel qu'elles ne porteraient contre toute autre opinion quelconque.

Par exemple, après avoir dit que « l'état primordial de l'os est celui d'une glu (1), et que la formation des os est due à la coagulation et à l'endurcissement d'un suc (2) », Haller fait à Duhamel cette objection.

« Je ne comprends pas, lui dit-il, que la dure-mère ait pu former un os aussi composé que l'est l'os pierreux, ni que la membrane tendre et délicate de la coquille ou des canaux demi circulaires ait pu servir de moule à l'os pierreux, ou lui imprimer ses spirales et ses contours. » (3)

Duhamel aurait pu lui demander s'il comprenait mieux, lui Haller, comment ces *canaux*, ces *contours*, ces *spirales* avaient pu se former par l'endurcissement d'une *glu* ou la coagulation d'un *suc*.

Voici une autre objection de Haller, laquelle accuse peut-être plus de précipitation encore.

« Les couches osseuses, dit-il, qui se forment dans un animal nourri de garance, sont rouges et le périoste reste blanc; donc les couches osseuses ne sont point formées par le périoste. » (4)

Fougeroux lui répond très bien : « En faisant un raisonnement tout pareil, je dirai : La grande apophyse du sternum des oiseaux ne prend aucune teinte de rouge tant qu'elle est cartilagineuse, quoique ces animaux usent, dans leurs alimens, de beaucoup de garance; l'apophyse du sternum des oiseaux, lorsqu'elle est convertie en os, prend très bien, au contraire, la teinture de la garance; donc l'apophyse du sternum des oiseaux n'est pas formée par le cartilage qui en occupait la place. » (5)

En effet, le cartilage ne rougit pas plus (6) que le périoste;

(1) Voyez, dans les *Mémoires sur les os*, recueillis par Fougeroux, le Mémoire de Haller et de Dethleef sur la *formation des os*, page 181.

(2) *Ibid.*, page 148.

(3) *Ibid.*, page 149.

(4) *Ibid.*, premier Mémoire de Fougeroux, page 24.

(5) *Ibid.*, page 24.

(6) Le cartilage ne rougit qu'en recevant le *sel terreux*, le *phosphate calcaire*, c'est-à-dire qu'en *s'ossifiant*. Voyez mon premier *Mémoire concernant l'action de la garance sur les os* (Annales des Sciences naturelles, tome XIII).

et si l'argument valait contre le périoste, il vaudrait contre le cartilage. Or, le cartilage se transforme en os, Haller n'en doutait pas. La *non-coloration* ne prouve donc pas plus contre le périoste qu'elle ne prouve contre le cartilage.

Mais venons à des propositions plus précises, à des assertions plus raisonnées, plus réfléchies de Haller :

Selon Haller : « le cal de l'os est formé par un suc gélatineux qui suinte des extrémités fracturées de l'os, surtout de la moelle, et qui s'épanche autour de la fracture. » (1)

Il affirme, d'un autre côté, que « le périoste n'a aucune part à la réunion des os, qu'il ne fait pas partie du cal, qu'il n'est pas attaché au cal. » (2)

Telles sont les deux propositions fondamentales de Haller.

Par la première, il établit sa théorie; par la seconde, il renverse la théorie de Duhamel.

Chacune de ces propositions mérite donc un examen sérieux.

Haller veut que la formation de l'os, que la formation du cal, ne soient que l'endurcissement d'un *suc gélatineux* (3); c'est là sa théorie; et c'est aussi, à de très légères modifications près, celle de presque tous les physiologistes qui sont venus depuis. (4)

On peut en juger par ces paroles de Béclard :

« Dans la réunion d'une fracture il y a successivement, dit Béclard, agglutination des fragmens par un liquide organisable, dont le sang fournit les matériaux; ossification de ce liquide infiltré tout autour de la fracture, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur; enfin, réunion vasculaire et osseuse entre les fragmens eux-mêmes. » (5)

Je n'ai pas besoin de faire remarquer que ce *liquide organi-*

(1) *Mémoires sur les os*, recueillis par Fougeroux. *Mémoire de Haller*, page 174.

(2) *Ibid.*, page 175.

(3) « Ce suc, dit-il, s'épaissit, devient une gelée tremblante, passe par d'autres degrés « de consistance et devient à-la-fin cartilagineux », *Ibid.*, Mémoire de Haller, page 174.

(4) Notre célèbre confrère, M. Larrey, a émis une opinion nouvelle. « Selon lui, la soudure et la réparation des os ne se fait et ne peut se faire que par les vaisseaux propres des pièces osseuses lésées » (Voyez son grand ouvrage, intitulé : *Clinique chirurgicale*, tome III, page 470).

(5) Béclard, *Anatomie générale*, page 521.

sable (1), qui successivement s'épanche, s'ossifie et réunit les fragmens osseux, n'est que le *suc gélatineux* de Haller. La théorie la plus récente, la théorie actuelle n'est donc au fond, comme je viens de le dire, que celle de Haller.

Or on a vu, par mon précédent Mémoire (2), ce qu'il faut penser de cette théorie. Dans les expériences faites à la manière de celles de Troja, il n'y a pas de *suc épanché* entre le périoste et l'os, et cependant entre le périoste et l'os un nouvel os se forme; la formation de l'os n'est donc pas le simple endurcissement, la simple ossification d'un *suc*.

Je passe à la seconde proposition de Haller. L'examen de cette proposition fera l'objet principal de ce Mémoire.

Haller dit que « le périoste n'a aucune part à la réunion des os, qu'il ne fait pas partie du cal, qu'il n'est pas attaché au cal. »

Voilà ce que dit Haller. Mais les pièces marquées des nos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24, que je mets sous les yeux de l'Académie, prouvent toutes le contraire.

Les deux pièces nos 16 et 17 sont les deux moitiés d'un radius de chien (3). L'os a été scié en long. L'animal avait été opéré le 27 juin : quinze jours après l'opération il fut tué.

Or, la matière qui forme le cal, la matière qui réunit les bouts rompus de l'os, est déjà cartilagineuse, et cette matière cartilagineuse tient de la manière la plus évidente au périoste.

Et quand je dis *tient*, je m'exprime mal. Si elle ne faisait que *tenir*, si elle ne faisait qu'*adhérer*, on pourrait conserver du doute; mais elle *se continue* avec le périoste, mais en plus d'un point elle est encore le périoste même, et le doute n'est plus possible.

Les pièces nos 18 et 19 sont les deux moitiés du radius d'un autre chien. L'os est toujours scié en long. L'animal n'a survécu

(1) Ou, comme on s'exprime plus communément aujourd'hui, *lymphe organisable*. Duhamel avait aussi vu cette *lymphe sanguinolente* (c'est l'expression dont il se sert); mais il la compare très judicieusement « aux épanchemens qui se font dans toutes les occasions où il arrive rupture de vaisseaux (*Mémoires sur les os*, recueillis par Fougeroux, *second Mémoire de Fougeroux*, page 123.) »

(2) Annales des Sciences naturelles, tome XVI, page 232.

(3) Ce chien, ainsi que les deux qui suivent, était âgé d'environ six semaines au moment de l'opération.

à l'opération, c'est-à-dire à la fracture de l'os, que douze jours.

Aussi le cal n'est-il pas encore complètement cartilagineux. C'est le périoste même qui pénètre entre les bouts d'os rompus et qui les unit l'un à l'autre.

Il faut en dire autant des pièces n^os^ 20 et 21. Ces deux pièces sont les deux moitiés d'un cubitus de chien.

L'animal n'a également survécu que douze jours à l'opération, et la matière du cal n'est également qu'à demi cartilagineuse. Ce n'est encore qu'un fibro-cartilage, mais ce fibro-cartilage se continue de la manière la plus complète, d'une part avec le périoste, et de l'autre avec les bouts d'os rompus.

Les deux pièces n^os^ 22 et 23 sont les deux moitiés d'un radius de pigeon.

L'animal avait été nourri avec de la garance, et l'os est rouge.

Ces deux pièces sont une preuve nouvelle et plus décisive encore, s'il est possible, de ce que je viens de dire.

L'animal était adulte, et il a survécu à la fracture de l'os à-peu-près un mois.

Or, sur les deux moitiés de cet os scié en long on voit, à l'endroit de la fracture, le périoste pénétrer entre les bouts d'os rompus, s'y transformer en fibro-cartilage, en cartilage; et, au milieu de ce cartilage qui tient au périoste, au milieu de ce périoste qui tient aux bouts d'os rompus, on voit un noyau osseux, lequel est rouge ainsi que l'os, parce que, comme je viens de le dire, l'animal avait été soumis au régime de la garance.

Enfin la pièce n° 24 est l'humérus d'un pigeon qui, comme le précédent, a survécu à la fracture de l'os à-peu-près un mois.

Les bouts rompus de l'os sont unis par un fibro-cartilage déjà fort épais, et au milieu de ce fibro-cartilage se voit un noyau osseux, lequel est rouge ainsi que l'os, parce que l'animal avait été soumis, comme le précédent, au régime de la garance.

Je pourrais présenter encore un grand nombre de pièces, mais elles ne feraient toutes que prouver la même chose. On verrait toujours le périoste pénétrer entre les bouts d'os fracturés pour y former le fibro-cartilage qui les unit, et ce fibro-cartilage s'ossifier pour former le cal : le cal est donc formé par le périoste.

Haller et ses partisans ont beau soutenir le contraire. Ici tout dépend du fait. Et si je ne me trompe point, si ces pièces que je présente à l'Académie je les ai bien vues, le périoste produit le fibro-cartilage, et le fibro-cartilage produit le cal.

Au reste, ce fait capital, ce fait qui décide tout, ce fait de l'adhérence du périoste au cal, je ne suis pas le seul, tant s'en faut, qui l'ait revu depuis Duhamel.

Fougeroux dit : « Lorsque je disséquais le périoste, en commençant par l'extrémité de l'os et en conduisant la dissection vers la tumeur, j'ai toujours été obligé d'emporter, avec le périoste, la substance en apparence mucilagineuse ou devenue cartilagineuse; bien plus, j'ai toujours trouvé des lames du périoste qui se perdaient dans le cal en partie ossifié. » (1)

On pourrait craindre, à la vérité, que Fougeroux n'eût l'esprit trop prévenu pour Duhamel. Il observait trop près de lui pour ne pas voir un peu par ses yeux.

Mais Troja, mais Macdonald ne partageaient pas, assurément, la prévention de Fougeroux pour Duhamel. Ils soutiennent tous deux l'opinion de Haller, que le cal n'est dû qu'à l'endurcissement d'une matière gélatineuse. Et cependant ils conviennent tous deux, car ils sont aussi consciencieux qu'habiles, qu'ils ont vu souvent le périoste tenir à cette matière.

Troja avoue qu'il n'a pas toujours réussi, quelques précautions qu'il ait prises, à séparer sans déchirure la matière cartilagineuse du périoste (2). Il dit que cette matière paraît naître des lames du périoste (3); que si l'on enlève le périoste, elle suit (4); et que ces deux choses sont si unies qu'elles semblent n'en faire qu'une. (5)

(1) *Mémoires sur les os*, recueillis par Fougeroux, *second Mémoire de Fougeroux*, page 120.

(2) Ferè semper, *si excepero quandò nimis sollicitè procedebam, periostium, sive internam periostii laminam, ab internâ tumoris superficie secernere potui* (*De novorum ossium, in integris aut maximis, ob morbos, deperditionibus, regeneratione*, page 191).

(3) *Hæc relata crusta, primis diebus..... ex periostii laminis oriri videbatur* (*Ibid.*, page 76).

(4) ..... *Si profundabatur ad os usque, et ex ossis superficie sublevationis initium ducebatur, periostium comitabatur* (*Ibid.*. page 47).

(5) ..... *Unum et altera, ambo simul unita, sic videbantur continuata ut affirmare non dubitasses solum fuisse periostium eo modo tumefactum* (*Ibid.*, page 49).

Macdonald dit aussi qu'il a vu le périoste tenir à la matière cartilagineuse, et y adhérer à tel point, qu'on ne pouvait l'enlever sans enlever une partie de cette matière. (1)

Voilà ce que disent Troja et Macdonald, et je ne ferai sur ce qu'ils disent qu'une remarque : c'est que vingt cas où le périoste aura paru ne pas se continuer avec la matière du cal ne prouvent pas, car la *discontinuité* peut être du fait de l'anatomiste, et qu'un seul cas où l'on aura vu le périoste tenir évidemment à la matière du cal prouve, car la *continuité* ne saurait être du fait de l'anatomiste.

Je termine ce Mémoire en rappelant les points principaux de la théorie de Duhamel.

Duhamel dit que, dans celles de ses expériences où l'os avait été percé par un trou, il a vu le périoste se porter dans ce trou et le remplir (2). Je montre, dans la pièce n° 13, d'un côté le trou de l'os, et de l'autre le prolongement du périoste qui se portait dans ce trou et le remplissait.

Duhamel dit qu'il a vu des lames en partie membraneuses et

(1) *Materia ipsa gelatinosa renato periosteo adeò adherebat, ut maximam ejus partem, uno cum hoc detraxerim* (Alexandre Macdonald, *Disputatio inauguralis de necrosi ac callo*, page 55). — *Ab initio periosteum arctè cum effuso humore gelatinoso conjunctum observavimus, ità ut* HAUD RARO *difficillimè à se invicem separarentur* (*Ibid.*, page 68).

(2) « Je pris, dit M. Duhamel, deux pigeonneaux, un petit chien et un jeune agneau. Je piquai assez profondément le gros os de la jambe de ces animaux..... Un des pigeonneaux fut tué trois jours après qu'on lui eut fait les petites plaies dont je viens de parler. L'autre pigeonneau ne fut tué que huit jours après le commencement de l'expérience. On laissa le petit chien vivre quinze jours, et l'agneau un mois.

« Dans l'examen que je fis de l'os du pigeonneau, qui avait été tué le premier, je vis que le périoste s'épaississait vis-à-vis le petit trou qu'on avait fait à l'os, et ce trou était rempli par un bouchon que formait l'épaississement du périoste. Je disséquai cette membrane....., et, sans la moindre difficulté, le petit bouchon sortit du trou et resta attaché au périoste, dont on voyait clairement qu'il faisait partie.

« En disséquant le second pigeonneau, je trouvai le petit mamelon beaucoup plus adhérent à l'os.

« L'adhérence était si considérable dans le petit chien, qu'il ne me fut pas possible de le détacher de l'os.....; enfin, l'union était si parfaite à l'os de l'agneau, qu'on avait beaucoup de peine à reconnaître l'endroit de la piqûre » (*Observations sur la réunion des fractures des os*, premier Mémoire, page 106. — *Mémoires de l'Académie des Sciences*, année 1741.)

en partie osseuses (1). Je montre, dans la pièce n° 12, une lame qui est os par un bout et périoste par l'autre.

Duhamel dit qu'il a vu le périoste fournir, par ses lames internes, les lames de l'os (2). Je montre, dans les pièces n^os^ 7 et 8, la couche cartilagineuse, premier germe du nouvel os, tenant à la lame interne du périoste.

Enfin Duhamel dit qu'il a constamment vu le périoste tenir au cal (3); et je montre, dans les pièces n^os^ 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23, les preuves les plus complètes de cette assertion.

La théorie de Duhamel, théorie qui ne voit, dans l'ossification, que la transformation du périoste en os, me paraît donc prouvée par toutes mes expériences.

Je n'ai parlé, dans ces deux Mémoires, que de la formation et de la reproduction des os longs. Je traiterai, dans un prochain Mémoire, de la reproduction des os plats, et particulièrement de la reproduction des os du crâne.

DESCRIPTION *de quelques Mollusques nouveaux*,

Par R. P. LESSON.

1° CANCELLAIRE AMPULLACÈRE, *Cancellaria ampullacera* Less.

Le genre *Trichotropis* de Sowerby a les plus grands rapports avec celui des Ampullacères (*Ampullacera*) de Quoy et Gaimard. Le premier est marin, et vit dans les parages du pôle Nord; le second est propre aux contrées les plus méridionales de l'hémisphère Sud, et ces espèces paraissent s'accommoder du mélange des eaux fluviales avec celles de la mer, et préférer les embouchures des rivières et leurs eaux saumâtres. La Cancellaire qui nous occupe nous paraît être un chaînon qui se rapproche de ces deux genres, car elle tient singulière-

(1) « Je m'assurai qu'il y avait plusieurs lames, qui étaient partie périoste et partie osseuses (quatrième *Mémoire sur les os*, page 100. — *Mémoires de l'Académie des Sciences*, année 1743).

(2) « J'ai fait voir que les lames intérieures du périoste s'ossifient et qu'elles augmentent la grosseur des os » (cinquième *Mémoire sur les os*, page 121. — *Mémoires de l'Académie des Sciences*, année 1743).

(3) Voyez ci-dessus tout ce que j'ai rapporté de Duhamel à propos du *cal*, page 756.

ment de l'un et de l'autre, et surtout des Ampullacères ; mais sa columelle dentée force à la placer dans les Cancellaires.

C. testâ subelongatâ, globoso-carinatâ, spirâ acutâ, crassiusculâ ; suturis depressis, canaliculatis ; anfractibus quinque, ultimo majore, tricarinato, omnibus marginibus perlatis. Testâ unicolore griseâ ; umbilicali cylindricâ ; aperturâ albâ, longitudinali et transversali, labio acuto, columellâ latâ, biplicatâ, canali inflexo.

HAB. *Nova Zelandia ?*

La Cancellaire ampullacère est ventrue, oblongue arrondie, à spire saillante, subturriculée, aiguë, formée de cinq tours, dont le dernier est à lui seul trois fois grand comme les quatre autres. Ce tour est ample, convexe, marqué de trois carènes couvertes d'éminences régulières, et dont les intervalles sont sillonnés de côtes transversales régulières. La suture des tours décrit une rampe déprimée et creusée assez profondément jusqu'au sommet de la spire, et dont l'arête est recouverte de petites éminences semblables à celles des carènes du grand tour. Ce dernier présente en bas, sous le rebord columellaire, une profonde dépression, creusée en canal, et au sommet de laquelle s'ouvre un ombilic arrondi et profond. L'ouverture est entière, plus longue que large, anguleuse dans le haut, marquée d'une sorte de canal dans le bas, à lèvre simple, coupante, sinuée vis-à-vis les arêtes des carènes, à columelle large, rebordée, marquée en dedans de deux varices saillantes, séparées par trois sillons.

Cette Coquille, haute de 16 lignes (0,032) sur 15 (0,030) de largeur, est uniformément gris-de-lin. Le dedans de la bouche est blanc mat.

Elle provient de la frégate *la Thétis*, en station dans la mer du Sud. Probablement que cette Coquille avait été recueillie à la Nouvelle-Zélande, et donnée au lieutenant de la frégate, de qui la tient le cabinet de Rochefort.

2° BUCCIN MELON, *Buccinum melo* Less.

B. testâ globuloso-ovatâ, ventricosâ, rugoso-striatâ, rufo-brunneâ ; anfractibus sex, quinque subdepressis, ultimo ventricoso, dilatato, canaliculato ; spirâ brevi, ad basim dilatatâ ; labio simplici ; aperturâ croceâ.

HAB. *Nova Zelandia.*

Ce Buccin a de grandes analogies avec les *Buccinum globulosum* de M. Kiener (Pl. 10, fig. 33, n. 12 et *B. distortum* de Wood (Kiéner, Monogr., n. 47, pl. 18, fig. 64), mais il est bien distinct de ces deux espèces remarquables, près desquelles il devra être placé. On ne peut non plus le confondre avec le *Buccinum ovum* de Turton, figuré pl. 13, n. 9 du tome 2 du *Zoological journal* (p. 366), ni avec le *B. testudineum*, dont il se rapproche beaucoup.

Ce Buccin a la spire très courte, aiguë, et le dernier tour ovale, ventru et très dilaté. Son test est épais, massif, très solide, brun violacé, recouvert d'un épiderme roux-blond. Des six tours de la spire, les cinq premiers sont aplatis, séparés par une suture creuse, convexes sur leur rebord et creusés d'un canal dans le haut ; les quatre petits tours ont leur milieu occupé par une rangée d'éminences peu élevées formant une ligne tuberculeuse peu sensible. Le dernier tour est beaucoup plus grand que les autres, très dilaté et comme bosselé à son quart supérieur, où se fait remarquer une profonde dépression simulant une sorte de canal. Toute la surface de ce tour est marquée de stries d'accroissement. La base de ce tour est creusée d'un canal qui contourne la dilatation de la columelle sur le rebord du canal, qui est assez profond. L'ouverture est grande,

ovalaire, anguleuse dans le haut par l'attache de la lèvre externe sur un bourrelet très renflé de la columelle, fort épaisse en cette partie. La lèvre est simple, coupante, dilatée dans le bas. Le bord columellaire est excavé, très épais, dilaté dans le bas, comme replié sur le canal, où il prend beaucoup de largeur. Des lamelles concentriques forment une dépression oblongue sur sa partie extérieure. Toutes les parties internes de la bouche et de la columelle sont d'un beau jaune safrané.

Ce Buccin a 26 lignes de hauteur (0,09 m.) sur 18 de largeur (0,04) dans son plus grand diamètre. Son test est excessivement épais et solide. Il provient des côtes de la Nouvelle-Zélande, d'où il a été rapporté par le commis aux vivres de la frégate *la Vénus*.

3° Pourpre (Licorne) marquetée, *Purpura* (*Monoceros*) *tesselliata*, Less. Rev. zool. Déc. 1840.

P. testâ ovato-elongatâ, lineis longitudinalibus flexuosis tectâ et transversè striatâ; sulcis profundè, regulariterque crebris numerosissimis quadratis perforatis; testâ rufâ; spirâ elongatâ, obtusâ; anfractibus complanatis, tessellatis, ultimo ventricoso ad suturam depresso; labro dextro dentato, intùs rubescente et quatuor punctis ornato.

Hab. *Nova Zelandia.*

La Pourpre licorne marquetée est une curieuse espèce dans un genre qui en compte tant de remarquables. Les cordons qui couvrent son test, séparés par des sillons, présentent, vus à la loupe, ces mêmes sillons composés de trous cloisonnés imitant les trous et les cloisons de la surface d'un dé. Seulement ces trous quadrilatères forment une ligne régulière sur le sillon où ils sont placés à se toucher. A la vue simple, les sillons paraissent continus.

La Coquille qui nous occupe est ovale-allongée, marquée de stries d'accroissement verticales, et cordonnée sur toute sa surface. Formée de cinq tours, sa spire est saillante et aiguë; les tours sont renflés à leur milieu et atténués à leur sommet; le dernier, ou plus grand, est ovalaire, recouvert de côtes alternativement grosses et petites, bien que les deux plus saillantes se trouvent occuper sa partie moyenne. Les sillons sont peu profonds et dessinés en simples lignes sur ce grand tour, dont le sommet est évidé et comme canaliculé; les autres tours ont à leur base leur plus forte côte, que bordent deux lignes de trous cloisonnés.

L'ouverture est ovalaire-oblongue. Le bord droit est simple, tranchant, épaissi en dedans, marqué sur la ligne d'épaississement de cinq petites éminences mamelonnées, tandis qu'à la ligne d'étranglement de la columelle part, à la suite de ces mamelons, une dent saillante, acérée, occupant l'échancrure de la lèvre. Le bord columellaire est droit, aplati, terminé en pointe aiguë, et le canal est court et droit.

Cette Coquille haute de 12 lignes (0,024) sur 9 de largeur (0,018) est de couleur terne et blanchâtre avec des stries rousses, tandis que l'ouverture et la columelle sont nuancés de violâtre clair. Deux taches noires occupent le haut du bord gauche.

4° STRUTHIOLAIRE A TROIS CARÈNES, *Struthiolaria tri-carinata* Less.

St. testâ ovato-oblongâ, transversim tenuissimè striatâ, luteâ, immaculatâ; anfractibus sex, majoribus, in medio, depressis, duobus canalibus cinctis, ad angulum unâ serie perlatis tectis; margine crasso; labro albo, luteoque.

HAB. *Nova Zelandia meridionalis.*

Quelques auteurs n'admettent que deux espèces de Struthiolaires, les *Struthiolaria nodulosa* et *crenulata* de Lamarck, l'une et l'autre des côtes de la Nouvelle-Zélande. Sowerby, sous le nom de *S. straminea* (fig. 1 et 2 du *Genera*), paraît avoir figuré une simple variété de la *nodulosa*. Quant à l'espèce qu'il appelle *S. inermis* (fig. 4), nous ne doutons pas que ce ne soit le jeune âge de notre Struthiolaire à carène; mais la figure du n° 3 est évidemment la *S. crenulata*, variété, de Lamarck, dont M. Kiéner ne distingue pas non plus la *S. oblita* du Musée Tankerville.

MM. Quoy et Gaimard ont donné une excellente figure de la *S. crenulata* dans la planche 31, fig. 7 à 9 de la Zoologie de l'*Astrolabe*. Celle de M. Kiéner laisse beaucoup à desirer.

Notre Struthiolaire à trois carènes nous paraît être bien distincte de deux espèces citées, car, bien que petite, elle est évidemment adulte, et, de plus, nous avons vu une vingtaine d'individus parfaitement semblables, rapportés par la frégate *la Vénus*. Comme les précédentes, elle provient de la Nouvelle-Zélande, mais elle paraît ne se trouver que sur les rivages de l'île Méridionale.

La Coquille qui nous occupe est petite, haute au plus de 22 millimètres sur 14 de largeur. Elle est ovale-oblongue, ventrue au milieu et atténuée aux extrémités. La spire est courte, régulièrement turriculée, pointue, formée de six tours dont le dernier est des deux tiers plus grand que les cinq autres. Ces tours sont déprimés à leur milieu par une assez large dépression formée par trois carènes qui s'effacent sur les premiers tours. La première carène est saillante, et couverte d'une rangée de petites éminences perlées; un sillon assez large la sépare d'une ligne carénée moyenne, séparée elle-même par un sillon de la troisième carène. Ces deux dernières n'ont pas d'éminences perlées, mais sont formées par des lignes en ressaut des sillons, et des lignes circulaires contournent dans le sens transversal toute la surface du test. Les tours supérieurs, convexes en dessus, sont plats en dessous jusqu'à la suture, et régulièrement sillonnés dans le sens de la spire. La suture est simple et peu profonde. L'ouverture est ovalaire-pointue, à columelle lisse et épaisse. La lèvre externe est en bourrelet; l'interne est presque droite et munie d'un petit canal peu marqué.

Cette Coquille est uniformément jaune-roussâtre sans taches. L'ouverture est blanche en dedans et lavée de jaune sur son péristome.

HISTOIRE *des métamorphoses des* CÉCIDOMYIES DU PIN MARITIME *et du* PEUPLIER;

Par M. LÉON DUFOUR.

L'entomologie, comme la considérait Réaumur, c'est-à-dire l'étude des métamorphoses et des mœurs des insectes, en même temps qu'elle imprime à la science un intérêt, un charme d'une piquante variété, est aussi destinée à nous fournir des données pour la classification. Les deux larves qui sont le sujet de ce Mémoire vont nous en offrir une preuve sur mille.

Latreille fonda le genre Cécidomyie (Mouche de galle) pour de petites Tipulaires dont les larves vivent dans des galles, et Meigen établit, sur ce dernier trait, la tribu des *Tipulaires Gallicoles*, admise aussi par M. Macquart. Eh! bien, les deux larves dont je vais m'occuper appartiennent à cette tribu et même au genre Cécidomyie et n'habitent pas dans les galles. Je ne donne pas ce fait comme nouveau, puisque M. Macquart et, avant lui, De Géer, en citent d'autres exemples; mais il existe entre mes deux larves une si remarquable différence et pour la forme, et pour la structure, et pour le genre de vie, et enfin pour les métamorphoses qu'il m'a paru curieux d'en exposer la description comparative dans un même article. Examinons-les d'abord séparément, nous en établirons ensuite le parallèle.

1° *Cécidomyie du pin maritime.* — Lorsque je publiai, il y a trois ans, dans les Annales de la Société entomologiques (1) des notes pour servir à l'histoire des Cécidomyies, et en particulier de l'espèce que je viens de nommer, j'ignorais que De Géer avait mentionnée deux espèces de Tipules dont les larves établissent leurs coques sur les feuilles du Pin. L'une de ces coques était de pure soie, tandis que l'autre avait une couche extérieure d'une résine blanche, absolument comme celle que j'ai décrite dans les notes précitées. La larve qui avait fabriqué

(1) Tome VII, page 293.

ce dernier cocon, se distinguait de l'autre par deux rangées de mamelons pointus, refendus au bout et semblables à des pattes. Celle que je vais faire connaître présente une structure analogue, mais non identique avec celle de De Géer, puisque l'insecte ailé de ce dernier auteur a des pattes d'un blanc argenté, tandis que dans la Cécidomyie du pin maritime, elles sont d'un rouge obscur uniforme. Malheureusement je n'ai pas à ma disposition l'ouvrage de De Géer, et il ne me reste que la ressource des citations consignées dans divers ouvrages d'entomologie.

LARVA acephala, apoda, ovata, subaurantiaca, rugosula, utrinque tuberculoso-spinulosa; appendicibus septem paribus, pediformibus, oblongis subrigidis, apice bifidis, subulatis; stigmatibus novem paribus. Long. 1 1/2 lin.

Pour bien apprécier la singulière structure de cette larve il faut l'étudier plongée dans l'eau. C'est alors seulement qu'elle met en évidence les traits qui la caractérisent. Toutefois, elle prend alors une forme oblongue, et c'est dans cet état que je l'ai figurée (1). Quoiqu'elle n'ait que douze segmens, on lui en supposerait davantage en l'envisageant par sa région dorsale qui est plissée, comme ridée. Elle est glabre, excepté sur les côtés de ces segmens, où le microscope découvre à chacun d'eux, sauf aux deux premiers, deux mamelons ou tubercules subglobuleux, rapprochés, terminés par un poil raide ou une soie. L'un de ces tubercules pilifères qui paraît plus petit que l'autre appartient au segment ventral correspondant. Indépendamment de ces tubercules il existe sept paires d'appendices saillans que l'on prendrait volontiers pour des pattes dont ils remplissent peut-être les fonctions. Ces curieux appendices raides, inarticulés, oblongs, divisés en deux digitations inégales, terminées par une soie, m'ont paru insérés, comme les pattes ordinaires, dans l'espace qui sépare les segmens dorsaux des ventraux, mais tout-à-fait en dessous, de manière que le microscope ne peut les rendre bien évidens que lorsque la larve est renversée sur le flanc, ainsi que je l'ai représentée (fig. 2). Je ne connais pas

(1) Grandeur naturelle, fig. 1.

encore de larves qui aient des pseudopodes de cette configuration.

Ainsi que dans les larves acéphales des muscides il y a des mandibules cornées, noires, rétractiles, terminées en arrière par deux tiges divergentes et en avant par deux crocs superposés. On lui découvre aussi, dans quelques conditions favorables de protraction une sorte de lèvre demi circulaire avec deux palpes labiaux excessivement courts et biarticulés. Le premier segment du corps, ou celui qui suit la lèvre, présente au microscope quatre poils courts à son bord antérieur, et le second un poil plus marqué de chaque côté.

Par le nombre et la disposition des stigmates, notre larve se rapproche des larves céphalées des Tipulaires fongivores. Ces orifices respiratoires, qui dans ces dernières sont au nombre de huit paires, sont ici, si je ne me trompe, au nombre de neuf paires d'une petitesse microscopique et très simples. Les antérieurs débordent un peu le premier segment. Les suivans, à partir du quatrième segment, sont placés près de l'angle antérieur des plaques dorsales. Les postérieurs terminent les deux lobes triangulaires du dernier segment et occupent l'extrémité trifide d'un tube fort court.

Cette larve se nourrit aux dépens de la feuille même du Pin, ainsi que je l'ai constaté par les *contenta* verts du tube digestif.

Pupa folliculata; folliculo ovoideo albido, extùs glabro, resinâ obducto, intùs sericeo-tomentoso.

Nympha oblonga, obvoluta, glabra, inermis.

Cecidomyia Pini maritimæ.

Je renvoie pour le Cocon et pour l'insecte ailé à ce que j'en ai déjà dit, l. c. p. 294.

2° *Cécidomyie du Peuplier.* — En janvier 1840, en étudiant les larves de Térémie qui habitaient en grand nombre sous l'écorce de vieux troncs de Peuplier morts, je trouvai entre les feuillets décomposés du liber de fort petites larves d'un jaune orangé vif, remarquables par les sauts qu'elles exécutaient en débandant brusquement leur corps roulé en anneau, ce qui me rappela aussitôt le ver du fromage dont Swammerdam a donné

l'histoire. J'en plaçai soigneusement un certain nombre dans un bocal avec les écorces où elles étaient établies. Je les tenais à l'ombre et j'arrosais de temps en temps ces écorces pour y entretenir cette fraîcheur, cette humidité qui m'avaient paru une condition d'existence pour les larves dans leur gîte en plein air. L'étude scrupuleuse que je fis de celles-ci au microscope excita à un haut degré ma curiosité pour en obtenir les métamorphoses. Au commencement de mai j'eus la satisfaction de constater des nymphes et peu de jours après je vis naître des insectes ailés. Je vais résumer les trois états de cette Tipulaire.

LARVA acephala, apoda, elongata, subcylindrica, aurantiaca, glaberrima et mollis; mandibulis? brevibus subparallelis; corporis ultimo segmento semicirculatim emarginato, anguis, acutis, subaduncis; stigmatibus undecim paribus. Long. 1 1/2 lin.

Hab. sub populorum emorturorum corticibus.

Le plus fort grossissement du microscope ne lui découvre ni poils, ni aspérités. Le premier segment du corps plus étroit que le suivant est ordinairement retiré sous celui-ci, et ce n'est qu'en étudiant la larve dans l'eau que l'on parvient à en procurer l'exsertion. Dans cette même condition on découvre aussi une lèvre rétractile demi circulaire avec deux palpes labiaux à deux articles courts et obtus. Je n'aperçois pour mandibules que deux pièces oblongues, noires, pointues, droites, nullement superposées comme dans l'espèce précédente et les muscides, mais situées à côté l'une de l'autre vers la base du premier segment. C'est la première fois que je vois des mandibules de cette espèce.

Les stigmates, sous la forme de très petits points, sont au nombre de onze paires, placés, à l'exception de ceux de devant et de ceux de derrière, près de l'angle antérieur des neuf segmens qui suivent le second. Le premier segment et le dernier n'en ont pas. Le premier stigmate occupe le milieu du bord latéral du second segment et le dernier l'angle postérieur du pénultième. Pour constater ces orifices respiratoires il faut nécessairement observer au microscope la larve immergée dans l'eau. C'est alors que les bords latéraux des segmens, devenant diaphanes par le retrait du tissu adipeux splanchnique vers la

ligne médiane, mettent en évidence et les stigmates et les trachées qui y aboutissent. Celles-ci dessinent à merveille leurs flexuosités régulières d'un stigmate à l'autre et les branches anastomotiques entre les systèmes des deux côtés. Une des figures (Pl. 14, fig. 9) exprime bien cette disposition.

Cette larve peut se dérober à ses ennemis en sautant. Or, voici comment s'exécute le saut. Le dernier segment dorsal présente à son bord postérieur une échancrure arrondie dont les angles se terminent par une très petite pointe un peu crochue en dedans. Lors du danger le corps de la larve se courbe en anneau de manière que la tête et la queue sont contiguës. Les deux petits crochets s'agrafent au-dessous du second ou du troisième segment; ils y prennent un point d'appui et le corps se débande alors avec prestesse pour s'élancer à une assez grande distance.

Nymphæ ovoluta, nuda, oblonga, subaurantiaca; oculis? minutis, rotundis, nigris; capitis vertice cornubus duobus truncatis; abdominis segmentis utrinquè unispinulosis; ultimo attenuato inermi apice fisso.

Les antennes reployées comme à l'ordinaire n'offrent qu'une faible trace d'articulations. Les pattes emmaillotées et pressées les unes à côté des autres sont droites et les extérieures un peu plus longues que les autres. Les spinules des segmens abdominaux et les cornes du vertex sont caduques, car après l'éclosion de l'insecte ailé, la dépouille de la nymphe n'en offre plus vestige. Lors de la naissance de la Tipulaire le thorax se fend tout le long de sa ligne médiane dorsale.

Cecidomyia populi.

Pallido-grisea trochanteribus aurantiacis; antennis corporis longitudine moniliformibus, villosis 25 articulatis, articulis in mare sphæroïdeis pedicellatis; abdomine molliter villoso in utroque sexu apice resupinato; tarsorum articulis tribus ultimis albis; alis subfumosis. Long. 1 1/2 lin.

Hab. in Galliæ meridionali-occidentalis populetis.

Tête petite, arrondie, dépourvue d'ocelles. Antennes composées dans les deux sexes de 25 articles, mais sensiblement plus longues dans le mâle. Premier et troisième articles oblongs conoïdes, le second fort court arrondi. Les autres sphéroïdes

distincts et pédicellés dans le mâle; globuleux, rapprochés, contigus, dans la femelle. Palpes assez longs et filiformes. Corselet pâle avec trois raies longitudinales obscures. Ailes velues à trois nervures. Abdomen pâle avec des poils fasciculés sur le dos des segmens; il est relevé à son extrémité, et l'oviducte de la femelle qui est allongé peut s'appliquer sur la région dorsale de l'abdomen (1). Pattes grêles et pâles avec le premier article des tarses fort court.

Résumons maintenant les analogies et les dissemblances de ces deux Tipulaires.

L'un et l'autre des insectes ailés réunissent les caractères génériques des Cécidomyies; savoir : antennes moniliformes velues, plus longues que le corselet; tête sans ocelles; pattes avec le premier article des tarses fort court; ailes velues, frangées avec trois nervures longitudinales. Mais la Cécidomyie du Pin Maritime n'a que 16 articles aux antennes, et ces articles sont oblongs, tandis qu'il y en a à 25 et globuleux dans celle du Peuplier comme dans la *Cecidomyia grandis* de Meigen. Le bout de l'abdomen de la *Populi* est réfléchi en haut, tandis qu'il n'offre pas ce trait dans la *Pini maritimæ*.

(1) Cette structure du bout de l'abdomen, si propre à insinuer les œufs sous l'écorce, s'observe aussi dans les *Lasioptères*, genre de Tipulaire très voisin des Cécidomyies. Comme j'ai étudié les métamorphoses d'une Lasioptère, et qu'elles ne sont pas connues, je vais, en attendant que j'en publie l'histoire, en donner les signalemens.

LARVA *cephala, apoda, ovata, albida, glabra, supra convexa, infra planiuscula; capite concolore, mandibulis oppositis, corneis, fuscis, uaidentatis. Long.* 1 *lin.*

Plusieurs larves étaient logées dans la partie ligneuse d'un espace dénudé et malade d'un tronc de saule vivant.

NYMPHA *nuda obvoluta, oblonga, subfusca glabra, antice rostro recto bipartito basi utrinque unisetoso terminata.*

Rien de plus curieux que la physionomie bizarre de cette nymphe, dont la tête semble se terminer par une sorte de hure de deux pièces mandibuliformes qui font l'office de tarière, pour percer le bois. Les dépouilles de ces nymphes, après l'éclosion de l'insecte ailé, demeurent à moitié engagées dans les trous dont est criblée la portion du tronc habitée par les larves. La hure reste dans son entier, fixée à la dépouille.

LASIOPTERA SALICIPERDA Nob.

Nigra abdominis segmentis rubro-ferrugineis, obscuro-marginatis; antennis moniliformibus villosis, 15-articulatis; articulis in mare pedicellatis; alarum costa nigra; femina oviscapto elongato, tubuloso, semper exserto; pedibus tenuibus pallidis; tarsorum articulo primo brevissimo. Long. 1 1/2 *lin.*

Hab. in Galliæ meridionali occidentalis salicetis.

La larve de ce dernier est ovalaire; elle a des mandibules à deux branches en crocs superposés; des tubercules pilifères sur les côtés des segmens; des pseudopodes bifides très saillans et 9 paires de stigmates; elle vit de la substance verte des feuilles du Pin et se file une coque. La larve de la Cécidomyie du Peuplier est subcylindrique, glabre et inerme; elle a des mandibules rudimentaires à branches droites et parallèles; elle est privée de pseudopodes; elle a 11 paires de stigmates; elle se nourrit du détritus, des lames du liber et ne file point.

La nymphe de la Cécidomyie du Pin maritime est renfermée dans un cocon formé de deux substances très différentes; elle est glabre et inerme. Celle de la Cécidomyie du Peuplier est à nu; elle a deux cornes sur la tête et des piquans aux segmens de l'abdomen.

EXPLICATION DES FIGURES DE LA PLANCHE 16 A.

(*Toutes ces figures sont fort grossies.*)

1. Larve de la *Cécidomyie du pin maritime*, avec la mesure de sa longueur naturelle indiquée à côté. La figure représente une larve d'une forme plus allongée que dans l'état naturel, parce qu'elle est prise sur un individu plongé dans l'eau.
2. La même larve, vue de côté, pour mettre en évidence les sept pseudopodes *aa* et les rides de la région dorsale.
3. Portion infiniment plus grossie de la partie antérieure de cette larve.
   a. Lèvre et palpes labiaux.
   b. Mandibules.
   cc. Stigmates antérieurs.
   dd. Stigmates abdominaux et tubercules pilifères.
4. Portion antérieure, détachée.
   a. Lèvre et palpes labiaux biarticulés.
5. Cocon, établi sur la face canaliculée de la feuille du pin.
6. Nymphe de ce cocon, vue de face.
7. Antenne de cette Cécidomyie, pour mettre en évidence la forme et le nombre de ses articles.
8. Aile détachée, pour mettre en évidence sa forme, sa villosité et ses nervures.
9. Larve de la *Cécidomyie du Peuplier*, avec à côté la mesure de sa longueur naturelle. Elle a été dessinée, lorsque, par son immersion dans l'eau, les bords des segmens étaient diaphanes, et permettaient de voir les stigmates et les trachées.
   a. Lèvre et palpes labiaux.
   b. Premier segment et mandibules.
   c. Dernier segment, avec son échancrure et ses crochets.
10. Cette même larve, roulée en anneau, pour sauter.
11. Nymphe, vue de face. On y voit ses cornes et ses piquans.
12. Abdomen de la femelle de cette Tipulaire, avec son oviscapte réfléchi sur le dos et les poils fasciculés.
13. Antenne du mâle.
14. Antenne de la femelle.
15. Aile détachée, avec sa villosité, ses franges, ses nervures.
16. Une patte postérieure, pour mettre en évidence la brièveté du premier article du tarse.

NOTE *sur la larve du* PACHYGASTER MEROMELAS, *insecte de l'ordre des Diptères*,

Par M. LÉON DUFOUR.

La science ne s'enrichit pas seulement par l'acquisition de faits nouveaux, les faits analognes qui confirment les faits existans, surtout lorsque ceux-ci sont isolés, ont aussi une valeur incontestable. L'infortuné Carcel avait découvert, aux environs de Paris, la larve du *Pachygaster ater* dans le détritus de l'orme, et il l'avait communiquée à M. Macquart; celui-ci en a consigné une excellente description dans ses *Insectes diptères du nord de la France*, mais sans l'accompagner de figures. Je vais remplir cette dernière lacune, et en même temps faire connaître la larve d'une nouvelle espèce de *Pachygaster*.

Dans le mois d'avril 1840 je trouvai, sous l'écorce d'un vieux tronc de peuplier mort, abattu, et au milieu de la substance ligneuse en pleine décomposition, de très petites larves sociétaires que je jugeai appartenir à un diptère. Je les plaçai dans un bocal avec le détritus où elles vivaient, pour attendre leur transformation, qui eut lieu vers la mi-juin de la même année.

LARVA apoda, cephala, oculata, subcoriacea, elongata, grisco-plumbea, pilosa, capite pallido oblongo, parcè piloso, anticè attenuato subrostrato; mandibulis concoloribus aduncis inflexis.

Long. 2 1/2 lin. — Hab. in ligno putrescente populi.

Cette larve est fort remarquable par la consistance coriacée et l'opacité de ses tégumens, dont la surface offre, à une forte lentille du microscope, des sortes d'écailles ou des aréoles arrondies comme la peau du lézard. Elle est allongée, étroite, déprimée, d'un gris plombé, ou parfois d'un brun panaché de gris et composée de douze segmens, la tête non comprise. M. Macquart ne porte qu'à onze le nombre de ceux-ci; mais la petite ligne transversale qu'il signale vers l'extrémité du dernier est, suivant moi, l'indice du douzième. Ces segmens, presque carrés avec les côtés arrondis, et à-peu-près égaux entre eux,

à l'exception du dernier, qui est presque rudimentaire, sont séparés les uns des autres par un sillon bien marqué, et, outre cela, ils présentent parfois une dépression transversale. Ils ont des poils ou des soies raides, distincts, disposés régulièrement les uns sur les bords latéraux, les autres en une série transversale, tant en dessus qu'en dessous. Le dernier segment est tantôt arrondi, tantôt comme échancré.

La tête est brusquement plus étroite que le corps, oblongue, un peu atténuée en avant, et ressemble au rostre des *Réduves*, ou mieux, de la *Ranatre linéaire*. Elle a une consistance coriacée, une configuration invariable, une couleur pâle, uniforme, et quelques poils rares. Elle est légèrement mobile à son articulation avec le premier segment du corps, mais nullement rétractile. Vers le milieu de sa longueur et de chaque côté, il existe une petite saillie arrondie et noirâtre, qui est sans doute un œil. A sa partie supérieure se voit à droite et à gauche une ligne longitudinale enfoncée, et à son bout antérieur s'articule une pièce oblongue de niveau avec la tête, et qui simule une sorte de *labre*. Celui-ci est flanqué, à droite et à gauche, par une autre pièce de même texture que lui et de même couleur, courbée à son extrémité en un crochet non articulé, dirigé de haut en bas et d'avant en arrière; ce sont là des *mandibules* qui ne ressemblent pas aux crocs rétractiles des larves acéphalées des Muscides. Elles sont étroitement rapprochées du labre et susceptibles de mouvemens limités que j'ai surtout constatés en étudiant la larve plongée dans l'eau. Au-dessous et entre les bases des mandibules, on découvre une pièce mobile ovalaire et duvetée, que je ne puis comparer qu'à une *lèvre*; je n'ai reconnu aucun vestige ni de palpes ni d'antennes; je n'ai pas été plus heureux pour les stigmates, et M. Macquart n'en parle pas non plus. Réaumur a reconnu que, dans les larves du *Sargus* (1), Diptères qui appartiennent au même groupe que le *Pachygaster*, les orifices respiratoires étaient placés dans une excavation de la partie postérieure du corps, sans doute comme dans les larves de plusieurs grandes

(1) Mémoires, tome III, page 347, planche 15, fig. 4-4.

Tipulaires, et la loi de l'analogie nous permet de penser qu'il en est de même dans celles du *Pachygaster*.

La larve de ce dernier a de grands rapports avec celle que Réaumur a représentée, presque sans la décrire, aux figures 5, 6 et 7 de la planche 14 du tome IV de ses Mémoires, et dont il ne nous a pas fait connaître la transformation. Il l'avait trouvée dans un Agaric parasite du sycomore. Sa forme et sa grandeur l'éloignent un peu de la nôtre.

Pupa larvæ similis at oculis destituta. Nymphâ invisa.

La pupe ne diffère de la larve que par l'absence des yeux et une immobilité absolue. Elle ressemble, sous plusieurs rapports, à celles des larves épineuses des Muscides, et en particulier des Anthomyies. Lors de l'éclosion de l'insecte ailé, la tête de la pupe se disloque ou se détache, et les trois premiers segmens du corps, qui correspondent au thorax, se fendent et s'ouvrent à leur ligne médiane. La larve et la pupe ont une ligne de plus de longueur que l'insecte ailé. On se rend raison de cette disproportion de taille, parce que la tête des deux premières formes est tout-à-fait étrangère à la nymphe.

Pachygaster meromelas Nob.

Pachygastre à cuisses noires.

Ater, pedibus pallis, femoribus nigris ; alis immaculatis nervis à basi ad medium atris cæterum rufo-fuscis.

Long. 1 à 2 lin. — Hab. in populetis Galliæ meridionali-occidentalis.

Cette espèce, dont les caractères sont constans, a la taille et la physionomie du *P. pallipennis*, qui est commun sur les feuilles de nos noisetiers, mais elle en diffère par la couleur noire des cuisses et des nervures de la moitié postérieure des ailes : les tibias ont aussi un peu de brun vers leur base.

EXPLICATION DES FIGURES DE LA PLANCHE 14 A.

(*Très grossies.*)

Fig. 17. Larve du *Pachygaster meromelas*, avec la mesure de sa longueur naturelle.

Fig. 18. Un segment dorsal du corps, détaché et encore plus grossi, pour mettre en évidence les soies dont il est hérissé et la texture aréolaire de sa surface.

Fig. 19. Tête détachée et vue de côté pour mettre en évidence l'œil, le labre, la mandibule et la lèvre.

DESCRIPTION *de quelques Annelides nouvelles du golfe de Naples,*

Par M. O. G. COSTA.

(Présentée à l'Académie des Sciences, le 2 août 1841.)

Les habitans de la mer sont très nombreux, et, par la nature même des milieux dans lesquels ils vivent, ne peuvent pas être saisis par les yeux du naturaliste aussi facilement que les animaux terrestres. Il n'est donc pas surprenant que ce soit parmi les animaux marins surtout, que l'on rencontre des espèces inconnues jusqu'alors. Les *Annelides* en particulier rentrent dans cette catégorie, et leur étude offre encore d'autres difficultés dépendantes des conditions spéciales dans lesquelles elles se trouvent placées. La vase du fond de la mer, les trous des rochers couverts d'eau, les tuyaux construits par les animaux eux-mêmes, en rendent toujours l'observation et la capture plus difficiles. A tout cela on doit ajouter le peu d'intérêt que les anciens naturalistes ont attaché à l'étude de cette classe d'animaux, ce qui explique pourquoi leur organisation, leurs fonctions et leurs mœurs ont été jusqu'ici presque inconnues. Nous devons à M. Savigny le travail le plus remarquable sur ce sujet; mais ce savant naturaliste s'est borné seulement à l'organisation extérieure, sur la considération de laquelle il a fondé sa classification. Après lui, c'est à MM. Audouin et Milne Edwards que nous sommes redevables de notions plus exactes sur la conformation extérieure de la plupart des Annelides, et à M. Milne Edwards, en particulier, de l'étude la plus approfondie de leur structure intérieure.

Mes recherches sur les côtes du royaume des Deux-Siciles m'ont offert plusieurs espèces très distinctes, parmi lesquelles il y en a deux qui appartiennent à des genres nouveaux, en adoptant, du moins, les principes de classification actuellement admis en zoologie. Ce sont ces espèces qui font le sujet de ce Mémoire.

que j'ai l'honneur de soumettre au jugement de l'Académie des Sciences de l'Institut de France.

§ I.

Hésione de Savigny.

Cette espèce (pl. 11, fig. 2) me paraissait ne devoir pas être différente de celle qui a été décrite par M. Risso sous le nom de *H. Panthérina*, et j'aurais adopté cette détermination, si la description qu'en ont donnée MM. Audouin et Milne Edwards n'avait pas fait naître en moi l'assurance qu'elle est bien distincte.

En effet, la tête de notre Hésione est tout-à fait semblable à celle de l'*Hes. splendida* de M. de Savigny, telle qu'on la voit dans le dessin que ce naturaliste en a donné. Elle est presque du même diamètre que le premier anneau du corps. Sa couleur est bleu céleste, et elle est presque entièrement composée de deux globules, sur lesquels on remarque une ligne plus foncée d'une forme spirale. Le corps est composé de dix-huit anneaux presque cylindriques, un peu renflés au milieu et sans aucune trace de rainures latérales, comme on en voit dans toutes les autres espèces connues. Tous les anneaux, excepté le dernier, sont pourvus d'une paire de pieds; le nombre de ces organes est par conséquent de 17 paires, de même que dans l'*H. festiva* de Savigny. Le dernier anneau est presque conique, un peu arrondi, sans tubercules ou mamelons, avec deux pieds rudimentaires, et se terminant par un appendice filiforme très long. La couleur générale est rosée, avec des taches plus foncées, rangées en stries longitudinales, parallèles entre elles et au vaisseau dorsal, qui est d'une couleur encore plus foncée, et qui a l'apparence d'être interrompue à cause des replis transversales particuliers à ce genre. Les lignes de démarcation des anneaux ont une couleur jaune-orange, qui, à la partie postérieure du vaisseau dorsal, s'élargit en croisant. Les pieds sont jaune pâle avec les soies noires et les cirrhes d'un rouge foncé. On doit remarquer cependant que, outre les faisceaux des soies centrales et très longues, il y en a une plus forte, insérée obliquement au-dessous de la

peau, et dont la pointe sort à côté de l'ouverture par laquelle naît le faisceau des soies (pl. 11, fig. 2ª).

La longueur de tout l'animal est d'environ quatre pouces, et le diamètre dans la partie la plus large est de quatre lignes.

J'ai trouvé cet animal dans le golfe de Naples le 13 janvier 1839. Il est très rare et vit dans les lieux les plus profonds.

§ II.

Sigalion de Blainville.

Ce Sigalion a beaucoup de ressemblance avec le Sigalion Mathilde de MM. Audouin et Milne Edwards; mais il en diffère essentiellement par la disposition de ses tentacules, et peut-être encore par une espèce de trompe ou d'antenne intermédiaire très longue, laquelle se replie au-dessous de l'abdomen, et enfin par l'existence d'un appendice filiforme au dernier anneau du corps (1). Les pieds des premiers anneaux environnent la bouche presque en éventail, comme on le voit dans le dessin ci-annexé (2). La bouche est armée de six tentacules ou antennes, trois de chaque côté. Le corps est aplati, et ses côtés recouvrent entièrement les pieds, qui sont au nombre de cent quatre-vingt-six paires. Sa couleur est rouge. Les élytres sont plus pâles, et, dans celles qui recouvrent la partie moyenne, il y a des points blancs qui dépendent des œufs qui sont dans l'intérieur. Tous les autres caractères sont génériques; mais on doit remarquer que les pieds sont garnis latéralement de poils, comme on peut les voir dans les figures.

Cet Annelide a été pêché à la *Riviera di Chiaja*, à Naples, dans le mois de mai 1841.

(1) Je doute encore si ce que j'ai appelé *trompe* ou *antenne intermédiaire* soit, en effet, l'une ou l'autre de ces choses. Je suis sûr d'ailleurs qu'à son extrémité il y a une ouverture très petite, et c'est pour cela que je l'ai considérée comme un suçoir. Pendant la vie de l'animal, elle se meut et se replie en tous sens, et, lorsqu'on irrite celui-ci, elle se raccourcit un peu et va se poser sur la ligne médiane entre les pieds. Il m'a été impossible de constater ce fait, parce que je n'en ai pu observer qu'un seul individu, que j'ai disséqué; mais, si de nouvelles observations viennent confirmer ce que j'avance, on devrait faire de cet animal un genre particulier.

(2) Planche 11, fig. 1.

EXPLICATION DES FIGURES.

Planche 11. Fig. SIGALION DE BLAINVILLE, *Sigalion Blainvillii* Nob.

La figure 1 représente l'animal de grandeur naturelle : *a*, est la trompe ou antenne intermédiaire.

La figure 1 [a] représente la partie antérieure, vue de côté ; *a*. est la trompe ; *b*, *c*. les tentacules.

La figure 1 [b] représente une portion du corps, vue par la partie inférieure : *a*, *a*. montre le vaisseau ventral moyen.

La figure 1 [c] représente deux de ses pieds : *a*, *a*. les faisceaux de soies ; *b*. les cirrhes.

La figure 1 [d] représente le même pied, vu du côté latéral, pour y montrer mieux le cirrhe *b*.

§ III.

Genre LOPHONOTE.

L'Annelide dont nous allons donner la description se distingue essentiellement du genre *Euphrosine* par l'absence de la caroncule, placée sur la tête, et par le défaut d'antennes (Pl. 13, fig. 1). Par ce dernier caractère même, il s'éloigne du genre *Hipponoa* de MM. Audouin et Milne Edwards, auquel il pourrait se rapprocher à raison de l'absence de cette caroncule, et de l'existence d'un seul faisceau de soies pour chaque pied ; mais par le reste de son organisation, il ressemble parfaitement à ce dernier type.

En effet, son corps est ovalaire, aplati, et composé de trente-deux anneaux (1). La tête est petite, et sa bouche munie d'une grosse trompe très courte, à bord froncé. Il est aussi dépourvu d'yeux, si toutefois on ne veut pas considérer comme tels les quatre taches noires qu'on voit latéralement sur sa trompe, ce qui ne me paraît pas vraisemblable. Les pieds sont simples et pourvus d'un faisceau de soies, et entre eux se trouvent les branchies sous la forme de franges ou d'arbuscules, lesquelles s'étendent sur le dos, en décrivant une ligne arquée. Lorsque l'animal est contracté, sa trompe rentre en elle-même, et la bouche prend la forme d'un cône, comme on le voit dans la figure 1 [a], où elle est représentée par la partie inférieure, et laisse apercevoir

(1) Ce nombre le rapproche davantage du genre *Euphrosine*, puisque, d'après MM. Audouin et Milne Edwards, les Hipponoës ont un très petit nombre d'anneaux.

les quatre taches noires *a*, *a*, *b*, *b* dont il a été déjà question. Lorsque l'animal est étendu, au contraire, on voit le pourtour de la bouche garni de huit appendices foliacés, qui constituent la frange, comme on l'a représentée dans la figure 1 *b*.

La grandeur de cet animal est de huit lignes environ : sa couleur est d'un rouge cinabre assez vif. Les soies et les branchies sont presque jaune rougeâtre, et ces dernières sont ponctuées de rouge. Il se roule sur lui-même comme les Oscabrions ; de sorte que, au premier abord, on peut le confondre avec un de ces animaux.

Je l'ai trouvé, le 18 janvier 1841, dans le golfe de Naples, entre les racines de la *Zostera Oceanica*.

EXPLICATION DES FIGURES.

Planche 13. Fig. 1. Lophonote d'Audouin (*Lophonota Audouinii* Nob.).

La figure 1 représente l'animal à sa grandeur naturelle.

Fig. 1 *b*. La bouche avec sa trompe étendue, et les trois premiers segmens du corps ; le tout grossi à la loupe.

Fig. 1 *c*. La même partie du corps vue du côté inférieur dans l'état de contraction ; *a*, *b*, *b* indiquent les quatre taches noires dont nous avons parlé.

Fig. 1 *e*. Coupe transversale d'un des segmens du corps. *a*, *a*. sont les pieds avec les soies correspondantes ; *b*, *b*. les arbuscules des branchies successivement décroissantes de l'extérieur à la partie moyenne ; *c*. la partie moyenne dorsale, qui est nue.

Fig. 1 *d*. Une portion de la partie latérale du corps, montrant l'un des pieds avec les branchies interposées, comme on les voit lorsqu'on regarde l'animal du côté dorsal.

§ IV.

Terebella misenensis.

Parmi les sept espèces du genre *Terebella* décrites par M. Savigny dans son *Système des Annelides*, il n'y en a aucune sur laquelle on puisse compter vingt-huit segmens thoraciques comme on le voit dans l'espèce que nous allons décrire, ni aucune qui offre une portion caudale aussi longue, et ce sont précisément ces deux caractères qui séparent nettement cette espèce nouvelle des autres. Elle appartient à la deuxième tribu, c'est-à-dire à celle des *Terebellæ phyzelinæ*. En effet, elle n'a pas d'appen-

dices sur le premier et le troisième segmens. Deux paires de branchies, en forme d'arbuscules sont insérées sur les deuxième et troisième segmens. Il y a vingt-quatre segmens dorsaux et vingt-six ventraux, et on en compte dans la région caudale, presque soixante qui ne sont pas tous nettement et constamment tranchés. Sa couleur est rouge vif. Ses tentacules sont jaunâtres et les branchies écarlates. Cette Annelide vit de sable et des débris de corallines et autres fucus.

J'ai observé dans cette espèce, outre la circulation du corps, celle de chaque tentacule, qui se fait principalement au moyen de deux canaux (fig. 3ᶜ), par l'un desquels le sang va et par l'autre revient des parties au-dedans desquelles il circule par vaisseaux spiraux. Les bords des tentacules sont frangés ou frisés, et les lobes qui en résultent constituent autant de ventouses par lesquelles les tentacules s'attachent aux corps, et ce sont là les *fines aspérités* mentionnées par M. Savigny.

On trouve cette espèce rare dans le golfe de *Pozzuoli*, tout près de *Miseno*.

EXPLICATION DES FIGURES.

Planche 11. Fig. 3. Terebelle de Misène (*Terebella misenensis* Nob.).

Fig. 3. L'animal, grossi à la loupe, avec ses tentacules *a*, *a*, et ses arbuscules branchiales *b*, *b*.

Fig. 3ᵃ. La bouche plus grossie et vue du côté inférieur, pour représenter mieux les faisceaux de tentacules et un des deux arbuscules de la première paire.

Fig. 3ᵇ. Un des ramuscules de l'arbuscule branchiale, vu au microscope à un grossissement de cent soixante fois en diamètre.

Fig. 3ᶜ. Une extrémité des tentacules, vue aussi au microscope au même grossissement.

§ V.

Siphostoma diplochaitos, Otto.

M. Otto a décrit et figuré d'une manière médiocre cette espèce, qu'il a trouvée aussi dans la mer de Naples, et a établi pour elle un genre particulier. Il en a examiné avec soin la structure interne; mais je crains qu'il se soit mépris sur les fonctions ou sur la véritable destination de quelques parties.

C'est pour cela que je crois utile de revenir ici sur l'anatomie et la physiologie de ce genre d'Annelides, et de donner une nouvelle description de cet animal, que le savant prussien voudrait rapporter avec les Sternaspis à la classe des Échinodermes.

Le *Siphostoma* (Pl. 12, fig. 1) a le corps fusiforme, et armé de deux séries de soies à chacun de ses côtés; deux faisceaux de mêmes soies, convergentes et presque entrecroisées, naissent de la partie antérieure de la tête, ainsi que deux cirrhes tentaculaires bien développées; enfin deux houppes de cinq branchies sont situées au-dessus de la bouche, et un suçoir garnit cette ouverture.

Le corps est enveloppé d'un épiderme coriace superposé à la peau interne, et, entre ces deux membranes, il y a un tissu vasculaire très délié, rempli d'un liquide transparent et peu épais, de sorte qu'il constitue avec les vaisseaux un parenchyme, assez semblable à du blanc d'œuf. Ce parenchyme est rempli de glandes conglobées, ayant leur pédoncule dans l'intérieur plus ou moins flexueux, parfois même contourné en spire, comme on le voit dans la figure 1^{a}, et comme on peut le vérifier au microscope.

En regardant la partie inférieure de cet Annelide, on aperçoit tout près de la tête une tache rouge brun foncé avec des points blancs, et bordée à droite et à gauche d'une autre tache rouge, laquelle s'étend un peu plus en arrière que la première. La couleur du reste du corps est gris cendré, avec des points blancs presque imperceptibles, et on n'aperçoit à l'extérieur aucune trace de viscères. La partie inférieure est plus transparente, de sorte que les anneaux sont plus distincts, et on y remarque très bien le vaisseau sanguin médian. Les anneaux sont au nombre de cinquante-deux. (1)

La bouche est garnie d'un suçoir (mais pas de deux, comme M. Otto l'a prétendu), qui, dans sa partie supérieure, est environné par les branchies, et qui est pourvu d'un tentacule de chaque côté. A côté de ces tentacules naissent deux autres appendices plus longs qui offrent, sur leur face antérieure, un sillon flexueux (Pl. 12, fig. 1^{b}).

(1) M. Otto en compte quarante environ.

Parties internes. En ouvrant l'animal dans sa partie supérieure, on remarque d'abord une vessie (fig. 1^d), qui constitue la tache plus foncée que nous venons de décrire. Au premier coup de bistouri, cette vessie est poussée au dehors en vertu de la force d'expansion du liquide qu'elle renferme, et de l'irritation occasionée par l'incision. Aussitôt après, cette vessie laisse apercevoir la partie vasculaire rouge, qui est au-dessous, et qui, en se renflant pour les mêmes causes, forme une espèce de hernie.

Dans la figure 1^d de la planche 12, on voit cette hernie, dans laquelle on remarque une zône blanche x, x, qui est déterminée par l'amincissement des tuniques, lesquelles sont tout près de se déchirer. Dans la partie f, prise à l'état normal, on voit un vaisseau longitudinal rempli d'un liquide obscur. Pendant la vie de l'animal, les mouvemens de ces troncs vasculaires, ainsi que du réservoir veineux v, qui est au-dessus, produits par le flux alternatif du liquide, sont si marqués que les taches dont ils sont la cause changent de figure.

Du côté de l'œsophage, on trouve un organe e, h, qui me paraît être l'organe mâle ou testicule. Du même côté de l'œsophage, sont attachés deux viscères (Pl. 12, fig. 1^d) qui pourraient bien être deux glandules salivaires, comme Otto les a considérés; mais les observations qui me sont propres me conduisent à une autre conclusion. Les ovaires sont distribués en plusieurs paquets le long du repli des intestins (fig. 1^c, o, o). Leur couleur est jaunâtre. Le cloaque est dans cet Annelide comme dans le Lophiocéphale, rempli toujours de limon et de sable.

Circulation. La circulation dans ce genre, comme il est aisé de s'en apercevoir par mes dessins, est au fond la même que celle que nous avons décrite dans le *Lophiocéphale*, avec la particularité cependant que le vaisseau dorsal, tout aussi bien que l'abdominal, a, dans les *Siphostomes*, un renflement beaucoup plus près de la tête, et qu'il est lui-même beaucoup plus grand. Pendant la vie de l'animal, les mouvemens du liquide qui y circule sont très évidens, et c'est à cause du flux et du reflux, qui s'y établit, qu'on remarque un changement très sensible de forme et d'extension dans les taches bleues et rouges qui sont à

ses côtés, et dont nous avons déjà parlé. C'est ici que nous devons observer que M. Otto se trompe, en supposant que ces deux vaisseaux étaient deux estomacs, l'un superposé à l'autre, selon ses expressions (1), et il crut voir leur origine dans deux ouvertures buccales, comme nous l'avons déjà noté. Il est inconcevable que cet auteur ait pu se persuader qu'il existait deux estomacs, dont l'un en forme de cœcum, qu'il considère comme une vessie suçant, et qu'il compare à celle de certains insectes. M. Otto se trompa même lorsqu'il regarda comme des intestins les vaisseaux spermatiques, dans lesquels cependant il constata l'existence d'une substance uniforme pulpeuse, brune, qui, en effet, les remplit.

On trouve cet Annelide dans les mois de janvier et février, dans le golfe de Naples; mais pas très souvent.

EXPLICATION DES FIGURES.

Planche 12. Fig. 1. Siphonostoma diplochactos.

Dans la figure 1, l'animal est représenté de grandeur naturelle et dans toute la plénitude de sa vie, dans l'eau même de la mer, et vu de sa partie supérieure.

Dans la figure 1_a, il est représenté du côté inférieur, où on peut bien voir le double canal de la circulation.

Dans la figure 1_b est représentée la bouche avec les faisceaux de soies, pour montrer leur distribution et les deux grands tentacules, qui sont de côté.

La figure 1^c représente le paquet des viscères, comme on le trouve, en ouvrant l'animal, après qu'il a été conservé dans l'esprit-de-vin : *a*, *b*, est l'œsophage, accompagné par les organes décrits ci-dessus ; *e*, *e*, le testicule déchiré ; *x*, *x*, la partie de l'artère tuméfiée ; *z*, la première portion de l'intestin *i*, *i*, *i*, bordée par le tronc veineux ; *o*, *o*, les ovaires ; *r*, *r*, le grand cloaque, plein de sable et de vase.

Dans la figure 1^d a été représentée la partie interne de la région œsophagienne : *e*, *e* est l'œsophage, qui se prolonge dans l'intestin *i*, *i*, *i*, borné par les vaisseaux artériel et veineux, dont le premier va se dilater ensuite, constituant l'espèce d'oreillette *f*, *f*, de laquelle résulte la hernie *a*, dont nous avons parlé ; *c* représente la vessie veineuse avec le vaisseau *d*, *d*, qui provient directement du tronc veineux abdominal *p*, *p* ; — *g*, *h*, l'organe mâle.

(1) Uti duo in capite observata sunt oscula, sic quoque duo adsunt œsophagi, longitudine pollicari circiter..... Superior œsophagus ex osculo superiore, *uti credo*, suctorio et ex sulco proboscidis incipit, carnosus, per breve capitis spatium transiens, in ventre tenuior augustiorque altero percurrit, et plerùmque vacuus, interdùm tamen succo albicante, flavo imò brunneo repletus apparet; alter verò œsophagus ex ore majore inferioreque ortum ducens, in ventre quoque sub priore jacet, eumque quoad amplitudinem.

Fig. 1 *e*. Portion de l'intestin bordé par le tronc veineux.

La figure 1 *f* représente une coupe du parenchyme tégumentaire : *a b*, *a b*, sont les faisceaux des soies, embrassés dans leur origine par le repli de la peau, qui s'élève pour les accompagner jusqu'à *x* ; — *c'*, *c''*, *c'* est l'épiderme un peu replié en arc.

La figure 1 *g* représente un de ces faisceaux de soies, plus grossi, pour montrer les dilatations de leurs extrémités en forme de cuillère.

Les figures 1 *h* et 1 *i* sont deux des glandes logées dans le parenchyme cutané, qui varient en grandeur et en figure.

§ VI.

Genre Lophiocephala.

J'aurais placé l'Annelide qui sert de type à ce nouveau genre parmi les *Trophonies*, si je n'en avais pas été empêché par des caractères très importans. En effet, MM. Audouin et Milne Edwards donnent à leur genre *Trophonia* deux faisceaux de soies courtes pour chaque anneau, tandis qu'il n'y en a qu'un dans le *Lophocéphale*. Dans les deux premiers anneaux seulement, il y en a quatre très longs, qui correspondent à ceux qui environnent la bouche dans le genre *Trophonia*. Les branchies, en outre, qui environnent la bouche, en y constituant une espèce de pinceau, ne rentrent jamais dans la cavité abdominale, pour s'y cacher totalement ou en partie, mais demeurent, au contraire, à l'extérieur. La tête enfin est constamment prolongée en une espèce de col rétractile, sans que cependant elle se cache en entier.

Le corps (Pl. 12, fig. 2) est composé de soixante-quatre anneaux, très peu distincts dans la moitié antérieure, où on en compte vingt. Dans la partie postérieure au contraire, les anneaux sont très visibles, parce que, cette partie étant fort extensible, on les voit très nettement lorsqu'elle est contractée. Tous les anneaux, excepté les deux premiers, sont pourvus d'un faisceau de soies de chaque côté. Les soies des anneaux antérieurs sont très courtes, de sorte que, dans le troisième, on les aperçoit à peine au-dehors. Elles augmentent successivement en longueur, et, dans les cinquième et sixième anneaux, on commence à en voir deux et ensuite trois.

Les deux premiers anneaux antérieurs portent chacun quatre faisceaux composés de trois soies très longues, qui vont jusqu'à surpasser d'une ligne le pinceau des branchies, lors même que celui-ci est complètement allongé. Ces faisceaux sont disposés, de telle sorte que la première paire supérieure du deuxième anneau se rapproche de celle du premier anneau, et que les deux faisceaux latéraux se rapprochent, de chaque côté, du couple latéral des faisceaux du premier anneau. Ces faisceaux du premier anneau étant situés à distances presque égales, il en résulte que les soies du deuxième anneau en recouvrent la partie supérieure plus que l'inférieure. Les soies de ces huit faisceaux brillent d'un beau jaune d'or. Lorsqu'on les observe au microscope, on les voit constituées par plusieurs couches en forme de cônes, emboîtés l'un dans l'autre, et marqués transversalement par des lignes plus opaques, qui indiquent leur accroissement progressif (Pl. 12, fig. 2'). Ces soies, comme celles de tous les autres anneaux sont très simples et aiguës.

La surface du corps est brune et offre une apparence chagrinée, qui doit être attribuée à une multitude de tubercules cylindriques, inégalement soulevés et si petits, qu'il est impossible de les apercevoir à une loupe même très forte. Au microscope, on voit qu'ils sont vasculaires et présentent dans le centre un trou par lequel transsude le mucus, qui constitue autour du corps une espèce d'enveloppe. Je ferai remarquer que dans ce mucus, se produisent des papillaires et des diastomes, qui avec leur pédoncule s'attachent aux soies, comme on peut les voir dans mes préparations. L'enveloppe générale du corps est opaque et de couleur terreuse. Malgré cela, on aperçoit le vaisseau dorsal et quelque peu encore le chemin parcouru par le fluide qui s'y trouve contenu. Les branchies qui environnent la bouche, comme nous l'avons déjà dit, vont se distribuer sur une ligne transversale et spirale qui se replie à l'extrémité de l'un et de l'autre côté. Entre ce double repli, se retrouvent deux grands tentacules d'une couleur noir-violet. Ils sont garnis sur la face inférieure, d'une frange de papilles blanches rangées en zig-zag, comme on les voit dans la figure 2' de la

planche 12. La longueur de ces tentacules égale celle des branchies. Au-dessus de celles-ci, et en particulier de leur base, naissent trois antennes très courtes, cylindriques, blanches et extensibles, telles qu'on les voit dans *a*, *a*, *e* de la figure 2ª. Dans la partie inférieure de ces mêmes branchies, on trouve l'ouverture de la bouche, de laquelle le suçoir *c* sort comme une trompe.

Parties intérieures. — Lorsqu'on ouvre l'animal dans toute sa longueur, on voit d'abord dans la partie dorsale l'œsophage, qui est tuméfié par le renversement au-dedans des organes respiratoires environnant la bouche, si l'animal a été conservé dans l'esprit-de-vin; mais, si on dissèque l'animal frais, on trouvera au contraire cet œsophage long et grêle, tel qu'il est représenté dans *e*, *e* des figures 2ª et 2ᵇ. Il se continue dans le ventricule *u*, *u*, qui est aussi long et étroit, et qui se prolonge en un intestin peu flexueux et terminé en un ample cloaque qui remplit toute la partie postérieure de l'abdomen de l'animal, et particulièrement celle qui est comprise entre le vingtième anneau et l'extrémité de la queue. Ce cloaque est toujours rempli de terre limoneuse et de sable, comme on les trouve ordinairement dans les Lombrics de terre, dans les Siphoncles, dans les Syphostomes, etc. Dans la partie supérieure de l'œsophage, et le long du ventricule, on remarque un vaisseau sanguin, très fin d'abord, se dilatant ensuite et se rétrécissant de nouveau en parvenant à la moitié du foie où il se ramifie entre ce viscère et l'estomac. C'est de ce point, correspondant au sixième anneau du corps, que se prolonge un des rameaux principaux, chargé de distribuer des petits vaisseaux au rectum, à l'ovaire, au testicule. Ces organes, côtoyant toujours ce vaisseau primaire, vont se joindre à l'extrémité postérieure du ventricule, où ils reçoivent deux veines qui viennent de la partie postérieure. Le vaisseau dont nous venons de parler est très visible lorsque l'animal jouit pleinement de la vie, parce que, à cause de la contraction de tous les viscères, le sang l'envahit tout entier, de manière qu'on voit injecté tout le réticule vasculaire de la membrane qui le constitue. Ce vaisseau se répand sur le foie, dans lequel il paraît se perdre. La figure 2ª

f, *f*, indique ce vaisseau légèrement grossi, mais il n'a pas une forme constante, comme il est aisé de le concevoir. Dans la partie supérieure de l'œsophage, on observe aussi l'autre vaisseau sanguin *m*, *n*, fig. 2ª, qui paraît avoir son point de départ dans le foie, mais qui, avant d'en sortir, reçoit un rameau de l'ovaire et un autre du rectum. Le sang qui y circule est vert. A quelque distance de l'œsophage, commencent à paraître l'oviducte et l'organe mâle, qui sont attachés à ce même vaisseau. Ces organes, qui sont très grêles dans plusieurs individus, tel que celui qui est figuré dans le dessin cité, sont au contraire tuméfiés dans d'autres individus dans lesquels les œufs ont commencé à se développer comme celui qui est représenté dans la figure 2ª, dans laquelle *o*, *o* sont les ovaires, et *m* les organes mâles. Les œufs sont si bien développés, qu'il m'a été possible de les séparer et de les observer au microscope. L'enveloppe cutanée, observée à l'aide du même instrument, laisse voir les vaisseaux transversaux, fig. 2ª, qui aboutissent dans le vaisseau dorsal 2, 2, tel que nous l'avons figuré dans le dessin.

Circulation. — Par tout ce que nous avons dit sur la structure de cet Annelide, il est aisé de concevoir que la circulation y est très modifiée et très différente de celle que M. Milne Edwards a reconnue dans plusieurs genres de la même classe. Cette circulation se rapproche en outre de celle des Holothuries et des Siphoncules. Le vaisseau abdominal, ou veineux, ne s'étend pas le long du corps, et n'adhère pas à ses parois ; mais il est libre, naît de la partie inférieure de l'œsophage, grandit en se portant en arrière, s'attache aux parois de l'estomac, ensuite se rétrécit encore une fois, et va se ramifier sur les viscères gastriques, aussi bien que sur les parois des enveloppes du corps ; ce qui veut dire que les vaisseaux de toutes les parties du corps vont se réunir dans ces endroits pour se jeter dans les branchies. Le sang ici élaboré revient par le vaisseau dorsal ou artériel, qui joue le rôle de cœur, et duquel il se répand dans le centre des viscères gastriques où il se ramifie comme dans le cas précédent. Ces ramifications ayant lieu seulement dans les derniers anneaux abdominaux, il en résulte que tous les autres points sont dépourvus de communication avec les

enveloppes extérieures, si on en excepte toutefois les communications qui s'établissent aux extrémités, près de l'anus et au pourtour de la bouche. Dans la partie inférieure de l'appareil dermique, il y a deux vaisseaux chargés du transport du sang dans la couche musculaire qui le constitue. Chaque couple de faisceaux musculaires longitudinaux a dans son milieu un faisceau secondaire qui subit une espèce d'étranglement dans le passage de l'un à l'autre. Le sang éprouve dans ces endroits une sorte de retard, et ensuite il est attiré énergiquement dans la partie qui succède, de sorte qu'il paraît que, dans cet endroit, les vaisseaux mêmes jouent le rôle d'oreillettes, chargées d'aider à pousser le sang dans les canaux de la circulation.

Cette espèce, que je dédie à M. Milne Edwards, se trouve en hiver dans le golfe de Naples, mais est assez rare.

EXPLICATION DES FIGURES.

Planche 12. Fig. 2. LOPHOCEPHALA EDWARDSII.

La figure 2 représente l'animal dans son état naturel et légèrement grossi : la ligne ponctuée indique l'allongement que peut atteindre sa partie caudale.

La figure 2^a représente l'ensemble des viscères de cet animal, après l'avoir plongé dans l'esprit-de-vin. Les détails de ce dessin ont été expliqués dans la description de l'animal.

La figure 2^b indique un de ces animaux qui avait été déjà blessé, et dont les organes étaient par conséquent atrophiés : *a*, *a*, représentent une des séries de ganglions nerveux, et la figure 2^c trois de ces ganglions grossis.

La figure 2^d est une partie du derme, dans laquelle sont représentés le vaisseau longitudinal 2 et les transversaux.

La figure 2^e est une des soies observées au microscope.

La figure 2^f est une partie des cirrhes tentaculaires, vue aussi au microscope.

La figure 2^a représente en grand tous les viscères qui ont été décrits pour les faire mieux connaître.

Fig. 2^g et 2^h, les œufs observés au microscope.

La figure 2^h est une partie de l'enveloppe avec ses tubercules *a*, *a*, *a*.

Rapport *fait à l'Académie des Sciences sur un mémoire de M.* Duval-Jouve, *relatif aux Bélemnites des terrains crétacés inférieurs des environs de Castellane,*

Par M. Milne Edwards. (1)

Les Bélemnites, qui à l'état fossile abondent dans les terrains secondaires, et qui doivent leur nom à une ressemblance grossière avec un dard ou une flèche, ont depuis long-temps fixé l'attention des naturalistes : les commentateurs ont cru les reconnaître dans le *Lyncurium* décrit par Théophraste, ou dans le *Dactylus idæus* de Pline ; et quoi qu'il en soit de ces indications obscures, on peut avec certitude faire remonter jusqu'à Agricola les observations dont ces corps ont été l'objet. La liste des auteurs qui, depuis la première moitié du quinzième siècle jusqu'à nos jours, en ont traité successivement, est des plus longues ; cependant c'est dans ces derniers temps seulement qu'on a été fixé sur la nature et sur l'origine de ces débris d'animaux qui n'existent plus, et, pour faire cesser toute incertitude à cet égard, il a fallu non-seulement les recherches approfondies de plusieurs zoologistes sur leur structure intérieure, mais encore la découverte d'une Bélemnite épanouie à son extrémité antérieure comme un os de Sèche, et renfermant encore dans l'espèce de loge ainsi formée un sac à encre semblable à ceux des Céphalopodes de nos mers. Ce fait, que M. Agassiz a constaté sur deux fossiles recueillis par une dame de Lyme-Regis, prouve en effet que les Bélemnites ne sont pas des baguettes d'Oursins ou des appendices cutanés de quelque autre Échinoderme, comme l'avait soupçonné Klein il y a plus d'un siècle, et comme le voulait encore, il y a peu d'années, M. Raspail, mais bien des coquilles intérieures provenant d'un Mollusque dont l'organisation devait offrir beaucoup d'analogie avec celle des Calmars de l'époque actuelle, résultat qui, du reste, ne pouvait

(1) Le travail de M. Duval s'imprime, et paraîtra sous peu de jours chez l'éditeur des Annales.

être mis sérieusement en doute par quiconque aurait su apprécier à leur juste valeur les recherches publiées sur ce sujet par Miller, par notre savant confrère M. de Blainville, et par Voltz, observateur aussi exact que laborieux, dont nous déplorons la mort récente. La nature des Bélemnites n'était donc plus un problème à résoudre ; mais l'étude des différences que ces fossiles offrent entre eux était encore peu avancée, et il régnait beaucoup d'incertitude relativement à la distinction des espèces, question intéressante pour le zoologiste, mais importante surtout aux géologues, qui peuvent demander à ces débris des caractères propres à fixer la date des dépôts dans lesquels on les trouve enfouis. Pour éclairer cette partie de l'histoire des Bélemnites, il ne suffisait pas de comparer et de décrire les variations qui se remarquent dans leur configuration extérieure; il fallait examiner avec soin les modifications de structure intérieure que ces fossiles présentent, constater les différences déterminées par l'âge des animaux auxquels ils avaient appartenu, et chercher à connaître les limites des variations dont les individus d'une même espèce sont susceptibles par suite des circonstances dans lesquelles ils ont vécu et des accidens auxquels ils ont pu être exposés. Plusieurs naturalistes ont recueilli à ce sujet des observations plus ou moins précises : M. de Blainville, M. Voltz, et M. d'Orbigny, par exemple ; mais le petit nombre d'échantillons dont ces savans ont pu en général disposer, ne leur a pas permis de pousser ces recherches aussi loin qu'ils l'auraient fait bien certainement, si les matériaux n'avaient manqué à leurs travaux. L'auteur du Mémoire dont l'examen nous a été renvoyé par l'Académie, s'est trouvé dans des circonstances plus favorables, et, sachant profiter avec habileté des richesses paléontologiques que ses montagnes lui fournissaient avec profusion, il a pu ajouter aux faits déjà acquis à la science des faits nouveaux, et résoudre d'une manière nette une partie importante des questions restées jusqu'alors sans réponses précises. Les environs de Grasse, où M. Duval se trouve fixé en qualité de professeur de philosophie, sont en effet une des localités où les Bélemnites se rencontrent en plus grande abondance, et depuis dix ans que cet observateur s'est appliqué

à l'étude de ces corps, il n'a cessé d'explorer les diverses couches des terrains crétacés inférieurs dans lesquels on les trouve, tant dans la partie nord-ouest du département du Var que dans la partie voisine des Basses-Alpes, auprès de Castellane. M. Émeric, qui habite la même contrée, et qui se livre aussi, avec une grande activité, aux recherches paléontologiques, lui en a fourni une collection précieuse, et notre auteur est parvenu de la sorte à pouvoir disposer de plus de dix mille individus. Il lui a donc été facile de suivre pas à pas les changemens introduits par la croissance dans la forme et la structure de ces coquilles curieuses, de multiplier autant qu'il le désirait les coupes destinées à montrer la disposition de leurs parties constituantes, et d'apprécier la valeur des variations que l'on y remarque. Nous ne pourrions, sans abuser des momens de l'Académie, suivre pas à pas M. Duval dans l'exposé qu'il donne des résultats auxquels il est ainsi parvenu ; mais, pour mettre en lumière les traits les plus saillans de son travail, il nous suffira d'indiquer quelques-uns des faits constatés par cet observateur.

Les naturalistes qui ont traité des Bélemnites ne sont pas d'accord sur le degré d'importance qu'il faut attacher aux différences de forme offertes par ces fossiles, et, pour montrer jusqu'à quel point cette divergence d'opinion a été poussée, nous nous contenterons de rappeler que trente-trois des espèces décrites par M. Raspail sont rapportées par M. d'Orbigny à une seule et même espèce, le *Belemnites dilatatus* de M. de Blainville. Cela tient à ce que le premier de ces auteurs a considéré toutes les variations de forme extérieure comme étant caractéristiques d'espèces distinctes, tandis que M. d'Orbigny a regardé ces variations comme étant pour la plupart dépendantes des changemens que l'âge de l'animal amène dans la configuration de sa coquille. Cette dernière opinion avait pour elle des argumens puissans, mais sa justesse n'était pas démontrée, et on ne possédait pas de règle sûre pour distinguer entre elles les particularités spécifiques et les différences individuelles dues à la marche de la croissance. Or, cette règle a été nettement formulée par M. Duval, et, dans la plupart des cas, ne permet plus d'incertitude.

En effet, les Bélemnites se composent de deux parties principales, savoir : une *alvéole* conique, sorte de godet cloisonné, ouverte en avant, et une espèce de gaîne recouvrant cette alvéole, et se prolongeant plus ou moins loin postérieurement, de façon à constituer un *rostre* dirigé en arrière. L'alvéole s'accroît par la formation de nouvelles chambres placées en avant de celles déjà existantes, et sécrétées par un organe logé dans son intérieur ; le rostre, au contraire, grandit, à peu-près de la même manière que la tige d'une plante exogène : par le dépôt successif de couches appliquées extérieurement sur les couches plus anciennes et produites bien probablement par l'action d'une partie qui, à son tour, recouvrait toute cette portion de la coquille. Ces couches superposées sont en général bien distinctes entre elles, et, par conséquent, en pratiquant sur la Bélemnite des coupes convenables, il devient facile de reconnaître chez un individu adulte la forme qu'il devait avoir après le dépôt de chacune de ces lames, c'est-à-dire aux diverses périodes de son accroissement. On voit ainsi que, dans certaines espèces, la forme générale reste à-peu-près constante, malgré l'augmentation de volume, parce que chaque couche nouvelle recouvre le rostre tout entier et offre partout la même épaisseur, tandis que dans d'autres espèces ces couches ne se déposent que sur une partie de la longueur du rostre et varient entre elles sous le rapport de leur épaisseur dans les diverses parties de leur étendue, d'où résultent des variations plus ou moins considérables dans la forme extérieure de la coquille, à mesure que l'animal vieillit. Or, cette remarque si simple permet d'apprécier l'influence des progrès de la croissance sur la configuration de ces corps fossiles, et fournit une règle certaine pour la distinction des particularités de formes inhérentes à l'espèce et des variations dépendantes de l'âge des individus ; car chaque espèce porte avec elle l'indication des formes par lesquelles elle a passé, et offre ainsi des points de comparaison pour la détermination des individus d'un âge moins avancé. C'est de la sorte que M. Duval a pu se convaincre que les *B. linearis*, *elegans* et *augustus* de M. Raspail sont de jeunes individus du *Belemnites dilatatus* de M. de Blainville ; que le *B.*

complanatus et le *B. spathulatus* de M. Raspail sont des individus de la même espèce un peu plus avancés en âge; et que les *B. sinuatus*, *ellipsioides* et *emarginatus* de ce dernier auteur appartiennent également à cette même espèce, tandis que le *Belemnites Emerici*, facile à confondre avec le *B. dilatatus* adulte, et considéré comme une variété de cette espèce par M. d'Orbigny, s'en distingue par sa conformation dans le jeune âge.

L'étude attentive de la structure intérieure des Bélemnites a conduit M. Duval à un autre résultat plus inattendu et non moins intéressant, car elle lui a fait voir comment la forme extérieure de ces corps pouvait être modifiée d'une multitude de manières plus ou moins bizarres, par suite de la fracture de la portion terminale du rostre et des moyens de consolidation employés par la nature pour réparer ces lésions. Il s'est assuré qu'à la suite d'une fracture semblable, le dépôt des couches concentriques du rostre pouvait continuer à s'effectuer, soit après la chute du fragment postérieur, soit autour de ce même fragment plus ou moins dévié de sa position normale, et que, dans tous ces cas, la coquille avait éprouvé des déformations plus ou moins considérables. Rien n'est plus commun que de rencontrer, dans les terrains crétacés des Basses-Alpes, des Bélemnites dont la forme est irrégulière et dont l'aspect est bizarre, telles que le *B. triqueter*, le *B. mitra*, le *B. mitræformis*, le *B. difformis* de M. Raspail; or, une section longitudinale montre toujours que ces individus difformes ont éprouvé des fractures dont les traces sont faciles à constater, et que la déformation qu'ils offrent correspond précisément au siège de cette lésion mécanique. Il est par conséquent évident que l'existence de pareilles irrégularités de forme ne peut constituer un caractère spécifique, et c'est en arguant de ce fait que M. Duval prouve, par exemple, que les quatre prétendues espèces citées ci-dessus ont été rapportées avec raison par M. d'Orbigny à l'espèce désignée préalablement sous le nom de *B. dilatatus* par M. de Blainville.

Un troisième fait, consigné dans le Mémoire de M. Duval, et assez important pour que nous ne puissions omettre d'en

parler ici, est relatif à la position du siphon dont la portion concamérée des Bélemnites est traversée. Dans toutes les espèces connues jusqu'alors, ce canal se trouve sur la ligne médiane, près de la face ventrale de la coquille ; M. Duval a reconnu ce caractère dans toutes les Bélemnites cylindriques soumises à son examen, mais il a constaté que dans toutes les Bélemnites comprimées qui se rencontrent en si grande abondance dans les terrains crétacés des Basses-Alpes, le siphon est situé du côté opposé, c'est-à-dire contigu à la paroi dorsale de l'alvéole. Cette particularité n'avait pas encore été signalée, que je le sache, et fournit à notre auteur une base pour la classification de ces fossiles, qu'il divise en trois familles : les Biparties, les Notosiphites et les Gastrosiphites.

M. Duval ne se borne pas à ces observations générales ; il figure et décrit avec un soin minutieux les seize espèces de Bélemnites dont il admet l'existence dans les terrains crétacés des Basses-Alpes, et présente des considérations intéressantes sur la distribution géologique de ces fossiles, sujet qui avait déjà été traité par M. d'Orbigny. Enfin nous ajouterons encore que M. Duval donne à l'appui de cette partie de son travail, une description géologique des formations crétacées inférieures des environs de Castellane, et distingue dans les terrains néocomiens de cette contrée deux étages, dont le supérieur seulement renferme des Bélemnites.

M. Duval a soumis à notre examen un nombre considérable de pièces propres à la démonstration des faits zoologiques dont nous avons eu l'honneur de rendre compte, et les observations de ce naturaliste nous ont paru exactes et intéressantes ; son travail contribuera beaucoup à l'avancement de nos connaissances relatives aux Bélemnites, et nous semble, à tous égards, digne d'approbation. Nous proposerons donc à l'Académie de remercier M. Duval de sa communication, et de l'encourager à étudier, dans le même esprit, les autres fossiles qui se rencontrent aux alentours de la ville où le retiennent ses fonctions universitaires.

Sur *la disposition du système nerveux chez les Echinides et les Holothuries, considérés en général,*

Par le Dr A. KROHN. (1)

Si, dans un sujet obscur et à peine éclairé par l'observation, des conjectures remplies de pénétration et de vues profondes sur les lois qui régissent la nature dans la disposition du système général d'organisation animale, méritent des louanges, cette gloire doit appartenir à notre célèbre contemporain le professeur Tiedemann, pour les idées qu'il a émises sur la disposition du système nerveux chez les Oursins et chez les Holothuries. Les conjectures de ce grand physiologiste s'accordent tellement avec les résultats des observations que je vais exposer, que je n'ai pas pu m'empêcher de rappeler au souvenir de ceux qui l'ont lu, l'admirable Mémoire couronné de Tiedemann (*Anatomie der Röhrenholothurie d. pomeranzenfarb. Seesterns und des Stein-Seeigels.* Landsh. 1816).

Pour les Holothuries, il a paru à Tiedemann que la partie centrale du système nerveux existait à l'intérieur de l'anneau calcaire, autour de l'origine de l'estomac, peut-être sous forme d'un anneau grêle d'où sortiraient des nerfs pour les tentacules et pour les muscles longitudinaux et transversaux. En ce qui regarde les Oursins (*Ouvr. cité*, p. 89), Tiedemann regarde également comme probable l'existence d'un collier nerveux, donnant naissance à des branches destinées aux muscles de l'appareil masticateur; plus loin, cinq canaux se rendraient aux canaux des suçoirs; enfin, des rameaux plus petits se distribueraient aux divisions latérales de ces mêmes canaux et aux pédicelles. Le lecteur verra lui-même jusqu'à quel point ces opinions de Tiedemann s'accordent avec l'expérience. Je commence par les Oursins; je m'occuperai ensuite des Spatangues, et je terminerai par les Holothuries.

(1) *Uber die Anordnung des nervensystems der Echiniden und Holothurien in Allgemeinen*, von D. C. A. Krohn — *Archiv. fur Anat. und Physiols*, von J. Muller, n. 1, 1841.

I. *Système nerveux des Oursins.*

Qu'on me permette d'abord une digression dans laquelle j'exposerai avec soin la disposition des parties qui se trouvent dans le voisinage de la bouche ; car, à moins de connaître cette disposition, on ne peut juger convenablement de la place qu'occupe la partie centrale du système nerveux. La bouche de l'Oursin conduit dans une cavité élargie, située au-devant du pharynx, entourant les extrémités des parties les plus volumineuses de l'appareil masticateur, les pyramides, de façon que ces dernières, avec leurs cinq dents fortement attachées, sont libres et font saillie dans la cavité du pharynx. Sur le fond ou plancher de ce dernier, qu'on pourrait appeler avec plus d'exactitude la cavité buccale, s'élèvent cinq éminences molles, en forme de mamelon, excroissances déjà connues d'Aristote, et qui sont toutes implantées dans l'intervalle de deux dents voisines, formant ensemble une couronne qui entoure l'entrée de l'œsophage. Ces mamelons ne sont autre chose que les prolongemens des arêtes que forment entre elles les parois de l'œsophage (dont la forme est pentagonale), et qui s'étendent, en se renforçant, dans la cavité centrale de l'appareil masticateur. Un intervalle compris entre les dents et la paroi de la cavité buccale, conduit à cinq petits culs-de-sac pratiqués dans le plancher de ces parois et alternant avec les mamelons dont il vient d'être question. On aperçoit ces culs-de-sac après avoir enlevé les faisceaux musculaires transversaux qui se trouvent placés entre les pyramides, et, après avoir étendu ces dernières, ils paraissent, à l'extérieur, comme des éminences ou des bosselures arrondies, groupées à l'origine de l'œsophage. L'appareil masticateur se repose sur la membrane qui ferme l'ouverture inférieure de la coquille, et y est fortement attaché par le moyen de cinq bandelettes. Ces bandelettes, qui lient ensemble les extrémités des pyramides, deux à deux, ne doivent pas être perdues de vue, car, comme on le verra par la suite, c'est sur elles que rampent les troncs nerveux.

La portion centrale du système nerveux a la forme d'un pen-

tagone, entourant l'origine de l'œsophage, éloignée seulement de quelques lignes de l'anneau buccal, postérieur. Elle repose sur le fond de la cavité buccale, entre les culs-de-sac de cette dernière et les pointes des pyramides. Elle est maintenue dans cette position par dix vaisseaux transversaux déliés, qui naissent deux à deux de chaque cul-de-sac, à travers lesquels ils passent en convergeant et se dirigeant vers les parois réfléchies du canal central de la mastication pour s'attacher à la surface latérale des deux pyramides voisines. Cette partie centrale du système nerveux échappe d'abord à l'œil dans plusieurs espèces, comme dans l'*Echinus subglobiformis* Blainv. (*E. edulis*, Delle Chiaje), et chez un grand nombre d'individus de l'*Echinus lividus* (*E. saxatilis* Delle Chiaje), parce que sa couleur violette se confond facilement avec celle de l'œsophage. Dans d'autres espèces, comme dans l'*Echinus æquituberculatus* (*E. neapolitanus* D. Ch.), et en particulier dans l'élégant et petit *E. miliaris* (la Châtaigne de mer de Fischer), elle est déjà plus reconnaissable. Au contraire, chez l'*Echinus cidaris* D. Ch., elle montre encore la teinte de l'œsophage, une couleur d'un vert foncé, sale. La manière la plus convenable de la mettre à nu, consiste à enlever d'abord tous les muscles de l'appareil masticateur; puis, après avoir détaché la portion basilaire semi-circulaire et rectangulaire de l'appareil masticateur, on commence l'opération urgente de nettoyer les intervalles des pyramides de toutes les fibres musculaires. Cependant on abrège cette opération, et on la rend beaucoup plus facile, si on coupe en travers, en évitant toute violence, les pyramides aussi près que possible de leur pointe.

Maintenant c'est par la rencontre deux à deux des prolongemens en forme d'arc de l'anneau nerveux, que se forment les cinq troncs qui marchent dans les intervalles des pyramides. Ici chaque tronc rampe sur la bandelette qui réunit ces pyramides deux à deux, sort de l'intervalle qui les sépare et s'étend sur la surface interne de la membrane qui ferme l'ouverture inférieure de la coquille, dans la direction de l'arc osseux correspondant (1). Le tronc

(1) On sait qu'il y a cinq de ces arcs qui sont des apophyses de la coquille, et qui s'étendent

se dirige sous l'arc, vers la paroi interne de la coquille, et marche le long de la ligne mitoyenne, tortueuse et en zigzag, mais ayant peu de saillie qui résulte de la réunion de chacune des cinq divisions ambulacrales de la coquille, jusqu'à ce qu'il arrive au petit disque situé tout auprès de l'anus. A leur origine, les troncs sont tant soit peu plus gros que dans le cours de leur trajet sur la membrane de l'ouverture de la coquille, mais sans offrir de renflement (1). Après leur trajet sous les arcs, ils deviennent graduellement plus gros et plus aplatis, jusqu'au point où la coquille a acquis sa circonférence la plus considérable, et, à compter de ce point, ils diminuent graduellement de grosseur. Chaque tronc est divisé en deux moitiés latérales par un sillon. Ces sillons sont plus visibles avant que les nerfs atteignent les arcs derrière lesquels ils se réfléchissent, car, plus tard, on n'en aperçoit que des traces sous la forme d'une ligne médiane claire; quelquefois même cette ligne n'est pas saisissable. Les troncs, aussi bien que l'anneau nerveux, sont colorés presque toujours jusqu'aux arcs; mais dans le reste de leur trajet, si on excepte les très gros individus des *Echinus subglobiformis*, ils sont incolores; lorsqu'ils sont frais, ils sont semi-transparens et mous; mais après avoir été plongés dans l'esprit-de-vin, ils sont opaques et durs. La couleur du tronc, aussi bien que celle de l'anneau, dépend de corpuscules parsemés en plus ou moins d'abondance dans la substance nerveuse, et la teinte plus ou moins foncée est en rapport avec la quantité plus ou moins considérable de cette même matière.

A la surface interne de la cavité de la coquille, le trajet des troncs correspond à celui du vaisseau principal des tentacules ou suçoirs (canaux de Tiedeman). On peut les isoler très facilement après avoir coupé les branches latérales de communication avec les parties qu'on appelle les *vésicules des pédicelles* ou *suçoirs*. (2)

du bord de l'ouverture inférieure du corps, en dedans, jusque dans la cavité du corps, et servent à l'insertion de la plupart des muscles masticateurs.

(1) C'est de même chez les Astéries. Je ne puis convenir de la justesse des vues qu'on a émises nouvellement (voyez Wagner's, *Verg. Anatom.* page 372) que, chez les étoiles de mer, les nerfs offrent des nœuds à leur origine. La préparation faite par Tiedeman, et qui est conservée à Heidelberg, n'offre rien d'analogue.

(2) Je saisis cette occasion pour exposer mes idées sur la structure des *vésicules des pédicelles*

Chez l'*Echinus cidaris*, la séparation de ces deux parties est telle, qu'une incrustation calcaire épaisse formée par le réseau remarquable et bien connu qui sécrète la partie fondamentale dure, de tous les Échinodermes, les sépare l'un de l'autre. Les rameaux vasculaires sont toujours moins larges que les rameaux nerveux, qui paraissent, pour cette raison, s'avancer sur eux, et tendent à les couvrir.

De chaque côté du tronc nerveux, s'en séparent un grand nombre de branches qui, prenant une direction transverse, accompagnent les rameaux des vaisseaux principaux correspondans dans leur trajet vers les feuillets à réseau vasculaire abondant. Les branches d'un côté alternent, à leur origine, avec celles du côté opposé; rapport qu'offrent également les branches vasculaires, dans toutes les espèces que j'ai examinées. Cette circonstance a déjà été entrevue par Delle Chiaje (*ouv. cit.* pag. 337). La branche nerveuse, s'approchant la dernière, longe la base des feuillets à réseau

(Fussblaschen). Monro, comme je vois par l'écrit de Tiedemann (*ouvrage cité*, page 83), en avait déjà connu le véritable caractère. En effet, ces plicatures ou feuilles, comme Monro les avait désignées non sans raison, possèdent un réseau vasculaire à mailles très serrées. Un vaisseau plus volumineux entoure leur bord, reçoit une partie des vaisseaux du réseau, et se met de l'autre côté en communication avec les vaisseaux latéraux du vaisseau principal correspondant. La base de chaque feuillet, dirigée vers les parois de la coquille, reçoit des vaisseaux de cette paroi deux rameaux, qui, par l'ouverture ambulacraire correspondante, pénètrent dans un pédicelle ou suçoir. Il en résulte de véritables vésicules, creuses, ovales comme Delle Chiaje a fait voir (*Memor. su. la Notom. degli anim. senza vertebre*, volume II, page 338). Quatre ou cinq paires de ces organes se trouvent placées sur la membrane qui revêt l'ouverture inférieure de la coquille. La première, celle qui se trouve le plus près des organes de l'appareil masticateur, est un peu éloignée des autres et plus volumineuse. Chaque paire communique avec un pédicelle ou suçoir court et épais, qui, deux à deux, sont disposées en rangées à peu de distance de la bouche. Pendant que les rameaux latéraux des vaisseaux principaux se divergent horizontalement vers les autres paires de vésicules, comme vers les feuillets à réseau vasculaire abondant, la première paire en reçoit un vaisseau plus considérable au dessus de l'origine du tronc nerveux et qui s'étend vis-à-vis de l'organe masticateur, en se divisant en deux branches divergentes. Chaque branche s'abouche, en passant par la bandelette qui réunit les pyramides deux à deux, à une des vésicules, les plus volumineuses qui s'y trouvent. Si on est disposé, sans plus ample informé, à attribuer une véritable respiration aux oursins, les feuillets, riches en réseau vasculaire, seraient les plus propres à remplir cette fonction. Chez les *Spatangus*, ils sont, en outre, plissés en travers, et leur forme extérieure n'est pas sans ressemblance à celle de branchies, quoique chaque vaisseau principal dans la plus grande partie de son trajet en avant correspond par des rameaux latéraux avec de véritables vésicules (voyez Delle Chiaje's, loc. cit. tab. XXVI, fig. 8).

vasculaire, et accompagne les rameaux vasculaires du tronc déjà accollés à ces feuillets, à travers l'ouverture ambulacrale jusque dans le pédicelle correspondant. Les filets nerveux s'étendent dans les parois de ce dernier jusqu'au disque du suçoir. De la même manière, les trois ou quatre branches nerveuses qui, avant la division du tronc, marchent sous les arcs en compagnie de vaisseaux des parois, se distribuent aux petites vésicules déjà mentionnées.

Les branches nerveuses des suçoirs disposés en paires autour de la bouche, se dispersent en suivant le cours des vaisseaux, se divisant sous un angle aigu, et conservant, chez la plupart des Échinides, la couleur de leurs troncs.

La longueur des ramifications nerveuses est en rapport direct avec la grandeur des feuillets à réseau vasculaire; le même rapport existe pour le développement des vaisseaux latéraux, qui augmentent et diminuent dans la même proportion que les feuillets. L'extrémité du tronc nerveux devenue ténue et accompagnée constamment par un ramuscule vasculaire, se plonge enfin dans une des cinq dépressions qui se trouvent aux plaques qui avoisinent l'anus et qui alternent avec les ouvertures qui conduisent aux oviductes; ces troncs nerveux échappent alors à l'observation. Delle Chiaje avait déjà exposé cette manière de terminaison pour les branches vasculaires (*ouvr. cité*, p. 335).

Il résulte de ces recherches, que les organes de locomotion et du toucher, et principalement les suçoirs, sont pourvus de nerfs; sans doute il s'en distribue aussi des ramuscules aux muscles masticateurs, comme Tiedemann l'avait déjà présumé, aussi bien qu'aux faisceaux charnus qui meuvent les épines. Mais ici les connaissances nécessaires nous manquent : je souhaite que cette lacune soit comblée par des recherches ultérieures. (1)

(1) Pour éloigner l'apparence de m'approprier le bien d'autrui, je dois à M. Vanbeneden et à moi-même de dire qu'après que mes recherches sur le système nerveux des échinodermes avaient été terminées et communiquées à M. Delle Chiaje, j'appris de ce savant que M. Vanbeneden avait découvert des traces d'un système nerveux chez les Oursins, dont une notification avait été faite à l'Institut. Comme je ne pus me procurer par aucun moyen la feuille en question, on ne peut me reprocher d'avoir passé sous silence les observations de M. Vanbeneden.

II. *Système nerveux chez les Spatangus.*

Chez les *Spatangus*, le système nerveux a un arrangement en tout analogue à celui de l'Oursin, comme je m'en suis assuré en ayant à ma disposition la plus commune et petite espèce de la mer Méditerranée, le *Spatangus canaliferus*. Cependant les modifications que l'absence d'un appareil masticateur apporte, et qui portent principalement sur l'anneau nerveux, m'obligent, comme pour l'Oursin, de faire précéder ma description par une esquisse des parties qui se trouvent dans le voisinage de la bouche.

L'ouverture antérieure de la coquille du *Spatangus* a quelque ressemblance avec la forme d'un rein. Le bord supérieur de cette ouverture, après avoir offert sa courbure moyenne, se termine dans le bord inférieur, qui est très épaissi, taillé en forme de bec, et tourné en dehors. L'ouverture est couverte par une membrane garnie d'un grand nombre de petites plaques dures et se prolongeant jusqu'auprès de la bouche qui est placée excentriquement, et approchées du bord inférieur. La fente transversale plus ou moins ouverte qui représente la bouche conduit immédiatement à l'œsophage, d'abord large et à parois minces et membraneuses. La surface interne de la membrane qui revêt l'ouverture de la coquille, est doublée d'une membrane fibreuse qui sépare les vaisseaux et l'anneau nerveux l'un de l'autre, les premiers se trouvant en dedans, et le dernier en dehors. Tous les deux entourent la bouche, mais ne s'y attachent pas immédiatement, le contour de l'ouverture de la coquille y mettant obstacle. L'anneau vasculaire parcourt la circonférence de l'ouverture de la coquille; l'anneau nerveux, au contraire, forme un pentagone dont les côtés sont inégaux ; de sorte que, quoique ces deux anneaux se trouvent superposés, ils ne se couvrent l'un l'autre que par place, comme on peut le voir par les dessins joints à ce Mémoire. L'anneau nerveux n'est jamais coloré, et ses prolongemens sont toujours moins forts que les cinq troncs qui en émanent.

Les troncs vasculaires et les troncs nerveux ont toujours

entre eux les mêmes rapports de position que ceux déjà décrits chez les Echinides. Ce n'est pas ici le lieu de décrire au long le trajet des troncs vasculaires dont la direction est suivie par les troncs nerveux. On pourra bien saisir les différences qui existent à cet égard entre le *Spatangus* et l'*Echinus*, en consultant la description et les planches de Delle Chiaje. Je ne fais que cette seule remarque, que les branches latérales des deux systèmes se rapportent parfaitement en ce qui regarde leur origine et leur trajet dans les diverses régions du corps. Il est également certain que les extrémités amincies des troncs nerveux, comme chez les Oursins, se perdent dans certains enfoncemens de la coquille qui chez les *Spatangus*, à cause de la convergence de ces ambulacres vers les ouvertures de l'oviducte, doivent être cherchés sur la surface postérieure de l'animal.

III. *Système nerveux des Holothuries.*

Le système nerveux des Holothuries est disposé d'une manière très analogue à celui des Échinides.

L'ouverture antérieure de l'anneau dur où s'insèrent les cinq muscles longitudinaux, est bouchée par une membrane résistante qui offre une solution de continuité à son centre pour la bouche. Cette dernière conduit immédiatement dans un élargissement subit du canal intestinal situé dans l'intérieur de l'anneau; Tiedemann avait pris cette dilatation pour l'estomac; pour moi, je la considère simplement comme l'œsophage. Elle est, dans toute son étendue, fixée fortement à l'anneau par le moyen des bandelettes transversales serrées les unes contre les autres, que Delle Chiaje (*ouvr. cité*, vol. 1, p. 89), avait le premier décrites, et qui s'attachent à la surface interne de l'anneau. Les deux crochets, dans lesquels se termine le bord antérieur de chacune des grosses pièces de l'anneau, forment, dans leurs rapports avec la membrane de la bouche, des ouvertures au nombre de cinq, placées à égales distances les unes des autres, et qui ont des rapports importans avec les vaisseaux et avec le système nerveux.

L'anneau nerveux de la *Holothuria tubulosa* se trouve sur la

surface interne de la membrane de la bouche, tout auprès de la circonférence antérieure de l'anneau dur. Il est dans l'état frais, blanchâtre, mou et semi-transparent. Comme la situation réciproque des pièces de l'anneau dur se trouve dérangée par la forte mutilation que l'animal, dont la vie est très tenace, a subi pendant la dissection, l'anneau nerveux éprouve aussi de petites modifications dans la forme circulaire qui lui est naturelle après la mort; c'est ainsi que, dans le dessin qui suit, il a pris, à cause de l'extension irrégulière des parties, la forme d'un pentagone irrégulier. En général, l'anneau nerveux est plus fort que chacun des cinq troncs qui y prennent naissance. L'origine de ces troncs se trouve placée exactement vis-à-vis des ouvertures de l'anneau dur mentionnées plus haut. Chaque tronc nerveux sort par la même ouverture avec le tronc vasculaire qui lui correspond, et avec lequel il est fortement lié jusqu'auprès de l'ouverture du cloaque. Les troncs vasculaires longitudinaux s'anastomosent, pendant leur trajet, par le moyen de rameaux latéraux avec les vaisseaux des suçoirs.

Les troncs nerveux, d'abord arrondis, s'aplatissent cependant bientôt après leur sortie de l'anneau dur, et offrent, comme chez les Oursins, un sillon à raison duquel ils ont toujours l'apparence d'être doubles latéralement : arrivés près du cloaque, leur grosseur diminue graduellement jusqu'à leur extrémité. Quant à la disposition relative des troncs nerveux et vasculaires, elle correspond exactement à celle qui a lieu chez les Echinides. Pendant que les troncs vasculaires passent entre les deux muscles longitudinaux, les troncs nerveux sont appliqués sur eux extérieurement, ayant des rapports étroits avec la couche musculaire transversale du corps; il est difficile, à cause de leur finesse extraordinaire, de suivre les rameaux latéraux de ces nerfs. Ils paraissent s'éloigner du tronc d'une manière régulière des deux côtés, et leur nombre correspond peut-être à celui des rameaux vasculaires qui se rendent aux vésicules des suçoirs. J'ai souvent, après des efforts continus, et à l'aide de la loupe, réussi à les suivre pendant un certain trajet, le long d'un rameau vasculaire ; mais je n'ai jamais pu les suivre jusque dans un suçoir, quoique l'analogie du système nerveux

des Holothuries avec celui des Echinides ne permet pas de douter que cette communication n'ait lieu.

Il reste aux observateurs futurs, qui s'occuperont des détails, à décider si des filets nerveux sont distribués aux tentacules et aux couches musculaires du corps.

Dans le golfe de Naples, une espèce très commune et dont la forme ressemble à celle des petits pains appelés par le peuple *Pagnolella di mare*, se distingue par la couleur rouge du système nerveux; la surface ventrale est aussi d'une belle couleur écarlate. M. Delle Chiaje la décrit sous le nom d'*Holothuria triquetra* (*ouv. cité*, vol. III, p. 68). La couleur de l'anneau nerveux est surtout très vive; dans certains individus il est d'un rouge de sang. Cette couleur perd beaucoup de son intensité après que la pièce a été conservée dans l'esprit-de-vin et se change en une teinte brun-rougeâtre sale et pâle. Cette coloration est déterminée, comme chez les Oursins, par la présence de corpuscules colorans qui sont mélangés avec la substance nerveuse. Les troncs nerveux sont toujours plus pâles que l'anneau nerveux, les corpuscules se trouvant de préférence entassés sur leur ligne médiane.

La manipulation que j'employais habituellement pour exposer l'anneau nerveux et les nerfs, était la suivante : chez des animaux dont la vie était affaiblie, je séparais avec soin le derme de la couche musculaire transversale, après avoir enlevé la plus grande partie du corps. Alors je divisais la couche transversale jusqu'à l'anneau dur en cinq lambeaux longitudinaux, d'une égale largeur. En même temps, après avoir enlevé la portion pendante de l'œsophage (estomac de Tiedmann) jusqu'au niveau de la partie postérieure de l'anneau dur, je fixais ce dernier en l'élargissant fortement et en tenant écartées aussi régulièrement que possible les diverses portions qui la composent; puis je coupais nettement les ligamens transversaux de l'œsophage qui réunissent ce dernier à l'anneau dur, et alors j'arrivais à l'anneau nerveux. Les parties volumineuses de l'anneau dur indiquent l'origine nerveuse qui se trouve un peu plus loin; on les dénude pour pouvoir en couper et en enlever des morceaux, jusqu'à ce qu'on arrive aux ouvertures par lesquelles

les nerfs sortent. Pour rendre visible le cours des nerfs sur la couche des fibres transversales, il faut détacher soigneusement les muscles longitudinaux et les troncs vasculaires. L'espèce d'Holothurie mentionnée la dernière nous serait alors d'une grande utilité, car elle servirait pour nous convaincre de la manière la plus positive de l'existence et de la disposition du système nerveux.

En terminant, j'ai un très grand plaisir d'annoncer que mes honorables amis les savans allemands, M. le Dr Philippi de Cassel et M. le Dr Schultz de Berlin, actuellement à Naples, se sont intéressés à mes recherches et qu'ils se sont convaincus par l'inspection de mes préparations de l'exactitude des points essentiels de ce mémoire.

EXPLICATION DES FIGURES.

PLANCHE 14 B.

Fig. 1. Anneau et tronc nerveux de l'*Echinus lividus*, représentés un peu grossis. Les pyramides de l'appareil masticateur que portent les dents sont séparées des bandelettes qui les attachent, et sont enlevées. — *a*. Œsophage coupé en travers, avec ses cinq angles saillans; *b*, *b*. Cul-de-sac sur le fond de la cavité buccale; *c*, *c*. Bandelettes qui lient ensemble les extrémités des pyramides; *d*, *d*. Le pentagone nerveux; *e*, *e*, *e*, *e*. Origine des cinq troncs nerveux sortant du pentagone.

Fig. 2. Montre les rapports de position des troncs vasculaires et nerveux de l'Oursin. — *a*, *a*. Deux prolongemens du pentagone nerveux se perdant dans un tronc nerveux *b*, *b*.; *c*. Tronc vasculaire côtoyant le côté interne du tronc nerveux, et distribuant des branches transversales qui alternent entre elles de chaque côté, et qui sont destinées aux vésicules et aux feuillets à réseau vasculaire abondant des suçoirs; *d*. Continuation du même jusqu'à la surface basilaire de l'organe masticateur, où il se perd dans le vaisseau circulaire qui entoure l'œsophage; *e*. Branche bifurquée du tronc vasculaire, dont les rameaux s'abouchent aux deux vésicules placées dans le voisinage de l'appareil masticateur.

Fig. 3. Le pentagone nerveux du *Spatangus canaliferus* fortement grossi. — *a*, *a*. Morceaux de la coquille qui entourent directement l'ouverture extérieure de la coquille; *b*. La membrane qui revêt cette ouverture, et qui est abondamment garnie de disques durs; *c*, *c*, *c*, *c*, *c*. Origine et cours des cinq troncs nerveux.

La figure 4 est un plan servant à indiquer la position de l'anneau vasculaire au-dessus de l'anneau nerveux, aussi bien que celle des troncs qui naissent de ces deux anneaux chez les *Spatangus*. L'anneau vasculaire réniforme se trouve en dedans; l'anneau nerveux est à l'extérieur.

Fig. 5. Anneau nerveux et tronc nerveux de la *Holothurie tubulosa*, un peu grossis. L'anneau, par suite d'un fort tiraillement pendant la préparation, a pris la forme d'un pentagone. — *a*. La membrane étendue sur la bouche *b*; *c*, *c*. Fragmens détachés successivement de l'anneau; *d*, *d*. Anneau nerveux; *e*, *e*, *e*, *e*. Origine et trajet des cinq troncs nerveux.

SUR *le mouvement rotatoire qu'exécute le vitellus de l'œuf des Mammifères dans son passage à travers l'oviducte*,

Par le Dr T. L. W. BISCHOFF, professeur à Heidelberg. (1)

J'ai reçu, il y a peu de temps, la seconde série des recherches du Dr Barry sur le développement des œufs du Lapin, mémoire extrait des *Transactions philosophiques* pour 1839, part. 2. Quelque intéressans que m'aient paru les faits renfermés dans ce mémoire, comparés aux résultats des observations que j'avais déjà faites sur les Lapins, je les réserve pour un autre temps et pour un autre lieu, et, pour le moment, je me borne à la communication suivante.

A la page 355, § 281, le Dr Barry s'occupe de mouvemens rotatoires d'un corps semblable à une mûre, logé dans des vésicules situées sous la membrane muqueuse de l'utérus. Il décrit d'abord de petites vésicules transparentes qu'il avait souvent observées comme d'autres observateurs avant lui, et comme moi-même, *sous* la membrane muqueuse de l'utérus des Lapins, et qu'on pourrait bien confondre avec des œufs, si la position de ces derniers n'en rendait pas la détermination très certaine. Dans le § 282, il annonce qu'ayant enlevé un oviducte, il avait trouvé attachée à l'instrument à l'aide duquel il faisait cette opération, et suspendue à un lambeau de la membrane muqueuse de l'oviducte, une vésicule elliptique, formée d'une membrane médiocrement épaisse, contenant un liquide transparent et un corpuscule elliptique ou vésicule.

Alors il décrit un mouvement rotatoire d'un corps semblable à une mûre au centre de cette vésicule, et qui dura pendant une demi-heure; puis, pendant un quart d'heure, se transforma en un mouvement d'oscillation. Il n'aperçut pas de cils comme cause de ce mouvement, bien qu'il regardât leur existence comme probable. Mais quoique lui-même fait ici ressortir l'analogie qui existe entre cette vésicule observée une seule fois par lui et les œufs de Lapins qu'il avait décrits, sous le rapport

(1) Traduit de l'Allemand. (*Archiv für physiologie*, 1841, n° 1).

des phénomènes de rotation, en rappelant même les observations de Leuwenhoeck, de Carus, de Weber et de Grant sur le mouvement rotatoire des embryons dans les œufs des Mollusques et des Polypes, cependant il ne regarde point cette vésicule comme un œuf, mais seulement comme un de ces corps qu'on observe sous la membrane muqueuse de l'utérus, et dit (ayant en vue les passages de Burdach, Physiol. II, p. 224-279, § 288) : « N'est-il pas possible que ce qu'on appelle le *jaune* dans ce cas, et dont les granules sont devenus vésiculaires, correspond réellement à la structure en forme de mûre qu'on a rencontrée dans les œufs des Mammifères et dans les vésicules qu'on vient de mentionner? »

Cette communication de M. Barry m'a décidé à faire connaître immédiatement les observations suivantes, dans lesquelles j'ai aperçu, *de la manière la plus certaine*, le mouvement de rotation du jaune de l'œuf du Lapin dans l'oviducte, et qui ne me permet guère de douter que M. Barry a vu un œuf sans l'avoir reconnu pour tel.

Chez une Lapine, qui avait déjà passé huit jours avec le mâle, et dont, par conséquent, je croyais que les œufs devaient avoir un certain développement, je vis de suite, par l'aspect de l'ovaire, que la fécondation et la sortie des œufs ne pouvaient être que très récens; aussi trouvai-je alors des animalcules spermatiques encore vivans dans l'utérus, ce qui est toujours un signe que les œufs ne sont pas avancés.

Mais comme les œufs des Lapines sont bien plus difficiles à trouver que ceux de la Chienne, et comme ils ne peuvent même être aperçus à l'œil nu, dans la partie supérieure de l'oviducte, je mis l'oviducte préparé sur une lame de verre, je le fendis avec précaution à l'aide d'une paire de ciseaux fins, et alors je l'observai sous la loupe et aussi sous le microscope, où sa transparence permet de l'observer après qu'il a été étendu. Déjà j'avais aperçu plusieurs fois, par ce moyen, les œufs entourés d'animalcules spermatiques, et, sans les avoir dérangés, je les avais fait voir à plusieurs de mes amis. Comme je procédais ainsi, cette fois-ci, je trouvai presque immédiatement, au milieu de l'oviducte gauche, les quatre œufs que je m'attendais à trouver,

comme d'habitude, les uns tout près des autres. Ils avaient les caractères suivans, déjà souvent observés. Ils n'offraient plus le disque des corpuscules, ni les cellules de la *membrana granulosa* de l'ovaire, mais au lieu de cela ils présentaient une couche d'albumen très légère et difficile à reconnaître, et qui les entourait. Ils mesuraient 0,0070 de pouce (prussien) en diamètre. Cette couche d'albumen était parsemée abondamment d'animalcules spermatiques dont aucun n'était vivant. Après se trouvait la *zona pellucida*, de 0,0010 de pouce d'épaisseur, et par conséquent considérablement plus épaisse que celle de l'ovaire, qui ne mesure ordinairement que 0,0004 de pouce. A l'intérieur de la zone, se trouvait le jaune, épais de 0,0030 de pouce, sous la forme d'une masse parfaitement ronde, cohérente, et composée de corpuscules qui n'étaient ni aussi épais, ni aussi foncés en couleur que dans les œufs du chien. Ces corpuscules étaient aussi moins distincts, et la couleur du jaune était plus pure que celle du jaune de l'œuf de Chien. Le jaune ne remplissait pas complètement la cavité intérieure de la zone; au contraire, entre lui et la surface interne de cette dernière, se trouvait un liquide transparent dans lequel, dans trois œufs, nageaient encore deux petits corpuscules d'un jaune éclatant ou cellules de différentes grosseurs. Je fus saisi d'étonnement et de plaisir quand je vis, sous le microscope, la sphère du jaune se mouvoir d'une manière forte et majestueuse sur elle-même, et même dans la direction de l'ovaire vers l'utérus. Ce mouvement était continu, et le jaune, par ce moyen, se déplaçait dans la cavité de la zone. Le liquide qui l'entourait changeait également de place, ce que je reconnus par le moyen des globules qui y nageaient. Je pus me convaincre alors, de la manière la plus certaine, que la surface du jaune était garnie de cils très fins, ce que je reconnus encore après avoir isolé l'œuf sur une lamelle de verre, et après l'avoir examiné sous un grossissement de plus en plus considérable, jusqu'à celui de 800 diamètres. Je croyais d'abord que tout l'œuf, avec la zone et l'albumen, tournait simultanément par l'effet des cils de l'épithélium de l'oviducte, mais quoique je fusse alors très disposé à le croire, et que les cils de l'épithélium se mussent avec vivacité, cependant on

voyait d'abord que la direction de l'oscillation avait lieu de dedans en dehors, et je me convainquis en second lieu, par l'observation de la surface de la zone et des animalcules spermatiques qui se trouvaient sur l'albumen, et par le moyen des fils croisés de l'oculaire, que l'œuf lui-même restait parfaitement tranquille, et que ce n'était que le jaune seul qui accomplissait cette rotation. Même par le moyen d'une forte loupe, je pus m'assurer parfaitement de cette circonstance. Après quelque temps, ayant cru nécessaire, pour empêcher l'évaporation, d'ajouter un liquide aqueux, le mouvement cessa.

Quoique, jusqu'à présent, je n'aie pas encore fait une seconde observation, cependant, celle-là faite sur chacun des quatre œufs, s'accordant parfaitement, me semble si sûre et si exacte, que je ne crains pas d'affirmer positivement qu'il y a ici une deuxième concordance entre le développement primitif des œufs des Mammifères et les œufs de peut-être tous les animaux, analogue à celle qui consiste dans la division du jaune en cellules, division que j'avais le premier annoncée dans mes additions à la physiologie de R. Wagner. J'examinerai plus tard ce sujet d'une manière plus étendue et plus exacte. Aux observations analogues déjà mentionnées par Barry, à celles de Leeuwenhoeck, de Swammerdam, de Stiebel, de Carus, de Grant, de Home et de Bauer sur le mouvement ciliaire et sur le mouvement rotatoire du jaune et de l'embryon dans l'œuf des Mollusques et des Polypes, j'ajoute celles qu'Ehrenberg et Siébold ont faites sur les œufs de la *Medusa aurita* (*Abhaudlungen der Berliner Akademie der Wissenschaften* 1836, et *Neueste Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig*, III, 2, p. 24, 1839). De plus, j'ai observé ce printemps sur les œufs de Grenouille et leur embryon, le mouvement rotatoire du jaune et de l'embryon produit par des cils implantés dans la membrane du jaune, et je m'étonne que, déjà, d'autres observateurs n'avaient pas aperçu ce qu'on peut saisir même à l'œil nu. Je ne doute point que cette rotation ne soit un phénomène général et par conséquent d'une grande importance. Les cils sont toujours le produit d'une formation d'épithélium, et se développent à la surface du jaune.

EXPLICATION DE LA FIGURE.

PLANCHE 14 C.

Un œuf de Lapin retiré du milieu de l'oviducte, et grossi à-peu-près deux cent vingt fois. — *a.* Couche de l'albumen formée autour de l'œuf pendant son trajet dans l'oviducte ; *b.* La *Zona pellucida*, ou chorion devenu plus épais. Ces deux couches sont abondamment parsemées d'animalcules spermatiques qui sont couchés tantôt sur la surface aplatie, tantôt sur celle qui forme une espèce de bord ; *c.* Cavité de la *Zona pellucida*, remplie d'un liquide transparent dans lequel deux corpuscules jaunâtres, brillans, *d*, ou des cellules nagent ; *e.* le jaune, garni de cils fins à la superficie ; il accomplit un mouvement rotatoire dans la direction des flèches.

RECHERCHES ANATOMIQUES *sur la terminaison des nerfs de la matrice*, *par M.* JOBERT.

Les nerfs de la matrice, comme on le sait, ont deux origines : la moelle vertébrale fournit les plexus hypogastrique et sacré, tandis que les filets fournis par le grand sympathique ou trisplanchnique, sont dans la dépendance de la vie organique.

M. Jobert s'est convaincu que ces nerfs s'entremêlent et se confondent en pénétrant dans le tissu intime ou dans le parenchyme de la matrice ; mais en se livrant aux recherches les plus minutieuses de l'anatomie, même microscopique, jamais il n'a pu suivre les filets jusqu'au col de l'utérus. Toute la portion de cet organe qui fait saillie dans le vagin et qu'on nomme le *museau*, celle qui contribue à former les lèvres de l'orifice utérin, ne reçoit aucun filet nerveux : les filamens qui semblent s'y diriger, après avoir éprouvé une sorte d'intrication, produisent un nouveau plexus dont il se sépare deux ordres de fibrilles, sous le rapport de la direction qu'elles prennent. Beaucoup sont rétrogrades ; elles se relèvent contre leur première direction pour se distribuer dans l'épaisseur des parois de la matrice, et

les autres descendent et vont pénétrer dans le tissu même du tube qui constitue le vagin.

Ce résultat, obtenu par l'étude de la structure intime des organes génitaux chez la femme, se trouve confirmé par l'anatomie comparée des parties correspondantes dans une Guenon, une Jument, une Chienne, et chez les femelles du Lapin, de la Marmotte, de l'Écureuil et du Cochon d'Inde; car dans tous ces animaux, les filets nerveux destinés principalement aux parois du canal qui précède le véritable orifice de l'utérus, et qui proviennent du plexus hypogastrique, ne parviennent pas dans l'épaisseur du bourrelet plus ou moins saillant qui termine le col ou l'orifice commun des cornes de la matrice chez ces animaux.

(*Extrait du rapport fait à l'Académie des Sciences le* 9 *août* 1841, *par M.* DUMÉRIL.)

SUR *un Entozoaire trouvé dans le sang de la Truite* (Saluco fario),

Par M. le professeur VALENTIN. (1)

En examinant le sang tiré de l'artère abdominale d'une Truite, M. Valentin a vu, entre les corpuscules sanguins, des corpuscules particuliers, de couleur foncée, semblables à des cellules rondes de pigment. Ils étaient agités d'un mouvement très vif, le plus souvent oscillatoire, quelquefois régulier. Quand on les examinait quelque temps, on voyait apparaître sur le côté une queue transparente, et plus tard se développait peu-à-peu un animal allongé qui se mouvait avec vivacité et d'une manière continue. Le mouvement était déterminé par des appendices variables, au nombre d'un à trois, situés sur l'un des côtés du corps, à l'aide desquels l'animal se roulait très rapidement, surtout en cercle. Ses extrémités antérieure et postérieure étaient transparentes; sa partie moyenne, au contraire, renfermait des

(1) Archives de Müller, 1841, n° 5, p. 435. Trad. par M. Lereboullet.

corpuscules nombreux, de couleur foncée, peut-être des molécules de pigment avalées par l'animal. Lorsqu'il était encore roulé sur lui-même, il ressemblait à un petit globe renfermé dans une enveloppe particulière, transparente, et qui finissait par prendre la forme d'une massue. On voit (Pl. XV, A), le dessin linéaire de cet être : *a* est le globe primitif; *b*, *c*, *d*, divers stades du développement de la queue; *e*, une boule dans laquelle les granules foncés paraissent être contenus dans des prolongemens particuliers; *f*, ces prolongemens grossis; *g* à *m*, diverses formes de l'animal développé, qui appartient probablement à l'ancien genre *Protée* ou *Amœba* EHRENB., mais qui forme sans doute une espèce nouvelle, puisqu'elle ne s'accorde avec aucune des espèces décrites par Ehrenberg dans son grand ouvrage.

Je n'ai rien pu découvrir de certain, dit l'auteur, sur son organisation intérieure, l'animal ne mesurant que 0,0003 à 0,0005 de pouce de Paris. J'ai cru voir quelquefois, en avant, une ouverture arrondie et quelques stries vers la queue, comme cela est indiqué en *k*. Les appendices changeans se sont toujours montrés du côté droit; peut-être faut-il aussi ranger parmi eux les petits prolongemens en massue. J'ai douté d'abord que ces êtres appartinssent réellement au sang, et j'ai exploré le corps entier du poisson, mais je n'ai pu trouver ni dans le péritoine, ni dans les reins, ni dans les intestins, ni dans la vessie natatoire, ni dans le cerveau, etc., aucune trace de cet Infusoire; seulement dans le quatrième ventricule, siège favori des Entozoaires microscopiques, j'en ai rencontré un seul individu; ils étaient, au contraire, en si grande abondance dans le sang, qu'une goutte de ce liquide en contenait au moins un, souvent dix et au-delà; dans le sang coagulé, ils restaient vivans au-delà de six heures et au-dessous de dix-huit. Le sang n'offrait, du reste, rien de particulier, et je n'ai trouvé, en fait de vers intestinaux, que l'*Ascaris obtuso-caudata* ZEDER, en quantité considérable, dans les appendices pyloriques de ce poisson.

MÉMOIRE *sur la direction de la circulation dans le système rénal de Jacobson chez les Reptiles, et sur les rapports qui existent entre la sécrétion de l'urine et celle de la bile,*

Par M. A. DE MARTINO.

(Lu à l'Académie des Sciences, le 30 août 1841.)

Jacobson a montré que les reins des Reptiles, outre les deux veines rénales internes qui donnent naissance à la veine-cave postérieure, possèdent aussi deux veines rénales externes qui, tirant leur origine des veines crurales, des veines hypogastriques et des veines caudales superficielles, marchent sous forme de deux troncs principaux sur le bord extérieur des reins, et poussent plusieurs ramifications à la surface inférieure de ceux-ci. D'un autre côté, les mêmes veines crurales, celles du tronc et du bassin, mais surtout les veines de la vessie urinaire, forment un autre système ayant pour centre la veine ombilicale (1). Celle-ci est une veine très remarquable, qui marche entre les muscles abdominaux et le péritoine jusqu'au foie, à chaque lobe duquel elle donne une branche qui s'anastomose avec les branches de la veine-porte. Ces deux systèmes veineux, celui des reins et celui du foie, ont donc une origine commune, et ils la tirent des veines de la queue, de celles des membres et de la partie postérieure du tronc et des veines de la vessie urinaire.

Jacobson donna la dénomination de *venæ renales efferentes* aux veines rénales internes, et celle de *venæ renales advehentes* aux externes : dénominations qui expriment les usages que l'anatomiste danois avait attribués aux deux ordres de veines rénales. En effet, Jacobson crut que les veines rénales internes (*efferentes*) versent le sang des veines dans la veine-cave, à laquelle elles donnent naissance, et que les externes (*advehentes*) apportent aux reins le sang qu'elles tirent des veines crurales, des caudales et des veines du bassin.

(1) La veine ombilicale est *unique* chez les Batraciens, les Protéides, les Salamandroïdes ; elle est divisée en deux zones chez les Chéloniens, les Ophidiens, les Sauriens. (CUVIER, *Leçons d'anatomie comparée*, 2e édit., par M. Duvernoy).

Cette doctrine, pour être vraie, suppose que les veines rénales externes conduisent réellement le sang veineux des membres postérieurs, de la queue, etc., dans les reins. Jacobson, dans son Mémoire, dit qu'au moyen d'expériences sur les animaux vivans, il s'est assuré que c'est la véritable direction de la circulation de ces veines.

Cependant il ne cite pas une seule de ces expériences.

M. Duvernoy, en appréciant justement l'importance de cette question, après avoir exposé les deux manières dont on peut envisager la marche du sang dans le système rénal de Jacobson, l'une inverse de l'autre, a entrepris à ce sujet quelques expériences chez les Grenouilles vivantes : « Quoique nous ayons vu, « dit-il, les veines *afférentes* se vider entre les reins et la liga- « ture, et les ramuscules des reins pâlir, nous n'avons pas en- « core assez répété ces expériences pour nous décider absolu- « ment en faveur de cette opinion. »

L'importance extrême d'un tel sujet nous a engagé à reprendre les expériences de M. Duvernoy dans la direction suivie par ce naturaliste, et nous les avons effectuées sur les Grenouilles, les Salamandres, les Ophidiens et quelques Chéloniens.

Nous avons pris des Grenouilles vivantes, et nous leur avons fait une incision à chaque flanc, en pénétrant jusqu'aux reins. Alors il nous a été facile de saisir les veines rénales externes, qui marchent au-dessous de la surface postérieure du péritoine, et avec un fil de soie très fin nous les avons liées sur le milieu environ du tronc. Les Grenouilles étaient vivaces et irritables comme avant l'opération, et leur circulation générale ne se trouvait gênée en aucune manière. Dans ces expériences, répétées un grand nombre de fois, non-seulement sur les Grenouilles, mais encore sur les *Salamandres d'eau*, sur les *Tortues* et sur *quelques Serpens*, nous avons observé, et avec nous plusieurs de nos confrères, que le tronc de la veine rénale externe se gonflait constamment *au-dessous de la ligature*, tandis que les ramifications qui se répandent à la surface inférieure du rein se vidaient. La congestion du sang, dans la partie postérieure du tronc veineux ainsi lié, augmentait le diamètre de cette portion du canal d'une quantité qui allait presque au double, et la

turgescence aurait surpassé cette limite sans une espèce de diversion à la marche du sang dans le tronc de la veine ombilicale, qui, comme nous l'avons déjà dit, a une origine commune en grande partie avec le tronc de la veine rénale externe. En effet, nous avons vu ce tronc ainsi modifié apporter au foie une quantité de sang plus grande que d'ordinaire, lorsque nous avions lié le tronc de la veine rénale externe : proposition que nous ferons ressortir encore davantage en traitant la question des rapports entre la sécrétion de l'urine et celle de la bile.

Pour se convaincre que la veine rénale externe est afférente, on peut rendre l'expérience de la ligature encore plus simple : il suffit pour cela de saisir avec une pince très délicate la veine rénale externe sur le milieu de son tronc, en peu de temps on le verra se gonfler au-dessous du point de la compression mécanique et se vider *au-dessus*. Dans ce cas, aussitôt qu'on ôte la compression, la circulation se rétablit dans la direction du tronc au rein correspondant.

Mais nous possédons encore un autre *criterium* tiré de l'observation directe pour juger que la chose se passe réellement ainsi.

Observons d'abord que, chez la plupart des ordres de reptiles, comme chez les Protéides, les Batraciens et les Salamandroïdes, les parois des vaisseaux sont *transparentes*, de manière que nous pouvons étudier à travers leur épaisseur, et avec une simple loupe microscopique, la constitution globulaire et le cours du sang dans l'organisme de ces animaux vivans. En profitant de cette condition, nous avons pu observer la circulation des veines rénales de Jacobson chez les Salamandres et les Grenouilles, et nous l'avons vue tout aussi clairement que l'on pourrait voir la circulation du sang dans le réseau pulmonaire de ces mêmes animaux. Maintenant voici ce qui a lieu à l'égard de la direction du sang dans ce système de veines.

Le courant du sang qui, chez les Grenouilles et les Salamandres, vient principalement des veines crurales, en arrivant vers le confluent des veines rénales et de la veine ombilicale, se divise en deux portions, une qui, gagnant l'embouchure de la veine rénale externe, marche droit au rein correspondant, at suit

les ramifications vasculaires de la veine sur les conduits urinifères; l'autre qui, suivant son cours jusqu'à la symphyse du pubis, mélange son sang avec celui qui y arrive en partie par les veines abdominales, et en partie par les veines de la vessie urinaire et par celles du bassin, et gagne le grand tronc de la veine ombilicale qui le conduit au foie. Ici nous remarquons, en passant, que la vitesse de ces deux courans, celui de la veine rénale externe et celui de la veine ombilicale, est très grande; elle semble à-peu-près égale à la vitesse du sang dans les autres veines du corps de ces reptiles. La physiologie a très bien apprécié, dans ces derniers temps, le rôle que la force aspirante du cœur joue dans la circulation du sang par les veines; cependant cette force ne peut avoir une grande action ni dans le système rénal de Jacobson, ni dans celui de la veine-porte ombilicale, car ces deux systèmes n'amènent pas directement leur sang dans l'oreillette du cœur.

Les résultats que nous avons obtenus au moyen de la ligature et de la compression sur le tronc de la veine rénale externe sont concluans; mais celui qui découle de l'observation pure sur la direction de la circulation dans cette veine, ne laisse plus aucun doute sur un tel sujet.

C'est ainsi que l'expérience et l'observation, guidées par les considérations anatomiques, démontrent que le système rénal externe de Jacobson est un *système de veines afférentes.*

Une autre question très importante naît des considérations sur les liaisons anatomiques du système des veines-portes rénales avec le système de la veine ombilicale. L'origine de ces deux systèmes veineux est en grande partie commune, car les veines cutanées du tronc, les caudales et principalement les crurales, sont les sources de l'un et de l'autre système. Ces deux systèmes seraient-ils complémentaires? Pourraient-ils, jusqu'à un certain point, se remplacer dans leurs fonctions? M. Duvernoy a montré toute l'importance de cette question, et a entrevu la possibilité de la résoudre dans les termes suivans : « Il sera « possible de s'assurer, par des expériences, si ces explications « sur la vie de sécrétion de ces animaux sont fondées; s'il y a, « en effet, un rapport aussi remarquable entre la sécrétion de

« la bile et celle de l'urine; si, en un mot, les deux systèmes « peuvent, jusqu'à un certain point, se suppléer l'un l'autre. »

Assurément la route qu'il faut tenir pour arriver à la solution de cette question consiste à faire en sorte que la quantité de sang qui doit normalement se distribuer en partie au foie par la veine ombilicale, et en partie aux reins par les veines rénales externes, se dirigeât par un seul de ces systèmes, ou tout au foie, ou tout aux reins. Or, on ne peut obtenir cette condition qu'au moyen des ligatures des vaisseaux, et, dans notre cas, la ligature doit tomber ou sur le tronc de la veine ombilicale, ou sur celui de la veine-porte rénale.

Les résultats que nous avons obtenus sur les Grenouilles démontrent, avant tout, que ces deux systèmes sont véritablement complémentaires l'un de l'autre, par rapport à la distribution réciproque de leur sang.

Maintenant on se demandera : y a-t-il une loi de compensation réciproque dans les fonctions de ces deux systèmes? On pourrait bien inférer la vérité de cette dernière loi de ce que nous venons de dire. Ayant prouvé la loi de *réciprocité* dans la distribution du sang de ces deux systèmes, si nous admettons que le sang apporté au foie par la veine ombilicale sert dans cet organe à la sécrétion de la bile, et que celui apporté au rein par la veine afférente serve à la sécrétion de l'urine, nous serons obligés d'admettre la *loi de réciprocité* de leurs fonctions, car le sang chargé de la sécrétion de la bile ne s'augmentera jamais dans le foie des reptiles sans entretenir une sécrétion plus abondante de bile; de même que celui de la veine-porte rénale ne s'augmentera jamais dans les reins sans procurer une sécrétion plus copieuse d'urine. Mais l'*hyperhémie* du foie, par le système de la veine ombilicale, produit par réciprocité l'*anhémie* du rein par le défaut correspondant de sang dans la veine rénale, *et vice versa*, par conséquent toujours la sécrétion de la bile augmente par l'excès du sang de la veine ombilicale, et celle de l'urine diminue par le défaut du sang de la veine rénale externe.

Recherches *sur l'existence des glandes tégumentaires chargées de sécréter la sueur,*

Par M. Giraldès.

(Extrait présenté à l'Académie des Sciences, le 16 août 1841.)

Ces organes, décrits pour la première fois par M. le professeur Breschet, dans son Mémoire sur la peau, ont été, depuis la découverte de ce savant, étudiés et figurés dans plusieurs ouvrages allemands par MM. Purkinje, Gurlt, Wagner, Berres, Arnold, etc., etc.; cependant, malgré le témoignage d'autorités aussi puissantes, quelques anatomistes d'un mérite élevé doutèrent et doutent encore de leur existence. Dans cette occurrence, il est important d'étudier ces glandes, si elles existent, de chercher quelle peut être la cause qui en a imposé aux anatomistes, et enfin de trouver un moyen convenable pour les démontrer.

Ces glandes existent en très grand nombre à la paume de la main et à la surface plantaire; dans ces régions ces organes, très nombreux et très développés, permettent de les étudier complètement : elles existent encore dans les régions garnies d'une assez grande quantité de poils, les aisselles, le périnée, le mont de Vénus, la tête, et enfin sur toute la surface du derme. Ces organes sont constitués, non pas par de simples canaux divisés à leur extrémité, mais bien par un canal étroit, lequel traverse toute l'épaisseur du derme pour aller se loger dans la couche graisseuse qui revêt cette membrane; quelquefois ils marchent très loin dans l'épaisseur de cette couche; à l'extrémité des doigts, par exemple, ils semblent la traverser en totalité. Arrivés dans ce point, ces canaux se dichotomisent quelquefois; mais le plus souvent ils sont simples et ils s'enroulent sur eux-mêmes, de manière à former des pelotons : ce sont ces masses ainsi enroulées qui ont été représentées comme terminant le vaisseau glandulaire. Avec une pièce convenablement préparée, il est facile de voir ces canaux traverser le derme et former les pelotons en

question. Cette disposition, que je viens de décrire, a été constatée par M. le professeur Serres, sur une pièce que ce savant professeur a bien voulu examiner.

Telle est la position et la disposition des glandes de la peau chargées de sécréter la sueur. Dans l'espèce humaine, cette forme est tout-à-fait unique, et elle rappelle très bien les formes élémentaires des glandes des insectes : elle sert encore à démontrer la série des développemens que subissent les glandes depuis leur état rudimentaire jusqu'à former des glandes agglomérées et très compliquées.

Les moyens qu'on emploie ordinairement pour découvrir ces organes devaient nécessairement amener les observateurs à des résultats négatifs; en effet, on examinait la peau presque toujours dépouillée de sa couche graisseuse, et toutes les fois qu'on opère ainsi, l'on a des parties très incomplètes, car les terminaisons glandulaires, logées dans ces tissus, sont séparées et enlevées. Une seconde cause d'erreur, c'est l'emploi qu'on faisait de tranches de peau très minces, car toutes les fois qu'on emploie ce moyen, les canaux sont coupés complètement; c'est par un pur hasard qu'on conserve, dans la même coupe, des canaux complets et leur terminaison. Pour bien les étudier et pouvoir les démontrer convenablement, il faut prendre un morceau de peau de la paume de la main, de la plante des pieds, garnie de son tissu graisseux, le faire macérer pendant vingt-quatre heures dans de l'acide nitrique étendu de deux parties d'eau, puis le faire macérer dans de l'eau pure pendant le même temps, couper ensuite des tranches de l'épaisseur d'un millimètre, et les soumettre à une légère compression entre deux lames de verre. La peau ainsi préparée devient transparente, les prolongemens épidermiques qui tapissent l'intérieur des canaux se colorent en jaune, et l'on a, par ce moyen, des canaux rendus très visibles par cette coloration. Ce moyen permet encore de voir la forme des papilles et d'examiner le tissu qui les compose.

DESCRIPTION *de plusieurs Oiseaux nouveaux ou peu connus, provenant de l'expédition autour du monde faite sur les corvettes l'*Astrolabe *et la* Zélée,

Adressée à l'Académie des Sciences, le 9 août 1841,

Par MM. HOMBRON et JACQUINOT.

FAUCON AUSTRAL (*Falco australis*).

Dessus de la tête brun noir; parties supérieures du cou et du dos, tectrices alaires supérieures, tectrices caudales supérieures, brun noir ondé de roux largement espacé sur le cou et le dos, plus resserré sur les tectrices alaires et caudales. Face supérieure des rectrices, traversée de sept raies blanchâtres; face supérieure des rémiges principales brun noir, traversé de bandes blanches.

En dessous, gorge, cou, poitrine, abdomen, cuisses, tectrices caudales inférieures roux, un trait brun noirâtre sur le rachis des plumes. La poitrine et le cou sont plus roux que la gorge et le ventre; les cuisses et le croupion sont d'un roux très vif. Le dessous des ailes est gris noirâtre rayé de blanc; les tectrices inférieures sont nankin en dedans, blanches en dehors et grivelées de marron.

Base du bec et pourtour de l'œil entourés de roux, iris roux; cirrhe noire, bec noir, mandibule inférieure blanchâtre dans ses deux tiers postérieurs. Pieds noirâtres.

Habite *Otago*, sud de Tavaï-Pounamou, et les îles *Auckland*.

Le nom que nous lui avons imposé nous a paru très applicable, puisqu'il habite les terres les plus australes des terres océaniennes habitables.

Le jeune, que nous possédons, diffère déjà peu de l'adulte: son ventre est brun, légèrement roussâtre, piqueté de blanc.

GOBE-MOUCHE DE ROUG (*Muscicapa Rugensis*). Mâle.

Jeune, adulte.

Partie supérieure rousse; tête, nuque blanches; front noir, grivelé de blanc; au croupion et à la base du cou quelques plumes blanchissantes, mais encore mêlées de roux; principales tectrices alaires supérieures blanches et légèrement bordées de roux; rémiges principales rousses en avant, noires en arrière et aussi bordées de roux dans le même sens: les quatre dernières rémiges scapulaires blanches, salies de roux. Face supérieure des rectrices très légèrement décolorée près de leur extrémité libre et le long de leur rachis. Rachis de toutes les pennes noir, excepté ceux des rectrices. Partie inférieure: gorge et collier noirs, çà et là tachés de blanc; cou, poitrine, ventre, tectrices caudales d'un beau blanc quelquefois taché d'un peu de roux pâle; flancs roussâtres; rectrices

rousses ; tectrices inférieures rousses en dedans, blanches en dehors ; ailes rousses ; extrémités des pennes noirâtres. Iris noir. Pieds et bec noirs ; moustaches noires.

Taille, 12 cent. — Habite le groupe de Roug (anciennement Hogoleu), où, les premiers, nous avons pénétré.

Gobe-Mouche de Roug. Femelle.

Partie supérieure rousse ; dos, tête, ailes, queue, maculés de noir partout où le mâle est marqué de blanc ; cou noir, un peu sali de roux ; front noir, où se trouvent mêlées quelques petites plumes blanches. Baguettes des pennes alaires noires.

Partie inférieure : gorge, cou noir fuligineux ; poitrine, ventre mêlés de roux et de noir fuligineux ; tectrices caudales inférieures blanches ; queue rousse ; rachis de six pennes noirs en dessus, roux en dessous.

Pieds, bec, moustaches noirs ; soie noire.

Taille, 12 cent. — Habite la même localité.

Gobe-Mouche de Roug. Mâle.

Age des couleurs les plus brillantes.

Partie supérieure blanc albâtre ; front d'un noir pur ; tête blanche, parsemée de quelques petites barbes noires, à peine sensible près de l'œil et très rares ; petit collier noir, étroit, interrompu et peu marqué ; baguettes des pennes alaires et caudales noires. Les baguettes caudales cessent d'être noires au milieu de leur longueur, où elles deviennent blanches. L'extrémité des pennes alaires est noire, bordée de blanc en avant.

Inférieurement, gorge et cou d'un noir pur, brillant, à reflets métalliques ; poitrine, ventre, queue, ailes du blanc le plus éclatant ; extrémités des principales pennes alaires noirâtres.

Iris noir ; œil bordé de noir en bas et en avant ; pieds noirs ; bec noir ; un petit trait blanchâtre sur la mandibule supérieure, de sa commissure au milieu de la longueur du bec.

Taille, 13 cent. — Habite les mêmes lieux.

Crinon analogue (*Criniger affinis*). Femelle.

Partie supérieure vert olivâtre, plumes de la tête hastées ; nuque pourvue d'un petit nombre de soies très fines et peu longues ; rémiges vert olive en avant, brunes sur leurs marges principales et bordées d'olivâtre, rectrices jaune soufre à leurs extrémités postérieures.

Inférieurement : jaune verdâtre ; la gorge, le menton, le milieu du ventre jaune à-peu-près pur ; portion interne des rectrices jaune ; tectrices alaires inférieures jaunes ; rémiges brun olivâtre, bordé de jaune verdâtre.

Iris rouge ; bec et pieds brun gris. Taille 13 cent. — Habite Warou (Ceram).

PHILEDON SUBCORNU (*Merops subcorniculatus*). Mâle.

Partie supérieure brune, à reflet olivâtre, principalement sur les bords des plumes ; rémiges et tectrices brunes, bordées d'olive clair. Crâne de la même teinte, recouvert de plumes oblongues, étroites et rudes. Corps gris, revêtu d'un duvet rare plutôt que de plumes.

Partie inférieure. Menton, gorge, cou, gris nuancé d'olivâtre ; collier jaune terni d'olivâtre faible ; poitrine gris olivâtre ; ventre gris ; tectrices caudales inférieures brunes, bordées d'un peu d'olive ; rectrices brun-grisâtre ; tectrices inférieures alaires olives ; rémiges brun-gris, fuligineuses.

Pourtour des yeux, joues, racine du bec, narines, nus. Ces parties dénudées sont d'un brun lavé d'olivâtre ; quelques petits poils noirs, durs et raides, y sont répandus. Narines grandes, ovales, transpercées, découvertes ; arête du bec saillant brusquement près du front, de manière à y former une sorte de crête. C'est cette configuration qui nous a engagés à lui donner le nom de Philedon subcornu : il justifie en effet encore cette dénomination par son cou mal pourvu de plumes, et par son port, double circonstance qui lui donne un peu de ressemblance avec le Philedon cornu.

Pieds et bec noirs ; iris brun-rouge.

Taille, 36 cent. Longueur du bec, 11 cent.

Hab. Waron (Cerám).

PHILEDON DE SAMOA (*Merops samoensis*). Mâle.

Partie supérieure. Dos terre d'ombre lavée d'olivâtre ; épaules, cou, nuque, olive très foncé. Tête noire ; rémiges feuille morte, bordée d'olive ; rectrices idem.

Partie inférieure. Menton et gorge noirs ; un trait olivâtre sur les joues ; cou, poitrine, ventre, brun fuligineux lavé d'olive ; ailes gris enfumé ; queue feuille morte, à reflet faible de vert olive.

Les plumes du cou et de la tête sont petites, courtes, échancrées ; les narines ont quatre lignes de longueur : elles sont elliptiques, couvertes ; elles ne s'ouvrent que par une longue fente ; les plumes du front s'avancent jusqu'au bord des narines.

Pieds et bec noirs ; iris noir.

Taille, 33 cent. Longueur du bec, 20 cent. 1/2.

Habite Samoa et l'archipel du même nom.

BENGALI PHAÉTON (*Fringilla phaeton*). Mâle.

Tête bleu foncé ; narines cachées sous des houppes de plumes carmin vif ; nuque et collier gris, un peu fuligineux ; dos, ailes de la même teinte, mais les extrémités des plumes en sont carminées ; rémiges principales brunes, frangées

d'olivâtre ; tectrices caudales carmin pur ; queue ornée de deux longues pennes carmin vif, dépassant les autres d'un tiers de leur longueur ; les six autres rectrices sont étagées et de couleur carmin terni de brun.

Inférieurement. Gorge, menton, cou, poitrine, ventre, flancs, carmin éclatant ; quelques points blancs clairsemés dans les aisselles et sur le ventre ; tectrices caudales bleu foncé ; rectrices brun légèrement animé de carmin ; tectrices alaires inférieures blanches ; rémiges gris brunâtre.

Bec, iris, carmin foncé. Pieds jaune pâle.

Taille, 11 cent.. — Habite la baie Raffles (nord de la Nouvelle-Hollande).

Martin-pêcheur. Double œil à ventre roux (*A. diophthalmo-rufo-ventro*). Mâle adulte.

L'Alcedo qui nous occupe ici ressemble à l'Alcedo Double-œil de Temmink, par la forme de son bec ; mais il en diffère beaucoup par le plumage. Or, comme la forme du bec de ce dernier devrait peut-être constituer le caractère d'un groupe particulier, si les mœurs de ces animaux étaient mieux connues ; en raison de la grande différence des plumages de ces deux spécimen, nous les considérons comme des espèces voisines du même genre ou sous-genre.

Supérieurement. Tête, cou, queue, tectrices alaires de l'azur de l'*Alcedo lazuli*, qui lui est aussi très voisin dans la série ; deux taches blanches dans la région du lorum, comme dans le Martin-Pêcheur double œil ; dos, scapulaires, tectrices caudales, teintes d'aigue-marine, variant du vert au bleu comme l'incidence de la lumière ; rémiges brun-noir bordé d'azur ; le milieu de l'aile porte une tache blanche.

Inférieurement. Menton, gorge, cou, poitrine, tectrices alaires et caudales blancs ; ventre roux ; ailes et queue couleur ardoise.

Iris noir ; une bande noire s'étend du cou au bec, et comprend dans son trajet la joue et le tour de l'œil.

Bec noir ; la moitié de la mandibule inférieure blanchâtre en dessous.

Pieds noirs. Taille, 14 cent.

Habite Vavao (archipel de Tonga).

Colombe des Viti (*Columba luteovirens*). Mâle et femelle.

Tête, menton, nuque, vert jaunâtre ; partie supérieure jaune un peu verdâtre ; rémiges bordées de jaune ; tectrices bordées de jaune. Rachis de toutes les pennes noirs.

Parties inférieures jaunes, légèrement verdâtres ; moitié postérieure de l'abdomen, cuisses, tectrices caudales inférieures jaunes ; ailes jaunes ; rémiges lavées de noirâtre dans les deux tiers de leur longueur ; rachis des pennes noirs.

Le mâle et la femelle ont le même plumage.

Taille, 28 cent. — Elle habite les îles Viti. A été tuée à Balaou.

Colombe de Félicie (*Columba Felicia*).

Le mâle ne diffère ne la femelle que par des couleurs verte et jaune moins vives.

Parties supérieures vertes; tête vert jaunâtre ; cou, dos, tectrices alaires et caudales vert à reflet bleu : la femelle a dans les mêmes parties des reflets cuivrés qui tempèrent beaucoup l'éclat de la nuance bleue, surtout propre au mâle. Rémiges bordées de jaune: les principales sont noires; les secondaires sont vertes en avant, noires en arrière; tectrices vertes en dehors, brunes en dedans.

Parties inférieures: menton jaune verdâtre ; cou vert à nuance jaunâtre légère ; ventre, cuisses, flancs verts, ondés de jaune ; tectrices caudales inférieures jaunes, à peine maculées d'un peu de verdâtre dans leur centre. Tectrices alaires inférieures jaunes, ondées de vert; rémiges moitié jaunes, moitié fuligineuses.

Pieds brun verdâtre, iris rouge, bec noir.— Taille, 29 cent.

Habite les Viti. Nos échantillons ont été rencontrés à Balaou. Cette espèce recherche des lieux plus sauvages que l'espèce précédente, qui affectionne spécialement les environs des habitations.

Colombe Kurukuru leucocéphal (*Columba Kurukuru purpuro-leucocephalis*). Femelle.

Variété de la C. Kurukuru femelle.

Cette Colombe leucocéphale (à tête blanche) est une jolie variété de la Colombe Kurukuru femelle, représentée par Temminck.

Tête blanche, entourée d'une auréole jaune d'or; cou vert grisâtre; dos, tectrices vert à reflet jaunâtre ; de chaque côté, trois tectrices scapulaires maculées dans leur centre de bleu azur, entouré de vert semblable à la teinte générale du dos; rémiges vert vif, taché de bleu azur, lequel est bordé de vert jaunâtre en arrière et de jaune en avant: queue verte à reflet bleu, traversée d'une bande jaune à son extrémité.

Menton, gorge jaunes ; joues gris verdâtre; cou et plastron grivelés de jaune verdâtre et de gris verdâtre; poitrine et ventre roux rose ; croupion et tectrices caudales jaunes ; cuisses jaune verdâtre; flancs verdâtres; tectrices alaires inférieures grises, salies çà et là de jaune verdâtre ; rémiges gris ardoise.

Pieds roses ; bec noir, blanc à son extrémité antérieure ; iris jaune.

Taille, 33 cent. — Habite Nuhiva.

Colombe Kurukuru de Vincendon (*Columba Kurukuru superba*). Femelle.

En dessus : tête pourpre, tendant un peu vers le roux, entourée d'un cercle

jaune peu marqué; cou blanc, traversé d'une bande jaune d'or à sa base; ceinturon pourpre, étendu d'une épaule à l'autre; dos, tectrices alaires et caudales, rectrices, gris; la circonférence des plumes seulement encadrée de jaune d'or un peu verdâtre; mais, au milieu du dos et sur les tectrices caudales supérieures, la totalité de la surface des plumes revêt cette teinte brillante d'or nuancé légèrement de verdâtre. Les rémiges sont vert éclatant aussi varié d'éclat que l'incidence de la lumière est variable; chacune d'elles sont denticulées en avant de jaune paille. Une bande vert brillant traverse la queue près de son extrémité libre.

En dessous : menton, gorge, cou blancs; plumes du plastron grivelées de rose et de blanc : ce joli plastron se détache sur un fond orangé, qui orne le milieu de la poitrine; le vente est blanc, un peu mêlé de jaunâtre; les tectrices caudales inférieures sont pourpre rose; les pennes sont grises.

Iris blanchâtre; pieds et bec gris verdâtre.

Taille, 33 cent.—Habite les îles Viti. Notre spécimen provient de Balaou.

Lori flammécié (*Lorius scintillatus* Temm.). Mâle, adulte.

Variété de celui représenté par Temm.

Front pourpre; cette belle couleur tend à s'étendre à toute la tête, qui n'est encore que brun purpurescent. Le cou et la poitrine sont vert foncé, avec des traits orangés sur les rachis des plumes; quelques plumes profondes, teintes de pourpre s'observent sur les parties antérieures et latérales du cou: elles y sont assez irrégulièrement disposées.

En ajoutant à cette courte description, que notre sujet avait le tour de l'œil noir, l'iris fauve et les pieds noirs, il ne nous reste plus rien de spécialement caractérique à mentionner; car il ressemble, du reste, de tout point, à l'individu figuré par Temminck.

Celui qu'a figuré cet honorable auteur provenait de la Nouvelle-Guinée; le nôtre, ainsi que sa femelle, sont des îles Arrou.

Taille, 44 cent. 1/2.

Lori flammécié (*Lorius scintillatus*). Femelle.

Jusqu'à présent l'on ne connaissait pas la femelle de cette espèce.

Le Lori flammécié de Temm. n'est connu que par un individu mâle; sa femelle ne l'est pas: il est donc intéressant de la faire connaître. Mais il est convenable de faire remarquer que notre échantillon appartient plus spécialement à la variété mâle, que nous venons de signaler, puisque les deux sexes ont été tués ensemble et dans le même lieu

Elle ne diffère que fort peu du mâle. Ses seules différences consistent dans le petit nombre des plumes pourpres, qui entourent la base de son bec; dans l'absence de ces plumes autour de son cou, lequel ne présente un peu cette éclatante couleur qu'au dessus des épaules; les cuisses n'en sont aussi que

médiocrement pourvues. Enfin les baguettes des plumules cervicales sont couleur de feu et non orange, comme dans le mâle, auquel nous la comparons.

Iris jaune. — Taille, 42 cent. — Habite les îles Arrou.

PSITTACULE DOUBLE-ŒIL (*Psittacula diophthalma*). Mâle et femelle.

Parties supérieures : tête recouverte d'une calotte rouge, se fondant en arrière avec une bande couleur de feu, qui recouvre l'occiput : œil entouré supérieurement d'un trait vert bleuâtre, se terminant en avant, sur la région du Loru par une huppe bleu tendre brillant, qui simule de loin des yeux doués d'un éclat de pierre précieuse ; joues rouges ; bordées en arrière d'un petit favori bleu azur ; dos vert à reflet un peu jaune, portant, de chaque côté des reins, quelques plumes bleues ; tectrices vertes comme le dos ; rémiges secondaires vertes aussi, mais les deux premières sont tachées de rouge sur leur bord postérieur ; rémiges principales noires, bordées d'azur en avant ; couvertures des cuisses vert tendre, tirant sur le jaune.

Parties inférieures : menton, gorge, cou, plastron, ventre, verts à reflet un peu bleu ; flancs jaunes ; tectrices inférieures des ailes vert tendre grivelé de bleu foncé et de verdâtre sur l'avant-bras ; centre de l'aile jaune ; le reste de la surface de l'aile est brun ; tectrices caudales vert jaunâtre ; rectrices brun verdâtre.

La femelle ne diffère que par la plus grande intensité du reflet jaune de son plumage, et par ses joues non plus teintes de rouge, mais d'orange.

Bec gris-brun, doué d'une grande force, surtout par rapport à la petitesse de l'animal ; pieds bruns ; iris fauve.

Taille, 14 cent. — Habite la côte sud de la Nouvelle-Guinée.

PERRUCHE DE GOUPIL (*Psittaculus smaragdinus*). Mâle.

Parties supérieures : front aigue-marine ; tête, cou, bleu de Prusse flammé-ché de bleu blanchâtre ; dos, tectrices supérieures aigue-marine variant, comme chez les Martins-Pêcheurs, du vert au bleu, selon le mode d'incidence de la lumière ; bas du dos et tectrices caudales aigue-marine moins foncé, mais présentant aussi à l'œil les mêmes passages successifs du bleu clair le plus doux au vert bleu d'aigue-marine tendre, selon la variété des jeux de la lumière ; queue teinte des mêmes nuances, tachée de blanc dans son centre.

Parties inférieures : menton, gorge, joues grivelés de noir et de blanc ; cou bleu un peu sombre, grivelé de blanc, à demi embrassé d'un demi-collier aigue-marine ; plastron bleu traversé d'une petite bande vert-bleu ; ventre recouvert de plumes bigarrées de bleu, de blanc et d'aigue-morte tendre ; rectrices blanc sali d'un peu de bleu ; ailes noir-brun.

Pieds et bec rouge minium ; iris orange.

Taille, 21 cent.

Habite les îles Nuhiva : notre échantillon est de l'île Nuhiva elle-même.

PERROQUET HÉTÉROGÈNE DE GEOFFROY (*Psittacus Geoffroyi heteroclitus*). Mâle.

Parties supérieures d'un assez beau vert très légèrement nuancé d'olive; tête, joues jaunes; collier gris cendré à reflet azur tendre; deux petites taches rouille sur l'épaule; tectrices alaires et caudales d'un beau vert pur et vif; tectrices digitales bordées de bleu; rémiges secondaires vertes; deux d'entre les humérales sont tachées de blanc jaunâtre en dedans; grand côté des rémiges principales moitié vert, moitié noir.

Parties inférieures : menton presque nu, offrant quelques plumes jaunes assez éparses; gorge grise grivelée de jaune; cou gris à reflet azur ondé de jaune faible; plastron, ventre, cuisses, croupion, tectrices caudales vert pré légèrement ondé de vert plus bleu; tectrices alaires inférieures d'un beau bleu azur à reflet purpurescent; rémiges noires; sept d'entre elles sont finement bordées de blanchâtre.

Bec : mandibule supérieure jaune, inférieure noire; pieds gris verdâtre; iris orange.

Taille, 33 cent. 1/2.— Habite Saint-George et Ysabel (îles Salomon).

Femelle.

La femelle est caractérisée par une calotte bleu grisâtre à reflet azur légèrement animé d'une petite nuance purpurine; par deux joues jaune sale; par un collier vert bleu se détachant sur le vert un peu plus jaune du reste du cou et de la totalité du corps.

Le reflet de la totalité de son plumage est jaunâtre, celui du mâle est bleu. Quant aux autres détails, la ressemblance est complète.

Bec gris foncé; pieds gris verdâtre; iris jaune clair. — Taille, 33 cent. 1/2.

Habite les mêmes lieux que le précédent.

COLOMBE GÉANTE GRISE (*Columba-spadicea leucophœa*).

Femelle.

Variété de la *Columba spadicea* Lath. Temm.

Dos, tectrices alaires ondulés de roux; tête, occiput, joues, derrière du cou brun grisâtre ondé de fauve; bas du dos et tectrices caudales gris, un peu ondé de gris plus pâle; rémiges et rectrices gris fuligineux; bout de la queue blanc; couvertures des cuisses et de l'avant-bras blanches.

Parties inférieures: menton, gorge, cou, plastron, brun gris un peu plus fauve, traversé de gris plus pur et plus clair; ventre, tectrices alaires inférieures, tectrices caudales blancs; rémiges et rectrices gris noirâtre.

Pieds rose-carmin; bec idem; iris rouge.

Taille, 53 cent.

Habite Akaroa (île Tavaï-Pounammou, Nouvelle-Zélande).

Cette variété adulte aurait-elle son analogue mâle? Il serait bien possible qu'il en fût ainsi, car le plumage de la Colombe géante femelle ne diffère ordinairement que fort peu de celui du mâle.

Dans notre espèce, le gris remplace la couleur verte de la Colombe géante ordinaire; le brun et les teintes fuligineuses remplacent le vert foncé propre au même animal.

Échasse noire (*Himantopus melas*). Femelle.

Toute noire; partie supérieure d'un noir brillant à reflets métalliques; tête, cou, parties inférieures noir mat.

Pieds rouges; bec noir; yeux rouges.

Taille, 56 cent 1/2.— Habite Otago (Tavai-Pounamou, Nouvelle-Zélande).

Harle austral (*Mergus australis*). Mâle.

Parties supérieures : tête brune tachetée de noir; cou brun rougeâtre; dos, ailes, queue, brun foncé presque noir; les plumes de ces parties sont encadrées d'une teinte grisâtre; tache blanche sur le milieu de l'aile; cette tache est traversée d'une petite bande noire sous forme de chevron.

Parties inférieures : gorge et partie antérieure du cou roussâtre; plastron, poitrine gris ardoisé ondé de blanc; ventre, croupion blanc ondé de gris ardoise; flancs, en dessous des ailes, ardoisé foncé; quelques tectrices secondaires blanches, grivelées de teinte ardoise; quelques scapulaires blanches; tectrices caudales inférieures noir ardoise bordé de blanc; rectrices noir gris.

Pieds brun pourpré; bec : mandibule supérieure noire, rouge sur les bords; mandibule inférieure rouge terne; iris noir.

Taille, 55 cent. — Habite l'île Auckland.

Gorfou antipode (*Catarrhactes antipodes*). Mâle.

Parties supérieures : vertex jaune paille; rachis des plumes noirs; moitié postérieure de l'œil entourée d'une bande jaune, qui couronne tout le pourtour de la tête; cou, dos, croupion, queue gris bleu tendre, rachis noir; plumes des nageoires noires bordées de bleu; tache blanche sur l'épaule; nageoires bordées de blanc en arrière.

Parties inférieures : joues jaunes; menton, gorge grisâtre; cou, poitrine, ventre, nageoires blancs.

Pieds et bec rouges; iris jaunes. Taille, 80 cent. — Habite les îles Auckland.

Femelle.

Elle est en tout semblable; seulement le jaune de la tête est moins pur, moins vif.

Gorfou d'Adélie (*Catarrhactes Adeliæ*). Mâle et femelle).

Parties supérieures noires; extrémité des plumes flammèchées de bleu.

Parties inférieures blanches; menton, gorge, joues noirs.

Bec noir marbré de blanc; pieds rougeâtres; iris noir. La moitié de la longueur du bec couverte de plumes. Habite les glaces de la terre Adélie.

Taille, 75 cent.

Mémoire *sur le développement de la* Medusa aurita *et de la* Cyanea capillata,

Par M. Sars.

Le Mémoire suivant était prêt à être imprimé il y a plus de six mois ; je l'avais destiné à former la suite d'un autre Mémoire sur le développement de l'Étoile-de-Mer, dont l'étude m'avait occupé pendant ces derniers temps, et qui m'aurait mis à même de faire de nombreuses additions aux courtes notes sur le développement de ces animaux, que j'avais communiquées antérieurement aux Archives de Wiegmann (1). Mais ayant reçu, il y a quelques jours, le beau Mémoire de M. le docteur Siebold sur le premier état de développement de la *Medusa aurita* (voyez les *Contributions à l'histoire naturelle des animaux sans vertèbres*, Danzig, 1839), je pense qu'il serait sans but de taire plus long-temps les observations que j'avais faites sur le même sujet, avant d'avoir connu les recherches de ce naturaliste habile, et cela d'autant plus que j'ai acquis la certitude que mon genre *Strobila* est bien réellement, ainsi que je l'avais supposé, un jeune âge de la *Medusa aurita*. C'est un véritable plaisir pour moi que de rendre témoignage à la justesse et à l'exactitude des observations de M. Siebold. La concordance de ses recherches avec les miennes me donne le courage de publier mon Mémoire tel qu'il a été écrit primitivement, sans changer les vues que j'avais exprimées, et que je considère encore comme fondées; et je crains d'autant moins les doutes exprimés par quelques naturalistes touchant l'exactitude de mes observations antérieures, que plusieurs des plus importantes viennent d'être constatées par Dalyell. Les animaux que j'ai choisis comme objets de mes

(1) Traduit de l'allemand par M. le Dr Young (*Archiv. für Naturgeschichte* Jahrg. 3. § 401).

recherches, sont difficiles à observer. Là où presque tout est nouveau, il est facile, comme tous les naturalistes expérimentés le savent bien, de commettre des méprises. Depuis quelque temps je suis plus habitué à observer, quoique jusqu'à présent je n'ai eu qu'un microscope imparfait; cependant, malgré cela, j'espère montrer que mes observations ne sont pas faites à la légère.

Dans mon Mémoire publié en l'année 1835, sur plusieurs animaux marins trouvés sur la côte de Bergen, j'observais le développement extrêmement remarquable d'un Alcalèphe d'un genre voisin à l'*Ephyra* d'Eschcholtz que j'avais découvert, décrit en détail et figuré, en 1829, sous le nom de *Strobila octoradiata* (1). Plus tard, j'ai reconnu que le *Strobile* n'était pas autre chose qu'un jeune âge de la *Medusa aurita*, et cette découverte je l'ai annoncé dans les *Archives de Wiegmann* (loc. cit. p. 406). Depuis je suis heureusement parvenu, je crois, à suivre le développement complet de la *Medusa aurita* et de la *Cyanea capillata* (qui, sous ce rapport, offre, avec le premier, une analogie très grande), depuis l'œuf jusqu'à l'état parfait. On comprend facilement qu'il n'est pas possible d'observer très long-temps un seul individu de ces animaux dans ses diverses périodes de développement; car, lors même qu'on voudrait le conserver dans un vase rempli d'eau de mer, l'animal en souffrirait beaucoup et finirait toujours par mourir après un temps plus ou moins long, à cause du changement répété et nécessaire de l'eau, le manque de nourriture convenable, et enfin à cause du mucus qui se dépose, soit sur les parois du vase, soit sur d'autres corps où les animaux se trouvent fixés pendant la période de leur développement; ainsi, je ne suis arrivé à la connaissance du développement de ces animaux que par des observations répétées sur des individus à divers états. Je me permettrai donc de communiquer les plus importantes de ces observations extraites de mon journal : on apprendra par là comment je suis arrivé aux résultats mentionnés et à plusieurs autres dont il

(1) Ehrenberg, dans ses *Acalèphes de la mer Rouge*, p. 52, en note, a considéré, sans fondement suffisant, mon *Strobila* comme une *Lucernaria* qui se diviserait spontanément en portions transversales; cependant leurs caractères sont tout-à-fait différens.

sera question dans la suite. Je supposerai qu'on connaisse les observations rapportées dans mon Mémoire cité plus haut. (1)

Je ferai voir d'abord que le *Strobile* à huit rayons, nageant à l'état de liberté, n'est qu'un jeune âge de la *Medusa aurita* commune. Je suis arrivé à ce résultat par une série de recherches instituées dans le printemps de 1837.

1° Le 22 et le 23 mars 1837, je trouvais une foule de petits

(1) Un extrait de mes Observations sur ce sujet, faites dans l'année 1829, a paru dans *l'Isis* pour l'année 1833, p. 24 et Pl. 10; et un extrait de mon Mémoire publié en 1835 a été fait dans les *Weigm. Archiv.* pour l'année 1836, p. 197, et également dans *l'Isis* pour 1837, à la page 354.

(Afin de compléter autant que possible l'exposé des observations importantes de M. Sars sur le développement des Méduses, nous croyons utile de rapporter ici les passages qui, dans son premier ouvrage, se rapportent à ce sujet, et nous empruntons à cet effet la traduction que M. Gervais en a donnée dans les *Annales d'Anatomie et de Physiologie* pour 1838 (t. II, p. 8).

Voici, dit M. Gervais, comment s'exprime M. Sars, dans l'ouvrage précité (*Beskrivelser og Jagttagelser*, etc. in-4°, Bergen, 1835).

« C'est en 1829, dans son ouvrage intitulé : *Bidrag til Soëdyrenes Natur Historie*, p. 17-26, que j'ai fait connaître pour la première fois l'espèce d'Acalèphe composé que j'appelle *Strobila*. Depuis lors, en août 1830, j'ai eu l'occasion d'observer une seconde fois cet animal à-la-fois rare et curieux; j'ai pu ajouter de nouveaux détails à ceux que j'avais publiés, et faire à ces derniers quelques rectifications. Ainsi il m'est démontré à présent que le genre que j'indiquais alors comme particulier en le nommant *Scyphistoma*, n'est autre que le Strobile, dans son jeune âge.

« En effet, le Strobile, à cette époque, ressemble tout-à-fait à un animal de la classe des polypes. Incapable de se mouvoir, il est fixé aux fucus. Sa longueur égale un seizième ou huitième de pouce, et son épaisseur un seizième; il est cylindrique, mais un peu plus épais en haut, et atténué, au contraire, à sa base, de manière à représenter un gobelet; sa surface est lisse et sa substance tout-à-fait gélatineuse. Son extrémité supérieure présente de 20 à 30 tentacules (différens individus m'en ont présenté 21, 24 ou 27), égalant le corps en longueur, filiformes, atténués à leur pointe et disposés sur un seul rang. Ces tentacules sont mobiles dans tous les sens; si on les touche légèrement, ils restent immobiles ou se courbent de côté; mais lorsqu'on les irrite davantage, ils se réunissent en un seul faisceau, se replient vers la bouche; mais jamais lors même qu'ils se sont réduits au sixième de leur volume, ils ne rentrent dans le corps. A la même extrémité et au milieu des tentacules disposés en cercle autour d'elle, se trouve la bouche de l'animal; s'il n'est pas inquiété, il la porte au dehors sous la forme d'un tube un peu quadrangulaire et plus large au sommet, dont le pourtour est entier. Il en agite continuellement l'ouverture, soit pour la rapprocher de la base du tube lui-même, soit pour l'en éloigner, soit pour la porter de côté. Mais si l'on touche l'animal, il contracte aussitôt sa bouche. Celle-ci est remarquablement dilatable, et quelquefois elle égale le corps en diamètre. Quant à ce dernier, il n'est pas moins contractile; car l'animal irrité vivement peut le raccourcir de moitié et même plus; dans ce cas, son épaisseur augmente d'autant, et par l'orifice de la bouche, alors très élargie, on distingue tout l'intérieur du corps: ce zoophyte, de même que le polype à bras (l'Hydre) manque de canal intestinal. — Voici tout ce que j'ai

Acalèphes dans la mer près de Florö, dont la plupart avaient 3‴ mais d'autres 4‴ en diamètre. Les premiers (Pl. 15, fig. 49, 50) avaient la forme et l'organisation des *Strobila* devenues libres depuis peu : elles avaient, comme elles, un disque aplati, mais hémisphérique, pendant la contraction de l'animal, et dont la périphérie était divisée en huit rayons assez allongés, bifurqués à leurs extrémités; une bouche allongée, quadrangulaire, ou tu-

appris sur le premier âge du Strobila ; plusieurs individus dans cet état étaient fixés aux fucus, parmi d'autres plus avancés.

« Je fais commencer le second âge à l'époque où des plis se développent sur le corps du polype. J'ai d'abord observé à la partie supérieure du corps un seul pli transversal. Mais le nombre s'en accroît bientôt ; à mesure que l'animal prend une forme cylindrique et qu'il se développe, il est déjà plus grand d'un quart de pouce. Ces plis sont constans, réguliers, également distans et semblables à des anneaux dont le corps serait environné. A cette époque ils sont encore lisses.

« Mais peu-à-peu ces anneaux, ou si vous aimez mieux, ces sillons, se disposent en petites lanières, au nombre de huit, dichotomes à leur sommet, et qui, lorsque l'animal a pris tout son développement, forment autour des rayons; elles sont libres, dirigées en haut et disposées de telle sorte que celles de tous les anneaux se correspondent régulièrement; le corps semble marqué de huit côtes longitudinales. Dans un même polype, j'ai compté, outre ceux de la partie inférieure, qui n'avaient pas encore pris d'appendices laciniés, jusqu'à dix ou douze anneaux pourvus de rayons.

« Arrivons enfin à la quatrième époque, celle qui voit le polype se diviser, et les divers anneaux de son corps, peu-à-peu désunis, former chacun un être distinct. Cette séparation, qui commence par la partie supérieure, se continue ensuite aux anneaux inférieurs ; toutefois je n'ai pas encore observé comment se détache le premier de tous ces anneaux, celui qui, au lieu d'appendices bipartis, présente les tentacules dont il a été question plus haut: mais il ne me paraît pas improbable qu'il ne tombe comme un polype ordinaire, et qu'il se fixe de nouveau aux fucus pour traverser de nouveau les mêmes phases de développement et se partager ensuite de la même manière. Au contraire, j'ai vu souvent la séparation des anneaux suivans, qui tous, excepté le dernier, qui reste fixé, présentent exactement la forme d'animaux de la classe des Acalèphes et sont disposés de telle sorte, qu'unis verticalement entre eux, la face convexe de chacun est toujours en rapport avec la face concave de celui qui est au-dessous. Leurs rayons, comme nous l'avons fait remarquer ci-dessus, sont alors dirigés en haut et mobiles. J'ai compté jusqu'à quatorze de ces animaux bien développés et empilés les uns au-dessus les autres. Tous sont exactement semblables, excepté le dernier, dont le côté convexe se prolonge en un pédicule qui sert à fixer au fucus toute cette association. Dans plusieurs individus, j'ai constaté la formation de nouveaux êtres au moyen de ce pédicule. Voici les dimensions d'une série de douze individus : hauteur, un tiers de pouce ; épaisseur, un dixième. En soumettant la réunion au microscope, je distinguais les mouvemens de contraction et d'extension au moyen desquels chaque disque, en forme d'Acalèphe se sépare des autres. En effet, quoiqu'alors aucun frein organique ne les retienne entr'eux, ils sont très étroitement unis, et lorsque je voulais les séparer, j'éprouvais plus de résistance que n'en présentent ordinairement ces êtres gélatineux. Si on abandonne l'animal à lui-même, l'individu d'en haut se sépare le premier après cinq ou

bulaire, pendante, bordée à l'entour, située à la surface inférieure et sans tentacules. Les corpuscules marginaux étaient déjà tout-à-fait développés, et offraient un point pigmentaire d'un rouge brun; ils étaient situés à la place où chaque rayon se divise en deux lobes allongés qui diminuent de grosseur vers leurs extrémités, lesquelles sont arrondies. L'estomac était entouré de quatre plicatures en couronne, desquelles cependant on ne-

au plus quinze minutes; les suivans ne tardent pas à se détacher aussi, et en une demi-heure à une heure, la masse est désagrégée. Pendant ce temps ils se dilatent et se contractent avec force. Lorsque je tenais plus long-temps dans la même eau les groupes de ces animalcules, ils paraissaient inquiets et ne tardaient pas à se séparer. Après leur dispersion ils voguaient au milieu du liquide avec vivacité; mais avant la désagrégation, le mouvement du corps commun résulte uniquement des mouvemens de systole et de diastole des animalcules; chaque animal agite isolément ses rayons, de manière que si l'on en touche un, il les contracte seul: les autres individus les laissent épanouis; cependant, sous l'influence d'une plus forte irritation, toute la masse se contracte. Retirée du lieu où elle avait pris naissance, cette masse commune ne se fixe pas de nouveau. Toutes les fois que j'ai fait cet essai, elle est tombée au fond du vase et s'y est divisée; ajoutons qu'une fois séparés, les animalcules disciformes qui la composaient, ne se réunissaient plus.

« Lorsqu'ils se sont désagrégés, ils sont mous et gélatineux; contractés, ils prennent une forme hémisphérique; étendus, ils sont aplatis et disciformes, mais cependant toujours un peu convexes en dessus et concaves en dessous: également lisses à leurs deux faces et sans côtes saillantes. Leur pourtour est divisé par huit rayons aplatis, profondément séparés entre eux. Chaque rayon est partagé dans son milieu en deux parties acuminées; il n'y a ni bras, ni cirrhes marginaux. Au centre de la base supérieure est la bouche, laquelle est quadrangulaire, en tube allongé, égalant le quart du diamètre de l'animal, et tout-à-fait semblable au même organe, dans le jeune âge du Strobila; l'orifice de la bouche est de même simple et quadrangulaire, et la bouche, qui est mobile, est tantôt rétractée et tantôt contournée, de telle sorte qu'elle ne paraît plus que comme une valvule cruciforme.

« A la face inférieure de chaque rayon, au lieu même où il se bifurque, est fixé un corpuscule oblong ou pyriforme, hyalin, et dont la partie la plus large, par laquelle seule il est fixé au rayon, est tournée en dedans, tandis que l'autre, plus étroite, terminée par un stigmate peu évident et légèrement avancé entre les deux lanières du rayon, pend librement. Ces corpuscules marginaux sont certainement analogues à ceux des Acalèphes de l'ordre des *Discophoræ phanerocarpæ* d'Eschscholtz et dont on ignore encore la nature et les fonctions. De l'estomac partent seize canaux semblables à de simples filets qui paraissent destinés à porter aux diverses parties du corps le suc nourricier. Les plus grands vont aux corpuscules pyriformes; ils ont trois ou quatre ramifications. Les plus petits ne m'ont pas paru subdivisés; ils aboutissent aux échancrures qui séparent les rayons. Un peu en dedans de l'orifice buccal, on distingue quelques cirrhes libres dans l'estomac, ils sont plus épais à leur base, et leur extrémité est atténuée; tantôt il y en a quatre, séparés par des intervalles égaux, tantôt huit; ils s'agitent lentement et se contournent dans toutes les directions. Pour Eschscholtz, ce seraient les conduits ovariens; dans le Strobile ils sont proportionnellement plus grands que dans les autres Acalèphes.

voyait provenir que les prétendus suçoirs ou tentacules, qui étaient, proportion gardée, beaucoup plus gros que chez la Méduse parvenue à son état adulte et qui ont un mouvement lent et vermiculaire. Les canaux qui s'étendaient de l'estomac vers la périphérie du disque étaient ainsi distribués : à chacun des huit corpuscules marginaux arrivait un canal assez large, et dans l'intervalle, encore très étroit, qui sépare les rayons, il s'en trouvait un autre, mais beaucoup plus petit. Ces deux canaux s'anastomo-

« On peut attribuer à l'âge les variations de leur nombre. La teinte de ces animaux est partout lavée de rouge, ou plutôt hyaline, et généralement piquetée de petits points rouges; les canaux qui partent de l'estomac sont d'un rouge plus intense. D'autres fois, la couleur est tout-à-fait hyaline. Ils nagent avec rapidité au moyen de mouvemens de systole et de diastole; c'est-à-dire en contractant leurs rayons vers la bouche et les en éloignant; qu'ils aillent verticalement ou horizontalement, ils portent toujours en avant la face convexe de leur corps. Souvent ils s'arrêtent immobiles au fond de l'eau, jusqu'à ce que, soit par leur propre volonté, soit par l'influence d'un excitant quelconque, ils se mettent de nouveau en mouvement.

« Si on touche un de ces animaux lorsqu'il nage, il replie aussitôt ses rayons vers la bouche, prend une forme hémisphérique, et, descendant ainsi jusqu'au fond, il reste quelque temps avant de s'épanouir. Toutefois il ne tarde pas à le faire si on ne l'inquiète point, et quelquefois même il ouvre ses rayons en tombant.

« Les rayons sont ordinairement au nombre de huit; cependant j'ai vu des individus qui en présentaient quatre, six, sept, neuf, dix ou même douze. Chez tous ces Strobiles, néanmoins, les rayons étaient dichotomes, et il y avait des corpuscules marginaux pyriformes, une bouche tubuleuse et exerte, et tous les caractères précédemment indiqués. Quelques-uns ont leurs rayons plus courts que ceux des autres.

Dans ces êtres, la vie est plus tenace que chez le reste des Acalèphes. J'ai pu en tenir plus de cent pendant huit jours dans la même eau de mer; ils y nageaient avec vivacité. Mais après cette époque, leurs mouvemens étaient moins rapides, ils s'élevaient avec moins de vigueur, et, pour la plupart, ils mouraient vers le douzième ou treizième jour, laissant pour tout résidu une gelée peu épaisse; au quatorzième jour, quelques-uns survivaient bien encore, mais leurs mouvemens étaient d'une extrême lenteur.

« La grandeur de ces Acalèphes entre deux rayons opposés est d'un huitième de pouce; chaque rayon a un vingt-quatrième, et la bouche un trente-deuxième. On les trouve dans la baie de Bergen, fixés par leur base à la face inférieure du fucus. Quoiqu'ils y soient communs, on se les procure difficilement, et je ne les ai observés que deux fois pendant les étés de 1829 et 1830. Depuis lors, je n'ai pas exploré de nouveau la localité qui me les avait fournis et je ne les ai rencontrés dans aucune autre. Devenus libres, ils ont une grande analogie avec l'*Ephyra octoradiata* d'Eschscholtz, mais la bouche, les canaux et la position des corpuscules marginaux ne sont pas semblables.

« Ainsi, pour résumer, le Strobile nous présente un animal tout-à-fait polypiforme qui se fractionne plus tard en plusieurs parties transversales, dont chacune possède une vie propre, et finit par se séparer des autres et devient libre. Ce fait est aussi singulier que positif: c'est la jonction des polypes et des Acalèphes. Nous avons aussi fait voir que l'agrégation de plusieurs individus n'était qu'un premier âge, et que le suivant et le plus parfait est celui où ces

saient l'un avec l'autre, par le moyen de deux autres, partant de chaque côté du milieu du canal destiné au corpuscule marginal, et qui se rendaient, après un trajet en forme d'arc, à l'extrémité de l'autre canal, lequel n'offrait pas de divisions pendant son trajet (1). Ces Acalèphes étaient plus sensibles qu'ils ne le sont ordinairement, car après les avoir irrité fortement, ils ramenaient les rayons les uns vers les autres, et vers la bouche, de sorte que ces animaux prennent la forme d'un hémisphère, et

petits animaux se disjoignent et devenaient libres. Ne pourrait-on pas appliquer ce raisonnement aux biphores (*Salpa*), car je suis peu porté à admettre l'opinion de Lesson (*Isis*, 1833), qui voit dans la réunion de ceux-ci l'effet de l'acte copulateur. Au reste, on admettra aisément que différens points restent encore à éclaircir avant que l'histoire du Strobila soit complètement terminée. Comment, par exemple, se développe la partie supérieure; que devient l'inférieure ou basilaire? Comment l'animal libre se propage-t-il? La solution de ces questions et bien d'autres contribuerait fortement à faire comprendre la nature de l'espèce qui nous occupe et celle des autres animaux composés.

« Je ne dois pas laisser passer sous silence, qu'en septembre 1830, j'ai recueilli dans la baie de Bergen, mêlé à des Méduses de l'espèce dite *Medusa aurita*, un Acalèphe qui me paraît un Strobila plus âgé que les précédens; il avait quatre lignes de diamètre, et il était hyalin, un peu rouge et fort semblable à ceux que j'ai décrits. Mais ses rayons étaient plus courts, et, entre chaque paire de ceux-ci étaient six ou sept corpuscules fort petits, vésiculiformes et pourvus intérieurement d'un nucléus plus foncé; ils variaient en grandeur, celui du milieu dépassant toujours les autres. Je pense qu'ils ont l'usage de petits appendices marginaux que j'ai signalés dans le Strobile.

« Les canaux qui partaient de l'estomac suivaient un trajet un peu différent. Ceux qui vont de l'estomac aux corps pyriformes de l'échancrure des rayons émettent, en effet, de chaque côté, un rameau qui se rend aux appendices vésiculeux dont j'ai parlé, s'étend jusqu'à leur base, s'y dilate, et, recevant à cet endroit le canal qui vient de l'estomac, se rend ensuite dans le rameau correspondant d'un autre tube principal, de telle sorte qu'il en résulte près du bord du disque un canal annuloso-flexueux; les conduits ovariens qui, dans les individus précédemment décrits, étaient au nombre de quatre ou de huit en quatre faisceaux, sont ici plus nombreux (douze, seize pour chaque groupe) et doués d'un faible mouvement. Mais je n'ai pas vu de trace des ovaires eux-mêmes. La bouche, est de même, tétragone et tubiforme. »

(Les autres résultats relatifs au *Strobila* indiqués dans le texte, se trouvent consignés dans une lettre adressée à l'Académie des Sciences, par M. Sars, et insérée dans les *Annales des Sciences Naturelles*, 2e série, tome VII, page 246. Enfin, les figures citées ci-dessus ont été reproduites dans les planches du Mémoire que nous donnons ici (figures 43 à 48), et on en trouvera l'explication à la page 348.) (*Note du Rédacteur.*)

(1) J'ai tout lieu de croire que ces canaux sont représentés d'une manière inexacte dans mes figures du *Strobila*, qui vient de se détacher. Au moins je trouve dans le dessin original, que le canal destiné au corpuscule marginal ne donne que deux rameaux de chaque côté et dont l'extérieur n'est qu'un très petit prolongement vers la base du corpuscule marginal; l'interne se dirige probablement (car dans la figure il est vaguement dessiné) au canal non divisé qui se voit dans l'intervalle des rayons. Je ne donnais à cette époque qu'une attention légère à la division de ces canaux.

restent ainsi pendant quelque temps avant de s'éteindre de nouveau.

2° Parmi les Acalèphes mentionnés plus haut se trouvaient plusieurs individus un peu plus gros (4‴ en diamètre), mais de la même forme et de la même structure, si ce n'est que l'intervalle entre les rayons était devenue un peu plus considérable, et se terminait, là sous forme de lobule arrondi, et qu'à l'extrémité du canal qui s'y trouve, au point où aboutissent les deux vaisseaux anastomotiques provenant du canal des corpuscules marginaux placé de chaque côté, se trouvaient trois petites vésicules ovales, dont celle du milieu commençait à s'allonger. — Un individu encore plus développé se trouve décrit et figuré dans mon Mémoire déjà cité p. 21, et Pl. III, fig. 7, *s*, *t*, *u*.

3° A cette même époque se trouvaient fréquemment parmi d'autres Acalèphes quelques individus (fig. 51, 52) plus développés et d'un volume à-peu-près double, 12‴ en diamètre, qui appartenaient à la même espèce, et qui fournissaient des éclaircissemens importans sur le développement de ces animaux. Les huit rayons étaient devenus beaucoup plus petits, tandis que les intervalles avaient pris du développement, et dans ces derniers, j'aperçus encore plus de petites vésicules ovales, huit à douze dans chaque, et dont la plus volumineuse était constamment celle du milieu, tandis que les autres situées de chaque côté restent toujours plus petites. Mais ce qui était surtout digne d'intérêt, c'est que la vésicule la plus développée, celle du milieu, s'allongeait en tentacule filiforme, aigu à son extrémité et plus épais à sa base, et que son bout dépassait considérablement la circonférence du disque (fig. 54, 55). Ces tentacules avaient, comme les autres vésicules, à l'intérieur, un noyau obscur, rougeâtre, lequel est leur cavité. C'est là l'origine de nombreux tentacules marginaux de la *Medusa aurita*. Les tentacules situées au milieu de chaque intervalle des rayons se développent les premiers; puis, ceux placés aux deux côtés du premier, croissent de plus en plus, comme on verra par la suite; les intervalles entre les rayons deviennent de plus en plus considérables, et ces derniers n'occupent qu'un espace très limité;

enfin, ces tentacules forment un cercle régulier autour de la périphérie du disque.

Il n'est pas moins intéressant de voir le développement des tentacules de la bouche qui se montrent alors pour la première fois. Chez les plus gros des Acalèphes mentionnés plus haut, la longue bordure buccale, encore sous forme de tube, était parsemée, surtout vers les angles, de tentatules aigus, saillans et très courts, au nombre de trente environ (fig. 54); ceux de quatre angles étaient le plus volumineux, et leur grosseur diminuait graduellement à mesure qu'on s'éloignait de ces points, jusqu'à ce qu'ils ne fussent plus que des éminences à peine visibles. Ces tentacules prenaient naissance aussi du couvercle buccal, et devenaient de plus en plus serrés à mesure qu'ils s'approchaient des bords de la bouche. Les canaux provenant de l'estomac avaient le même trajet que j'ai décrit plus haut; seulement ils étaient devenus beaucoup plus petits. Aux plicatures en couronne, les tentacules étaient considérablement plus nombreux. La surface supérieure du disque était couverte d'une foule innombrable de très petites éminences ou papilles d'un rouge pâle (*Saugwärzchen* d'Ehremberg) qui ont déjà été observées chez les *Strobila* devenues libres (*Mém. cité*, p. 19).

4° Le 5 avril, je trouvais des individus 2/3″ en diamètre (fig. 56 à 60); les rayons étaient plus courts encore, et leurs intervalles, plus grands, offraient chacun de vingt à trente tentacules marginaux filiformes, dont le médian était toujours le plus long, et ceux qui étaient les plus éloignées de lui, restaient encore à l'état rudimentaire ou ressemblaient à des éminences ovales. Les canaux qui se dirigeaient vers les corpuscules marginaux offraient plusieurs rameaux nouveaux sous la forme de conduits minces, et, ce qui est surtout remarquable, c'est que ces derniers se développent du bord, vis-à-vis les bases des tentacules, là où se trouve le canal marginal qui entoure le disque; ils s'accroissent graduellement de dehors en dedans, se réunissent deux à deux, et s'anastomosent enfin avec les deux rameaux latéraux du canal primitif (fig. 57). Les canaux qui s'étendent de l'estomac aux intervalles des rayons, au contraire, restent simples et sans rameaux. Cet aspect est celui que présentent ces

canaux dans leur état de développement complet, car c'est tout-à-fait ainsi qu'on les voit chez la *Medusa aurita* adulte. Les corpuscules marginaux (fig. 60), les yeux, d'après Ehrenberg, sont, comme nous avons dit plus haut, complètement développés. Ils sont formés d'une vésicule en forme de poire dont la partie la plus volumineuse est fixée entre les deux branches très courtes, ou appendices du canal; du reste, ils sont libres et font saillie à la partie inférieure du disque où ils sont coiffés par les deux lobules des rayons, lesquels sont courbés en bas et en dedans et forment une espèce de voûte. A l'intérieur de cette vésicule s'en trouve une seconde de la même forme, et à l'intérieur de cette dernière on voit un petit corpuscule qui se meut vivement. La partie externe est obscure et granuleuse (chez l'animal tout-à-fait développé on y observe le cristallin calcaire, bien connu), et à son extrémité supérieure, se trouve la tache pigmentaire, arrondie et d'un jaune rougeâtre.

La bouche a subi un changement remarquable. Elle s'est divisée (fig. 58 et 59), vers son extrémité, en quatre parties en même temps que ses bords externes ont éprouvé des solutions de continuité qui s'étendent assez loin dans les endroits correspondans aux angles, et ces derniers, semblables à quatre bras serrés les uns contre les autres, font saillie et sont libres. C'est là la véritable origine de quatre gros bras qui sont suspendus à la surface inférieure de la *Medusa aurita*. Ils sont prismatiques, et offrent trois bords, savoir : un bord externe, lisse, correspondant au bord longitudinal externe du conduit buccal, primitivement quadrangulaire, et deux bords internes, formés par le bord terminal de la bouche, fendu et garni par les tentacules buccaux et brachiaux, mentionnés plus haut, qui sont coniques, pointus, disposés longitudinalement en ligne, et dont le nombre augmente de plus en plus (fig. 59).

5° Peu-à-peu les bras se séparent de plus en plus les uns des autres, et ne se tiennent enfin qu'à leur base, de sorte qu'on n'aperçoit plus la bouche, qui était visible auparavant; ils grossissent, et sur leurs bords internes se développent des tentacules nouveaux. Les tentacules marginaux deviennent aussi plus nombreux et plus longs, et les rayons sont limités à une espace en-

core plus restreinte. Tels étaient les animaux que je trouvais en abondance depuis le 11 jusqu'au 20 avril dans le voisinage de Florö, et qui avaient 1" de diamètre (fig. 61, 61 *bis*). On y reconnaît le jeune *Medusa aurita*, complètement développé dans tous les points essentiels de son organisation, et ne se distinguant des grands animaux que par ses dimensions moindres. On voit aussi que les quatre bras se développent de bonne heure et simultanément, et non les uns après les autres, comme O.-F. Muller le croit, en jugeant d'après un individu déjà gros dont il a parlé dans la *Zoologia Danica*, et qui, sans doute, avait été blessé ou était monstrueux.

Pour terminer, je remarquerai, comme j'ai déjà fait à l'égard du *Strobila* (*lieu cité*, p. 20), qu'on observe souvent chez ces acalèphes des anomalies dans leurs formes et dans le nombre de leurs rayons, normalement au nombre de huit. Ainsi, j'ai trouvé des individus avec dix rayons, auxquels correspondaient cinq plicatures en couronne, cinq bras, etc.; tout-à-fait comme les Acalèphes observées par Ehrenberg (*lieu cité*, p. 22, pl. 11). De plus, j'observerai que le développement ne se trouve pas avancé au même degré chez les individus de la même époque. C'est ainsi, par exemple, que je trouvais encore, le 11 avril, des individus en grand nombre, au même degré de développement à tous égards que ceux que j'avais observés le 22 mars (fig. 49, 50), et auparavant (*lieu cité*, p. 21), j'avais trouvé en septembre des individus d'un 1/3" de diamètre.

Des observations précédentes, il résulte que le genre que j'avais voulu établir jadis sous le nom de *Strobila*, n'est qu'un état de développement ou de jeune âge de la *Medusa aurita*, et qu'il doit, par conséquent, être effacé du Système de la nature. Sans doute aussi la même erreur existe pour le genre *Ephyra* d'Eschscholtz, qui n'est rien autre que des petits d'une espèce quelconque de Méduse.

Dans les *Opuscula subseciva* de Baster (t. II, pl. VII, fig. 5, A, B), on trouve les figures d'un très petit Acalèphe qui est commun pendant l'été sur la côte de Hollande. Il a une longue bouche pendante en forme de tube, quatre plicatures en couronne, huit rayons qui, dans la figure, paraissent être rétractés

en forme d'arc. En un mot, c'est probablement un petit de la *Medusa aurita*, de la même grosseur, et parvenu au même degré de développement que ceux que j'avais observés vers la fin du mois de mars.

J'avais toute raison de présumer que la *Cyanea capillata* ressemblerait dans ses caractères à la *Medusa aurita*. Le 18 avril 1837, je trouvai dans la mer, près de Florö, plusieurs Acalèphes de cette espèce, qui avaient près d'un 1/2" en diamètre (fig. 62, 63), et qui frappaient les yeux par leur grande analogie avec les petits de la Méduse. Comme chez ces derniers, la périphérie de disque était divisée en huit rayons, assez profondément sous-divisés en trois; mais les lobules bifurqués étaient aigus à leur extrémité. La bouche aussi était formée de la même manière, longue, pendante, quadrangulaire ou en forme de tube. L'extrémité ou le bord était coupé en quatre parties, et montrait ainsi l'origine de quatre bras, qui, quoique courts encore, étaient disposés en prismes triangulaires, aigus à leur extrémité et sans tentacules (fig. 63, 64). Les corpuscules marginaux étaient situés comme ceux des petits de la *Medusa aurita*, et en avaient la forme de même que les quatre plicatures en couronne qui n'offraient qu'un petit nombre de gros tentacules. Les appendices cordiformes de l'estomac n'étaient que peu développés; au contraire, et en raison inverse, les appendices allongés qui se dirigent vers les rayons l'étaient beaucoup. Les rayons occupaient presque toute la périphérie du disque, de sorte que les intervalles, qui plus tard deviennent si considérables, étaient encore très limités. Cet intervalle entre chaque paire de rayons, montrait déjà les longs tentacules qui y croissent (fig. 64), et, comme on sait, forment chez la *Cyanea* développée, huit faisceaux situés sous le disque et un peu plus en dedans que son bord. Ces tentacules, qui avaient déjà la même situation que chez l'animal adulte, croissaient exactement de la même manière que chez les petits de la Méduse. C'est ainsi que j'ai vu au milieu de cet espace un tentacule épais à sa base et effilé à son extrémité, et de chaque côté de cet appendice un tentacule court et sphérique qui commençait à croître. En outre, à la base, de gros tentacules, et à leur côté externe il

y avait deux petites éminences arrondies, et de chaque côté des tentacules sphériques il y avait trois autres éminences arrondies, de plus en plus petites à mesure qu'elles approchaient du bord. Toutes ces éminences avaient, comme les gros tentacules, intérieurement un noyau d'un brun jaunâtre obscur (cavité), et étaient toutes des tentacules en voie de formation. Ces appendices se développent comme chez la Méduse, du milieu d'un intervalle, progressivement vers les rayons voisins. Du reste, les longs tentacules étaient de diverse grosseur dans les longs intervalles du disque. Les plus longs, étendus mesuraient 2, 3" en longueur; mais ils pouvaient se rétracter d'une manière très extraordinaire; ils étaient d'une couleur brun jaunâtre, et les plus longs étaient brun foncé à leur extrémité. Ils étaient probablement remplis d'un liquide urticant.

Ce qui précède montre la grande analogie qui existe entre les Cyanées et les Méduses sous le rapport de leur développement.

J'étais parvenu à ce point dans la connaissance du développement des Acalèphes; j'avais constaté ce que je soupçonnais depuis long-temps, que les *Strobila* n'étaient qu'un jeune âge des Méduses; je savais, par mes observations antérieures, que les *Strobila* peuvent se propager par division transversale spontanée d'une larve polypoïde, si je puis me servir de cette expression. Maintenant il ne me reste plus, pour exposer la série complète de développement, qu'à en faire connaître le premier degré et le développement, à partir de l'œuf jusqu'à l'état de larve polypoïde.

Après plusieurs essais répétés, infructueux peut-être à cause de la saison non propice ou par toute autre raison, je suis enfin parvenu cet automne, à deux reprises différentes, à être témoin de ce développement. Tout naturaliste peut facilement répéter ces expériences.

Ehrenberg en traitant, dans son ouvrage sur les Acalèphes, p. 19; Pl. VII, des ovules dans les ovaires de la *Medusa aurita*, a déjà donné quelques éclaircissemens sur ce sujet; mais il représente le principe de l'œuf, le vésicule de Purkinje, et la tache, ou plus proprement la vésicule de Wagner, ainsi que la division ou la bifurcation du jaune d'une manière qui n'est pas claire.

Il a décrit aussi les petits qui viennent de sortir, semblables aux Leucophres et aux Bursaires, et qui se trouvent en grande abondance assemblés sur les quatre gros bras de leur mère (O. Fr. Müller les avait déjà observés). « Mais, dit-il (*Ouv. cit.* p. 20), personne n'a encore vu ces formes, en se développant, devenir des Méduses, et cela fait qu'on a imaginé (comme V. Baer) que ces corps pouvaient bien n'être que des parasites ». Cependant M. Ehrenberg les regardait comme les petits des Méduses, quoiqu'il fût malheureux dans l'expérience qu'il avait tentée pour suivre leur développement; il est disposé en concordance avec ses vues connues, à les considérer comme de très petites formes mâles, et il prend pour des femelles les autres individus de couleur violette, moins nombreux, qu'on trouve dans les ovaires.

M. Siebold aussi croit avoir trouvé des sexes séparés chez la *Medusa aurita* (Wiegm. *Archiv.* 1837, B. d. II, S. 275), mais d'une autre manière, c'est-à-dire par des différences des organes génitaux dans divers individus; de sorte que le même organe qui, chez les individus femelles, est un ovaire, devient chez le mâle un testicule. Je ne puis rien prononcer sur ces observations, n'ayant jamais eu l'occasion de les vérifier (1); au contraire, je dois rejeter nettement l'hypothèse d'Ehrenberg et venir à l'appui de M. Siebold, quand il annonce que les individus ovales, cylindriques, d'un brun jaunâtre et garnies de cils, sont un état de développement plus avancé des œufs sphériques et violets, et quand il déclare que ces derniers sont le premier état de développement des Acalèphes. Je ferai voir maintenant, par l'observation, que c'est ainsi que les choses se passent; que ces corps, pourvus de cils, ne sont ni des petits mâles, ni encore moins des parasites; mais qu'ils deviennent de véritables Méduses, à la vérité, après des métamorphoses étonnantes, dont on n'avait pas auparavant la moindre idée; car, *à priori*, on a adopté l'opinion souvent contraire à ce qui existe réellement, que ces animaux, comme beaucoup d'autres des classes inférieures, ont un développement extrêmement simple.

(1) *Note poster.* M. Siebold dans son Mémoire qui vient de paraître *Beitrage zur Naturgesch. der wirbellosen Thiere*, S. 7, a démontré ce qu'il avait avancé à cet égard.

La première expérience qui me réussit, avec les petits trouvés sur les bras de la *Cyanea capillata*, fut faite le 19 septembre 1839, à une époque où ces petits étaient en nombre incalculable; mais une autre expérience, faite quelques semaines plus tard, m'a fourni des résultats plus précis, quoique s'accordant parfaitement avec la première; j'aime mieux, par conséquent, rapporter la seconde expérience et l'exposer en détail.

Je trouvai, le 12 octobre 1839, dans la mer près de Florö, deux individus de la *Cyanea capillata*, l'un de moyenne grosseur (8 à 9″), et qui n'avait qu'un petit nombre de jeunes dans les bras; l'autre, qui était plus petit (6″), en avait un plus grand nombre. Ces petits étaient jaunes comme le jaune d'œuf, et d'une très petite dimension, car, vus à l'œil nu, ils avaient la grosseur d'un grain de sable. Je plaçai ces animaux dans un vase rempli d'eau de mer, à la maison, et peu-à-peu la plupart des petits, quittant les bras, nageaient libres dans l'eau. Je pêchai alors un grand nombre de ces petits dans un verre. Vus au microscope, ils étaient ovales (fig. 1, 3), un peu comprimés (fig. 2), et plus volumineux à une extrémité qu'à l'autre; quelques-uns étaient plus allongés ou s'approchaient plus de la forme cylindrique (fig. 4); le corps était partout couvert de cils vibratiles par le moyen desquels ces animalcules nageaient librement; on ne voyait pas de différence entre le dos et le ventre, car ils nageaient autour de leur axe longitudinal, et montraient tantôt la surface large (fig. 1), tantôt la surface étroite (fig. 2); au contraire, il est certain qu'il existe une partie antérieure et une partie postérieure, car ils nageaient toujours, comme M. Siebold l'avait déjà remarqué (*Op. cit.* p. 276), avec la grosse extrémité en avant. Au centre de cette dernière, on voyait une petite dépression arrondie que M. Siebold considère comme la bouche (1). Mais une observation qui sera présentée plus tard combat cette opinion et rend probable que les petits, dans cet état, n'ont point de bouche. A cet égard et à plusieurs autres, ils ressemblent aux petits de certains polypes qui viennent de se détacher de leur mère, et, en particulier, à ceux des Campanulaires, comme Lowen nous

(1) *Note postér.* M. Siebold lui-même a rectifié cette erreur dans son dernier Mém., p. 27.

a appris à les connaître dans son beau Mémoire (*K. Svensk, Vetensk. Acad. Handl. for ar* 1835, S. 260, fig. , et traduit en allemand par Creplin, dans Wiegm. *Archiv.* S. 1837, 5-249, fig.). (1)

Le corps est mou, d'une texture très finement granuleuse, et paraît creusé d'une grosse cavité de la même forme que le contour extérieur; cette cavité est reconnaissable non-seulement par sa teinte plus foncée, mais encore sous le compresseur. La natation est assez active, et déterminée entièrement par la vibration des cils.

Ces jeunes Acalèphes, sous forme d'infusoires, continuèrent de nager dans le vase le premier jour et le jour suivant. Il est à remarquer que la plus grande partie de ces animaux se dirigeaient de préférence, vers le côté éclairé du verre, de quelque côté qu'on le tournât; cela paraît démontrer que ces êtres jouissent de la faculté de sentir les effets de la lumière.

Nous venons de voir le premier état ou état *infusoréiforme* des Acalèphes, nous allons en voir un autre dans lequel ils se transformeront à l'état polypoïde. En effet, le 14 octobre, beaucoup de petits étaient montés à la surface de l'eau, à laquelle ils étaient suspendus par une extrémité, tandis que l'autre flottait libre dans le liquide. Plusieurs autres s'étaient attachés aux parois du vase. J'en vis encore d'autres nageant dans le voisinage de la surface de l'eau; mais peu-à-peu leurs mouvemens commençaient à s'affaiblir, et enfin l'extrémité qui était antérieure pendant qu'ils nageaient, s'attachait à la surface de l'eau, tandis que l'extrémité postérieure pendait verticalement (fig. 5, 6); chez les petits qui, s'étant attachés aux parois du vase, l'extrémité, auparavant antérieure, était fixée au verre, tandis que l'autre extrémité, dirigée horizontalement, était libre dans l'eau. Plusieurs petits, que j'observais au microscope et qui nageaient encore, se fixaient enfin au porte-objet avec tant de force, qu'on ne pouvait les en détacher que par violence; l'extrémité postérieure de ceux qui se fixaient ainsi était dirigée en haut (fig. 7, 8). Les jours

(1) Voyez la traduction française de ce Mémoire dans les Annales des Sciences naturelles, 2e série, tome XV, page 155. (*Note du Rédacteur.*)

suivans, un grand nombre des petits qui s'étaient tenus sur le fond du verre, prenaient encore cette même position. En un mot, les petits s'attachaient par l'extrémité qui, auparavant, était l'antérieure; l'autre extrémité, qui est encore arrondie (fig. 17) se tronquera bientôt (fig. 8), et dans ce point on verra, plus tard, la bouche de l'animal.

Pour les fixer, la petite dépression sur l'extrémité antérieure mentionnée plus haut, agit comme un suçoir, et en même temps sécrète un mucus gluant qui s'élargit plus tard et devient un disque arrondi et aplati, par le moyen duquel les petits restent attachés aux corps étrangers, comme s'ils en faisaient partie, car ils ne peuvent plus changer de place; quand ils se trouvent près de la surface de l'eau, c'est encore cette dépression qui s'attache à une bulle d'air, par le moyen de laquelle l'animal est maintenu en suspension (fig. 5, 6).

Quand on réfléchit pendant quelques instans aux faits que je viens de mentionner, savoir : la fixation et l'accroissement de ces jeunes Acalèphes sur les corps étrangers, on ne peut s'empêcher de penser à la grande analogie qui existe entre le premier âge de ces animaux et celui des Campanulaires. Cette similitude deviendra plus frappante et plus remarquable quand nous verrons nos Acalèphes se transformer en polypes.

En effet, le 15 octobre, j'observais qu'il y avait des changemens considérables chez les petits qui s'étaient fixés la veille. L'extrémité libre, celle qui était précédemment l'extrémité postérieure, était maintenant devenue plus épaisse et coupée droite; l'extrémité fixe, au contraire, était plus mince et s'épanouissait régulièrement dans le disque d'attache, mentionné plus haut (fig. 9); enfin sur l'extrémité libre on voyait alors, chez la plupart, l'ouverture de la bouche qui était entourée d'un bourrelet (fig. 10). La bouche pouvait s'ouvrir d'une manière notable et se fermer; dans le premier état, elle était circulaire ou quadrangulaire (fig. 10, 11). Enfin, j'observai chez un grand nombre, sur l'extrémité libre, quatre éminences arrondies qui sont des bras ou des tentacules en voie de développement (fig. 11, 12, 13); chez plusieurs (fig. 14), ces quatre tentacules étaient plus longs, coniques, et aigus à leur extrémité; le corps, inférieurement, à me-

sure qu'on s'approchait du disque d'attache, se rétrécissait de plus en plus, de sorte que le corps prenait la forme d'une coupe.

Chez deux individus mêmes, qui étaient du reste les plus développés de tous, les tentacules avaient la moitié de la longueur du corps, et étaient en outre beaucoup plus minces que ceux des autres (fig. 15); de plus, ces petits qui s'étaient développés si rapidement, comme on voit, et qui étaient devenus alors des Polypes complets, s'étaient accrus beaucoup; ils étaient déjà près du double de ce qu'ils étaient trois jours auparavant; ils avaient perdu presque en entier leur couleur jaune, et étaient devenus blanchâtres et un peu transparens.

Le 16 octobre, les tentacules d'un grand nombre d'entre eux avaient une longueur égale à l'épaisseur du corps; et le 17 ils étaient encore plus longs, très minces et filiformes. A cette époque il y en avait beaucoup qui venaient de se fixer, et un grand nombre d'autres qui nageait encore, quand déjà les parois et le fond du verre étaient couverts de plusieurs centaines d'autres déjà fortement fixés. Le corps de ceux qui étaient les plus développés, était devenu plus étroit inférieurement, comme une tige mince, entouré par un tube muqueux qui faisait corps avec le disque d'attache (fig. 16. Dans cette figure les tentacules ne sont pas épanouis). Ces deux parties étaient formées d'une substance plus ferme et plus analogue à du cartilage que toutes les autres parties de l'animal, qui étaient plus molles et contractiles. Le 18, de nouveaux tentacules commençaient à se développer sur quelques individus, sous la forme d'éminences dans les intervalles des quatre tentacules primitifs. Depuis le 18 jusqu'au 22 octobre, je n'ai pu continuer mes observations. Le 22 tous les individus avaient huit tentacules qui étaient à-peu-près quatre fois plus longs que le diamètre du corps, et partout très minces (fig. 17, 18, 19, 20, 21). Le corps est maintenant, comme je viens de l'observer, très contractile (propriété qui n'était pas remarquée dans l'état infusoréiforme), blanchâtre et un peu transparent; mais la partie qui entoure le pédoncule est parfaitement incolore et transparente comme de l'eau. L'animal a en outre une grande cavité dont la conformation est à même que celle du contour extérieur du corps, et qui s'ouvre

à la partie supérieure et élargie au milieu de la couronne de tentacules, par une bouche d'une étendue variable selon son état de contraction. En effet, quand elle est complétement contractée, on n'y remarque qu'une petite dépression ; quand l'animal l'ouvre, au contraire, elle est arrondie, circulaire (fig. 18), quadrangulaire ou allongée, selon que ses bords sont contractés d'une manière ou d'une autre. Souvent elle est aussi large que le diamètre du corps. Quand la bouche est fermée, la surface supérieure du corps est un peu convexe. Au bord de cette surface se trouvent les tentacules disposés en un seul cercle autour de la bouche. On voit de quelle manière le Polype fait mouvoir un ou plusieurs de ses tentacules dans des directions particulières, comment il les rétracte ou les étend; si on les touche, tous se contractent, deviennent courts et épais, et quand on les irrite fortement ils n'ont plus en longueur que la moitié de la largeur du corps, et se portent en dedans vers la bouche. Le corps se rétracte fortement aussi quand on l'irrite, devient plus court et plus épais, et prend à-peu-près la forme d'une sphère ou d'une poire. Quand on regarde à l'aide d'une loupe les tentacules étendus, on voit qu'ils sont articulés à distance égale, car ils se trouvent partagés en petites intervalles par un grand nombre de petits nœuds arrondis (peut-être des suçoirs, fig. 23) (1). Si on détache violemment ces Polypes, il n'y a qu'un petit nombre qui peut se fixer de nouveau, et alors ils n'adhèrent pas si fortement qu'à l'ordinaire; la plupart restent libres au fond du verre.

Le 23 octobre, chez des individus les plus avancés, un ou deux très petits tentacules commencèrent à se développer entre les premiers, et le 24, chez deux autres individus qui avaient presque le double de grosseur de ceux ayant seulement huit tentacules, on voyait sur l'un trois, et sur l'autre cinq nouveaux tentacules d'une longueur très inégale: ce qui fait, en tout, treize tentacules (fig. 24). Ces nouveaux tentacules se développèrent

(1) *Note postér.* Ce sont d'après M. Siebold, qui les a observés avec un meilleur instrument que moi, des corps transparens comme du verre, semblables à ceux qu'on voit sur les tentacules de la Méduse adulte (Voy. son Mémoire, p. 31).

promptement les trois ou quatre jours suivans ; les huit premiers tentacules avaient cinq fois le diamètre du corps. On voit donc que le nombre des tentacules croît de plus en plus à mesure que l'animal se développe. Chez une partie des individus, le corps était plus allongé ou comme étiré inférieurement en pédoncule plus long (fig. 22) ; mais la partie inférieure, mince, filiforme, et entourée par le tube muqueux, avait conservé toujours son diamètre primitif. Chez quelques-uns on voyait déjà dans l'intérieur de la cavité du corps, le commencement de quatre éminences longitudinales dont il sera question plus bas; elles paraissaient se développer au-delà de la région buccale, vis-à-vis les bases des quatre tentacules primitifs, mais plus en dedans, et se dirigeaient ensuite en ligne droite de haut en bas, le long de la paroi interne de la cavité du corps jusqu'à sa base. (1)

Dans les huit à dix jours suivans, ces jeunes Acalèphes polypoïdes n'offrirent plus de changemens remarquables, ils devinrent de plus en plus faibles, se rétractèrent fortement et moururent enfin.

Ainsi nous avons vu se produire la forme polypoïde que j'ai décrite et figurée en 1835 (*loc. cit.* p. 16, Pl. III, fig. *a, b, e*), et de laquelle, plus tard, naît le *Strobila* par section transversale spontanée. Le cercle est ainsi complet, et la série de développemens est achevée dans ses traits principaux.

Cependant j'ai encore à exposer ici une circonstance très remarquable qui se rattache à ce sujet. En effet, dans l'état polypoïde que j'ai décrit, état où les animaux restent fixés et qu'on peut considérer avec raison comme un état de larve, les Acalèphes peuvent déjà se propager avant que la division transversale spontanée qui produit les *Strobila* ne commence; cette reproduction a lieu, comme chez les polypes, par gemmes et par ce qu'on appelle des stolons.

En effet, le 9 septembre 1836, je trouvai sur un laminaire près de Florö, une foule d'individus tous dans leur état de larve polypoïde; on ne pouvait pas dire, avec certitude, s'ils étaient

(1) *Note postér.* M. Siebold a observé aussi ces quatre éminences (lieu cité p. 31); Wiegmann les a vues également (Voy. la note de la page 342).

des Méduses ou des *Cyanees*. Ils étaient de diverses grandeurs et à divers états de développement : quelques-uns étaient comme des grains de sable (1) $\frac{1}{24}$ à $\frac{1}{30}''$ en diamètre), pareils à ceux que nous avons vus se développer, et, comme eux, avec 8 tentacules (fig. 25, 26); d'autres, de $\frac{1}{16}$ à $\frac{1}{12}''$ en diamètre, avec 10 à 12 tentacules (fig. 27, 28); d'autres enfin, d'un $\frac{1}{10}''$ à $\frac{1}{5}''$, avec des tentacules dont le nombre montait jusqu'à trente (fig. 25, 30, 31). Le nombre des tentacules est, en effet, très peu déterminé et n'est guère le même chez deux individus; c'est ainsi que, chez quatre individus différens, je comptais 19, 23, 24 et 30, tous très minces, filiformes, aigus à leur extrémité. (2)

Autour de la bouche qui dans son état de contraction se montre comme une fossette ou ramassée en quatre plicatures (fig. 31), on voit vers le bord, là où les tentacules forment un cercle, l'apparence de quatre trous arrondis, égaux entre eux, et situés à égale distance les uns des autres (fig. 31, *a*). Mais ces parties, qui paraissent être des trous, ne sont autre chose que les quatre éminences dont nous allons parler, lesquelles sont saillantes dans l'intérieur de la cavité du corps, et sont visibles à travers les tégumens communs.

La bouche peut s'ouvrir d'une manière extraordinaire, de sorte qu'elle devient aussi large que le corps (fig. 32) et tout-à-fait circulaire. On voit alors, et mieux encore quand on coupe le polype longitudinalement, que le corps est, à l'intérieur, tout-à-fait creux et vide, à l'exception des éminences saillantes et convexes mentionnées plus haut, et placées à égales distances les unes des autres le long des parois internes, depuis le haut jusqu'en bas (fig. 32, 33). Ces éminences ne paraissent être autre chose qu'une duplicature de la membrane

(1) A cette occasion, je dois remarquer que le dessinateur qui a fait les figures jointes à mon Mémoire, souvent cité, a représenté en fig. 7, *a*, *b*, *d*, *e* les extrémités des tentacules comme si elles étaient épaisses, au lieu de les faire minces et pointues comme elles doivent être.

(2) *Note postér.* On voit maintenant que la multiplication de bras ou de tentacules observée par V. Siebold (lieu cité, p. 32) et par moi, n'est pas monstrueuse mais normale. Et on ne doit pas s'étonner que des individus, renfermés dans des vases, et par conséquent privés en grande partie de leur nourriture naturelle, sont si peu disposés à augmenter le nombre de leurs tentacules et à poursuivre leurs métamorphoses successives.

interne du corps; leur usage m'est inconnu; peut-être elles sont le commencement de la division future en rayons. Des recherches faites avec plus d'exactitude, jetteront peut-être sur ce point quelque lumière. (1)

A l'intérieur de la cavité du corps, je trouvais souvent des Monocles et des petites Crevettes; une fois j'y trouvai un petit Rissoa : tous étaient morts, déformés et digérés.

Mais ce que j'observai de plus remarquable à ce sujet, était la manière dont ces animaux se propagent. Cela a lieu :

1° Par *gemmes* (fig. 37, 41, 42) qui se développent à divers endroits du corps, dont tous les points paraissent propres à cette reproduction. La première trace d'une gemme est une petite éminence arrondie qui devient peu-à-peu plus volumineuse, et se détache de plus en plus du corps de la mère, au moyen d'un pédoncule mince et court; il se forme à son extrémité externe, développée en forme de massue, une ouverture circulaire, la bouche; puis on voit apparaître les tentacules, qui, en petit nombre (4, 6, 8) et très courts d'abord, croissent plus tard en nombre et en longueur. Les gemmes ou les nouveaux polypes deviennent de plus en plus semblables à leur mère, et, quand ils sont devenus mûrs, s'en détachent probablement et se fixent fortement à d'autres corps. Les gemmes les plus grosses que j'ai vues n'excèdent pas le quart ou le tiers de la grosseur de leur mère. J'ai trouvé à-la-fois trois de ces gemmes plus ou moins développées et fortement fixées encore sur le corps de leur mère (fig. 42).

2° Par ce qu'on appelle des *stolons*, qui sortent ordinairement de la base du polype comme un prolongement mince et cylindrique, laquelle après avoir rampé sur une laminaire, s'y attache fortement (fig. 38, 39, 40). A la surface supérieure de ce stolon, et à quelque distance de la mère, un nouveau polype se développe dans une direction verticale. Il se montre d'abord comme une petite éminence ronde (fig. 39, *a*) qui est un peu plus large en diamètre que le stolon; bientôt on y voit s'ouvrir la bouche

(1) Le professeur Weigmann, de Berlin, m'a informé, dans une lettre, qu'il avait observé également ces éminences pendant son séjour sur la côte de la Norwège, dans l'année 1836.

(fig. 38, *a*), puis les tentacules se développent (fig. 40, *a*, *b*) et ressemblent en tout aux gemmes qui croissent immédiatement sur le corps de leur mère. Ordinairement on ne voit qu'un seul de ces stolons sortir de la mère et le plus communément avec une seule, rarement deux de ces gemmes; plus rarement encore on voit deux stolons partir dans deux directions différentes (fig. 40). Parfois on voit croître, sur une des gemmes encore fixées sur le corps de la mère, un stolon qui se développe horizontalement (fig. 37, 42). Il n'est pas rare non plus de voir des stolons prendre naissance à une certaine hauteur sur le corps des polypes (fig. 34, 35, 36, 37), et tantôt ces stolons, devenus épais et coniques, sont comme une division du corps de l'animal, tantôt, au contraire, ils deviennent en peu de temps minces et filiformes (fig. 36). Cette espèce de stolon reste quelquefois libre en dehors du corps des polypes (fig. 37, 34), quelquefois elle se fixe, par son extrémité externe, à une Laminaire, à une Sertulaire, ou à quelque autre corps étranger (fig. 35, 36) (1). Enfin, ces stolons, en réunion avec les gemmes, donnent à ces polypes un aspect bizarre et monstrueux au plus haut degré.

CONCLUSIONS.

Ainsi, les résultats les plus importans auxquels l'étude du développement des Acalèphes a conduit, sont les suivans :

1° Des œufs sphériques contenus dans les ovaires, et sur lesquels on voit la vésicule de Purkinje, la tache (vésicule) de Wagner, et dont le jaune offre la division ou bifurcation ordinaire, donnent naissance à des jeunes ovales ou ovalo-cylindriques, qui sont garnis de cils vibratiles, et qui sont contenus pendant une certaine période de leur développement dans des réceptacles nombreux, lesquels se forment en même temps dans les quatre bras environnant la bouche de leur mère.

2° Puis ces jeunes quittent leur mère et nagent comme des infusoires pendant un certain temps; bientôt après ils se fixent par une de leurs extrémités à un corps étranger sur lequel ils s'accroissent,

(1) *Note postér.* M. Siebold a vu également de semblables stolons sortir du corps des petits polypoïdes de la *Medusa aurita* (lieu cité, p. 33, fig. 36, 37).

tandis que par l'autre ils sont libres; une bouche s'ouvre à cette dernière extrémité, et peu-à-peu autour de cette ouverture se forme une couronne de tentacules.

3° Dans cet état polypoïde, qu'on peut considérer comme un état de larve, ces animaux peuvent se propager par bouture, à la manière des Polypes, c'est-à-dire par gemmes, et par ce qu'on appelle des stolons. Les nouveaux animaux qui se développent ainsi, ressemblent parfaitement aux larves primitives.

4° Enfin, après un espace de temps indéterminé, la larve se divise spontanément en une foule de segmens transversaux (fig. 43, 46), qui tous deviennent de nouveaux animaux(1). Ces derniers (qui ne ressemblent pas à la larve) sont libres, nagent en tous sens, et offrent un corps en forme de disque, dont la périphérie est divisée en huit rayons bifurqués à leurs extrémités; ils ont une bouche quadrangulaire, en forme de tube, et pendante, etc. A mesure qu'ils croissent, les rayons deviennent de plus en plus courts; tandis que les intervalles entre ces rayons augmentent d'étendue, et donnent naissance aux tentacules marginaux, la bouche se divise et se transforme en quatre tentacules buccaux; en un mot, ces animaux deviennent parfaitement semblables à leur mère originaire (la Méduse ou la *Cyanea*).

Ce n'est donc pas la larve ou l'individu développé dans l'œuf, qui se métamorphose en Acalèphe parfait; ce sont les petits qui sont formés par division transversale spontanée. Je ne puis mieux comparer cette métamorphose qu'au développement des Salpas, quoiqu'elle diffère de ce dernier en plusieurs points. Mes nombreuses observations, faites pendant l'automne dernier (que je communiquerai dans une autre occasion), m'ont convaincu que Chamisso (dont les observations pleines de bonne foi ont été si souvent mises en doute par des naturalistes dont les systèmes ne cadrent pas avec elles) a bien saisi leur développement dans tout ce qui est essentiel. Les Salpas

(1) Je dois faire remarquer combien il est rare de rencontrer des Méduses dans la mer à leur état de larve. Cette rareté m'a fait douter d'abord que ces petits polypoïdes puissent appartenir à la *Medusa aurita*, qui est si commune. Peut-être ces jeunes Méduses infusoréiformes se fixent et se développent plus particulièrement à de grandes profondeurs.

ressemblent aux Acalèphes, en ce que ce n'est pas la larve, mais les petits de cette larve qui deviennent des animaux parfaits : ce n'est pas l'individu, mais la race qui se métamorphose.

En finissant, je ne puis m'empêcher de remarquer que les observations de Graham Dalyell (*The Edinb. Philos. Journ.* vol. XXI, 1836), que je ne connais que par Wiegmann (*Jahresberichte*, 1837, tom. II), et par l'*Isis* d'Oken pour 1838 (1), constatent en partie plusieurs de mes observations. Son *Hydrotula* paraît être la larve Acalèphe polypoïde que j'avais décrite, et sur laquelle, lui aussi, a vu des gemmes; il a été également témoin de la division transversale spontanée par laquelle les Acalèphes à rayons (*Strobila*) prennent naissance. Il a figuré deux de ces derniers, l'un avec onze rayons et le second avec huit (*Isis*, Pl. I, fig. 3, 2). (J'en ai trouvé depuis qui en offraient jusqu'à douze, mais chez la plupart, il y en avait huit (*Ouvrage cité*, page 20); la colonne à quatre angles (fig. 2, dans l'*Isis*), que Dalyell représente, à tort, comme prenant naissance et s'élevant sur la surface convexe (2), est la bouche pendante, et à sa base les quatre organes représentés par lui, étaient les quatre plicatures en couronne et leurs tentacules. Mais dans son appréciation des objets qu'il a observés, ses vues s'éloignent des miennes : En février et mars, dit-il, la surface du disque de plusieurs Hydres était couverte de prolongemens pendans et mobiles ayant la forme demi-sphérique renversés et qui se développaient jusqu'à ce qu'il y en avait vingt à trente divergens qui peu-à-peu se détachèrent et devinrent des Acalèphes libres; mais il ne dit pas d'où ces prolongemens venaient, ni quel rapport ils avaient avec l'Hydre, on di-

(1) *Note du traducteur du Mémoire original suédois.* Les observations nouvelles de Dalyell sur la manière de propager des zoophytes de l'Écosse, se trouvent traduites en entier, si je ne me trompe pas, dans les *Notizen* de Froriep, Bd. L, n° 6, et les premières observations de ce même auteur se trouvent également dans ce même recueil, B. XLII, n° 18, mais sous forme d'un court extrait. Dans *l'Isis*, pour l'année 1838, p. 41-54, on trouve ces deux Mémoires, en extrait, l'un tiré du t. XVII du Journal d'Édimbourg, et l'autre du t. XXI du même Journal.

(2) Il a probablement fait l'esquisse de son dessin au moment où le petit Acalèphe, après avoir nagé pendant quelque temps, se laisse lentement tomber au fond, alors certainement sa surface connexe devient concave et contractée.

rait qu'il décrivait le polype comme vivant et donnant naissance aux petits. D'après mes observations, c'est l'animal lui même, la larve polypoïde qui se divise en sections transversales régulières, en commençant par le haut et s'étendant inférieurement jusqu'à la base. A la vérité, je n'ai pas vu comment les tentacules du polype disparaissent, après que toutes les portions transversales sont séparées, ni ce que devient la partie inférieure du pédoncule, mais je crois qu'il est probable que les choses se passent comme je les ai représentées : toujours est-il que mes observations sont en contradiction avec celles de Dalyell, quand il dit qu'après la disparition des prolongemens mentionnés le polype croît de nouveau, acquiert de nouveaux tentacules, et reprend sa première apparence et ses premières fonctions : tout cela contredit les faits que j'ai recueillis (voy. mon Mémoire, Pl. III, fig. 7, *a à*, *h*), et me paraissent être les résultats d'une observation imparfaite.

EXPLICATION DES FIGURES DES PLANCHES 15 A, 16 et 17.

Les fig. 1 à 24 représentent le développement de la *Cyanea capillata*, tel qu'il a eu lieu sous mes yeux depuis le 20 jusqu'au 24 octobre 1839. Toutes les figures sont plus ou moins grossies.

Les fig. 1 à 6 montrent le développement de la *Cyanea capillata* dans son premier état ou état infusoriforme.

Fig. 1 à 4 : plusieurs petits qui venaient de quitter les bras buccaux de leur mère et qui maintenant nagent librement dans l'eau. Fig. 1 en représente deux de grandeur naturelle. Fig. 2 : montre l'animal, vu par le côté étroit ; dans les trois autres figures il est représenté vu par le côté large. Fig. 5 et 6 représentent deux des petits qui, le 14 octobre, sont montés à la surface de l'eau et s'y sont fixés ; dans la fig. 5, l'animal est vu obliquement de côté et de haut en bas ; dans la figure 6, il est vu par la face supérieure. Dans ces deux figures on voit clairement la dépression arrondie située sur la grosse extrémité de l'animal ; on ne voit pas dans les figures précédentes cette dépression d'une manière aussi distincte.

Les fig. 7 à 24 représentent la *Cyanea capillata* dans son deuxième état de développement ou l'état polypoïde.

Fig. 7 et 8. Deux des petits, semblables à des infusoires qui, le 14 octobre, s'étaient attachés par la grosse extrémité de leur corps. L'autre extrémité est devenue maintenant plus volumineuse (fig. 8), tandis que la première (comme fig. 9 et 10) est devenue plus mince et s'élargit à la base pour former un disque petit et arrondi par lequel l'animal est fixé. Dans la fig. 10 l'extrémité libre offait déjà la bouche entourée par un bourrelet circulaire. Les fig. 11, 12 et 13 (15 octobre) montrent les quatre bras des tentacules qui se développent originairement sous la forme d'éminences arrondies. Dans la fig. 12 l'animal est vu de côté ; dans les figures 11 et 13, il est vu en dessus, et la bouche est au milieu. Dans les fig. 14, 15 et 16

(15 et 16 octobre) on voit les tentacules se prolonger peu-à-peu et devenir filiformes. Le disque d'attache est visible avec son tube muqueux. Il est à remarquer que les petits, pendant ces changemens perdent leur couleur jaune et deviennent blancs et plus transparens. Dans la figure 13, les tentacules ne sont pas tout-à-fait étendus. Les figures 17, 18, 19, 20, 21 et 22 (le 22 octobre) offrent toutes huit tentacules; dans la fig. 17, l'animal est vu de côté; dans la fig. 18 il est vu en dessus; dans ces deux figures, les tentacules sont rétractés; on voit à la fig. 19 un individu tant soit peu grossi avec des tentacules étendus: il est vu en dessus. La fig. 20 représente le même animal vu de côté; la fig. 20′ est encore le même individu de grandeur naturelle; fig. 21, le même encore, fortement grossi. La fig. 22 montre un individu dont la partie inférieure du corps est mince et allongée; les tentacules sont rétractés. La fig. 23 représente un morceau d'un tentacule étendu, plus grossi que les autres, et figuré pour montrer les petites éminences nombreuses disposées en anneaux. La fig. 24 est un individu (24 octobre) qui, outre les huit tentacules, offrait encore cinq autres inégaux; cette figure est un peu grossie.

Les fig. 25 à 42 représentent l'état de développement polypoïde de la *Medusa aurita* ou de la *Cyanea capillata*, observé par moi, le 9 septembre 1838 (on ne peut dire, avec certitude, auquel des deux animaux appartenaient ces petits).

Dans les fig. 29, 30, 31 et 40, les tentacules sont étendus; dans toutes les autres ils sont rétractés.

La fig. 25 représente un individu avec huit tentacules de grandeur naturelle; la fig. 26 est le même, grossi et vu en dessus; à la fig. 27 est un autre individu pourvu de dix tentacules et représenté de grandeur naturelle; à la fig. 28 est le même individu, grossi et vu en dessus. La fig. 29 montre un autre individu avec trente tentacules et vu de côté, de grandeur naturelle. A la fig. 30, le même individu est représenté vu par sa partie supérieure, et à la fig. 31, le même grossi; on voit, au milieu, la bouche assez rétractée, et, près du bord, les quatre éminences internes (*a*), vues à travers les tégumens. A la fig. 32 on voit un de ces animaux avec la bouche ouverte; elle est aussi large que le corps; on voit, dans sa cavité, les quatre éminences. La fig. 33 représente le même individu coupé dans le sens de la longueur et étalé pour montrer les quatre éminences longitudinales; les lignes transversales sont le résultat de la contraction du corps.

Les fig. 34, 35 et 36 représentent des stolons qui naissent vers le haut du corps des Polypes; à la fig. 35, l'extrémité d'un stolon s'attache à une Laminaire; et à la fig. 36, un autre se fixe à une Sertulaire; la fig. 37 montre un stolon analogue, avec une gemme, de laquelle sort également un autre stolon.

Les fig. 38, 39 et 40 représentent des stolons qui croissent de la base des polypes, rampent le long des Laminaires, et donnent naissance à de nouveaux polypes (*a*, *a*, *a*). A la figure 39, on voit l'origine d'un jeune polype sous la forme d'une éminence petite et arrondie. A la fig. 38, *a*, cette éminence est déjà pourvue d'une bouche arrondie. On voit, à la fig. 40 (*a*) le commencement des tentacules, en forme d'éminences rondes; et à cette même figure (*b*), on peut apercevoir un jeune polype, assez bien développé, avec des tentacules filiformes.

Les fig. 41 et 42 montrent des gemmes qui se développent; à la fig. 41 on voit deux gemmes peu développés et un stolon qui se dirige en dehors et est libre à son extrémité. A la fig. 42, il y a trois gemmes, dont deux sont développées jusqu'à l'état de polype avec des tentacules filiformes; une d'elles est déjà pourvue d'un stolon qui en procède; elle est analogue, à cet égard, à celle qui est représentée à la fig. 37.

Les fig. 43, 44, 45, 46, 47 et 48 sont copiées de la Pl. III de mon Mémoire, souvent cité ci-dessus, et montrant la transformation de l'état polypoïde au troisième état, ou état d'Acalèphe, comme je l'ai observé en août 1830.

A la fig. 43 est une larve polypoïde grossie (le trait 43 indique la grandeur naturelle), dont le corps se trouve entouré de rides transversales; la fig. 44 représente le même plus développé et se trouvant surmonté de rayons arrondis, bifurqués à leur extrémité. A la fig. 45 on voit une semblable larve de grandeur naturelle; ses tentacules ont disparu, et son corps est divisé en environ quatorze segmens transversaux qui, plus tard, se détacheront un à un, et de haut en bas. A la figure 46 est un autre individu, grossi, qui n'a que quatre segmens transversaux, dont les trois supérieurs sont sur le point de se détacher. La fig. 47 montre un pareil segment transversal, détaché (un *Strobila* libre) nageant librement; il est vu par sa face inférieure, et montre dans son milieu une bouche quadrangulaire, autour de laquelle les tentacules des plicatures en couronne se voient à travers la peau; plus loin on observe la division des canaux qui procèdent de la bouche et tels que mon dessin original, fait en 1830, les a dépeints; plus loin encore, les huit rayons qui se bifurquent, et leurs corpuscules marginaux; le trait fig. 47 montre la grandeur naturelle; la fig. 48 représente le même, au profil, la bouche allongée et pendante, se voit, inférieurement.

Les fig. 49 à 61 montrent comment les jeunes Acalèphes, devenus libres (*Strobila*) prennent les caractères de la *Medusa aurita*, d'après mes observations faites dans le printemps de l'année 1837.

La fig. 49 représente un petit, nageant à l'état de liberté, en tout semblable à celui de la fig. 47, de grandeur naturelle et vu en dessous; on le voit grossi à la fig. 50. A la fig. 51 est un individu plus développé, en *a* il est vu d'en bas, en *b* de profil et en *c* il est également de profil, mais contracté. La fig. 52 est une partie de ce même animal, grossie et vue d'en dessous. Les rayons sont devenus plus courts; leurs intervalles, plus larges et garnis, vers les bords d'éminences nombreuses dont celle du milieu a déjà pris la forme d'un tentacule filiforme; les angles de la bouche montrent des tentacules buccaux, qui y prennent leur origine. La fig. 55 est encore une autre portion du même animal, plus fortement grossie.

La fig. 56 est un animal encore plus développé, et à la fig. 57 on en voit une portion grossie; les rayons sont devenus encore plus courts et sont limités à un espace plus étroit; les tentacules marginaux sont plus nombreux; on observe comment de nouveaux canaux se développent de dehors en dedans et se réunissent, peu-à-peu, avec les canaux primitifs. A la fig. 58 est la bouche du même animal, vue de côté et grossie; on voit comment elle commence à se diviser en quatre lobules, qui deviendront les quatre gros bras buccaux. La fig. 59 montre un de ces lobules ou bras futurs, dont les tentacules se trouvent disposés sur les deux bords internes. La fig. 60 est un corpuscule marginal fortement grossi et vu en dessous. La fig. 61 est la *Medusa aurita* complétement développée et vue de côté, avec ses quatre bras buccaux, pendans et parfaitement fendus, et garnie de ses nombreux tentacules marginaux étalés.

La fig. 62 représente un jeune *Cyanea capillata*, vu d'en haut et de grandeur naturelle. A la fig. 63, le même animal est figuré de profil; la bouche est quadrangulaire, un peu fendue ou divisée en quatre lobules; les tentacules marginaux sont très longs et pendans; et la fig. 64 en est une partie grossie et vue en dessous. On voit au milieu la bouche qui, extérieurement, est divisée en quatre lobules; autour d'elle viennent les tentacules des plicatures en couronne qui sont vues à travers les tégumens; plus loin, sous la forme d'éminences, se voient les tentacules marginaux, dont le médian est déjà devenu un tentacule long et filiforme.

Recherches anatomiques *sur la structure des membranes muqueuses* (5e Mémoire),

Par M. Flourens.

(Présentées à l'Académie des Sciences, le 29 novembre 1841.)

J'ai fait connaître, par mes précédens Mémoires, d'abord, la structure de la peau, soit dans l'homme de race blanche, soit dans l'homme de race colorée (1); et ensuite la structure des membranes muqueuses de la langue (2), de la bouche, de l'œsophage et des intestins (3). Je fais connaître, par celui-ci, la structure de la membrane muqueuse du nez, de celle de la trachée-artère, et de celle de la vessie.

Je commence cette nouvelle suite d'études par l'étude de la membrane muqueuse du nez ou *pituitaire.*

La structure intime de la membrane *pituitaire* est encore, aujourd'hui même, très peu connue.

Vers le milieu du dix-septième siècle, Schneider détruit l'erreur ancienne qui faisait descendre la *pituite* du cerveau, et montre, dans la membrane muqueuse du nez, qu'il nomme pour cela même *membrane pituitaire*, le véritable organe de la sécrétion de la *morve* ou *pituite.* (4)

Bientôt après, Ruysch distingue et sépare de la membrane muqueuse proprement dite le périoste qui recouvre les os du nez (5)

Haller, un des premiers, parle de l'épiderme de la membrane

(1) Voyez *Annales des Sciences Naturelles*, tome VII, page 156.

(2) *Ibid.*, tome VII, page 219.

(3) *Ibid.*, tome XI, page 282.

(4) Conradus Victor Schneider: *De Catarrhis*, etc..... *Illa membrana pituitam condit, continet et emittit*; lib. III, cap. 8.

(5) Et le périchondre qui en recouvre les cartilages. *Præterea consideratione dignum judico, septum narium cartilagineum, non solum investiri membrana mucosa, verum quoque sub hac immediate membranula tenuissima. Hæc continuatio est periostii, nasi partem osseam obducentis, atque perichondrum dici meretur*; epist. VIII.

pituitaire (1); mais ni Bichat, ni Meckel, ni Béclard, venus après Haller, n'en parlent plus.

Bichat paraît ne voir, comme Ruysch, dans la membrane *pituitaire*, que deux feuillets, dont l'un est le périoste même et l'autre le *feuillet muqueux* (2). Meckel n'en dit pas plus que Bichat (3); et Béclard se borne à dire que : « dans certaines « parties, comme les fosses nasales..., la diminution de l'appa- « rence de l'épithélium est graduelle, insensible, et qu'il est « impossible d'en assigner exactement les limites. (4)

Ainsi, Bichat et Meckel ne parlent que du chorion, du derme de la membrane *pituitaire*; Béclard ne parle que de l'épiderme des bords extérieurs de cette membrane; et nul ne parle du *corps muqueux*, de ce *corps*, de cette *lame* particulière, qui, comme on l'a déjà vu par mes précédens Mémoires, et comme on va le voir encore par celui-ci, s'interpose toujours, dans toute membrane muqueuse, entre le derme et l'épiderme.

Trois lames superposées constituent donc toute membrane muqueuse; et ces trois lames se voient, en effet avec évidence, sur la pièce n° 1, que je mets sous les yeux de l'Académie.

Cette pièce est un morceau de la membrane pituitaire d'un cheval, et de la portion même de cette membrane qui recouvre les cornets du nez. On voit, sur cette pièce, au fond : le derme tout sillonné de lignes, lesquelles sont disposées comme les nervures d'une feuille; devant le derme est une membrane fine, qui est la *lame muqueuse* ou le *corps muqueux*; et, devant le corps muqueux, est une lame plus fine encore qui est l'épiderme.

Le derme, le corps muqueux et l'épiderme existent donc,

(1) *Suam habet sibi superjectam epidermidem*, dit-il (*Elementa Physiologiæ*, etc., tome v, page 144); mais, ce qui est singulier, c'est que, à l'appui de cette assertion, il cite Winslow, lequel a écrit cette phrase confuse : « Vers le bord des narines externes, la membrane pitui- « taire est très mince, et y paraît comme un tissu dégénéré de la peau et de l'épiderme. » *Exposition anatomique de la structure du corps humain; Traité de la tête;* n° 336.

(2) « Un feuillet fibreux, qui est le périoste ou le périchondre des cavités nasales, se joint, « dit Bichat, au feuillet muqueux pour former la membrane pituitaire..... Le feuillet mu- « queux, dit-il encore, épais, spongieux et mou, est formé d'un chorion très prononcé qui « lui donne cette épaisseur. » *Anatomie descriptive;* tome II, page 573.

(3) *Manuel d'Anatomie*, tome III, page 279.

(4) *Éléments d'Anatomie générale*, etc.; page 256.

réunis et superposés l'un sur l'autre, dans la membrane muqueuse du nez ou *pituitaire*.

Je passe à la membrane muqueuse de la trachée-artère.

La structure de cette nouvelle membrane n'est pas mieux connue que celle de la membrane *pituitaire*. Haller y admet un épiderme (1) que Bichat nie. Bichat dit formellement que : « dans aucune partie de la membrane muqueuse des voies aériennes, on ne peut démontrer l'existence de l'épiderme. » (2)

Or, je montre ici, sur les pièces nos 2 et 3, et l'épiderme, et le corps muqueux et le derme de la membrane muqueuse de la trachée-artère.

Ces deux pièces sont deux morceaux de la trachée-artère d'un Cheval. On voit l'épiderme sur la première. L'épiderme manque sur la seconde ; mais on y voit deux lames détachées et superposées : l'antérieure est la *lame muqueuse* ou le *corps muqueux ;* la postérieure est le derme.

La membrane muqueuse de la trachée-artère, a donc, comme la membrane muqueuse du nez, comme toutes les membranes muqueuses étudiées par moi jusqu'ici, un derme, un corps muqueux et un épiderme.

Il en est de même de la membrane muqueuse de la vessie.

La pièce n° 4, que je mets sous les yeux de l'Académie, est la vessie d'un lapin. On voit clairement, sur cette vessie, trois lames, toutes trois d'une finesse extrême, et placées l'une sur l'autre : l'antérieure ou la plus fine, est l'épiderme ; puis vient la *lame muqueuse ;* puis vient le derme ; et derrière le derme, est la *membrane* ou plutôt la couche musculaire de la vessie.

(1) *Epidermis est levis, sui similis, simplex. . . . . Eam in funesta puerorum angina frequenter ægroti reddunt. Elem. Physiolog.*, tome III, page 148.

(2) *Anatomie descriptive*, tome IV, page 56. « L'unique preuve, ajoute-t-il, que l'on « puisse acquérir ici de l'existence de l'épiderme, se tire des cas pathologiques où des fragmens membraneux ont été rendus par expectoration. Haller en cite plusieurs, et n'admet « que d'après cela un épiderme muqueux pulmonaire. Mais cette preuve est insuffisante, ces « lambeaux pouvant être analogues aux eschares plus ou moins profondes produites sur la « peau par les brûlures, etc. »

L'épiderme de la vessie avait été déjà vu par Haller (1); il avait été vu par Ruysch (2); mais Haller, mais Ruysch paraissent ne l'avoir vu qu'à la suite de lésions ou de maladies de la vessie, qu'à la suite de *cas pathologiques*. Or, je le montre ici isolé, détaché du reste de la membrane par un procédé régulier, méthodique, sûr; et je ne montre pas seulement l'épiderme, je montre l'épiderme, le corps muqueux et le derme de la vessie.

Les membranes muqueuses ont donc toutes une même et fondamentale structure; et cette structure est complexe. Aucune membrane muqueuse n'est simple. Toute membrane muqueuse, quelque mince, quelque fine qu'elle soit, a toujours trois lames ou membranes distinctes : un épiderme, un corps muqueux et un derme.

Et cela va si loin, qu'il n'est pas jusqu'à la membrane interne des artères (membrane déjà classée en effet, par quelques anatomistes, parmi les membranes muqueuses) (3) qui n'offre les trois lames ou membranes distinctes et superposées dont je parle.

La pièce n° 5, que je mets sous les yeux de l'Académie, est une portion de l'aorte d'un bœuf.

On voit, sur cette pièce, trois lames détachées et superposées : la première, et la plus fine, est l'épiderme; la seconde est la *lame muqueuse*, le corps muqueux; et la troisième est le derme. Derrière le derme est la *membrane* propre, la *membrane fibreuse* ou *moyenne* des artères.

(1) *Membrana vesicæ nervea. . ., ex cute evidenter continuata, præcipua est vesicæ tunica. . Intima membrana, levissima. . . , tenuior quam nervea, epidermidis est propago. . . . Cum epidermide, cui continuatur, id habet commune, ut secedat de nervea, deque corpore exeat. . . . , et perinde renascatur.* Elementa Physiologiæ, etc.; tome VII, page 326.

(2) *Pauca superaddo de interiore membrana, quæ vesicæ urinariæ cavitatem urinæ contiguam facit. De qua imprimis notasse juvet portionem ejus, a reliqua separatam, posse per vias urinæ excerni.* Adversarior. anatomic. Decas secunda, p. 24.

(3) Bichat, *Anatomie générale*, tome II, page 52, dit : « Quelle est la nature de cette membrane (*membrane interne* ou *commune* des artères)? Je l'ignore entièrement. » — « On l'a comparée, dit Béclard, aux membranes séreuses et au tissu muqueux ou cellulaire. . . . ; « c'est à l'arachnoïde qu'elle est le plus comparable. » *Élémens d'Anatomie génér.*, p. 371. Les anatomistes, plus récens, qui l'ont comparée aux membranes muqueuses, ont, comme on voit, rencontré plus juste.

Trois lames constituent donc, comme je viens de le dire, toute membrane muqueuse, et ces trois lames peuvent être complètement isolées et détachées l'une de l'autre par une macération lente et méthodiquement ménagée.

Cette macération méthodique est même le seul procédé qui les donne ; et jamais peut-être n'a-t-on mieux vu que par cet exemple combien est radicale et profonde l'influence de la méthode en fait d'anatomie de structure.

Malpighi se servait du procédé de l'ébullition pour détacher les unes des autres les lames constitutives des membranes muqueuses ; et ce procédé lui donnait le *réseau muqueux* de la langue.

Je me sers du procédé d'une macération lente et méthodiquement ménagée, et ce procédé me donne, au lieu d'un *réseau*, une *lame continue* et entière.

J'ai fait voir, dans un précédent Mémoire (1), que le *réseau de Malpighi*, ce *réseau* si fameux en anatomie, n'est qu'un *réseau factice* : le *corps muqueux* de la langue est essentiellement une *lame continue* et entière.

Les trous qui transforment cette *lame continue* en *réseau*, sont dus à l'arrachement des gaînes que le corps muqueux fournit aux papilles du derme.

Chaque papille du derme a en effet, comme je l'ai fait voir (2), une double gaîne : une gaîne fournie par le corps muqueux, et une gaîne fournie par l'épiderme.

Or, quand on emploie le procédé de l'ébullition, comme Malpighi, l'épiderme se crispe et se contracte. Chaque gaîne du corps muqueux se trouve prise et serrée dans chaque gaîne de l'épiderme. Et quand on enlève l'épiderme, toutes ces gaînes du corps muqueux, serrées par autant de gaînes de l'épiderme, sont arrachées et le suivent. Partout donc où était d'abord une gaîne muqueuse est maintenant un trou, et le corps muqueux tout entier, qui formait d'abord une *lame continue*, ne forme plus maintenant qu'un *réseau*.

(1) Voyez *Annales des Sciences médicales*, tome IV, page 445.
(2) *Ibid.*

Je montre dans la pièce n° 6 une langue de bœuf préparée d'après le procédé de l'ébullition, ou de Malpighi. On y voit le magnifique, mais factice *réseau* de ce grand anatomiste.

La pièce n° 7 est une langue de veau, préparée d'après mon procédé. Le corps muqueux y forme une *lame continue* et entière. Cette pièce n° 7 montre cette *lame continue* par sa face externe. La pièce n° 8, préparation faite sur une langue de bœuf, montre cette même *lame continue* par sa face interne.

La pièce n° 9 montre, sur une langue de mouton, le derme, le *corps muqueux continu* et l'épiderme.

NOTE *sur le* DICÉRAS, *par le professeur* ESCHRICHT. (1)

Tout le monde connaît les discussions nombreuses qui s'élevèrent au sujet de la découverte d'un Entozoaire singulier faite en 1801, par M. Sultzer, alors prosecteur à l'école spéciale de médecine de Strasbourg, et aujourd'hui médecin praticien à Barr (Bas-Rhin). La plupart des helminthologistes doutèrent de l'exactitude de ses observations, et, malgré les détails remarquables, fournis par notre compatriote, sur l'organisation de cet animal, ils refusèrent de lui donner une place parmi les Entozoaires, alléguant pour tout motif qu'ils ne l'avaient pas vu!

En 1818, M. le docteur Lesauvage, de Caen, annonça qu'il avait retrouvé le ver de Sultzer (*Bulletin de la Faculté de médecine de Paris*, tom. VI, p. 115); mais son Mémoire resté, pour ainsi dire, inconnu, ne suffit pas encore pour dissiper les doutes de plusieurs des helminthologistes.

L'article suivant, que nous trouvons dans les Archives de Müller, suffira-t-il pour ôter tout scrupule à nos sceptiques? Nous avons lieu de le croire, à moins qu'on ne s'obstine à fermer les yeux en présence des faits les plus évidens. Voici cet article, extrait d'une lettre adressée par le professeur Eschricht, de Copenhague, au professeur J. Müller :

« J'ai reçu, il y a quelques mois, de mon ami M. Grove,

(1) Traduit par M. Lereboullet. (*Muller's Archiv.*, 1841, n. 5, p. 437.)

médecin cantonal (Landphysicus) à Rænne, dans l'île Bornholm, un flacon renfermant quelques vers rendus en quantité prodigieuse par sa petite fille, à la suite d'une grave maladie, et dont il me priait de lui indiquer le nom, attendu qu'il ne les connaissait pas. On se représentera mon étonnement, quand je reconnus de suite la figure de l'un des pseudohelminthes donnés par Bremser, sur le frontispice de son ouvrage, *sur les vers qui vivent dans le corps de l'homme* (Lebende Würmer im lebenden menschen) : c'était le *Ditrachyceros* ou le *Diceras rude* Rud. de Sultzer de Strasbourg. Je m'empressai de prendre une connaissance plus exacte de la monographie de ce médecin, intitulée : *Dissertation sur un ver intestinal nouvellement découvert et décrit sous le nom de bicorne rude, par Charles Sultzer;* Strasbourg et Paris, 1808 (1), mon intention étant de donner une description détaillée de cet helminthe si singulier. Mais, à mon grand étonnement j'ai trouvé, dans cette monographie trop peu connue, une description anatomique si complète de l'animal, que je dois la regarder comme le travail helminthologique le plus complet qui ait paru avant l'ouvrage de Mehlis sur les Douves, et que j'ai peu d'espoir d'y ajouter quelque chose d'essentiel. Bremser, dans l'ouvrage que j'ai cité, regarde ces animaux comme des semences qui auraient été avalées, et ajoute : « Celui qui lira avec attention tout ce que Sultzer dit de sa « structure extérieure et intérieure (car il l'a aussi disséqué), « et qui aura soin, en outre, de comparer les figures aux descrip- « tions, ne trouvera pas peut-être cette opinion trop ridicule. » Pour moi je trouve, au contraire, cette opinion très hasardée, puisque Bremser n'était ni phytotomiste, ni helminthotomiste, *et en même temps très imprudente, attendu que le jugement d'une aussi grande autorité en helminthologie devait avoir une influence décisive sur le sort de la dissertation et sur son auteur. Malheureusement ce jugement téméraire et imprudent était entièrement faux.* Le *Diceras rude* est réellement un Entozoaire, qu'il puisse ou non s'adapter au système de Rudolphi, et ce ver est exactement, à l'extérieur comme à l'intérieur, tel que Sultzer

(1) Il y a ici erreur typographique, sans doute; c'est en 1801 qu'il faut lire.

l'a décrit, car Sultzer l'a disséqué avec le plus grand soin. Comment se fait-il que ce ver, que l'on a trouvé deux fois en quantité prodigieuse, n'ait encore été rencontré que ces deux fois, savoir, près de Strasbourg en 1801 et sur l'île Bornholm en 1811 (1)? C'est ce dont il est difficile de se rendre compte, surtout pour moi et pour d'autres, qui ne croient pas à la génération spontanée. »

NÉCROLOGIE.

JEAN-VICTOR AUDOUIN,

Membre de l'Institut de France (Académie des Sciences) et de la Légion d'Honneur; Professeur-administrateur au Muséum d'Histoire Naturelle; Docteur en médecine; Membre de la Société royale d'Agriculture, de la Société Philomatique de Paris; de la Société Entomologique de France; de la Société royale académique de Caen, des Sociétés Linnéennes de Bordeaux et du Calvados, des Sociétés académiques de la Loire-Inférieure et d'Arras, de l'Académie des Sciences d'Aix, de la Société des Sciences de Lille, de la Société Philomatique de Perpignan, des Sociétés d'Agriculture de la Drôme, de la Marne, de Lyon, de la Charente-Inférieure, du département de Seine-et-Oise et d'Aurillac, du Cercle médical de Vassy, de l'Académie de Médecine de Marseille; de l'Académie des Sciences de Stockholm, de la Société des Curieux de la Nature de Moscou, de l'Académie royale de Turin, du Lycée des Sciences naturelles de New-York, des Sociétés Géologique et Entomologique de Londres, de la Société des Sciences physiques et naturelles de Genève, de l'Académie des Sciences naturelles de Philadelphie, des Sociétés d'Histoire naturelle de Hartford, de l'île Maurice et de Hall, de l'Académie des Géorgophiles de Florence, de la Société d'Agriculture de Turin et de la Société de Médecine de Gand.

DÉCÉDÉ LE 9 *NOVEMBRE* 1841.

Les *Annales des Sciences naturelles* manqueraient à leur mission et aux devoirs qu'impose la reconnaissance, si elles omettaient de faire part à leurs lecteurs de la mort de l'un des fondateurs de ce recueil, et d'enregistrer sommairement les nombreux travaux par lesquels ce savant s'était acquis le rang élevé qu'il occupait parmi les zoologistes de nos jours. Cette perte est encore trop récente pour que les rédacteurs des

(1) M. Eschricht n'a pas connu, à ce qu'il paraît, la note du docteur Lesauvage, de Caen, publiée, comme nous l'avons dit plus haut, dans le Bulletin de la Faculté de Médecine de Paris.

Annales puissent donner la biographie de leur collaborateur ; et d'ailleurs, les liens qui les unissaient à lui ne leur permettent pas de se porter juges de ses titres scientifiques : l'Académie remplira plus tard ce devoir ; et ici nous nous bornerons à donner une simple liste de ses œuvres, et à transcrire les expressions de regret déposées sur les bords de sa tombe par ses collègues et ses amis.

DISCOURS DE M. SERRES,

Président de l'Académie des Sciences.

Messieurs,

Lorsqu'un homme a rempli sa tâche scientifique, quand le temps lui a permis de se dévoiler tout entier devant ses contemporains, sa mort est toujours un grand malheur sans doute, mais ce n'est plus qu'un malheur privé.

Lorsqu'au contraire la mort frappe un savant dans la vigueur de l'âge, dans toute la force de son talent, lorsqu'elle le saisit au moment même où il allait féconder des matériaux immenses péniblement recueillis, alors, Messieurs, on ne peut se défendre d'un sentiment doublement triste, car la perte est double en effet, puisqu'elle frappe à-la-fois la science et la société.

Tel a été le sort du jeune et savant collègue dont nous déplorons aujourd'hui la fin prématurée; tel a été le sort de M. Victor Audouin, si regrettable pour ce qu'il avait déjà produit dans les sciences, plus regrettable encore par les travaux inachevés qu'il laisse après lui.

Confiant à une voix plus éloquente que la nôtre le soin de tracer les phases d'une carrière scientifique tout à-la-fois si courte et si bien remplie, peu de mots nous suffiront pour exprimer la vive douleur de l'Académie des sciences, frappée coup sur coup dans ceux de ses membres qui, comme Savart, Savary et Audouin, avaient encore devant eux un si long avenir.

Dès son entrée dans la vie, M. Audouin, que sa famille destinait au barreau, tourna ses regards vers la médecine. Il voyait dans cette belle science un champ immense pour l'activité de

son esprit, et dans son application à l'humanité souffrante un aliment pour les besoins de son cœur. Mais quoique ses études médicales aient été des plus brillantes, quoiqu'il les ait couronnées à son doctorat par une page qui ne s'effacera jamais de la médecine (l'Histoire naturelle et médicale des cantharides), une vocation presque irrésistible l'entraînait vers l'étude de la zoologie, et cette vocation fut favorisée par les nobles encouragemens qu'il avait sous les yeux. Alors, en effet, les Cuvier, les Geoffroy Saint-Hilaire, les Brongniart recherchaient la jeunesse studieuse avec autant de soin qu'ils en étaient recherchés eux-mêmes, car le froid égoïsme de notre époque n'a pas pénétré chez les savans.

Encore élève, M. Audouin révéla toute l'originalité, toute la portée de son talent, par une de ces idées hardies qui commandent à ceux qui les conçoivent. Avant lui, les entomologistes avaient remarqué les différences que présentent les zones diverses dont se composent les animaux articulés, M. Audouin fut frappé de leur analogie.

Pour établir leurs caractères différentiels, les entomologistes s'étaient trop exclusivement renfermés dans les considérations extérieures de ces animaux. Pour dévoiler leur analogie, M. Audouin fut obligé de pénétrer plus avant qu'on ne l'avait fait dans leur organisation intime : il fut obligé de se livrer à des recherches nombreuses pour les fonder sur des comparaisons multipliées et sur des rapprochemens ingénieux souvent pleins d'évidence; en un mot, il fut anatomiste et zoologiste tout à-la-fois. Ses connaissances profondes dans l'anatomie de l'homme percent, en effet, à chaque instant dans ses nombreux Mémoires sur l'organisation des *Annélides*, des *Insectes* et des *Crustacés*.

Le premier Mémoire de M. Audouin date de 1818; son second, sur la comparaison du squelette tégumentaire des animaux articulés, parut en 1820, et reçut l'assentiment de l'Académie des sciences, par l'organe de notre illustre Cuvier, si excellent juge sur cette matière. Un an plus tard, il publiait ses découvertes anatomiques et physiologiques sur la génération des insectes; découvertes qui à elles seules suffiraient pour lui assigner un rang très honorable dans les sciences.

De l'organisation des Insectes, M. Audouin passa à celle des Crustacés, moins connue encore, et, en 1828, l'Académie des sciences couronna un travail qu'il avait fait sur ce sujet avec son excellent ami, M. Milne Edwards. Enfin, vers la même époque, il commença à se livrer à la publication des recherches qu'il a faites sur les *Annélides* des côtes de France, travail plein de vues élevées, auquel l'avaient si bien préparé ses études approfondies sur les larves des Insectes, qui ne sont que des Annélides d'une autre espèce.

Dès-lors la réputation de notre jeune savant fut établie; mais il l'avait acquise aux dépens de sa santé, quand s'ouvrit devant lui, en 1826, la carrière de l'enseignement. Ce fut là qu'il montra toutes les richesses scientifiques qu'il avait accumulées, toute la sagacité qu'il y avait dans ses aperçus sur l'anatomie comparée, toute la finesse qu'il portait dans les observations si difficiles et si délicates dont se compose l'étude des animaux sans vertèbres, qu'il était appelé à professer. Il le fit d'abord, en qualité de suppléant de MM. de Lamarck et Latreille, puis il fut nommé professeur au Muséum en 1833. L'éclat que prit, sous sa direction, le cours d'entomologie, fut pour M. Audouin la plus douce récompense de ses nombreux travaux.

Ce fut pendant son enseignement, et peut-être à cause même de cet enseignement, que M. Audouin sortit l'entomologie du cercle trop étroit où on l'avait renfermée, pour l'appliquer aux besoins de l'agriculture; car si le but de l'agriculture consiste à faire produire à la terre le plus possible, M. Audouin montra par ses nouveaux travaux que, pour atteindre ce but, il fallait conserver le plus possible aussi ce que la terre produit.

En 1838, ses recherches si neuves sur les insectes nuisibles à l'agriculture lui ouvrirent, dans cette section, son entrée à l'Académie royale des sciences, où sa place était marquée depuis long-temps.

On n'a pas oublié, à cette occasion, l'intérêt et l'utilité de son travail sur la *Muscardine*, espèce de champignon parasite qui produit de si grands ravages sur les vers à soie; on n'a pas oublié ses travaux importans sur les *Termites*, petit insecte qui ronge les bois et qui menace de destruction les constructions

des ports de la Rochelle et de Rochefort; on oubliera encore moins son remarquable ouvrage sur un insecte nommé *Pyrale*, qui occasionne annuellement de si grandes pertes dans les vignobles du Mâconnais, et dont il a appris à se rendre maître. Enfin, il y a quelques semaines à peine, M. Audouin parcourait le midi de la France, pour reconnaître les insectes qui nuisent à la culture de l'olivier, qui forme une partie des richesses de cette contrée. C'est au moment où il se livrait avec ardeur à ces nouveaux travaux, c'est au milieu de ce noble dévoûment à l'intérêt public, que notre digne collègue a puisé le germe de la maladie qui l'a enlevé si jeune encore aux sciences dont il a reculé les limites, et à sa famille dont il complétait le bonheur par l'élévation de son âme et les qualités inappréciables de son cœur. Puissent les vifs regrets que je dépose sur sa tombe, au nom de l'Académie royale des sciences, contribuer à adoucir, pour cette famille si honorable, l'amertume d'une perte si inattendue! Puisse la voix de l'amitié pénétrer encore jusqu'à lui, pour lui porter les témoignages de l'affliction profonde de tous ceux qui, comme moi, ont pu l'apprécier et le connaître!

DISCOURS DE M. CHEVREUL,

Directeur du Muséum d'Histoire naturelle,

Au nom du Muséum et de la Société royale et centrale d'agriculture.

Messieurs,

Lorsque nous perdons un confrère qui a fourni toute l'étendue de la carrière qu'il est donné à l'homme de parcourir, lorsque nous ne devons plus revoir celui qui a payé à la science tout ce qu'elle attendait de lui, parce qu'il a eu le loisir de mettre la dernière main à ses travaux pour leur imprimer la forme la plus favorable aux vérités qu'ils établissent, le dernier adieu que nous prononçons sur sa tombe entr'ouverte est toujours douloureux sans doute; mais la réflexion, née de la triste condition où nous sommes tous, sans exception, de faire place à ceux qui nous suivent dans la vie, vient tempérer souvent l'amertume

dès regrets que nous inspire la perte de celui qui nous y a dès long-temps précédés. Enfin, la pensée d'une dernière séparation peut être adoucie encore, si nous savons que le confrère qui nous manque s'est éteint au milieu des siens, après avoir vu ceux qui lui étaient étroitement unis par les liens du sang, occuper la position que la sollicitude paternelle avait désirée pour chacun d'eux.

Ces réflexions me vinrent tout aussitôt que la nouvelle du triste évènement qui m'a imposé la tâche que je remplis maintenant; elles me préoccupent vivement, lorsqu'il me semble que le privilège de l'âge aurait dû m'affranchir de cette pénible mission : enfin, loin d'être consolantes, elles accroissent les regrets de l'ami de la famille, tout autant que ceux de l'ami de la science!

En effet, Messieurs, n'est-il pas douloureux de voir M. Audouin mourir à quarante-quatre ans, au sein d'une famille qui lui avait donné toutes les affections et tous les biens que peut envier ici-bas l'homme le plus difficile à satisfaire? De tristes pensées ne s'attachent-elles pas au sort de la jeune femme qu'il laisse avec deux enfans en bas âge, qui ne sentiront que plus tard tout ce que la perte d'un père a de grave? Enfin, la revue des travaux scientifiques de notre jeune confrère n'inspire-t-elle pas de vifs regrets, en nous montrant tant de recherches interrompues, qui auraient été menées à bonne fin sans doute, s'il lui eût été donné de les achever, comme il l'a fait pour celles qui lui valurent l'honneur de professer au Muséum et de siéger à l'Académie des sciences?

Jean-Victor Audouin, né à Paris le 27 avril 1797, se sentit de bonne heure le goût de l'histoire naturelle; aussi quitta-t-il bientôt la carrière du barreau, à laquelle sa famille le destinait, pour prendre celle de la médecine, qui le rapprochait de ses études de prédilection, en lui donnant les plus sûrs moyens de les perfectionner par la nécessité même qu'elle lui imposait de savoir l'anatomie et la physiologie de l'homme.

C'est parce qu'il a senti que les recherches d'histoire naturelle, dont l'objet est de connaître la structure et les fonctions des organes d'un animal quelconque, doivent reposer, en défi-

nitive, sur des connaissances puisées à l'étude du corps de l'homme; c'est parce qu'il a senti, en outre, que le naturaliste tenterait vainement de résoudre plusieurs problèmes, s'il renonçait à s'éclairer des lumières de l'anatomie et de la physiologie, que nous voyons M. Audouin, dès son début dans la carrière (1818), subordonner tous ses travaux à cette manière de chercher la solution des questions qu'il veut traiter.

Convaincu de la sûreté des guides qu'il a choisis, il publie, à vingt-trois ans, un travail d'anatomie comparée, remarquable par la nouveauté du sujet et les généralités auxquelles l'induction le conduit. Il ne s'agit de rien moins que de ramener à une composition théorique le squelette tégumentaire des animaux articulés, en partant de la considération des rapports de position et de fonction, et, quand il est possible, de nombre et de forme des diverses parties de ce squelette, afin de définir chacune d'elles aussi rigoureusement que le sont entre eux les os du squelette des animaux vertébrés. Il faut bien que le jeune auteur n'eût pas trop présumé de ses forces ni de ses méthodes, qu'il fût toujours resté fidèle à l'observation, sans se laisser séduire par de trompeuses analogies, puisque son travail obtint une approbation complète de deux hommes éminemment propres à le juger, George Cuvier et Latreille!

Le nom de M. Audouin est encore attaché à des travaux d'histoire naturelle, de physiologie et d'une anatomie délicate et précise, entrepris sur les Crustacés, les Annélides et les Mollusques du littoral de la France; mais il ne s'y trouve pas seul, il est associé à celui de M. Milne Edwards, qui n'a jamais cessé d'être l'ami le plus cher et le plus dévoué de son collaborateur.

Telles sont, Messieurs, les principales recherches qui recommandent au monde savant M. Audouin comme naturaliste observateur. Considérons-le maintenant dans ses relations avec le Muséum d'histoire naturelle. Ce fut en 1827, sur la présentation de Lamarck, fortifiée de l'assentiment de G. Cuvier et de Latreille, qu'il fut désigné par l'assemblée des professeurs-administrateurs pour faire le cours de l'histoire des animaux sans vertèbres. Comme professeur suppléant, il eut tout le succès qu'il pouvait

désirer; aussi, lorsqu'en 1833 M. Latreille, qui depuis deux ans avait succédé à M. Lamarck dans la moitié de ses attributions, laissa vacante par sa mort la chaire d'entomologie, M. Audouin y fut-il nommé sans contestation.

M. Audouin ne s'est pas seulement acquitté de ses devoirs de professeur, mais il a satisfait encore aux obligations que lui imposaient la conservation, la classification et l'accroissement de la vaste collection entomologique confiée à ses soins; notre établissement conservera donc toujours le souvenir du zèle qu'il a déployé dans cette partie des fonctions du professeur-administrateur du Muséum, qui demande à-la-fois une grande activité et une surveillance minutieuse de tous les instans.

En remontant aux premiers travaux de M. Audouin, on voit qu'en s'y livrant il était préoccupé des instincts et des mœurs des animaux qu'il étudiait, et que, loin de borner son rôle de naturaliste à classer les nombreuses espèces qui font de l'entomologie la partie la plus étendue du règne animal, il devait saisir avec ardeur toutes les occasions de considérer l'histoire naturelle des insectes, telle que Réaumur l'avait envisagée dans ses admirables mémoires. Si ce genre d'étude touche à la philosophie générale, en donnant à l'homme la preuve que des actes aussi variés que nombreux sont exécutés par des individus de diverses espèces animales, en vertu d'une cause qui les y porte à leur insu d'une manière fatale, et si la coordination de ces actes, considérée du point de vue le plus élevé, offre la preuve la plus évidente que la perpétuité des espèces fait partie du plan le plus sublime, mais dont le vaste ensemble échappe à la faiblesse de notre intelligence; il faut reconnaître, en descendant de l'abstraction à l'application, que le genre d'étude dont nous parlons se lie aujourd'hui de la manière la plus intime aux progrès de l'industrie et de l'agriculture, ainsi que M. Audouin l'avait parfaitement senti, et c'est pour les hâter qu'il dirigea ses principaux efforts vers ce but, dans les dernières années de sa vie. Il était donc parfaitement préparé, non-seulement à constater l'exactitude des observations de M. Bassi sur la cause de la Muscardine, cette maladie mortelle des vers à soie, mais encore à donner plus de précision à cette belle dé-

couverte, et à en développer plusieurs conséquences qui intéressent à un haut degré la prospérité des magnaneries. Lorsqu'on apprit, à Paris (1838), les ravages qu'un petit insecte avait occasionés dans plusieurs vignobles de la France, M. Audouin se trouva prêt à remplir la mission que M. le ministre de l'agriculture lui donna pour constater, sur les lieux, l'étendue des dégâts, en déterminer la cause, et voir s'il serait possible d'empêcher le retour d'un pareil fléau.

S'il est à regretter que notre confrère n'ait pas achevé la rédaction de ses nombreuses recherches sur ce papillon qui, sous le nom de *Pyrale*, vient à l'improviste porter la désolation dans les pays dont la vigne est la richesse, espérons que les notes de l'auteur permettront de compléter la publication de cet ouvrage. Espérons que beaucoup d'observations qu'il a faites sur d'autres espèces nuisibles à l'olivier, aux arbres verts, aux céréales, etc. pourront être publiées. Il est à désirer que les recherches de M. Audouin aient des continuateurs, auxquels les encouragemens de l'administration supérieure ne manqueront pas sans doute, car l'utilité des travaux propres à approfondir la connaissance des insectes nuisibles est incontestable, lors même qu'il ne serait pas au pouvoir de l'homme d'en détruire à jamais les races.

Les travaux scientifiques de M. Audouin, et la direction qu'il avait donnée à ses études, dans ces derniers temps, pour éclairer l'agriculture, le firent appeler, en 1838, dans la section d'économie rurale de l'Académie des sciences. Quelques années auparavant (1834), la Société royale et centrale d'agriculture l'avait nommé à une de ses places d'associé ordinaire, convaincue qu'elle était de l'utilité des recherches entomologiques pour les progrès des sciences agricoles.

Voilà, Messieurs, les titres de notre jeune confrère à la considération publique : en les rappelant dans ce moment solennel comme un hommage rendu à sa mémoire au nom du Muséum et de la Société royale et centrale d'agriculture, puissions-nous apporter quelque adoucissement à la douleur de sa famille et de ses amis!

DISCOURS DE M. MILNE EDWARDS,

Membre de l'Institut, Président de la Société Philomatique.

Messieurs,

Ce n'est pas au nom de la science que je viens sur les bords de cette tombe vous parler d'Audouin. Il m'appartient moins qu'à tout autre de porter un jugement sur quelques-uns de ses travaux; et les services qu'il a rendus à la zoologie ont déjà été appréciés à leur juste valeur par les représentans des grands corps scientifiques dont il était membre. Mais ici la voix du cœur peut aussi se faire entendre, et une amitié étroite qui date de plus de vingt ans, et qui ne s'est pas démentie un instant, m'impose le douloureux devoir de prendre à mon tour la parole; car, ce n'est pas seulement comme savant que notre collègue est digne de nos regrets : ses vertus morales étaient non moins remarquables que les facultés de son esprit, et notre longue intimité m'a permis de connaître les qualités de son âme, mieux peut-être que toute autre personne étrangère à sa famille.

Sa fin prématurée a rappelé à notre pensée Savart et Savary, que la mort a été choisir dans nos rangs comme elle a choisi Audouin parmi les plus jeunes, les plus ardens au travail et les plus dévoués au culte de la science. Savary, il est vrai, fut long-temps à l'avance averti de ses coups; mais elle frappa Savart d'une manière soudaine au milieu de ses plus nobles travaux, et c'est aussi comme la foudre qu'elle vient d'atteindre Audouin; elle l'arrache de même à ses études quand il touchait au terme qu'il s'était marqué pour leur publication; mais, plus cruelle cette fois, elle l'enlève au sein d'une famille nombreuse et éplorée; elle le poursuit dans les bras d'une compagne chérie; rend orphelins du même coup les enfans que la providence lui avait donnés, et celui que son cœur, non moins ardent que son

intelligence, avait adopté comme un fils et qu'il avait placé au même rang dans son affection.

Ainsi, tout ce qui peut exciter les regrets de la société, tout ce qui peut troubler de pitié le cœur des hommes, tout ce qui est propre à semer l'angoisse et la détresse au sein d'une famille, tout se trouve réuni dans cet évènement funeste.

Pauvre Audouin ! quelles souffrances affreuses lui ont été épargnées, si le coup qui l'a frappé a éteint chez lui la conscience des pertes qu'il éprouvait lui-même et du vide irréparable qu'il allait laisser après lui !

Espérons-le ; car celui que nous pleurons avait un cœur à la hauteur de tous les sentimens que la nature et le devoir auraient commandés à ses alentours, si, depuis long-temps, il n'avait su les acquérir par sa bonté, par son dévoûment profond et sincère au culte de la famille et de l'amitié, par une chaleur d'âme peu commune.

Né le premier d'une famille nombreuse, obligé de lutter long-temps contre ces commencemens pauvres et souvent désespérés qui désolent à leur début tant d'existences scientifiques, Audouin avait, dès ses premiers pas dans la vie sociale, appris à connaître toutes les douleurs, et su montrer tout ce qu'avaient d'inépuisable les ressources du cœur le plus dévoué qui fut jamais.

Il perd une de ses sœurs, laissant après elle une nombreuse famille ; Audouin adopte un de ses enfans, qui, dans sa reconnaissance, le pleure maintenant comme un fils tendre et dévoué.

La fortune modique de ses parens se dérange, et dès-lors Audouin redouble d'efforts ; il recueille sa mère et sa jeune sœur ; et tandis que la première termine ses jours auprès de lui dans l'oubli de ses douleurs, des économies obtenues à l'aide d'un esprit d'ordre et d'une persistance incroyable, lui permettent d'offrir une dot à cette sœur dont le mari était devenu pour lui un véritable frère.

Dans sa famille nombreuse et privée de son chef naturel, trois frères lui restaient, et il devient leur chef, leur appui, leur père. Ses conseils, ses soins, ses secours au besoin, rien ne lui

coûtait pour les guider dans la vie, pour les soutenir dans l'adversité, pour les consoler dans leurs malheurs.

Cette chaleur de cœur instinctive, presque irréfléchie, qui le faisait s'approprier, regarder comme siennes toutes les peines qui pesaient sur ses alentours, peut seule donner la mesure de l'ardeur avec laquelle, d'un autre côté, son intelligence sans cesse éveillée, recueillait toutes les observations propres à éclairer cette partie de l'histoire naturelle dont il avait fait une étude si approfondie, bien plus par goût, par entraînement que par devoir.

Audouin était doué, à un haut degré, du génie de l'observation; sa sagacité était vraiment surprenante, sa patience infatigable; et la nature l'avait doué d'une finesse d'esprit qui donnait un grand charme à sa conversation intime, à celle que réveillent les douces relations de famille.

Ces qualités lui étaient plus nécessaires qu'à personne; car, s'attachant de plus en plus à l'étude des mœurs et de la physiologie des insectes, il avait à observer, à poursuivre, à pénétrer ou à deviner des faits, des actes, des instincts étranges, merveilleux, qui confondent l'esprit du zoologiste, mais qui montrent avec éclat les desseins de la Providence. Dès qu'un fait, une observation l'avaient mis sur la voie, il n'y avait pour notre ami ni paix, ni trêve, ni repos, ni relâche; à tout prix il voulait en connaître, en préciser toutes les circonstances, tous les détails; remonter jusqu'aux antécédens, poursuivre jusqu'aux conséquences, et tracer un tableau fidèle de la vie tout entière de l'insecte obscur qui venait de fixer son attention. Cette ardeur à observer, ce désir, immodéré peut-être, de voir, de connaître, de recueillir, n'étaient d'abord guidés que par une pensée philosophique. Audouin voulait livrer aux méditations des esprits élevés un vaste tableau des mœurs, de la vie entière de ces myriades d'insectes si industrieux, si habiles dans leurs instincts, qui pullulent autour de nous.

Pour donner une idée du développement qu'il avait jugé nécessaire d'accorder à cette étude, il suffira de dire qu'il possédait déjà douze gros volumes in-4° d'observations de cette nature. Toutes les circonstances y sont relatées avec un soin ex-

trême; des dessins exécutés sous ses yeux par une main qui lui était bien chère, accompagnent ces descriptions, dont un grand nombre sont assez complètes pour être livrées au public; devoir triste et doux pourtant que les amis d'Audouin sauront remplir.

Mais tandis que, abandonné à ses goûts d'observation, à ses besoins de travail curieux et ardent, notre collègue ne songeait qu'à satisfaire les instincts de son intelligence, il devenait, sans qu'il s'en doutât peut-être, une des lumières de la plus noble et la plus vaste des industries.

En effet, une calamité vint à frapper les vignes de notre pays, et en particulier celles de la Bourgogne; d'immenses richesses furent anéanties; la désolation régnait dans les pays atteints; les populations réduites à la misère imploraient à-la-fois les secours de la religion, les lumières de la science et la sollicitude de l'administration. Un insecte causait tous ces malheurs : la *pyrale de la vigne*, se développant avec une intensité croissante, dévorait et détruisait, chaque année, dans leur germe, les récoltes des vignerons épouvantés.

Audouin, préparé par ses longues études, eut bientôt fait connaître l'histoire entière de l'insecte, les moyens de l'attaquer à l'état d'œuf, de chenille ou de papillon. Dans plusieurs missions exécutées par les ordres du Ministre de l'agriculture il se mit en rapport avec les populations rurales, et, tout en recueillant les matériaux du magnifique ouvrage qu'il terminait quand la mort l'a frappé, il allait de village en village, exposer dans des leçons simples, expressives et vraiment populaires, les faits que les vignerons avaient tant d'intérêt à connaître, et qui devaient guider leur inexpérience dans leurs efforts contre ce cruel ennemi.

Le succès de cet enseignement, l'empressement avec lequel les conseils généraux votèrent des fonds pour favoriser la publication de ses recherches, le sentiment même de la haute utilité de cette direction nouvelle donnée à ses travaux, exaltèrent encore ce besoin de perfection, base du caractère scientifique de notre ami. Il voulait voir et revoir cent fois les mêmes faits; il voulait se livrer aux dissections les plus minutieuses pour faire connaître la Pyrale dans toutes les conditions de sa

vie; il voulait enfin que des planches d'une exécution irréprochable missent sous les yeux du public tous les faits qu'il avait recueillis.

Le travail ainsi conçu exigeait toutes les forces d'Audouin, dont la santé inspirait déjà quelques inquiétudes ; mais il aurait pu y suffire si la position nouvelle où il venait de se placer ne lui avait imposé d'autres devoirs. Les Termites, qui, originaires d'un pays lointain, sont venus attaquer les constructions de la Rochelle; les insectes qui dévastent les plantations forestières exécutées en Champagne; ceux qui détruisent les arbres dont nos routes sont bordées; ceux qui mettent en péril nos cultures d'oliviers, devinrent à leur tour l'objet de ses études, dans ses missions longues et pénibles.

En même temps, donnant à son enseignement du Muséum une forme nouvelle, il consacra son cours à l'étude des insectes nuisibles à l'agriculture, et il fonda ainsi une branche importante de l'application des sciences naturelles à l'industrie.

Mais cette surexcitation de l'intelligence succédant à une surexcitation des sentimens du cœur, devait avoir des suites funestes. Sous cette double influence, la santé de notre ami allait toujours s'altérant; rien ne pouvait le sauver, sinon un repos antipathique à toutes ses habitudes, et un calme d'esprit qu'une sensibilité trop développée ne lui permettait plus de se donner à volonté.

Comment croire que notre ami, uni à l'une des familles les plus estimées par tous les hommes de science et les plus respectées par tous les hommes de bien; associée à une compagne si digne, par son caractère et ses vertus, d'embellir sa vie et de charmer son existence; heureux dans ses enfans, n'ayant rien à souhaiter pour lui-même; comment croire qu'il mourait le cœur froissé par des chagrins répétés, si on n'avait vu dans tout le cours de sa vie avec quelle vivacité il sentait tout ce qui lui arrivait en bien comme en mal.

Une nouvelle et triste épreuve, ajoutée à bien d'autres, vint le surprendre au milieu d'une mission qu'il accomplissait dans le Midi, il y a quelques semaines. Cruellement frappé déjà, il revint à Paris, et tous ses amis, en le voyant, furent pénétrés des

sentimens les plus tristes. Chaque jour ses forces semblaient s'éteindre; son estomac rejetait les alimens les plus légers; les sources de la vie paraissaient attaquées. Après trois semaines des soins les plus tendres, les plus assidus, et les plus inutiles, hélas! une apoplexie est venue mettre un terme à cette scène de désolation.

Une intelligence trop ardente, un cœur trop prompt à s'abandonner aux émotions les plus nobles et les plus pieuses, voilà le triste secret de cette maladie qui depuis long-temps travaillait sourdement à ravir Audouin à notre amitié. C'est à ces deux causes qu'il faut reporter l'origine de cette attaque soudaine, quoique lentement préparée, qui vient de nous enlever notre collègue, âgé à peine de 44 ans.

Son nom ne s'oubliera pas dans l'histoire de la science, et son souvenir restera profondément gravé dans le cœur de tous ceux qui l'entouraient; car il était du petit nombre de ces hommes qu'on estime d'autant plus qu'on les connaît mieux.

Mais il est temps que je m'arrête. Adieu, Audouin; adieu pour la dernière fois, au nom de ta femme, de tes enfans, de tes frères et de tes amis.

DISCOURS DE M. BLANCHARD,

Aide-naturaliste d'Entomologie au Muséum du Jardin-du-Roi.

Messieurs,

Dans cette circonstance solennelle, dans ce jour d'affliction et de deuil, qu'il me soit permis aussi de venir exprimer les regrets profonds que j'éprouve de la perte du savant distingué qui vient de descendre dans cette tombe. La tendre affection qu'il eut pour moi pendant plusieurs années, la vive reconnaissance que j'en ai toujours eue et que j'en aurai toujours, me font un devoir de lui rendre un dernier hommage en présence de sa dépouille mortelle.

Je ne parlerai point des brillans travaux de M. Audouin, qui lui ont acquis, à si juste titre, un rang élevé dans la science.

Les progrès qu'il a fait faire à l'entomologie, les applications de cette dernière branche de la science à l'agriculture, qui étaient une création de son génie, les succès brillans qu'il avait déjà obtenus, sont maintenant assez appréciés, assez connus des savans, et d'ailleurs leur importance a déjà été mieux exprimée que je n'aurais pu le faire...

M. Audouin, le digne successeur de l'illustre Latreille dans la chaire qu'il occupait au Muséum d'histoire naturelle, entouré d'une famille dont tous les membres se sont illustrés dans les sciences naturelles, et de quelques amis dévoués, croyait avoir acquis le bonheur pour une longue existence; alors qu'il avait constamment en vue celui de ses enfans et d'une épouse chérie, on était bien loin de penser qu'il allait être, si jeune, ravi à ses plus douces affections.

Que le destin est donc cruel dans ses arrêts! Tous les amis de la science déploreront sincèrement une telle perte, et je suis un des premiers à la sentir; cette amitié dont il m'honora pendant long-temps, la vive sollicitude dont il m'entourait, sont un vide immense pour moi. Les bienveillans conseils qu'il me donna et qu'il me donnait chaque jour, pour toutes les circonstances importantes, aux débuts de ma carrière scientifique, ne viendront plus m'aider désormais.

Que ta cendre repose en paix aujourd'hui, mon illustre maître; que ta mémoire soit chérie et honorée.

Reçois les regrets bien sincères, les derniers adieux de ton élève le plus dévoué! Jamais la reconnaissance que je te dois ne s'effacera de mon souvenir.

LISTE

DES TRAVAUX ZOOLIQUES DE J.-V. AUDOUIN.

188.

Anatomie d'une Larve apode, trouvée dans le Bourdon des pierres, par MM. Lachat et Audouin. (Journal de physique, tome LXXXVIII, et Mémoires de la Société d'histoire naturelle de Paris, tome 1, page 329, avec planches.)

1820

Mémoire sur les rapports naturels qui existent entre les appendices masticateurs et locomoteurs des Crustacés, et ceux de même nature chez les Insectes apodes et les Arachnides. (Lu à l'Académie des Sciences, le 7 février 1820, inédit.—Voyez Analyse des travaux de l'Académie pendant 1820, par G. Cuvier.)

Recherches anatomiques sur le thorax des animaux articulés et celui des insectes en particulier. (Lues à l'Académie des Sciences, le 15 mai 1820, et publiées en partie dans les Annales des Sciences naturelles, tome 1.)

1821.

Mémoires sur l'Achlysie, nouveau genre d'Arachnides trachéennes. (Mémoires de la Société d'histoire naturelle, tome 1, page 98, avec planche.)

Observations sur les organes copulateurs mâles des Bourdons. (Annales générales des Sciences physiques, tome VIII, page 285.)

Recherches sur les rapports naturels qui existent entre les Trilobites et les animaux articulés. (Annales générales des Sciences physiques, tome VIII page 233, avec planche.)

1824.

Lettre adressée à M. Arago, président de l'Académie des Sciences sur la génération des Insectes. (Annales des Sciences naturelles, tome II, page 281.)

Recherches anatomiques sur la femelle du Drile jaunâtre et sur le mâle de cette espèce. (Annales des Sciences naturelles, tome II, page 443, avec une planche.)

Note sur une nouvelle espèce d'Achlysie. (Annales des Sciences naturelles, tome II, page 497.)

1826.

Mémoire sur la Nicothoé, animal singulier qui suce le sang des Homards, par MM. Audouin et H. Milne Edwards. (Lu à l'Académie des Sciences, le 13 novembre 1826. — Annales des Sciences naturelles, tome IX, page 345.)

Recherches pour servir à l'histoire naturelle des Cantharides. (Lues à l'Académie, le 3 septembre 1826. — Annales des Sciences naturelles, tome IX, page 31.)

1827.

Recherches anatomiques et physiologiques sur la circulation dans les Crustacés, par MM. Audouin et H. Milne Edwards. (Premier Mémoire, lu à l'Académie des Sciences, le 15 janvier 1827; deuxième Mémoire, lu le 5 février 1837. — Annales des Sciences naturelles, tome XI, pages 283 et 352. avec planches.)

Recherches anatomiques sur le système nerveux des Crustacés, par MM. Audouin et H. Milne Edwards. (Lues à l'Académie des Sciences, en septembre 1828. — Annales des Sciences naturelles, tome XIV, page 75, avec planches.)

1828.

De la respiration aérienne des Crustacés, et des modifications que l'appareil branchial présente dans les Crabes terrestres, par MM. Audouin et H. Milne Edwards. (Lu à l'Académie des Sciences, le 12 mars 1828. — Annales des Sciences naturelles, tome XV, page 85.)

Observations pour servir à l'histoire de la formation des Perles. (Lues à la Socié d'histoire naturelle en juin 1828. — Mémoires du Muséum d'histoire naturelle, tome XVII, avec planche.)

Résumé des recherches sur les animaux sans vertèbres, faites aux îles Chausey, par MM. Audouin et Milne Edwards. (Présenté à l'Académie des Sciences, le 29 septembre 1818. — Annales des Sciences naturelles, t. XV, p. 1.)

1829.

Observations sur l'animal de la Siliquaire. (Communiquées à la Société

Philomatique, le 3 janvier 1829. — Annales des Sciences naturelles (Revue), 1829, page 13.)

Mémoire sur l'animal de la Glycimère et sur l'anatomie de ce Mollusque. (Lu à la Société Philomatique, en mars 1829. — Annales des Sciences naturelles, tome XXVIII, page 331, avec planches.)

Observations sur un Mollusque de la Méditerranée, qui se rapproche beaucoup des Clavagelles. (Communiquées à l'Académie des Sciences, le 29 juin 1829. — Annales des Sciences naturelles (Revue), 1829, page 78.)

Des poils des Annelides, considérés comme moyen de défense, par MM. Audouin et Milne Edwards. (Lu à l'Académie des Sciences, le 19 juillet 1829. — Annales des Sciences naturelles, tome XXI, page 317.)

Description et classification des Annélides de France, par MM. Audouin et Milne Edwards. (Présentées à l'Académie des Sciences, le 19 juillet 1829. — Annales des Sciences naturelles, tome XXI.)

Observations sur divers faits relatifs à l'anatomie des Crustacés et à la découverte de plusieurs Mollusques nouveaux, par MM. Audouin et Milne Edwards. (Lues à l'Académie des Sciences, le 23 novembre 1829. — Annales des Sciences naturelles, tome XXI, page 317.)

1830.

Description de l'Hypponoé, nouveau genre d'Annelides, par MM. Audouin et Milne Edwards. (Annales des Sciences naturelles, tome XX, page 156, avec figures.)

Note sur le système nerveux des Crustacés, par MM. Audouin et Milne Edwards. (Lue à la Société d'histoire naturelle de Paris. — Annales des Sciences naturelles, tome XX, page 181.)

Recherches sur la cause de certaines fissures, qu'on remarque sur les tiges des Poiriers et qu'on attribue à la gelée. (Communiquées à la Société entomologique, le 21 décembre 1836, et publiées par extrait dans le Bulletin de cette Société. — Annales de la Société Entomologique, tome V, page 68.)

1832.

Observations sur l'accouplement entre des individus d'espèces différentes du genre Coccinelle. (Communiquées à la Société Entomologique, le 4 avril 1832. — Annales de la Société Entomologique, tome I, page 232.)

Recherches pour servir à l'histoire naturelle du littoral de la France, ou Recueil de mémoires sur l'anatomie, la physiologie et les mœurs des animaux de nos côtes, par MM. Victor Audouin et Milne Edwards. In-8, avec planches.)

Recherches sur quelques Araignées parasites des genres Ptéropte, Cœris, Argas et Ixode. (Annales des Sciences naturelles, tome xxv, page 401.)

1833.

Observations sur les phénomènes qui précèdent souvent la reproduction des pattes chez certains Crustacés. (Annales de la Société Entomologique, tome 1, page 238.)

Note sur un Insecte fossile, découvert dans le terrain houillier. (Lue à l'Académie des Sciences, le 25 février 1833. — Annales de la Société Entomologique de France, tome II, page 7. — Feuilleton du journal *le Temps*, 27 février 1833.)

Observations sur le nid d'une Araignée, construit en terre et remarquable par une grande perfection de travail. (Annales de la Société entomologique de France, tome 1.)

Observations sur un Insecte coléoptère qui passe une grande partie de sa vie sous la mer. (Lues à l'Académie des Sciences, le 3 juin 1833. — Nouvelles Annales du Muséum d'histoire naturelle, tome III, page 117.)

Observations sur les métamorphoses d'une Chenille du genre Dosithea, et sur les habitudes d'une larve d'Ichneumon, qui vit à ses dépens. (Mémoire lu à la Société Entomologique, le 6 novembre 1833, et publié dans les Annales de cette Société, tome III, page 417, avec planches.)

Observations sur le mode singulier d'accouplement des Cébrions. (Annales de la Société Entomologique de France, tome II.)

Observations sur les coques construites par divers insectes, qui subissent leurs métamorphoses dans la terre. (Communiquées à la Société Entomologique, le 4 décembre 1833. — Annales de la Société Entomologique, page 71.)

Observations sur la faculté que possèdent les Callidies de ronger des corps très durs. (Communiquées à la Société Entomologique, le 18 décembre 1833, et insérées par extrait dans le Bulletin de cette Société. — Annales de la Société Entomologique, tome II, page 76.)

Observations sur la manière de vivre des Larves du Sitaris humeralis. (Communiquées à la Société Entomologique de France, séance du 2 décembre 1835. — Annales de la Société, tome IV).

1835.

Quelques remarques sur le développement excessif de la lèvre inférieure dans les Sténes. (Annales de la Société Entomologique de France, tome IV, page 166.)

Observations sur les altérations que produit le Puceron lanigère sur les pommiers. (Communiquées à la Société Entomologique, le 5 février 1835, et publiées par extrait dans le Bulletin de cette Société. — Annales de la Société Entomologique, tome v, page 9.)

Mémoire sur une larve de Taupin (Elater segetis) *qui exerce de grands ravages dans les champs d'avoine.* (Lu à la Société Entomologique, le 3 juin 1839. — Inédit.)

Analyse de deux calculs d'acide urique, trouvés dans les canaux dits canaux biliaires des Insectes. *Détermination des fonctions de ces canaux.* (Lettre adressée à l'Académie des Sciences, séance du 7 décembre 1835. — Compte rendu des séances, tome 1, page 442. — Annales des Sciences naturelles, deuxième série, tome v, page 129.)

1837.

Observations sur les Podures (Podura nivalis L.), *observés à la surface de la neige dans des Alpes.* (Communiquées à la Société Entomologique de France, séance du 17 février 1836. — Annales de la Société Entomologique (Bulletin), tome 5, page xi.)

Observations sur les Insectes, qui, depuis plusieurs années, dévastent le bois de Vincennes. (Lues à la Société entomologique, le 2 mars 1836, et publiées par extrait dans le Bulletin de cette Société. — Annales de la Société Entomologique, tome v, page xv.)

Observations sur le dépérissement de plusieurs Chênes, qui a eu pour cause la piqûre faite à l'écorce par des milliers d'insectes du genre Coccus. (Communiquées à la Société Entomologique, le 6 avril 1836 et publiées par extrait dans le Bulletin de cette Société. — Annales de la Société Entomologiqua, tome v, page xxix.)

Examen des Crustacés qui habitent les salines de Marignane. (Communiqué à l'Académie des Sciences, dans la séance du 7 novembre 1836. — Compte rendu des séances, tome III, page 545.)

Observations sur les dégâts occasionés par le Ptinus fur dans les farines conservées en magasin. (Communiquées à la Société Entomologique, le 18 novembre 1836, et insérées par extrait dans le Bulletin de cette Société. — Annales de la Société Entomologique; tome v, page lxij.)

Observations sur un genre nouveau d'Entomostracé bivalve, remarquable par son volume. — Lues à la Société Entomologique, le 1er février 1837. — Annales de la Société Entomologique (Bulletin), tome VI, page ix.)

Note sur la demeure d'une Araignée maçonne originaire de l'Amérique du Sud. (Lue à l'Académie des Sciences, séance du 29 mai 1837. — Compte rendu, tome IV, page 853. — Annales des sciences naturelles, avril 1837.)

Observations sur la manière dont les Scolytes nuisent aux arbres forestiers. (Communication verbale, faite à la Société Entomologique, le 14 juin 1837, et publiée par extrait dans les Annales de cette Société, tome VI, Bulletin, page ij.)

Notice sur les ravages causés, dans quelques cantons du Maconais, par la Pyrale de la vigne. (Lue à l'Académie des Sciences, le 4 septembre 1837. — Annales des Sciences naturelles, deuxième série, tome VIII, page 5.)

Considérations nouvelles sur les dégâts occasionés par la Pyrale de la vigne, particulièrement dans la commune d'Argenteuil. (Lues à l'Académie des Sciences, le 25 septembre 1837.—Annales des Sciences naturelles, deuxième série, tome VIII, page 65.)

Remarques sur les dégâts occasionés aux ormes de nos routes par les insectes. (Inédites, mais publiées par extrait dans le grand ouvrage de M. Loudon, intitulé: *Arboretum et fruticetum britannicum*, pages 1387 et suivantes.)

1839.

Observations sur les écailles des ailes de la Pyrale de la vigne et sur la structure de la verge de cet insecte. (Communiquées à la Société Entomologique, le 16 janvier 1839. — Annales de la Société Entomologique, tome VIII, page 111.)

Exposé sommaire de diverses observations recueillies pendant plusieurs années sur les insectes nuisibles à l'agriculture, et présentées à l'Académie des Sciences, le 27 janvier 1838. — Annales des Sciences naturelles, deuxième série, tome IX, page 54.)

Remarques sur la Cochenille du Nopal. (Communiquées à l'Académie des Sciences, le 8 juillet 1839. — Comptes rendus, tome IX, page 69. — Annales de la Société Entomologique, tome VIII, page xlvj.)

Instructions pour un voyage de M. Lefebvre en Abyssinie. (Lues à l'Académie des Sciences, le 4 février 1839.—Comptes rendus, tome VIII, page 160.)

*Observations sur l'*Artemia salina. (Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, tome IX, page 570.)

Observations sur le vol des Cétoines. (Communiquées à la Société Entomologique le 4 décembre 1839. — Annales de la Société Entomologique, tome VIII, page xlviij.)

Deuxième lettre pour servir de matériaux à l'histoire des insectes, contenant des observations sur les mœurs des Odynères, adressée à M. Léon Dufour. (Annales des Sciences naturelles, deuxième série, tome II, page 104, avec figures.)

1840.

Observations sur certains insectes qui attaquent les bois employés dans les constructions. (Annales des Sciences naturelles, deuxième série, tome XIV, page 39. — Comptes rendus, tome X, page 689.)

Sur une éducation, faite à Paris, d'un Ver à soie de la Louisiane (le Bombyx cecropia). (Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, tome II, page 96.)

Remarques sur la phosphorescence de quelques animaux articulés. (Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, tome II, page 747.)

Histoire des insectes nuisibles à la vigne, et particulièrement de la Pyrale, 1 vol. in-4, avec atlas. (La première livraison a paru en 1840 ; la seconde est sous presse, et la publication de l'ouvrage tout entier sera promptement achevé.)

1841.

Description des Crustacés nouveaux ou peu connus, et remarquables par leur organisation, conservés dans la collection du Muséum, par MM. Audouin et Milne Edwards. Premier article, sur le genre Sérole ; second article, sur l'Ecrevisse de Madagascar. (Archives du Muséum, tome II, page 5.)

M. Audouin a publié un grand nombre d'articles entomologiques dans le *Dictionnaire classique d'histoire naturelle*, et a concouru à la rédaction d'un petit *Manuel d'entomologie*, faisant partie de l'Encyclopédie portative. On lui doit aussi l'article *Arachnide*, publié dans le *Cyclopedia of anatomy and Physiology* ; l'article *Abeille* du *Dictionnaire d'histoire naturelle*.

Enfin, il a donné dans le grand ouvrage sur l'*Egypte*, une explication sommaire des planches zoologiques publiées par M. Savigny.

PUBLICATIONS NOUVELLES.

REPORT *on the invertebral Animals*, etc.; *Rapport sur les Animaux sans vertèbres du Massachusets;* publié par ordre de l'Assemblée législative, par M. A. GOULD (1 vol. in-8° avec figures. Cambridge, 1841).

L'état du Massachusets a donné un noble exemple en décrétant les travaux dont M. Gould vient de publier une portion; et les naturalistes apprendront avec plaisir que presque tous les autres états de l'Union-Américaine sont entrés dans la même voie et rassemblent les matériaux nécessaires pour écrire l'histoire naturelle des vastes régions envahies par cette fille cadette de la civilisation Européenne. Le volume que nous avons sous les yeux est consacré presque entièrement aux Mollusques et contient une description détaillée de toutes les espèces observées jusqu'ici dans le Massachusets; plusieurs d'entre elles sont nouvelles et ont été figurées avec soin par l'auteur. La liste des Crustacées, des Annelides et des Radiaires est moins riche en espèces nouvelles, mais offre aussi de l'intérêt.

GENERA *et index methodicus Europæorum Lepidopterorum*, A. J. A. BOISDUVAL (1 vol. in-8°). (1)

Dans ce livre M. Boisduval expose le système de classification qui lui est propre, donne les caractères de tous les genres dans lesquels il répartit les Lépidoptères d'Europe, et indique le nom, la patrie et l'époque d'apparition de chaque espèce.

ZOOLOGIE CLASSIQUE, OU *Histoire naturelle du règne animal*, par M. PONCHET; 2me édit. 2 vol. in-8° avec atlas (2).

Nous ne pourrions sans déroger à la règle toujours suivie dans la rédaction des *Annales*, donner l'analyse d'un traité général de zoologie, et par conséquent

(1) Prix, 5 fr.; chez Roret, éditeur.

(2) Paris, 1841; chez Roret, libraire. Prix, 26 francs.

nous devons nous borner à annoncer ici l'ouvrage que vient de publier M. Ponchet, professeur d'histoire naturelle au muséum de la ville de Rouen. Nous ajouterons cependant que ce Traité, destiné à rendre facile les abords de la science, nous a paru rédigé avec clarté et renferme une masse très considérable de faits importans à connaître pour quiconque veut étudier d'une manière sérieuse l'histoire des animaux. Ce livre pourra aussi être consulté avec fruit par les hommes déjà versés dans la zoologie, car l'auteur y développe la classification de M. de Blainville, méthode qui n'avait pas encore été exposée avec les mêmes détails.

Cours élémentaire *d'Histoire Naturelle à l'usage des collèges et rédigé conformément au programme de l'Université*; par MM. Milne Edwards, Ad. de Jussieu et F. Beudant; *Zoologie*, par M. Milne Edwards, membre de l'Institut, professeur au Muséum d'Histoire naturelle, etc. Deuxième partie (1).

La seconde et dernière partie de ce petit Traité de zoologie vient de paraître et contient des notions sur l'organisation des animaux en général, sur leur classification et sur leur distribution géographique. Pour faciliter l'intelligence du sujet on a intercalé dans le texte un grand nombre de figures gravées avec soin.

(1) Un vol. in-18, chez Fortin-Masson et C^e^. Paris, 1841. (Les deux parties renferment 416 figures.) La *Minéralogie* par M. Beudant est également en vente, et les volumes consacrés à la géologie et à la botanique paraîtront au printemps.

TABLE DES MATIÈRES

CONTENUES DANS CE VOLUME.

ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE.

Leçon sur la *Statique chimique des êtres organisés*, par M. Dumas. . . 33
Recherches expérimentales sur l'alimentation, par M. Magendie 73
Cinquième mémoire sur le *développement des os*, par M. Flourens. . . 232
Sur le *mouvement rotatoire* qu'exécute le vitellus de l'œuf des Mammifères dans son passage à travers l'oviducte, par le Dr T. L. W. Bischoff. 298
Recherches anatomiques sur la *terminaison des nerfs de la matrice*, par M. Jobert (Extrait). 302
Recherches sur l'existence des *glandes tégumentaires* chargées de sécréter la sueur, par M. Giraldès (Extrait). 310
Recherches anatomiques sur la structure des *membranes muqueuses*, par M. Flourens. 349

ANIMAUX VERTÉBRÉS.

Note sur la découverte d'un *squelette* entier de Métaxytherium, par M. Marcel de Serres. 14
Observations faites pendant l'*incubation* d'une femelle du Python à deux raies (*Python bivitatus* Kuhl.) pendant les mois de mai et de juin 1841, par M. Valenciennes. 65
Note sur certains genres de *poissons* et de *reptiles* qu'on ne peut classer d'une manière absolue, comme marins ou d'eau douce, par M. Valenciennes. 110
Mémoire sur la direction de la *circulation* dans le système rénal de Jacobson chez les reptiles, per M. A. de Martino. 305
Description de plusieurs *oiseaux* nouveaux et peu connus, par MM. Hombron et Jacquinot. 312

MOLLUSQUES.

Considérations paléontologiques et géographiques sur la distribution des *Céphalopodes acétabulifères*, par M. Alcide d'Orbigny. 17
Considérations zoologiques, géologiques et géologico-géographiques sur les *Ammonites* du terrain crétacé, par M. Alcide d'Orbigny 113
Note sur le prétendu parasite de l'*Argonauta Argo*, par M. O. G. Costa. 184

Description de quelques *Mollusques*, provenant de la campagne de l'*Astrolabe* et de la *Zélée*, par MM. Hombron et Jacquinot. . . . . 29 et 190
Description de quelques *Mollusques nouveaux*, par R. P. Lesson. . . . 253
Rapport fait à l'Académie des Sciences sur un mémoire de M. Duval Jouve, relatif aux *Bélemnites* des terrains crétacés inférieurs des environs de Castellane, par M. Milne Edwards. 281

ANIMAUX ANNELÉS.

Etudes anatomiques et physiologiques sur une Mouche, dans le but d'éclairer l'histoire des métamorphoses et de la prétendue *circulation des insectes*, par M. Léon Dufour 5
Histoire des métamorphoses des *Cécidomyies du Pin maritime* et du *Peuplier*, par M. Léon Dufour. 257
Note sur la larve du *Pachygaster mesomelas*, insecte de l'ordre des Diptères, par M. Léon Dufour 264
Description de quelques *Annelides nouvelles* du golfe de Naples, par M. O. G. Costa 267
Sur un *Entozoaire*, trouvé dans le sang de la Truite (*Salmo fario*), par M. Valentin 307
Note sur le *Diceras*, par M. Eschricht. 351

ZOOPHYTES.

Observations sur la structure et les fonctions de quelques *Zoophytes*, *Mollusques* et *Crustacés* des côtes de la France, par M. H. Milne Edwards (premier article sur le genre *Equorée*, *Lesueurie*, *Béroé* et *Stéphanomie*). 19
Sur la disposition du *système nerveux* chez les *Echinides* et les *Holothuries*, considérés en général, par M. A. Krohn. 289
Note sur l'appareil vasculaire de la *Velelle*, par M. O. G. Costa. . . . 187
Mémoire sur le développement de la *Medusa aurita* et de la *Cyanea capillata*, par M. Sars. 321

MÉLANGES.

Nécrologie. Discours de MM. Serres, Chevreul, Milne Edwards et Blanchard, sur M. J. V. Audouin; suivis d'une notice bibliographique sur travaux de ce naturaliste. 366
Publications nouvelles. 379



Schinzel

1. EQUOREE VIOLACÉE (Aequorea violacea)





1. L'ESUEURIE VITRÉE (Lesueuria vitrea)



APPAREIL CIRCULATOIRE DE LA LESUERIE

Organisation de la Lesueurie.



Organisation du Zoé de Forskal.



Organisation du Bèrvé de Forskal

Schmelz sc.

Stephanomie tortillée. (Stephanomia contorta.)

1.
c
b
c
c
a
4.
d
c
b
a
3.
2.
9.
5.
6.
7.
8.
b
a
Stéphanomie tortillée.

Stéphanomie tortillée.

Mettle Nairet sc

3.

6.

2

4.

5.

8.

7.

9.

Organisatic de l. Stéphanomie prolifère.

Annelides.



Annélides

1. Lophonate. 2. Prétendu parasyte de l'Argonaute.
3. Système vasculaire de la Vélelle.





A. 1-16. Métamorphoses des Cecidomyies. 17-19. Larve de Pachygaster.

B. Système nerveux des Echinodermes. C. Ovologie.

A. *Entozoaires trouvés dans le Sang.*

B. *Developpement des Meduses.*

47.

50.

48.

49.

51.

52.

53.

54.

56.

55.

Développement d… …lèphes.

Développement des Acalèphes.

00087903

TABLE DES MATIÈRES PAR NOMS D'AUTEURS.

Audouin. — Liste bibliographique de ses travaux, etc. 372
Bischoff. — Sur le mouvement rotatoire qu'exécute le *Vitellus* de l'œuf des mammifères 298
Blanchard. — Discours sur *J. V. Audouin*. 370
Chevreul. — Discours sur *J. V. Audouin*. 360
Costa. — Note sur le prétendu parasite de l'*Argonauta Argo* 104
— Note sur l'appareil vasculaire de la *Velelle* 187
— Description de quelques *Annélides nouvelles* du golfe de Naples 267
Dufour. — Études anatomiques et physiologiques sur une Mouche, dans le but d'éclairer l'histoire des métamorphoses et de la prétendue *circulation des Insectes* 5
— Histoire des métamorphoses des *Cécidomyies du pin maritime* et *du peuplier* 257
— Note sur la larve du *Pachygaster mesomelas*, insecte de l'ordre des Diptères 264
Dumas. — Leçon sur la statique chimique des *êtres organisés* 33
Duval-Jouve. — Sur les *Bélemnites*. Voyez Edwards.
Edwards (H. Milne). — Observations sur les structures et les fonctions de quelques Zoophytes, etc. (*Equorea*, *Lesueurie*, *Beroé* et *Stéphanomie*) des côtes de la France 193
— Rapport sur un Mémoire de M. Duval relatif aux *Bélemnites* des terrains crétacés inférieurs des environs de Castellane 281
— Discours sur *J. V. Audouin* 365
Eschricht. — Note sur le *Dicerus* 361
Flourens. — Cinquième Mémoire sur le *Développement des os* 232
— Recherches sur la structure des *Membranes muqueuses* 349
Gerlachs. — Recherches sur les *glandes tégumentaires* 310
Hombron et Jacquinot. — Description de plusieurs *oiseaux* nouveaux ou peu connus 313
— Description de quelques *Mollusques* provenant de la campagne de l'*Astrolabe* et de *la Zélée* ..... 29 et 190
Jacquinot. — Voyez Hombron.
Jobert. — Recherches sur la terminaison des *Nerfs de la matrice* 302
Krohn. — Sur la disposition du système nerveux chez les *Echinides* et les *Holothuries* 287
Lesson. — Description de quelques *Mollusques* nouveaux 253
Magendie. — Recherches expérimentales sur l'*alimentation* 73
Marcel de Serres. — Note sur la découverte d'un squelette entier de *Metazytherium* 14
Martins. — Mémoire sur la direction de la circulation dans le *système rénal* de Jacobson chez les Reptiles 305
Orbigny [d'] (Alcide). — Considérations paléontologiques et géographiques sur les *Céphalopodes acétabulifères* 17
— Considérations zoologiques et géologico-géographiques sur les *Ammonites* du terrain crétacé 113
Sars. — Mémoire sur le développement de la *Medusa aurita* et de la *Cyanea capillata* 321
Serres. — Discours sur *J. V. Audouin*. 357
Valenciennes. — Observations faites pendant l'incubation d'une femelle du *Pythas* à deux raies 65
— Note sur certains genres de *Poissons* et de *Reptiles* qu'on ne peut classer d'une manière absolue comme marins ou d'eau douce 110
Valentin. — Sur un *Entozoaire* trouvé dans le sang de la truite 303

Digitized with financial assistance from the
Government of Maharashtra
on 18 July, 2018